

**DE HISTORIA  
STIRPIUM  
COMMENTARII  
INSIGNES,  
MAXIMIS...**

---


Leonhart Fuchs, Albrecht  
Meyer, Heinrich Füllmaurer, ...













# DE HISTORIA STIR-

PIVM COMMENTARII INSIGNES, MA-  
XIMIS IMPENSIS ET VIGILIIS ELA-  
BORATI, ADIECTIS EARVNDEN VIVIS PLVSQVA-  
quingentis imaginibus, nunquam antea ad naturæ imitationem artificiosius effi-  
ctis & expressis, [redacted] medico hac

nostra ætate longè clarissimo, autore.

Regiones peregrinas pleriq; alijs alias, sumptu ingenti, studio indefesso, nec sine discrimine vitæ non-  
nunquam, adierunt, ut simplicium materiæ cognoscendæ facultatem compararent sibi:  
eam tibi materiam uniuerfam summo & impensarum & temporis compendio,  
procul discrimine omni, tanquam in uiuo iucundissimoq; uiridario,  
magna cum uoluptate, hinc cognoscere licebit.

Accessit ijs succincta admodum uocum difficilium & obscurarum  
palsim in hoc opere occurrentium explicatio.

Vnà cum quadruplici Indice, quorum primus quidem stirpium nomencla-  
turas græcas, alter latinas, tertius officinis seplasiariorum &  
herbarijs usitatas, quartus germanicas continebit.



Cautum præterea est inuictissimi CAROLI Imperatoris decreto, ne quis  
alius impune usquam locorum hos de stirpium historia com-  
mentarios excudat, iuxta tenorem priuilegij  
antè à nobis euulgati.

BASILEAE, IN OFFICINA ISINGRINIANA,  
ANNO CHRISTI M. D. XLII.

*Domus S. M. Magdalene Urbis*

*pro libris conuicti & famulus famulo  
uenero dilectis dilectis. Saluti*

*J. Angelus fauens inq. Vinctus 1584*



ÆTATIS SVÆ ANNO XLI





ILLVSTRISSIMO ET CHRISTIANISSIMO  
 PRINCIPI AC DOMINO, DOMINO IOACHIMO, SACRI RO-  
 MANI IMPERII ELECTORI, MARCHIONI BRANDENBUR-  
 genſi, Stetinæ, Pomeraniæ, Caſſuborum, Sclauorumq; Duci, Burg-  
 grauio Norimbergenſi, necnon Rugiæ Principi, Domino  
 ſuo longè clementiſſimo, [REDACTED]  
 medicus S. P. D.



VANQVAM uniuerſa medicina nullis non ſeculis glorioſa &  
 diuina ſit habita, Illuſtriſſime ac generoſiſſime PRINCEPS, ta-  
 men in hoc eius ſummo ſplendore ſemper plus laudis, admiratio-  
 nis ac ponderis, ea illius pars quæ naturas ſtirpiũ ueſtigat rima-  
 turq; obtinuit: idq; partim quod uetuſtate, cuius maxima ſemper  
 apud omnes autoritas & ueneratio fuit, eſſet antiquiſſima: par-  
 tim etiam quod iucunda, utilis & neceſſaria eius eſſet cognitio.

Herbaria medici  
 nam multũ admi-  
 rationis & lau-  
 dis ſemper obui-  
 uiſſe.

Nam cum reliquæ propemodum omnes artes, ſimulatque à Deo  
 opt. max. creatus eſt homo, inuentæ ſint, ac ſubinde multorum induſtria auctæ, ſolæ herbæ  
 poſt condita ſtatim elementa, nulloq; adhuc exiſtente homine, unà cum diuinis ſuis uiribus,  
 ita iubente Deo, è terræ latebris eruperũt. Vt hoc nomine nullius rei aut artis inuentio ue-  
 rius quàm medicinæ et ſtirpium, Deo aſſignetur. Quod ſi tamen quiſpiam ijs quæ aſſerui-  
 mus impudenter reclamare audeat, huic quidem Moſen, omnium qui ſcripſerunt uetuſtiſ-  
 ſimum teſtem, utpote ante quem nullum aliũ inuenies ſcriptorem, neq; apud Chaldæos, neq;  
 Aegyptios, neq; Phœnices, neque Græcos, quæ tamen ſunt uetuſtiores nationes, oppone-  
 mus, qui palàm quod nos, in Geſeſi ſua aſſignat. Neq; eſt cur inſolenter & contumelioſe  
 quis illius teſtimoniũ repudiet aut aſpernetur, ut quem nō noſtri modo, ſed & profani quicq;  
 nunquam non admirati ſunt, ſummisq; extulerunt laudibus: quem etiam uenerandum ueridi-  
 cumq; ipſa uetuſtas facit. Siquidem hæc ipſa, Cicerone teſte, proximè ad deos accedit: qua-  
 propter quo propius abeſt ab ortu, et diuina progenie, hoc melius ea quæ uera ſunt retinet.  
 Proinde haud temerè quotquot unquam extiterunt homines, adhiberi fidem uenerandæ ue-  
 tuſtati conſtanter aſſeruerunt. Cæterum non ſolum Moſes, ſed etiam quotquot eum ſequu-  
 ti ſunt poëtæ & hiſtorici, Aegyptia exculi diſciplina, herbarum originem & inuentionem  
 dijs tribuerunt. Græcorum nanque antiquiſſimi poëtæ Homerus & Heſiodus (neque  
 enim quicquam Græci habent quod ante illos citent) aperte ſtirpium diuinam eſſe originem  
 teſtantur. Hic quidem dum homines ignorare tradit, quantũ in Malua & Aſphodelo re-  
 conditum ſit. Nam ijs uerbis ſubobſcurè admodum herbarum uires in intimis earundem me-  
 dullis reconditas eſſe, hominibusq; ignotas, nec niſi dijs ipſis, qui illarũ ſunt inuectores, per-  
 ſpectas innuit. Ille uerò, dum Moly herbæ laudatiſſimæ, & contra Circes ueneficia mirè  
 efficaciſ, inuentionem Mercurio deorum apparitori acceptam refert, hominibusq; inuentu  
 difficilem, dijs uerò nō item, eſſe ſcribit. Quinetiam in ſuis Theriacis Nicander Panaces,  
 quod ipſo ſtatim nomine morborũ omnium remedia pollicetur, à dijs ipſis inuentũ eſſe, huicq;  
 adeò Chironium, Aſclepium & Herculeum appellatum, memoriæ prodidit. Quod græ-  
 ci poëtæ particulatim atq; de ſingulis ferè generibus aſſeruerunt, hoc inter Latinos Oui-  
 dius, quem unum pro multis nunc produxiſſe teſtem ſatis ſit, in uniuerſum de omnibus, dum  
 ita loquentem de ſciſſo Apollinem fingit, aſſirmare uoluit, dicens:

Stirpium origo  
 diuina.

Moſes ſcriptor  
 omnium antiquiſ-  
 ſimus.

Vetuſtatis  
 autoritas.

Homerus & He-  
 ſiodus Græcorũ  
 ſcriptores anti-  
 quiſſimi.

Inuentum medicina meum eſt, opifexq; per orbem

Dicor, & herbarum ſubiecta potentia nobis.

Quare nunc omnibus perſpicuum eſſe arbitror ſi antiquitatem diuinamq; originem ſpecte-  
 mus, barbaria medicina nihil uſquam eſſe laudabilius, ſplendidius, honorificentius. Quod



Herbarie medi-  
cine utilitas.

si uerò utilitatis magnitudinem, quam hæc ipsa hominibus affert, animo expendas, quid ea præstantius sit non uideo. Nam nulla alia re magis bonam corporis ualitudinem conseruamus, tuemur, sustentamus, quam stirpium omnis generis subsidio. Valetudine autem bona nihil neque melius, neque præstantius, neque optabilius existit, utpote sine qua nec potētia, nec diuitiæ, nec ullæ aliæ res suauēs, et usui esse possunt: ut præclare ab Hippoc. nostro dictū sit, ὁ δὲ ὁ φελός ἐστιν ὅτε χαμᾶτωρ, ὅτε σάμαλος, ὅτε τ' ἄλλω ὁ δ' ἐνός, ἅ τ' οὖν τῆς ὑγιείας.

Herbarie medi-  
cine necessitas.

Neque præsentem tantum ualitudinem herbarum beneficio tuemur, sed et labefactam et conuulsam ijs ipsis corrigimus, emendamus ac restituimus. Vt enim apes ex illarum floribus materiam colligunt unde mel conflant, ita nos ex immensa earundem uarietate ad-

Iucunditæ cogni-  
tionis stirpium.

uersus morbos remedia decerpimus. Porro cum innumeri ferè sint morbi qui nobis à fronte, tergo, lateribus insidias tendunt, summè necessariam quoque esse exquisitam stirpium notitiam nemini obscurum fore, sed constare inter omnes puto. Neque enim sine diuinis illarum uiribus ut à nobis propulsemus morbos licebit. Quantum uerò iucunditatis ac delectationis habeat stirpium cognitio, non est cur pluribus exponam, cum nemo sit qui nesciat nihil esse in hac uita iucundius, delectabiliusque, quam siluas, montes, campos, uarijs ijsque elegantissimis flosculis ac herbis redimitos et ornatos peragrarè, intentisque oculis intueri. Voluptatem uerò ac iucunditatem illam non parum auget, si earundem facultatum ac uirium accedat notitia. Neque enim minor in cognoscendo, quam aspiciendo suauitas et delectatio. Quare cum ueteres illi diuinam esse stirpium originem, easque in tanta uitæ humanæ fragilitate non modò usum et fructum immensum habere, sed et summè necessarias esse animaduertent, non solum de hac parte medicinæ honorifice sentire coeperunt, uerum etiam nihil in ipsa natura quod suspicerent dignius, aut quod inuestigarent et perscrutarentur pulchrius, aut quod cognoscerent iucundius esse duxerunt. Proinde se totos et animo et corpore in earundem inquisitionem atque indagationem contulerunt. Et hoc studio uestigandarum stirpium non plebei tantum et abiectæ sortis homines tenebantur, sed et ex omni genere hominum potentia, diuitijs, prudentia et doctrina præstantes. Quanto enim illi generis nobilitate clariores, prudentiaque et doctrina præstantiores fuerunt, atque adeò de hac parte medicinæ incorruptius indicare potuerunt, tanto magis ad sectandum hoc

Reges olim stu-  
dio perscrutanda-  
rum stirpium mi-  
rifice occupati.

studium animi illorum sunt excitati ac inflammati. Hinc est quod plerique Reges, potentia et prudentia excellentes, neglecto interim regij fastigij honore, cum toto regie dignitatis satellitio, per uastas multarum regionum solitudines ire, inuia montium iuga peragrarè, lacus inaccessos lustrare, abditas terræ fibras scrutari, biantes uallium sequi specus, minime grauati sunt. Quod ut facerent, non tam eos immensa iucunditas et uoluptas, quibus tum fruebantur quam uaria loca uarijs floribus ac herbis ornata obibant, inuitauit, quam ut de humano genere, adeoque tota posteritate optimè mererentur, et immortalè nomen adipiscerentur, ardor quidam impulit. Quare de illis quas quisque inuenit sibi asserendis non minus acriter et strenuè, quam de imperio, aut uita ipsa, qua nihil charius, dimicauerunt: id quod uerum esse multarum stirpium nomina testantur. Neque enim Polemonia herba alia de causa etiam Philetæria, teste Plinio, dicta est, quam propter certamen inuentionis regum.

Gentius Illyrio-  
rum rex.

Nonne Gentiana etiam ipsa, cui à Gentio Illyriorum rege eius inuentore nomen inditum est, satis docet quam ille studiosus herbarum fuerit: utpote quem etiam inter media arma earundem indagationi operam nauare, et Gentianæ rimari facultates non piguit, idque nullo alio nomine, nisi ut hac ratione memoriam sibi perpetuam ac nunquam in-

Lysimachus Ma-  
cedonum rex.

termorituram conciliaret. Porro Lysimachum Macedonum regem non tam animi magnitudo uiriumque gloria nobilitauit, quam Lysimachia herba, quæ in hunc usque diem nomen eius retinet. Mithridates sanè, Ponti et Parthorum rex maximus, ne uiginti quidem duarum

Mythridates  
Ponti rex.

linguarum.



linguarnm peritia, uarijsq; hinc inde uictorijs nomen sibi parasse contentus fuit : sed ut clarior celebriorq; euaderet, in eam quoque curam fortiter incubuit, ut omnium simplicium medicamentorum, eorum maxime quæ letalibus aduersantur, exactam notitiam nancisceretur. Quàm uerò intentum in eam rem animum habuerit, quantumq; hinc laudis & gloriæ consequutus sit, nihil attinet dicere, quod idipsum abundè satis medicamentum hoc quod in bodiurnum usque diem nomen eius retinet, ac Mithridaticum appellatur, quodq; adhuc hodie ad arcenda uenena à medicis usurpatur, declaret. Et quidem Scordium herba, quæ non alia de causa, Crateia herbario autore, nominata Mithridatia est, quàm studiosus ille fuerit stirpium satis etiam monstrat. Prædictis iam regibus nobis adiiciendus uenit omnium quotquot fuerunt unquam regum sapientissimus opulentissimusq; Solomon, ad cuius immensas laudes, quas illi sacra Bibliorum historia defert, hoc ueluti maximum, & quod reliqua omnia superare uidetur, accedit, quod de singulis stirpibus sapientissimè differere potuerit. Præterea primus Pergami rex Attalus, ut testis est grauiissimus autor Galenus, omnis generis medicamentorum studiosissimus fuit, ita ut multas ac uarias compositiones, quæ adhuc extant, & nominis eius inscriptionem retinent, construxerit. Euax etiam Arabum rex tanto studio inquirendarum stirpium flagrasse dicitur, ut de simplicium effectibus ad Neronem scripserit. Iuba denique Mauritanie rex herbarum studio quàm regno memorabilior factus est. Quantam enim huic Euphorbium herba, quam ille à se inuentam medici sui nomine appellauit, mirisq; laudibus priuatim ei dicato uolumine celebrauit, pepererit, neminem esse puto qui ignoret. Cæterum quum sequentibus subinde annis Romanorum reges & Imperatores propter publicas, easq; uarias & maximas, occupationes, indagandis stirpibus operam nauare non possent, hoc saltem studiose & diligenter curarunt, quod idem Galenus testatur, ut uarijs in locis, maximis quidem impensis, herbarios alerent : idq; nulla alia de causa, quàm ut studium hoc cognoscendarum stirpium, hominibus non minus utile quàm necessarium, fouerent, & ab interitu conseruarent. Verum relictis nunc regibus, alijsq; multis insignibus heroibus, Teucro Aiæis fratre, qui Teucro nomen dedit: Achille, à quo Millefolia Achilleia cognominata est: Chirone Centauro, à quo Centauriū nomen accepit: Hercule, qui Hyoscyamū inuenisse traditur: quantum operæ ac studij in perquirendis omnis generis stirpibus ueteres tum Greci tum Latini poëtæ & philosophi posuerint, breuiter perstringemus. Aiqui ex compluribus paucos aliquot, eosq; optimos produxisse sufficiat. Plinius quidem inter Græcos antiquissimum poëtam Orpheum (nemo enim ante hunc apud illos memoratur, siquidem ante omnes alios poëtas & philosophos floruit) de herbis aliqua, curiosius etiam, prodidisse, & post eum Musæum & Hesiodū Polium herbam miris laudibus celebraisse scribit. Præterea rerum humanarū peritissimū uatem Homerum curam cognoscendarū stirpium magni fecisse, nec à se reiecissee aut aspernatum fuisse, Nepenthe, Moly, Lotos, & Alcinoi hortus satis ostendunt. Virgilium autem, Latinorū poëtarū principem, stirpium fuisse peritissimū, tam crebræ earundem in suis uersibus mentiones palam testantur. Quare nō raro etiā interpretibus grammaticis faceßit negociū, illum miseris modis enarrantibus. Quàm uerò studiosus herbarū fuerit Ouidius, nemini nō notū est, nisi qui illius carmina introspicere dedignatus est. Philosophos autem herbariam medicinā non neglexisse aut contempsisse hinc colligitur, quod literis proditum sit Pythagoram, clarum sapientia uirum, integro uolumine Bulbos celebraisse, perinde atq; Chrysippum Brassicam, Zenonem Capparin: quod facere tanti philosophi nunq; in animum induxissent, si nō optimè de hac medicinæ parte sensissent. Aristotlem præterea, summū certè philosophum, aliquot de stirpibus libros reliquisse nemo nescit: unde quanti fecerit herbarum cognitionem, tam excellentis ingenij uir, quicuis cōiecturam fa-

Solomon rex  
Hebræorum.Attalus Per-  
gamix rex.Euax Ara-  
bium rex.Iuba Mauri-  
taniæ rex.Cæsares Roma-  
ni suis impensis  
herbarios aluerePoëtarū & phi-  
losophorū in ue-  
stigandis stirpi-  
bus studium.

Orpheus.

Musæus.  
Hesiodus.  
Homerus.

Virgilius.

Ouidius.

Pythagoras.

Chrysippus.

Zeno.

Aristoteles.



Quid ueteres stu-  
dio inquirendarū  
stirpium consecu-  
ti sint.

A principib her-  
barij alendi, aut  
sumptus ad inqui-  
redas herbas sup-  
peditandi.

Medici nostri tē-  
poris à studio in-  
dagandarum her-  
barū abhorrent.

Herbariam me-  
dicinam hodie in  
manibus esse im-  
peritis plebis.

cit. Sed desino tandem illustrium uirorum qui de herbaria medicina honorificentissimè & senserunt & scripserunt, texere catalogum, ubi prius unam etiam è præclaris mulieribus, Artemisiam Mausoli Cariae reguli uxorem, quæ ab hoc indagandarum stirpium studio non abhorruit, illis adiecero. Quàm enim incredibili quodam ardore ac desiderio cognoscendarum herbarum hæc ipsa flagrarit, Artemisia stirps, quæ in hunc usque diem nomen eius retinet, cum antea Parthenis sit appellata, loquitur. Ut nunc omnibus perspicuum sit, omnis & ætatis & generis homines, eosq; nobilitate ac doctrina præstantissimos, non solum de herbaria medicina præclarè sensisse, uerum etiam ut illam perdiscerent plurimum operæ, studij, diligentiae & laboris contulisse. Atqui cognoscere fortassis à nobis quispiam huic parti medicinae parum æquus desiderabit, quid tandem illi per nos longo ordine commorati, hoc studio inquirendarum stirpium cōsecuti sint? Rem sanè longè præstantissimam, nullisq; neq; diuitijs, neque uoluptatibus postponendam, memoriam scilicet apud posteros immortalem ac sempiternam. Tandiu enim firma & illabefacta eorum manebit memoria, quandiu tellus fida & optima rerum parens Gentianam, Lysimachiam, Scordium, Eupatorium, Euphorbium, Clymenon, Polemoniam, et id genus alias stirpes quibus præclarissimi morum regum indita sunt nomina, producet. Viuent itaque hodie grata hominum memoria, illorum nomina, alioqui statim simulatq; è uiuis excessissent cum ipsis peritura, nisi illa stirpibus indita post se reliquissent. Et à nobis certè meritò hoc omniū longè præclarissimum ac saluberrimum tantorum regum & doctissimorum hominum studium atque certamen laudibus ad cælum usque extollitur, quoties quàm optimis donis uitam nostram excoluerint, & quàm de nobis præclarè sint meriti recordamur. Quare uerissime Plinius dixit: Singula quosdam inuenta deorum numero addiderunt, omniumq; uitam clariorem fecerunt cognominibus herbarum, tam benignè gratiam memoria referente. Quod ubi mecum reputo, mirari subit cur nemo propemodum principum nostrorum, ueterum regum & heroum exemplum imitari studeat, atque iuuare saltem eos qui hoc studio indagandarum herbarum tenentur, in animum inducat. Scio quidem eos molestis & operosis negocijs sic implicitos, modò Spartam quæ illis obtigit, probè tueri uelint, ut inquirendis stirpibus operam dare ipsi non possint. Attamen illorum nihilominus erat hortos optimis, & à longè etiam petitis herbis consitos construere, atque qui easdem subinde colant, augeant & conseruent herbarios, quod etiam olim Cæsares Romanos fecisse suprà cōmemorauimus, suis impensis alere. Idq; ea potissimum de causa, quod nulla sit res unde sibi plus laudis & gloriæ aucupari ualeant, aut de tota posteritate melius mereri, quàm si hac ratione stirpium notitiam conseruare studuerint. Optarem itaque aliquam saltem partem, eamq; planè minimam suorum sumptuum, quos magna ex parte in res fluxiles ac momentaneas, ne quid grauius dicam, collocant, ad illustrandam hanc medicinae partem, quæ nunc quasi caput suum è profundis tenebris exerit, ponerent. Sed prò Deum immortalem, quid mirum reges & principes hoc studium indagandarum stirpium non admodum respicere, cum nostræ ætatis etiam medici sic ab eo abhorreant, ut inter centum uix unum qui pauculas saltem herbas exactè cognititas habeat, reperire liceat. Quod quidem alia de causa fieri nō iudico, quàm quod eam medicinae partem quæ stirpium cognitionem tradit, ad se pertinere haud putent: aut uiliorem inhonestioremq; esse censeant, quàm ut ad se pertinere patiantur. Dignitati enim existimationiq; suæ non parum detractum iri arbitrantur, si ea tractent, quorum se plasiarij & quidam alij, si dijs placet, sibi iam cognitionem uendicarunt. Hinc est quod totam hanc curam in pharmacopolas, indoctum mehercule magna ex parte hominum genus, & in stultas mireq; superstitionosas mulierculas reijciant. Adeò ut nostra tempestate uniuersa herbaria medicina in manibus sit rusticarū & uetularum mulierū, ineruditorumq; hominū, qui errorem sub-



rem subinde errore cumulant. Merito itaq; reprehensionem & obiurgationē nostram multorumq; aliorum bonorū uirorum incurrunt medici, qui hanc cognoscendarū stirpium curam funditus repudiant, aspernantur, & pro nihilo putant. Quis enim æquo animo ferret hoc si bi studium ignominiosum existimare, quod olim regibus, Græcorumq; ducibus, adde etiam poëtis & philosophis, fuisse longè honorificentissimū demonstrauimus? Quod si uerò quispiam secum etiam reputet quā utilis quāq; necessaria medicis sit hæc herbarū notitia, longè maxima castigatione & obiurgatione dignos censebit. Nam nemo illorum morbis rectè mederi potest, aut medicamenta componere, aut antea inuentis commodè & opportunè uti, nisi simplicium exactam habeat notitiam. Id quum omnibus sit manifestissimū, cur pluribus demonstramus nihil opus est. Ad hanc autem consequendam notitiam non satis est semel aut bis tēre illorum discrimina, Galeno etiam nostro teste, sed frequenter admodum inspexisse. Proinde cum ueteres olim cum philosophi tum medici & τὸ ἴδιον propriamq; inspectionem ad exquisitam stirpium notitiam consequendam necessariam esse perspectum haberent, harum inquirendarum munus non rudibus & imperitis seplastiarijs, non horum ministris æquè imperitis, aut multò rudioribus, non etiam stultæ & ineptæ plebi permiserunt: sed ad se potius pertinere hanc prouinciam arbitrati, non unius & item alterius tantum regionis tractus, sed magnam orbis partem peragrarunt, ut non solum suis ipsorū oculis omnis generis herbas contuerentur, uerum etiam manibus contrectarent, degustarentq; ut scilicet hac ratione non tantum earundem imagines, sed & uires planè addicerent. Sic sanè Theophrastus, qui nobis nouem de historia libros certè præstantissimos reliquit, multas peragrasse prouincias constat: neq; enim aliàs tam exquisita ratione singulas stirpium differentias, quas diuersarum regionum ratione habent, tradere potuisset. Dioscorides quoq; ut metipse tes latur, incredibili quodam cognoscendarum herbarum desiderio ductus, multa admodum in militari labore loca perlustrauit, tantam hinc consecutus peritiam stirpium, ut post se de iisdem, Galeno etiam teste, absolutissimos reliquerit libros, quos multi hodie herbariæ medicinæ studiosi, magno cum fructu, non tantum assidue domi legunt, sed & secum nunquam non circumferunt. Prætereo nunc lubens Crateiam, Dionysium, Methrodorum, utpote quorum scripta non extent, temporumq; iniuria perierint. Omitto etiam Plinium Secundum, diuini illius operis De mundi historia autorem, quem omnes plurimū operæ non solum in hoc cognoscendarum stirpium, uerum etiam multarum aliarum rerum studio posuissent, ac tandem mortem oppetisse sciunt. Quā uarias autem terræ regiones ut medicam materiam exactè cognosceret, uitamq; mortalium iuuaret, Galenus lustrauerit, nemo qui libros eius paulò diligentius legit, ignorare potest. Nam metallorum gratia in Cyprum, quæ ibidem multa sunt: bituminis & aliorum quorundam causa, in Syriam Palestinam nauigauit. Quantum uerò studij & operæ in sola dignoscenda terra Lemnia posuerit, ijs qui nauigationis suæ descriptionem legerunt notum est. Hæc longius commemorauimus nulla alia de causa, quā ut hinc nostri seculi medici discerent, quantum ipsi à ueterum abessent diligentia: quos maximo etiam rerum suarum, adeoq; corporis dispendio, in densissimis syluis & nemoribus oberrare, altissimāq; montium iuga conscendere ut exactam stirpium notitiam consequerentur, haud piguit: & ut uel tantorum uirorū exemplo tandem conuicti, stirpium cognoscendarū studium ad se pertinere credant. Quod si tamen ijs exemplis parum mouentur, ad hanc suscipiendam curam uel pudor eos impellat adigatq;. Nemo enim est cæterorū artificum qui sibi nō ignominiosissimū esse duceret, si suæ artis instrumenta & materiā quā quotidie manibus cōtreclat, ignorare iudicaretur. Cum itaq; in manuarijs artibus omnes eum ridendū esse artificem existiment, qui artis eius quam proficitur materiā nō satis perspectā habeat: multò certè maiori cachinno dignus erit medicus, qui suæ artis materias,

Stirpium notitia  
medicis tum uti-  
lis tum necessaria

Veterum medi-  
corum circa sim-  
plicium medica-  
mentorum cogni-  
tionem studium.

Theophrastus.

Dioscorides.

Plinius Sec-  
undus.

Galenus.

Medicū ignora-  
re materiā me-  
dicam, ridiculū.



atq; adeò sanandi instrumenta, ignorat. Et detestanda quidem si nullo alio, hoc tamen potissimum nomine, hæc medicorum quorundam inertia, desidia, socordia, & negligentia, quod effecerit ut propemodum omnis stirpium cognitio extincta & funditus deleta fuerit. Atque actum planè de medicina herbaria fuisset, nisi aliquot bonos, eruditos, & diligentes viros Deus excusasset, qui hoc studium quod iam ad internitionem tendebat, & propè totum oblitteratum erat, maximis & uigilijs & laboribus iuuare, atq; ab interitu uindicare uoluissent. Inter eos autem qui strenuè in hanc curam incubuerunt, mea quidem sententia primas tenet genere & eruditione clarus Hermolaus Barbarus, qui primus omnium, quod sciam, nostra ætate facinus longè pulcherrimū aggredi, eamq; medicinæ partem neutiq; contemnendam, à tenebris in lucem reuocare ausus est. Nam initio suscepti illius laboris præstantissimū, atq; multis tam seculis cōprobatū medicæ materiæ scriptorē Dioscoridem Latio donauit. Quo feliciter peracto labore, Corollarium adiecit, quo nihil eruditius, nihil copiosius, nihil deniq; magis uarium post Plinium in latina lingua editum esse docti unanimi sententia fatentur. Quicquid enim à Theophrasto, Aithenæo, Oribasio, Aëtio, Paulo, Polluce, Plinio alijsq; cum Græcis tum Latinis eruditis admodum hominibus, quos nominare nunc nihil attinet, sparsim notatū est, hoc totum in Corollario suo, uno quasi fasce, complexus est Barbarus. Et quidem huius celeberrimi uiri studiū eò magis à nobis prædicandum esse censeo, quod ipse primus, quæ uis professione medicus nō esset, securè interim in utramuis aurem dormitantibus medicis, nutanti tum breuiq; casuræ rei herbariæ auxiliares manus porrigere dignatus sit. Incōparabilis huius uiri exemplum ac institutū, paulò post imitatus est Ioannes Ruellius Gallus, homo supra linguarū peritiā nō uulgari rerum cognitione præditus: is enim pari conatu ac studio cum prodigiosis monstris congressurus, eum primū nobis autorem latinitate donatum exhibuit, unde ueram exquisitamq; materiæ medicæ cognitionem petere liceret, ut scilicet proscriptis & explosis tandem Auicennæ & aliorum Arabum insulis, erroribusq; nō leuibus refertis de re herbaria placuis, è purissimo fonte Dioscoride stirpium notitiam hauriremus. Certarunt itaq; inter se hi duo insignes uiri uter alterū uinceret: bone stum sanè, Hesiodo & Galeno nostris testibus, certamen, è quo uterq; immortalem est consecutus gloriam. Cæterum cum Ruellius ueteres atq; adeò legitimas stirpium nomenclaturas, quibus eas Dioscorides appellauit, accessione nouarū, quas nobis magna ex parte monachorū & muliercularū superslitio peperit, obscuratas nunc & oblitteratas esse, neq; etiam singulas stirpes ab uno Dioscoride descriptas animaduerneret, paucis abhinc annis opus, ut apparet, multis uigilijs adornatū, cui de stirpium natura titulum indidit, edere uoluit. In quo sanè quicquid usquam ferè apud Theophrastum, Plinium, Galenum, aliosq; ueteres & recentes probatos autores de stirpibus scriptum est, complecti magno studio annixus est. Quare à plerisq; hodie uir ille bonus male audit, eò quod complura admodum ad uerbum aliunde, è Plinio præsertim ac Hermolai Corollario, transcripta, suppressis eorundem nominibus, in suos transulerit cōmentarios: quasi uerò illi quibus hoc suum tuetur factum, modò supersites esset, ueterum eorumq; probatissimorū scriptorum exempla desissent. Aique ut mortuo iam nōnihil patrocinemur, unum tantū cōmemorabimus. Neminè esse arbitramur qui nesciat Plinium uastum hoc suum & immortalitate dignum de historia mundi opus ex antiquissimis ac uarijs autoribus contexuisse: is tamen non quouis in loco eorum unde singula descripsit nominatim mentionē facit, cōtentus id ipsum semel fecisse. Quare cum in Plinio baud culpetur quod non nisi semel, libro nimirum primo, eorum unde sua transcripsit meminerit, qui sit ut hoc ipsum Ruellio uitio detur? cum tamen constet hunc in præfatione eius operis ingenuè fateri, ea quæ sparsim à ueteribus tradita sunt, se ueluti in compendium digessisse, atq; usque adeo ab ijs adiutum esse, ut eis penè totum acceptū referat.

Proinde



Proinde cum is aliorum scriptis comode usus sit, eaque quasi in ordinem digesserit, atque adeo sua fecerit, non erat cur passim autorum unde singula mutuauerat nomina, maximo legentium fastidio apponeret. De ijs itaque Ruellij laboribus alij statuam ac iudicent quicquid uelint: scio enim quam disparia, et magna ex parte iniqua, multorum de ijs ipsis sint iudicia: me certe non pudebit aperte fateri, mihi eius commentarios multum profuisse. Quamuis nec illud nobis dissimulandum sit, nos non raro ab illo dissentire, tantum abest ut quispiam me in uniuersum omnia quae in ijs libris de natura stirpium decernit, probare existimet. Vicinque autem multa sint in Ruellij commentarijs quae non probemus, debet tamen nihilominus eius studium nobis esse longe gratissimum, ut qui in tanta rei herbariae caligine plus tamen omnibus qui hunc antecesserunt praestiterit. Sed de Ruellio satis, aut certe plura quam oportuerit diximus, praesertim cum non desint suae gentis homines tum eruditi tum eloquentes, qui illi multo rectius quam ego patrocinari in hac causa possint. Ad Marcellum igitur Virgilium Florentinum, qui post Ruellium hanc medicinae partem illustrare aggressus est, accedamus. Quamuis uero ille non magnam admodum herbarum notitiam habuisse uideatur, ut qui professione medicus non fuerit, eoque tempore quo densissimis tenebris res herbaria obducta iacuit sua ediderit, tamen quia complura obscura et deprauata Dioscoridis loca emendauit, et pristino nitore restituit, debet uel hoc saltem nomine illius studium et conatus nobis probari, cum nihil aequae ad recte intelligendum Dioscoridem aliosque autores conducatur, ac exemplariorum integritas et puritas. Quod uero nonnunquam a uerbis Dioscoridis paulo longius recesserit, nec eorum legitimum et genuinum sensum affecutus fuerit, id illi uitium cum ceteris interpretibus commune est; utpote qui non raro Plinij magis quam Dioscoridis sensum exprimere ac sequi studuerint. Quod uero nonnulli Marcellum Dioscoridis interpretem plane grammaticum esse iudicant, non magnopere reprehendo. Sed quod adieciit eum in hac arte non satis tritum, hoc faciunt more suo, ne non palam omnibus insanire ac furere uideantur, dum ita sinistre ac temere de hoc uiro multusque alijs de literis et re medica optimè meritis iudicare audent. Ego uero omni asseueratione affirmare nihil metuo, Marcellum in tanta etiam rerum omnium caligine, plures herbas cognitatas habuisse, magisque grammaticum fuisse, quam illi hodie, qui tam impudenter de fama illius et aliorum eruditorum hominum detrabere non ueremur. Verum omisissis nunc exteris, ad Germanos nostros, uiros aliquot bonos et eruditos, qui editis scriptis medicinae herbariae lucem afferre, et eam quasi in integrum restituere conati sunt, ueniamus, ut ne eos etiam merita defraudemus laude. Inter hos autem primus fuit Otto Brunfelsius, uir quidem eruditus et plane ἑκδοτικός, qui primum latino, dein etiam germanico scripto herbariam medicinam iuuare et illustrare conatus est. Quamuis autem multa in illius scriptis desiderantur, utpote quod descriptiones picturis passim non respondeant, et quod paucas admodum, et uulgares tantum stirpes protulerit, quodque saepe non suis et legitimis nominibus appellauerit herbas: nihilominus tamen ut hunc omnes certatim laudibus efferrant uel unica hac de causa meritis est, quod ipse primus omnium rectam pingendarum stirpium rationem denuo in Germaniam nostram inuexerit, alijsque hanc imitandi occasionem praebuerit. Cetera quae in eo desiderantur, cum illa praestare non potuerit multas ob causas, potissimum uero propter crebras ac multas typographi molestias, qui importune insistebat, editionemque ut metipse in aliquo suarum uigiliarum loco fatetur, maturabat, ueniam merentur. Quid multa? cum constet Brunfelsium primum fuisse in Germania nostra qui herbariam medicinam propemodum extinctam et crassissimis eruere tenebris attentauerit, certe hoc nomine, quamquam non omnia ex sententia ceciderint, uenia dignissimus est: nam etiam iuxta prouerbum, οὐ γυνώμεν τὸ πρωτοπείρω. Praeterea cum huic optimo uiro nihil optatius fuerit, quam ut posteritati plurimum prodesset, et qui bonique faciendos studiosis omnibus

Marcellus Virgilius Florentinus.

Defenditur ab iniuria Marcellus.

Otto Brunfelsius



eius labores, qualescunq; sunt, censeo. Brunfelsio in hoc studio illustrandæ rei herbariæ  
Euricius Cordus successit Euricius Cordus, uir præter singularem poetices, aliarumq; disciplinarum eruditio-  
nem, integerrimus ac diligentissimus. Quantum autem rei herbariæ uindicandæ ab interitu  
profuerit, Botanologicon quod ille posteritati suæ diligentia testem reliquit, abundè testa-  
tur, aded ut nunc nostra cõmendatione huic non opus sit. Hoc tamen in præsentia dicere uo-  
lui, uirum hunc longiori uita fuisse dignissimum, ut qui opera sua instaurandæ herbariæ me-  
dicinæ plurimum momenti adferre potuisset. Sed quod parenti per ipsa fata non fuit inte-  
Valerius Cordus grum perficere, hoc filius, quem post se reliquit, Valerius Cordus, optimæ spei iuuenis, et  
incredibili quodam cognoscendarum stirpium studio amoreq; flagrans, nisi dii quoq; quod lon-  
gè absit, illi uitam longiorè inuideant, cumulatè præstabit. Cum enim nunc paternis uestigijs  
strenuè insistat, nõ est cur uelit quasi in medio cursu gradum sistere. Post Euricium Cor-  
Hieronymus Tragus. dum in hanc arenam descendit Hieronymus Tragus, qui anno abhinc altero, cum iam propè-  
modum hos cõmentarios absolueramus, germanicū scriptum bene longum de stirpibus publi-  
cauit. Cuius quidem conatus mihi ualde probantur. Nam etsi mihi cum eo nulla intercedit fa-  
miliaritas, apparet tamen in hoc homine mira quædam in inquirendis stirpibus diligentia.  
Et quidem hunc non esse imperitum herbarum, earundem descriptiones quas affert palam  
testantur. Eiusmodi enim magna ex parte sunt, ut oculis suis inspexisse huc herbas quas pin-  
git abundè demonstrent. Atq; hoc quidem nomine laudem meritus est nõ uulgarem, potuissetq;  
multorum euitare reprehensionē, nisi singulis ferè herbis sua ex Dioscoride nomina ac-  
cerfere uoluisset: quasi uerò Dioscorides omnium regionum stirpes descripsisset, cognitassetq;  
habuisset, cum tamen cõstet quamuis propèmodū terram suas priuatim ferre herbas. Dum  
itaq; omnibus stirpibus sua ex Dioscoride nomina imponere studet, dictu mirum quàm in-  
terdum temerè admodum, probatas & multis iam seculis receptas Dioscoridis lectiones im-  
mutare ac deprauare cogatur. Quod quidem ius præter necessitatem immutandi loca autorum  
non solum sibi Tragus, uerum etiam alij quidam, idq; magno cum supercilio, usurpant: ut ni-  
hil mirum sit raros esse admodum autores, quamuis optimi sint, quos nõ infinitis mendis con-  
taminatos uideamus. Neque enim alia est maior deprauandi bonos autores occasio, quàm  
cum quisq; quod maxime placet in ijs immutandis statuit. Qui enim fieri potest ut dum qui-  
uis pro suo arbitrio nunc demit, nunc adiicit aliquid, maneat illa be facta genuina & legitima  
scriptoris sententia? Quare non minus uerè quàm lepidè quidam dixit, eos libros esse opti-  
mos, qui nullam prorsus lituram experti essent. Cum igitur is mos temerè quæuis in bonis  
autoribus immutandi nobis semper suspectus & infensus fuerit, diligenter admodum cauimus  
ne quid facile in Dioscoride mutaremus, nisi ut id ipsum faceremus manifestissimæ con-  
iecturæ, aut Plinius, aut alius quispiam fide dignus autor moneret cogeretue. Sed ad Tra-  
gum reuertamur, qui quum strenuè annitur ut singulis herbis nomina ex Dioscoride im-  
ponat, in alterum peccatum incidit, ut nõ raro falsas & adulterinas facultates, quod pernicio-  
sissimū esse nemo nõ nouit, eisdem assignet. Haclenus tum exterorum, tum etiam nostræ gen-  
tis uirorum aliquot sanè eruditorum, qui editis scriptis rem herbariam iuuare studuerunt,  
honorificam facere mentionem uoluimus, ut quàm bene de nobis totaq; posteritate meriti es-  
sent ostenderemus, & ut extaret etiam erga iam mortuos aliqua gratitudinis nostræ signifi-  
catio. Cæteros qui de ea medicinæ parte scripserunt nihil moror, ut quos constet plus illi  
tenebrarum offudisse, quàm lucis attulisse, taceo quod eorum scripta multis ac grauib; erratis  
plena sint. Verū inter omnes herbarios libros qui hodie extant, nulli sunt qui plus crassissi-  
Egenolphus herbarij libri. morum errorum habeant, quàm illi quos iam iterum atq; iterum edidit Egenolphus typo-  
graphus. Nam multis in locis unam atq; eandem herbam pro duabus tribusue, ijsq; & for-  
ma & facultatibus distantibus, pingit. Sic ex uno quidem Polygonato, Dictamnū & Elle-  
borum



borum album facit. Vna etiam pictura Atroplicem & Mercurialem exprimit. Gladioli nomine tres inter se differentes herbas describit. Omitto alia multa quæ quiuis, modò pertenuen herbarum notitiam habeat, primo statim aditu deprehendet. De picturis eius hoc dixisse satis sit, me mirari maiorem in modum cur suis pyxidibus non appinxerit etiam assistentes pharmacopolas, aut illorum ministros præcinctos corio, cum melli aduolantes muscas, & aquæ naues, atq; in ijs ad transstra sedentes nautas adhiberi curauerit. Sed cum non magni faciat cōmoda studioforū, & ad rem augendam magis attentus sit, nihil mirum ex illius officina prodire eiusmodi libros. Porro ut eò tandem quò tendebat animus perueniam, ego quidem paulò antè cōmemoratorum longè doctissimorum uirorum studium imitatus, hos de historia stirpium commentarios maximis cum uigilijs tum sumptibus confeci. In quibus initio quicquid ad uniuersam cuiusque stirpis historiam attinet, omnibus superuacaneis re-  
 cis, breuiter, & ordine, ut confidimus, optimo, eodemq; perpetuo, complexi sumus. Deinde singulis stirpium historijs, uiuas & ad naturæ æmulationem à nullo unquam, pace omnium dixerim, artificiosius expressas imagines adiecimus: idq; nulla alia de causa, quàm ut ea quæ nudis uerbis exponit historia, certius exprimeret, atque adeo altius animo infingeret pictura. Neque sanè peregrinarum tantum stirpium, suaq; sponte in Germania nostra haud prouenientium, quarum tamen plus centum ijs in commentarijs studiosi reperient, picturas dedimus: uerum etiam uulgarium, & earum quæ iuxta sepes ac dumeta passim proueniunt. Idq; ut faceremus duabus potissimum rationibus moti sumus. Primum ut herbariæ medicinae studiosi earundem etiam historiam integram, & in ordinem digestam haberent, quæ magna ex parte à ueteribus non est tradita, apud recentiores uerò non nisi manca & confusa. Dein ne posteris nostris accadat quod nobis euenisse nemini obscurum est, ut scilicet quæ hodie sunt omnibus notissima stirpes, illis prorsus incognitæ fiant. Nam quis est qui nesciat Dioscoridis seculo plerasq; herbas tam notas fuisse, ut illum piguerit earundem notas, quibus à posteris suis agnoscerentur, tradere? Quod si tamen hodie peritissimos etiam herbariæ rei homines perconteris, nemo erit qui eas cognoscat. Quare ne nostra negligentia, aut temporum iniuria eueniat ut è notitia hominum uulgares nunc plebeisq; cognitæ stirpes excidant, earundem etiam historias & imagines ijs nostris commentarijs inferendas esse duximus. Et quare notas & uulgares admodum stirpes contemneremus, cum sæpius maior illis uis insit, quàm ijs quæ à remotissimis extremisq; orbis partibus, non sine maximis sumptibus conquisita, importantur? Nam quid Polygonum magis uulgare? quid contemptius? omnium siquidem conculcatur pedibus: quod si tamen uim eius quam in sistendo sanguine obtinet experiri uolueris, nihil eo præstantius dices. Possem huic similia multa commemorare, sed in re nota non est cur temerè uerba fundamus. Quid multa? ut tanquam diuersis copijs iunctis nobis contra uarios morborum insultus aciem instruere liceret, tam nostratium quàm exterarum stirpium tum historias tum imagines studioforum oculis subijcere placuit. In acquirendis autè peregrinis et radicibus & seminibus quæ subinde terræ mandata nobis feliciter prouenire, multū nobis profuit Hieronymus Schallerus  
 medicus Noricus, homo & barbarū aliarumq; multarū rerum peritissimus. Quod hoc loco cōmemorare uolui, ut nostræ amicitia ac charitatis aliquod apud posteros extaret testimoniū, & ut studiosi quantum huic bono & erudito uiro, qui sua nobis nunquam defuit opera, deberent palàm intelligerent. Cæterum cum multarum stirpium quas neq; Dioscorides neq; alij ueteres cognouerunt historias huic operi inferuerimus: nam cum magna ex parte sint uulne-  
 raræ, atq; adeò in quotidiano multorū, maxime chirurgorū, usu, prætereundas minime putauimus: illarū certè usitatis atq; adeò barbaris nobis utendum fuit nomenclaturis, quandoquidem latinis desistueremur. Maluimus enim uti ineptis minusq; latinis appellationibus, q̃

Confilij sui ratio-  
nem in conficien-  
dis ijs de stirpium  
historia cōmenta-  
rijs exponit.

Vulgatissimarū  
etiam herbarum  
picturæ non con-  
temnende.

Hieronymus  
Schallerus.

Quare interdū  
usitatis & barba-  
ris usus sit no-  
menclaturis.



illis adulterinas uel græcas uel latinas accersere, ne scilicet cum illegitimis earundem nomenclaturis adulterinæ etiam illis facultates ascribendæ nobis essent: quod cōtingisse nōnullis qui de re herbaria scripserunt, suprà cōmemorauimus. Quare ubi potuimus habere dictionem græcam per omnia germanicæ appellationi respondentē, hanc potius quàm falsam aliquam ex Dioscoride illis imposuimus. In alijs stirpibus quas Dioscorides cognouit unicè cauimus, ne omnes earundem nomenclaturas quæ initio capitum reperiuntur cōmemoraremus, quod sciremus propemodum omnes à scolis quibusdam ex Apuleio, aut alio eius generis autore adiectas, & in contextum Dioscoridis temerè raptas esse: & quod perspectum habeamus, nihil æque herbarum cognitioni obfuisse, maioremq; iacturam attulisse, ac illam confusam appellationum coacervationem. Præstat igitur paucis admodum, ijsq; ueris & legitimis uti, ne nominum confusio, rerum etiam nobis cōfusionem pariat. Porro adieciimus etiam aliquot arborum historias & imagines, non quod nobis consilium fuerit singulas uelle describere, id enim infiniti laboris erat: sed cum Dioscorides alijsq; rei herbariæ scriptores illis stirpium quarundam folia assimilent, atq; adeò sine earum deliniatione tota historia satis intelligi non possit, harum etiam aliquas ijs cōmentarijs inserere uoluimus, ad quas in cognoscenda stirpium historia studiosi respicerent. Quapropter quod fecimus, non errore, sed iudicio factum æqui iudices iudicabunt. In facultatibus cōmemorandis summa diligentia cauimus, ne alicui stirpi adulterinas ac illegitimas, quod pleriq; nō sine maximo errato & uitæ humanæ dispendio fecerūt, assignaremus. Quare in historia stirpiū quas ueteres cognouerunt, eas duntaxat quæ à Dioscoride, Galeno, Plinio, interdū etiā quæ ab Aëtio, Paulo, & Simeone Sethi tradūtur retulimus. Idq; ea maximè de causa, ut omnes scirent eas facultates in quibus illi tres concordēs sunt, esse eiusmodi, ut in ijs, tanquā maximè legitimis, spem certam ponere liceat. Nam si inter se dissentiant, tum Galeni potius quàm Dioscoridis, & huius rursus magis quàm Plinij erit sequenda sententia. Cur autem Galeni sententia omnibus alijs sit præferenda, nulla alia est ratio, quàm quod is stirpium facultates partim certa quadam ratione & methodo, quam literis subinde mandauit, cognouerit, partim etiam experientia didicerit. In reliquis quidem stirpibus quæ ignotæ ueteribus fuerunt, Galeni secuti sumus exemplum: nam eas tantum facultates cōmemorauimus, quas multorum experientia comprobauit, quæq; longo usu receptæ sunt ab omnibus, & quæ ab earundem qualitatibus non abhorrebant. Quod uerò in ijs cōmentarijs græcarum literarum ordinem secuti sumus, id necessitate ipsa quasi nos cogente fecimus. Nam multò maluissimus, Dioscoridis exemplo, congeneres sibi herbas passim connectere, quàm eum quem instituimus sequi ordinem, nisi id ipsum per picturas nobis non licuisset. Siquidem cum nullius stirpis historiam sine uua eiusdem imagine ijs nostris cōmentarijs inserere constituissemus, stirpes uerò ipsas ac earundem genera non nisi diuersis temporibus, & nonnunquam aliquot annorum interuentibus interuallis nancisceremur, hunc literarum græcarum sequi ordinem coacti sumus. Quanquam non uideam cur mihi tam exquisita opus sit excusatione, cum hunc etiam ordinem sequi Galenum, Plinium, & post eos Paulum, Aëtium, aliosq; complures nō pudeat. Quod ad picturas ipsas attinet, quæ certe singulæ ad uiuarum stirpium lineamenta & effigies expressæ sunt, unicè curauimus ut essent absolutissimæ, atque adeo ut quæuis stirps suis pingeretur radicibus, caulibus, folijs, floribus, seminibus ac fructibus, summam adhibuimus diligentiam. De industria uerò & data opera cauimus ne umbris, alijsq; minus necessarijs, quibus interdum artis gloriam affectant pictores, natia herbarum forma obliteraretur: neq; passi sumus ut sic libidini suæ indulgerent artifices, ut minus subinde ueritati pictura responderet. Pictorum miram industriam præclare imitatus est Vitus Rodolphus Specklin sculptor Argentoracensis longè optimus, qui uniuscuiusq; picture sculpendo

Cur multe & cōfuse apud Dioscoridem stirpiū nomenclaturæ præteritis.

Arborū quarundam historie & imagines cur adiectæ.

Quid in cōmemoratione facultatum stirpiū considerandum.

Ordinis in ijs cōmentarijs ratio.

Picturæ & imagines quales.

Vitus Rodolphus Specklin sculptor.



pendo lineamenta tam affabrè expressit, ut cum pictore de gloria & uictoria certasse uideatur. Sed etsi multis & impensis & sudoribus picturas parauerimus, tamen non defuturos In contemptores scimus qui easdem ueluti inutiles ac nullius momenti damnabunt, atque huic quidem suæ ineptissimæ sententiæ Galenum patrocinari clamabunt, ut qui ne describi quidem stirpes uoluerit, tantum abest ut earundem picturas probauerit. Pictura. Quanquam uerò neminem esse putem qui non quantū illi insaniant intelligat, tamen eos hoc in loco rogare haud pigebit, ostendant nobis ubi locorum Galenus stirpium descriptiones & picturas damnarit? cum certò sciam hoc illi ne per somnium quidem uenisse in mentem. Atqui respondebunt statim, Galenum id ipsum libro sexto de simplicium medicamentorum facultatibus, capite de Abrotono, disertè asserere. Verum nos uicissim illis respondemus: fateri nos quidem Galenū noluisse stirpium formas ac species describere, non tamen quod eas ipsas damnaret aut inutiles esse iudicaret, sed quod id ipsum post tot tantosq; uiros, Dioscoridem præsertim, qui hoc, Galeno etiam ibidem teste, absolutissimè præstitit, conari planè superuacaneum existimaret. Sed quid multis moror? quis quæso sanæ mentis picturam contemneret, quam constat res multò Pictura laus. clarius exprimere, quàm uerbis ullis, etiam eloquentissimorum, delinari queant. Et quidem natura sic comparatum est, ut pictura omnes capiamur: adeoq; altius animo insident quæ in tabulis aut charta oculis exposita sunt & depicta, quàm quæ nudis uerbis describuntur. Hinc multas esse stirpes constat, quæ cum nullis uerbis ita describi possint ut cognoscantur, pictura tamen sic ob oculos ponuntur, ut primo statim aspectu deprehendantur. Proinde nō immeritò bonis pictoribus suis semper apud omnes ætates honos fuit. Et in uniuersa Græcia hunc morem fuisse notū est, ut ingenui et liberè educati pueri ante omnia, aut saltem unā cum literis picturam docerentur, quod illis constaret, hanc ipsam esse quæ singularū rerum non solum naturam exprimeret, sed & memoriam conseruaret. Quare ea quoq; ars in primum gradum liberaliū artium recepta est, semperq; bonos ei fuit, ut ingenui eam exerceant, mox ut honesti, perpetuo interdico, ne seruitia docerentur: ideoq; in hac nullius qui seruii opera celebrantur. Atqui de pictura, quam quidā satis certè imprudenter explodunt, hæc dixisse satis sit. Præterea cum in texenda stirpiū historia uocabulis paulò obscurioribus, & ab imperitorū intelligentia sensuq; disiunctis nobis utendū fuerit, operæ precium nos facturos duximus, si horum breuem quandam explicationē adijceremus, ne inter legendum parum peritos remorarentur. Porro cum singulis ferè stirpibus quatuor nomenclaturas inditas esse constet, græcam nimirum, latinam, barbaram, qua officinæ seplastiariorū utuntur, & germanicam, quadruplicem etiam Indicem concinnauius, ut quisq; statim audito nomine, cuiusq; stirpis historiam quærere nullo labore possit. De nobis insuper hoc affirmare possumus, nos neq; impensis neq; laboribus in ijs adornandis cōmentarijs pepercisse, ut multorum de nobis expectationi satis faceremus. Neq; enim grauati sumus in campos & syluas creberrimè excurrere, altissima iuga montium cōscendere, multaq; artificum tædia, quæ illis erratorum interdum emendatio peperit, deuorare: quod quicuis rerum æquus æstimator per se statim deprehendet, ita ut non opus sit nostram operam parum modeste prædicare. Quod si tamen quid nobis humanitus accidit, sat scimus uenia dignos esse nos boni quicq; iudicabunt, quod unius hominis non sit rem herbariam funditus propemodum obscuratam, in integrū restituere, ut omni prorsus reprehensione uacet, in hac præsertim rerum omnium difficultate, ac ueterū de stirpibus cōmentariorū inopia. Inter omnia enim ueterum de stirpium natura scripta quæ earundē coniunctim notas tradunt, nullum prorsus nisi Dioscorides in re præsentanda stirpium facie interduum uariū & ne gligens.



de qua illi sermo est stirpem exprimere uideatur. Id quod tum maximè fit, ubi à se non uisus, & ex aliorum sententia stirpes depingit. Præterea non pudebit etiam nos errata, si qua commisisse conuincamur, agnoscere, atque palinodiam canere: tantum abest ut indignè laturi simus, si quod nos non potuimus, impediti aut negligentia, aut nudicij tenuitate, alij inueniant aut sarciant, modò omisis maledictis & conuicijs, ut ueritatis studiosos decet, rationibus potius & probatissimorum scriptorum testimonijs sententiam nostram reuellant & conuincant. Quod si uerò quispiam omnino stomachari, & malignè in conuicia prorumpere perget, hunc ipsum suæ magis quàm nostræ exsultationi obfuturum arbitramur: quod nemo cum bonum uirum reputet, qui temerè deträhere de fama alterius audeat. Et certè qui tam prompti & parati sunt ad alienos labores uel extenuandos, uel contemnendos, uel prorsus repudiandos, magna ex parte in tenebris delitescunt, & in angulis se continent, ubi apud sui similes & imperitos asinos mirè triumphant. Quod si tamen momi illi aliquando è tenebris erumperent, & in apertum prodirent, nemo non statim intelligeret quàm inani eruditionis fastu turgeant, quamq; sint impudentes nugatores. Et nos certè istos conuiciatores sic exciperemus, ut sese in latebris continuisse, & lucem nunquam affectasse optarent. Nam ad illos probè tractandos, ac eorundem tela & iacula fortiter propellenda retorquendaq; neque uires neque artes nobis defuturas consideremus. De Michaëlis Isingrinij typographi Basiliensis diligentissimi, in excudendo hoc opere industria & sedulitate hoc in loco plura dicerem, nisi has ipsas ex alijs multis quæ nunc annis aliquot ex illius officina prodierunt, satis cognitæ ac testatas esse sciremus. Et quidem opus ipsum per se satis loquitur quàm in eo imprimendo diligens fuerit. Quantos autem fecerit sumptus, facile quiuis æstimabit qui operis magnitudinem & picturas ipsas pro rei dignitate expendere uoluerit. Plurimum itaque huic uiro debent rei herbariæ studiosi, ut qui neque impensis neque laboribus, quo illorum commodis inferuiret studiisq; iuuaret, pepercerit. Cum uerò hodie multos esse typographos compertum sit, qui inslar fucorum alienis insidientur laboribus, librosq; optimis ac elegantissimis typis excusos, & præstantissimis picturis ornatos, inepta sua æmulatione deformant atque contaminant, idq; nulla alia de causa, quàm ut ex aliorum incommodis sua comparent cōmoda, Isingrinij etiam, qui immensos in hoc opere excudendo sumptus fecit, ratio habenda fuit: ideoq; ne quis alius hos nostros commentarios usquam locorum impunè imprimat, Cæsareo decreto, quod initio etiam operis monuimus, cautum & prospectum est. Quum uerò usitato more patronum aliquem ijs nostris commentarijs quererem nobilitate & uirtutum splendore excellentem, nemo omnium cui uisus quàm tibi Illustrissime Princeps IOACHIME, clarissimo heroi, hos dedicandos esse putarem occurrebat. Nam si generis tui uetustatem atque nobilitatem spectro, nemo te hodie Principum aut melior, aut præstantior, utpote cuius maiores à Guelfis, qua uix ulla in Germania uetustior est nobilitas, ortos esse constat. Quod si eorundem uirtutes expendo, nullam prorsus uirtutem magnis & bonis Principibus dignam illis de fuisse uideo. Omni uerò genere uirtutum fuisse claros uel inde maximè colligi potest, quod Franciæ pars ad Moenum sita, cuius tamen gens libertatis tuendæ semper studiosissima fuit, non alio nomine quàm nobilitate & uirtute eorum inuitata, ijs parère cœperit. Possem nunc singulorū maiorum tuorū qui res maximas gesserunt uirtutes cōmemorare, si longius euagari Aristolæ ratio permitteret: quare prætereo cæteros, atq; unū eumq; præcipuū produco ALBERTVM illum, quem ut reliqui propter insignem fortitudinē, inq; prælijs dexteritatem ac felicitatem, germanici Achillis cognomine celebrariūt: ita ego propter singularem prudentiā, atq; in rebus agendis miram industriā & solertiā, germanicū Vlyssē meritò appellandū esse censeo. De huius autē multis ac uarijs uirtutib. multa extant præclara testimonia in eorū libris, qui Prin-

IOACHIMI  
electoris, Mar-  
chionisq; Bran-  
denburgensis  
laus.

Albertus Mar-  
chio Brandenburgensis  
germanicus  
Achilles &  
Vlysses.



qui Principum Germaniæ res bene gestas memoriæ prodiderunt, adeo ut de ijs nunc longius mihi differendū minimè sit. Ad tuam itaq; celsitatem redeo, de qua uerissimè dici potest quod semina uirtutis à bonis parentibus in posteros propagentur. Tantum enim abest ut à maioribus tuis Principibus optimis degeneraueris, ut pleròq; etiam ingenio & uirtute superaueris. Nam ut multas easq; præclaras & magno Principe dignas uirtutes tuas, iusti-  
 tiam in imperio, pacis tuendæ curam, magnitudinē animi, integritatē, modestiam, clementiā, & eximiam bonitatem, omittam, nōne hæc uerè in te regia est uirtus quod studia literarū,  
 quæ tamen uulgi Principum odit cane peius & angue, adiuuare, ornareq; tantopere stude-  
 des? Quod autem immenso fauore literarum prosequaris studia maximo est argumento, quod non solum scholam, sed & aulam doctissimis uiris, quorum opera ad studiorum ac re-  
 rum gubernationem uteris, quorumq; te colloquio oblectas, pulchrè ornatam habeas. In eo autem quod literas earumq; cultores amas, obseruas, tueris, amplissimisq; honoribus auges, singularis tua elucet prudentia: intelligis nanq; sapientiæ studio, atque adeo literis ipsis flo-  
 rentibus, res omnes quibus humana societas constat cōseruari. Literis enim debemus quod  
 hodie doctrinæ coelestis, aliarumq; disciplinarum puritate fruamur. Iisdem etiam acceptum  
 referendum quod aliquid, quicquid est, adhuc restat, quodq; non omnia unā cum corporibus  
 eodem puluere obruta & sepulta sint. Quid enim maiorum nostrorū uirtutes, atq; res præ-  
 clare gestas ab interitu & obliuione uindicauit nisi literæ ipsæ? Quid aliarum rerum om-  
 nium memoriā usq; ad hæc nostra tempora conseruauit nisi literæ? Sed id ipsum uno & item  
 altero exemplo breuiter demonstremus. Nemo hodie animantium naturas exploratas ha-  
 beret, nisi Aristoteles præclarissimos illos de eorundem historia libros conscribere uo-  
 lisset. Quod ut præstare posset non parum Alexandri adiutus est liberalitate, qui ad con-  
 ducendos uenatores & alendas bestias illi octingenta talenta, hoc est, quadringenta & octo-  
 ginta millia coronatorū transmisit. Nullam præterea stirpium peritiam hodie apud ullam  
 gentem reperire liceret, si Dioscorides, Theophrastus, Plinius, & alij quidam earundem  
 notas quibus deprehenduntur, literis non mandassent. Merito igitur hæc uerè regia in te  
 uirtus nobis multis modis prædicanda erit, hoc præsertim tempore, quo maximus literarum  
 omnium contemptus nō tantum rusticis irrepit casas, & artificum tabernas, sed & magna-  
 tum domos ac Principum aulas. Quotus enim quisq; hodie est Principū, quem hæc cura con-  
 seruandorum studiorum tangat: ita ut nobis metuendum sit, nisi C. T. aliorumq; quorundam,  
 paucorum tamen pro dolor, Principum patrociniō & liberalitate adiutæ fuerint, ne prope-  
 diem è manibus nostris elabantur, redeatq; pristina illa uerè Scythica barbaries. Quare  
 ut literas quemadmodum coepisti perpetuò ames, foueas, & conserues, non solum hortor,  
 imò etiam per CHRISTVM oro. Siquidem dum eas iuuare & ornare studes, simul etiam  
 religionem, cuius in primis cura habenda est, naturæ cognitionem, leges, & quicquid est ad  
 reipub. pacem & tranquillitatem conseruandam necessarium, tueris. Proinde non est cur  
 C. T. eius liberalitatis, qua in conseruatione literarū uteris, poeniteat: dum enim harum cul-  
 toribus succurris, atq; adeo ut suum cursum strenuè urgeant efficias, tibi etiam simul sempiter-  
 nam laudem paras. Quum enim illis non sit quod pro tantis tibi beneficijs quibus eos ornas  
 rependant, tamen hoc præstabunt uicissim, ut memoria tua apud posteros perpetuò sit dura-  
 tura. Nam quanquam reliqua humana omnia, utcunq; in speciem uideantur firma & soli-  
 da, cum annis simul labantur & deficient: sola tamen laus quam doctrinæ conseruatio pepe-  
 rit, immortalis existit. Quapropter neq; ampliorem, neq; splendidiorem famam & gloriā  
 tibi, imò toti tuæ ornatissimæ familiæ, comparare poteris, quàm doctrinæ & studiorū con-  
 seruatione. Vt autem id quod nunc facis perpetuò quidem facias, in primis te necessitas ipsa,  
 quam paulò antè exposui, cohortetur: dein diuinum etiam præceptum quod hoc ipsum abs te

Virtutes Principis magno dignæ

Studia literarum iuuare uirtus regia.

Literarum cōmoda.

Alexandri liberalitas in Aristot.

Hodierno tempore maximus literarū cōtemptus.

Quæ commoda literarum conseruationem sequuntur.



alijsq; Principibus seuerè admodum exigit, ut liberalitate uestra sic iuuetis studia, ut horum subsidio publica pax & tranquillitas conseruetur. Sed non est cur C. T. sponte currenti calcaria addam, quàm inter omnes Germaniæ nostræ Principes uix alius reperiatur qui æquè atq; tu literas, eosq; qui opinione aliqua eruditionis clari sunt, amet, foueat, tueatur, ornet.

Dedicationis  
cause.

Nobilitatis itaq; tuæ, multarumq; aliarum præclarissimarum quæ in te elucet uirtutum splendore motus, hos, quos multis sanè sudoribus & impensis adornauit, de Stirpium historia commentarios Celsitati tuæ inscripsi. Perspectum enim habebam eos non uulgare, sed excellens aliquod patrocinium requirere, quandoquidem uix ulla alia possit esse cōmentatio quæ plurimum calumnijs pateat & exposita sit, quàm ea quæ de stirpium natura explicanda suscipitur. Proinde cum in spem certissimam adduceremur, nostras has uigilias non uulgarem gratiam ex amplissimi nominis tui inscriptione apud candidos & æquos inituras, foreq; ut eam ob causam maledicorum conuiciatorum petulantia perfringeretur, te quidem in tanto ornatissimorum Principum numero mihi delegi, cui potissimum has ipsas consecrarem. Quare cum eas suscipies illustriss. PRINCEPS, cōmendari tibi defensionem & conseruationem huius

Diuina presen-  
tia & benignitas  
ex stirpibus ipsis  
elucet.

partis medicinæ quæ stirpium naturas inquirat, statues. Quam ut cupidè & libenter in te recipias multa, scio, mouebunt: potissimum uerò hoc ipsum, quod uix ex ulla alia re magis diuina præsentia & benignitas eluceat, quàm ex tam uaria stirpium tum forma, tum natura; dum scilicet omnes illas ad usum hominis conditas à Deo ipso perpendimus. Si quid igitur aliud, herbarum certè diligens contemplatio exuscat, imò cōfirmat in animis nostris opinio nem hanc, quod homines Deo curæ sint, qui tam anxie laborauit in ijs iuuandis ac tuendis, dum tot elegantissimis atq; præstantissimis stirpibus, quibus illi tam uarios morbos propulsare possunt, terram exornauit. Non parum etiam ad eam suscipiendam curam te præclarissimorum tum Regum tum Principum exempla, quæ supra recitauimus, hortabuntur. Sed omnium maximè immensa cōmoditas quæ ex istius partis medicinæ conseruatione ad uniuersos perueniet. Ad herbariæ deniq; medicinæ tum amorem tum defensionem mira quoq; iucunditas, quæ in contemplandis tot herbarum generibus animū subibit tuum, inuitabit. Quid enim iucundius, quid delectabilius quàm inueneri stirpes, quas Deus opt. max. tot tamq; uarijs pinxit coloribus, tot elegantissimis redimiuit floribus, quorum colorem nullus unquam pictor satis exprimere potuit: tot deniq; seminibus & fructibus, quorum & in culina & in medicina usus est maximus, ornauit? Verum non est cur te pluribus in admirationem huius partis medicinæ pertrahere coner, utpote qui antea studio & amore eius sic tenearis, ut uix sit aliud quod te magis delectet. Nunquam enim in extruendis hortis tot arboribus atq; herbis confusus tantum operæ & impensarum poneres, si non illuc te rei iucunditas ac singularis amor pertraheret. Reliquum nunc est illustriss. PRINCEPS, ut pro tua excellenti humanitate, quæ uestræ familiæ cognita est, munus hoc nostrum tanquā specimen & testem mei erga C. T. amoris & obseruantiae, exporrecla lætaq; fronte accipias, atq; me tuo fauore cōplectaris, & autoritate ab inuidorum calumnijs defendas. Bona autem spes est hunc hortum quem donamus C. T. fore longè gratissimum, non tantum quod in eo omnis ferè generis herbas elegantissimè pictas reperire queas, uerumetiam quod inde ad quæuis morborum genera remedia decerpere tibi liceat. Deus opt. max. te tuamq; ditionem incolu-

mem seruet, ut Reipub. Christianæ atque literis diutissime prodesse possis. Tübingæ, Calen. Martijs, Anno à

nato Christo M. D. XLII.



**EXPLICATIO QVARVN  
DAM VOCVM TOTO HOC  
opere passim occurrentium, in quibus  
assequendis non admodum peri-  
tus lector hærere posset.**

Acetabula.



Cetabula ab aceto denominata videntur: quãuis alij ab accipiendo dictum putent, atque hinc est quod scribant acceptabulum: uaculaq; fuerunt orbiculata, concava, sine marginis latitudine, quæ aceto plena ad inunctus ponebantur. Dehinc uox ad omnia alia quæ similem concavitatem habent, translata fuit. Primumq; sic concavas partes in polyporum flagellis, quibus id animal nititur, & uelut adminiculis fultum exurgit, nominauerunt. Translata etiam uox ad fœminarum locos, uocaueruntq; acetabula uenarum arteriarumq; ora, quæ in uterũ feruntur hiantia. Translulerunt postremo etiam hoc nomen ad herbam, quam eam ob causam Acetabulum dixerunt, quod folia acetabulo similia in orbem circumacta, sensimq; sic ut sensum fallant, in concavam lacunam descendentiã, habeat. *κετυλιδίον* græcè nominantur.

Acinus.

Acinus non tantum grana interna uuae, quemadmodum quidam existimant, sed totũ fructum, qui ex succo, & parte quæ ueluti caro est, & ex uinacels, & ambiente forinfecus cute cõstat, significat. Testis Galenus, qui libro 1. de facultatibus alimentorũ sic scriptũ reliquit: Acini corpus ex quatuor partibus constat, ex ea scilicet quæ eius ueluti caro est: exq; humores per eam disperso, unde uinum: præterea ex nucleo, atq; eo quod omnia hæc foris circunccludit membranoso tegumento. *ἄκνις* Græcis dicitur.

Aculei.

Aculei, quæcũq; duriuscula in cuspidem turbinata punctiõnem infligunt spiculorũ modo, nominantur.

Acus.

Acus, purgamentũ frumenti, leuissimũ scilicet in eo quod

Adnata.

uentilabris extra aream iacula. Adnata, uel Adnascentia, siue Appendices, ramuli dicuntur quos caulibus nonnunq; ex se mittit, quasi nouã adscititiãq; prolem. Sic autem uocantur, quod quasi cauli adnascantur & superaccedant. Græci *παρὰφυλλοι*, quod circum cau-

Alæ.

lem erũpentes accrescant, appellarũt. Alæ, caui inter caulem, & ramulos anfractus, unde sinuatim noua proles egreditur, facta ab humanis alis translatione, dicuntur. Græci *μυοχαλας* uocant.

Alabastra.

Alabastra sunt seruandis odoribus ex solidissima & frigidissima materia facta uascula, sic dicta Græcis quod ob læuorem suam capi teneriq; manibus non facile possent, lubricaq; dilaberentur. Hinc alabastrites lapis, quem nunc alabastrum uocant, quoniam ex eo alabastra fierent, denominatus est.

Aluta.

Aluta pellis seu corium dicitur postquã ad usum & opus calceorũ & aliarum rerum concinnatũ est. Hinc alutamen, si

ue alutamentũ, opus ex cõcinnatis pellibus factum. Et alutarij, pellium & coriorũ cõcinnatores. Alsiosa nō dicuntur ea quæ frigidis locis gaudent, sed contrã potius quæ algores ferre non possunt. Amuleta remedia sunt præsentanea aduersus uenena & fascino-nes, qualia quidã in annulis, & collo suspensa gestare solent. Amphora mensura est quæ capit duas urnas, seu octo congios. Apices quæ in medio calycis seu folliculi quo flos claudit erumpũt, stamina sunt, quæ ueluti filamenta ab intimo floris sinu profiliũt. Habent apices sæpius in summo quidpiam crassiusculum, à qua similitudine nomẽ acceperũt. Arbor est quicquid à radice statim simplici caudice, brachiatũ ramis, surculosum, dissolutuq; contumax assurgit. Articuli sunt partes quæ in nodos quosdam intumescũt, à quibus persæpe ramuli prodeũt. Asparagi quæ primum in lucem prodeũt olerũ germina, priusquam in folia explicent, recentissimiq; turiones qui edendo sunt, dicunt. Arista, est quæ ut acus tenuis, longa, eminet à gluma. In summa, aristæ quasi apices & cornua sunt spicarũ.

B

Baccæ sunt foetus minutiores herbarũ, fructicũ, arborum uel, qui dispersius rariusq; enascunt: ut sunt partus lauri. Atq; in hoc ab acinis differunt, quod ij densius proueniant.

Baccæ.

Brachia sunt plantarũ, præcipuè autẽ arborum ramuli, quod instar brachiorũ in homine extendant. Bulbi radices sunt rotundæ tunicate, quales sunt hyacinthi, asphodeli, & colchici.

Brachia.

Bulbi.

C

Cachryes sunt oblonga panicularum modo nucamenta, quæ squamatim cõpacta propendent è ramis. Crescũt hyeme, uere dehiscũt in flauescences squamulas, & folio prodeunte, decidunt: qualia in abiete, picea, & alijs permultis uidere licet. Plinius pilulas nominat. Calathus est rectus turbo, hoc est, id quod ex angustijs in latitudinem se diffundit. Calathi effigiem planè referunt flores liliorũ.

Cachryes.

Pilulæ.

Calathus.

Calyx folliculus est, quo flos primũ, mox seminis foetus clauditur. Capillamenta particulae teretes & oblongæ in capilli modũ extenuata dicuntur. Caput est id quod sursum deorsum uel in globũ extuberat, aut in orbem glomeratur. Si magnitudine cesserit, capitulũ nominat. Extremã tamen uitris partem caput etiam uocant, id est, ultimũ & productissimũ flagellum.

Calyx.

Capillamenta

Caput.

Capreoli sunt coliculi intorti ueluti cincinni quidã in ipsis pampinis tenerioribus apparentes, quibus uitis ueluti manibus quibuldam adminicula cõplectitur, ac cõprehendit. Ii enim ut uitem teneant, serpunt ad locum capiendum: unde à capiendõ capreoli dicti sunt.

Capreoli.

Caro.

Caudex.

Caudex dicitur in arboribus & fruticibus, id quod à radice supra terrã simplex assurgit, & in quod à radice fertur alimonia. Caulis

Caulis.



uerò idem quod supra solū simplex profilit in herbis nominat. Sic utiq; caudex ad frutices & arbores, caulis ad herbas duntaxat pertinet.

**Ceruis.** Ceruis est pars illa à capitis radicibus prodiens, prælonga, teresq; sic dicta, quod in colli speciem figuretur. Cyathus Græcis *καὶ πῦ* *χυν*, id est, à fundendo dictus, est duodecima pars sextarij. Cymæ herbarū delicatiores tenerioresq; coliculi, quos à prima germinatione, & in summa stirpe proferūt. Nam cum uerum tempus appetit, primo quoq; foliorū pululatu, præclusis adhuc florū calycibus, quosdam quasi turiones, olus subministrat, in quibus floris primū, mox seminis fœtus cōcluditur. Cirri sunt capillamenta quæ contorta crispantur. Clauiculæ coliculi sunt, quibus quasi manib. proreptans uitis adminicula cōprehendit. Coma est quicquid hilari uenustate criniū modo, summa ramorū uel coliculorum exornat. Congius, qui græcè *κῶν* dicitur, sex sextariorū capax mensura est. Eadem etiā congiariū appellat. Conus Græcis, uel pyramis, est inuersus turbo, hoc est, id quod ex latitudine in arcū protrahitur ac fastigiatur. Cui calathus, ut diximus, cōtrarius existit.

**Cor.** Cor est quod in medioligni residet, & tertium à cortice cōtinetur, uelut in ossibus medulla.

**Matrix.** Ab alijs matrix, à nōnullis medulla nominat.

**Corymbus.** Corymbus est hederarū uua dependentib. acinis coacta. Transferē tamen ad multos herbarū fructus. Cortex pars est ultima à subiecto corpore separabilis, uelut crusta quædam ad tegendū data. Cotyle uox est in Græcia nata, nam Romani hemina uocabulo utunt.

**Crenæ.** Vide in dictione Hemina. Crenæ sunt quædam in extremis oris incisuræ, à quibus crenata herbarū folia uocantur, hoc est, serrata, per ambitūq; secta. Cubitus est mensura quāta patet à cubiti flexura usq; ad summū mediū digitū, quæ sex palmis digitis uel uirgini quatuor cōstat. Culmus frumētū calamus est, qui spīcam sustinet.

## D

**Decussis.** Decussis antiquis ad x literæ figurā fiebat, quæ apud Latinos decem significat. Hinc decussari est in speciem literæ x diduci.

**Dilutum.** Dilutū dicitur, quod est mixtū: unde uinum aqua mixtū dicitur dilutū. Dilutum uerò substantiuū factū, est id liquidum, in quo aliquid certo tempore maceratū & infusum fuit: ut si in uas uini appositū absinthiū fuerit, deinde post interiectū tempus abstractū, id uinum absinthij dilutū uocatur. Dodrans est mensura duodenū digitorū. Aliàs palmus maior Latinis, & Græcis *αυθαμν* dicitur. Dodrantalis itaq; cauliculus uocatur, qui longitudine duodenos æquat digitos.

## E

**Echinus.** Echinus est quicquid numerosa congerie aculeorum stipatur, siue tegmen, siue caput, siue cacumē fuerit: sic dictus quod globos

so spinarū agmine maris herinaceū mentiat.

## F

**Fibra.** Fibra capillamētis germanæ sunt, quæ herbarum arborumq; minutiores sunt radiculæ, in quas uelut extremas, crassiores effusæ sparguntur. Fimbriæ sunt uestium extremi tates, à quibus & fimbriata folia dicuntur, quæ in ambitu in quasdam fimbrias exeunt.

Flagella dicuntur cymæ arborum & ipsarū summæ partes, quæ ad cuiusq; uenti flatū mouentur: unde etiam nomen traxerunt ab eo quod flatibus petantur. Flagella etiam sunt uitium rami oblongiores, & productiores, alijs tamen minores, ab ipsis brachijs sursum ascendentes: dicta flabella prius, à uenti flatu scilicet. Folliculus theca rei cuiuslibet, quæ granum uel semen cōtinet inuolutum. Sic membranosa cutis acini folliculus dicitur. Fructus, quod carne & semine cōpactum est. Frequenter tamen pro eo, quod inuolucro perinde quasi carne & semine coactum est, accipi solet. Frutex est quod à radice caudice multiplici, ramosumq; sese attollit, ut rubus.

Frons interdū pro ramo ponitur. Proprie tamen dicitur id quod ipse ramus circunquaque producit, multa interdū folia habens, & nonnihil corticis, ac uelut cauliculi.

## G

**Gemma.** Gemma in uite idē est quod oculus, quia ueluti ocellus quidā cōspicius, aut gemma quædam excellens conspici possit, cum primū ē uite prodit, aut sarmento. Hæc ineunte uere sese ostendit, & ab ea primū flos, deinde fructus prodit tam in ipsis uiribus, quā arboribus. Genuculi siue genicula sunt nodi qui in herbis, aut leguminibus, aut etiam subfruticibus apparent. Sic geniculatæ radices nominantur, quæ nodis quibusdā interstinctæ protuberant, rotundæ & leuiter capitulatæ. Gluma est folliculus grani quod in spica continet, uel grani theca. Grossi appellatur fici, quæ nō murescūt. Priuatim tamen in bifea fico eas intelligunt, quæ per messes maturantur. Has grossulos Græci uocant *ἀλμύδες*.

## H

**Hemina.** Hemina Romana uox est, ex græco quidē *ἡμιον*, quod dimidia sextarij pars sit, deriuata. Græcis *κατύλη* nominatur. Capituncias decem mensurales, ut copiose in annotationibus nostris in quartū de uenda sanitate librū Galeni demonstrauimus. Herba est quod à radice foliatum, sine caudice prouenit, sæpiusq; semen in caule fert.

## I

**Intermediū.** Intermediū, quod inter artus uel genicula intermediū intercedit, dici cōsueuit. Interuenium, quod inter uenas intercipit. Iuba est arūdinacea coma effusa, qualis in milio est: metaphora desumpta à iubis, hoc est crinibus animalū à collo pendentib. Iulus tam Græcis *ἰούλος* Latinis est quod in corylo cōpactili callo racematim



matim cohaeret, & ueluti praelongus uermis, singulari pediculo pensile nititur, & fructum praecedit.

L

**Lachryma.** **L**achryma est is humor, qui statim defecto caudice, uel ramo, aut tantum ipso ligno, profilit, & apparet. **Lanugo.** Lanugo in herbis atq; arboribus lanata quaedam est hirsuties, qua folia, coliculiq; canescunt. **Liber.** Liber pars corticis interior quae ligno pressius adhæret. Is qui bus scribimus libris nomen dedit. **Libra.** Romana capit uncias duodecim mensurales. **Ligula.** Ligula quarta pars cyathi dicitur, hoc est, semuncia, demptis scilicet duobus scriptulis. **Loculamēta.** Loculamenta sunt seminū inuoluta, quæ ueluti paruae capsulae ea recludunt. **Lomentum.** Lomentum, fabarum farina est. **Lacinia.** Lacinia partes sunt extremae particulatim decoris causa concisae, orarumq; summarum caesurae. Inde folia membratim per flexuras digesta, uel natius segminibus discreta, laciniata uocantur. Sunt tamen qui lacinosum pro sinuoso usurpent,

M

**Malicorium.** **M**alicorium est mali punici putamen. **Malleolus.** Malleolus nouellus est palmes inna rus prioris anni flagello, cognominatus à simi litudine rei, quod in ea parte qua deciditur ex uetere farmento, prominens utrinq; malleoli speciem praebet. Vel, quod capillatus utrinq; & surculatus solebat feri. **Matrix.** Matrix, uide in dictione Cor. **Medulla.** Medulla, uide ibidem. **Mucro.** Mucro est acumen in quod pars quaecunque desi nit. Sic foliorum multorum, siliquarum quarun dam, & spinarum omnium extrema in mucro nem acuminantur. **Muscus.** Muscus est id quod in ipsa corticis superficie quarundam arborum lanuginosum apparet, ueluti cani quidā ipsa rum arborum uilli. In quibusdam etiam quæ dam ipsarum arborum quæ uisitur uillosa flo sculorum congeries, quæ quod confecta sit densa q; floreat, muscus dici consuevit: ut in **Muscaria.** Ligustro, & compluribus alijs. Muscaria sunt in orbem radiatae herbarū comæ, cacumi naq; in fascies coacta: à stabri similitudine, cuius uentilatu muscae cōiuijs abigunt, dicta.

N

**Nucamenta.** **N**ucamenta dicuntur ea quæ callo squa matim compactili pendent è ramis nu cum, roborum picearum: sic dicta, quod sint quasi quædam naturæ rudimenta, pineam nu cem facere condiscantis.

O

**Oculus.** **O**culus gemmula illa in herbarū furcu lis, primum germinationis argumentū dicitur.

P

**Palma.** **P**alma dicitur maius uitis flagellum, unde nascuntur uuae. **Palmus.** Palmus ueteribus du plex fuit. Minor digitorum quatuor habeba tur, Græcis *πενταδης* uocatus. Maior digitorū


duodecim, *ωδωδωδης* Græcis dictus. **Palmi tes** dicuntur qui è stirpibus ac furculis quotan nis prodeunt: sic nominatae, quod in modum humanarū palmarum uirgulas quasi digitos ædant. **Pampini** sunt frondentium ramu sculorum comæ coliculiq; fructum fouentes, & ab impendente uindicantes iniuria. Hinc pampinare, est pampinos superfluos ex uinea detrahare, posteaquàm fronduit. **Panicu la** dici potest quicquid sublonga uel subrotun da effigie tumet, ut quæ pendet è picearum ra mis. Lanosam quoq; comā in milio, panico, arundine, & qualem in aruis complures her bae, & in palustribus iunci gerunt. Latini pani culam dixere. **Pappus** tam Græcis quàm Latinis est lanugo ex floribus aut fructib; de cidua. Sic etiam lanosi quidam uilli, qui deflo rescentibus aliquot herbis remanent, & post modum in auras euanescent, pappi sunt, ut in senecione, soncho, & plerisq; alijs sit. **Pedi culus,** siue quod idem habet, **Petiolus,** id est quo foliū, fructus, aut flos dependet. **Peda menta** quibus stat recta uinea dicuntur, hoc est, quibus ueluti pedibus nititur. Nominant etiam à quibusdam pedamina. **Pilula,** uide Cachrys. **Pyramis,** uide Conus. **Pro pago** dicitur uitis uetula depressa, atq; in terrā per inflexos arcus submersa, ut ex una plures emergant. **Pulpa** in arboribus est, quod nos in animalium corporibus musculum ap pellamus. **Puluinus** est quod inter sulcos eminulū protumet, sic dictus quod quandam referat puluinorum in quibus sedemus simi litudinem.

Q

**Q**uincuncialis figura, eius figurae quæ de culsim antiquis significabat, media est. Fiebat uerò deculsis ad x literæ formam, quæ quidem apud Latinos decem significat. Atq; hæc si per medium secetur, remanebit v figura, quæ quinarium numerū, atque adeo quin cuncem demonstrat. Sed hæc quidem multipli tum superius, tum etiam inferius multipli cata, figuram facit, quæ quincuncialis appella tur. Talem planè Trichomanis cauliculi effi ciunt. Typos formæ quincuncis, & quincun cialis ordinis, subijcere placuit.

Quincunx.

Ordo quincuncialis.



R

**R**acemus pro uua accipitur. Neq; tantū ipsius uitis est, sed etiam hedere, & aliarū herbarū, aut fruticum uuas quasdam produ centiū. Dicitur etiam ramosum id, quo depen dent acini. Rami sunt, qui in caule fissi mul tiplices sparguntur.

Palmites.

Pampinl.

Panicula.

Pappus.

Pediculus.

Pedamenta

Pilula.

Pyramis.

Propago.

Pulpa.

Puluinus.

Racemus

Rami



**Sarmenta.** Sarmenta praelongæ sunt uirgule, in quas uitis luxurians spargitur: hoc est, uitis ipsius brachiorum & caulium ligna, tam dum sunt in ipsa uite, quam dum execta, & exempta sunt. Scapus est caulis qui in styli modum sursum proreptat, aut in altum fertur, ducta à columnaribus scapis similitudine.

**Scopus.** Scopus ramosum id, quo dependet acini.

**Sesqui.** Sesqui uocabulum cum aliqua mensura uel modi, uel numeri, uel temporis collocatū, non integrum modò id cui iungitur explicat, sed integrum & semis. Sic sesquilibra, libram unam & semis significat. Sesquimensis integrum mensum cum dimidio. Sextarius capit uncias uiginti mensurales. Siliqua tegumentum est, quo uel grana leguminū, uel herbarū semina concluduntur. Nam non modò legumina, sed & complures quoq; & herbaræ & frutices siliquas proferunt. Sinus aliarum caua sunt. Spica est quod culmus extulit. Hanc antiquitus rustici specam uocabant, & à spe uidetur nominata: eam enim quod sperant fore, ferunt. Tria uerò continet, granum, glumam, & aristam. Spica mutica est quæ non habet aristam. Et mutica, quasi mutila nominatur. Spongiæ antiqui olitores uocarunt radículas illigatas & connexas. Hinc Asparagi satui & altulis radices multis irretitæ capillamentis coalescentes, & inter se implicatæ, ac quasi in unitatem coeuntes spongiolæ, & spongiæ spongiolæq; appellantur. Stamina sunt qui in medio calycis erumpunt apices: sic dicta, quod ueluti filamenta ab intimo floris sinu profiliant. Stipulæ folia sunt culmū ambientia. Striæ partes sunt quædam quæ protuberant & eminent. Hinc striatus caulis, qui huiusmodi striis est præditus, aut striaturis exasperatus. Strigiles etiam, si Virruuo credimus, appellantur.

**Stolones.** Stolones appellantur coliculatorum soboles, inutilisq; è radicibus fruticatio. Suffrutices sunt quæ cōpluribus ramulis surculisq; lignosis scatent, sed minutis constant folijs.

**Surculus.** Surculus, quod ex ramis simplex ac indiuiduum oritur, estq; uelut germen quoddam ex ipso trunco uel caudice productum.

## T

**Thyrus.** Thyrus est caulis, idq; nomen sibi uendicauit, quod uirgulæ in modū, uel teli reseruitudinem confurgat. Tomentum Latinis omne id quo culcitæ ad molliorem & calidiorē quietem infarciuntur, dicitur, siue id lana sit siue pluma, siue quod uoluerit aliquis, excipiendo molliter & fouendis calore corporib. nostris aptum. Sic Dictamni folia, quod mollia uidentur esse, tomentitia & lanæ dicuntur.

**Tori.** à Dioscoride, hoc est, *γυπαλιδας*. Tori prominentes partium calli, & in se pulparum mo-

do collecti nominantur. Græci *κινδύλος* uocant. Hinc *κινδυλάδας*, id est, torosus, quod idem Latinis est ac nodi formā præ se ferens.

Triens quatuor cyathi. Tunica est tenuis cortex & uelut membranaceus, quo uel arbor, uel radix inuestitur. Sic cape folliculis est tunicatum. Turbo dicitur quicquid ex acumine tendens in amplius spaciatur. Hinc turbinatum, quod ex angusto continenter in latius prodit. Sic turbinata conspiciuntur pyrorū forma. Per multa etiam herbarum folia in mucronem turbinantur. Turiones sunt teneritates summitatū ipsarum arborum, quæ singulis annis crescunt. Topiarium opus est quod ex arbore, frutice, uel herba ad decorem componitur in testudines aut cameras fornicatum. Hinc topiarie dici merentur arbores uel herbaræ quæ nimirum huic operi, quod flexiles sunt, ac suo lentore sequaces, accommodantur.

## V

**Vascula.** Vascula, seminū inuolucra sunt. Vena sunt quæ in plantarū folijs apparent, & ramulos & humorē habentes. Vermiculum quod rosæ modo, quasi purpuriffo, rutilat, dicitur. Verticillum florum uel foliorū ambitus, qui coliculos aut ramulos herbarum coronat, existit: ab instrumenti mulieris similitudine dictum, quod fuso uertendi gratia solitum est adhiberi. Vinacei, grana sunt acinorum, *γίγαρτα* Græcis nominantur, quæ pressis uuis cum folliculo abijciuntur.


Virga est quæ ex radicibus, aut caudicis lateribus exit. A nonnullis uirgæ appellatæ sunt soboles. Virgultum surculus is est, qui terræ cōmittitur, ut in arbore infurgat. Viticulæ non palmites aut sarmenta sunt, sed flagella quæ uitis modo reptantia longè lateq; uagantur, ac uicinos frutices nactæ sic intrincant eos, ut ijs perinde quasi pedaminibus abutantur: uel scandentia suis irretiunt clauiculis, quibus quasi digitis hærent, quales in cucurbitibus, cucurbitis, & plerisq; alijs inueniuntur.

Vmbella est floris seminis uel pedamentū, in plures digestum longiores pediculos, qui simul ex fastigio eodem orti, in latius continuo radiantur, singuliq; uel florem, uel semē sustinent, in orbem circumactum. Græci hunc floris habitum *σινυδιδας*, Latini uerò quoniā umbellæ, qua mulieres uultum uindictant à sole, & æstum arcant, circinatæ effigiem gerit, umbellam dixerunt. Umbilicus id in pomis est, quod in eis medium uel prominet, uel conditur. Vngues in rosas & foliatis floribus intellexerunt ueteres, imas suorum foliorum partes, quibus in capite suo cohærent, decoloresq; dependent. Vel breuius: Vnguē infima pars foliorum rosæ alba appellatur.



GRÆCA-  
RVM \*NOMEN-  
clationū Index: cuius nu-  
merus paginam, litera se-  
quens eiuſdē paginæ par-  
tem, designat. Picturas,  
uel ante, uel post capita lo-  
catas, uel ipsam in-  
ſcriptas repe-  
ties.

Α



Βρόπιον 8. C  
αχαιοί 324. D  
αχαιοί 135. A

αδαντον 81. A  
αδαντον 191. A  
αδαντον 31. A  
αδαντον 799. B  
αδαντον 797. A  
αδαντον 128. C  
αδαντον 105. A  
αδαντον 51. D  
αδαντον 54. B  
αδαντον 86. C  
αδαντον 13. A  
αδαντον 63. A  
αδαντον 16. C  
αδαντον 43. C  
αδαντον 79. B  
αδαντον 268. C  
αδαντον 137. A  
αδαντον 20. C  
αδαντον 582. C. C  
αδαντον 666. C  
αδαντον 98. C  
αδαντον 66. D  
αδαντον 95. A  
αδαντον 96. D  
αδαντον 83. B  
αδαντον 17. A  
αδαντον 724. C  
αδαντον 75. A.  
αδαντον 830. C  
αδαντον 111. A  
αδαντον 29. A  
αδαντον 24. D  
αδαντον 529. A  
αδαντον 61. A  
αδαντον 60. C  
αδαντον 51. C  
αδαντον 132. C  
αδαντον 68. C  
αδαντον 89. B  
αδαντον 71. B  
αδαντον 77. A  
αδαντον 40. A  
αδαντον 68. C  
αδαντον 48. A

αδαντον 9. C  
αδαντον 130. C  
αδαντον 73. B  
αδαντον 59. C  
αδαντον 133. A  
αδαντον 448. C  
αδαντον 114. D  
αδαντον 123. A  
αδαντον 120. C  
αδαντον 109. B  
αδαντον 3. A

Βαλάντι. 153. B  
Βαλάντι. 149. A  
Βαλάντι. 545. D  
Βαλάντι. 151. A  
Βαλάντι. 155. A  
Βαλάντι. 139. B  
Βαλάντι. 171. A  
Βαλάντι. 197. A  
Βαλάντι. 173. A  
Βαλάντι. 168. D  
Βαλάντι. 474. C  
Βαλάντι. 178. C  
Βαλάντι. 133. A  
Βαλάντι. 141. B  
Βαλάντι. 797. A  
Βαλάντι. 175. A  
Βαλάντι. 143. A  
Βαλάντι. 149. A  
Βαλάντι. 165. A  
Βαλάντι. 95. A  
Βαλάντι. 184. C

Γαλάντι. 193. A  
Γαλάντι. 193. A  
Γαλάντι. 195. B  
Γαλάντι. 199. A  
Γαλάντι. 210. C  
Γαλάντι. 877. A  
Γαλάντι. 217. A  
Γαλάντι. 197. A  
Γαλάντι. 191. A  
Γαλάντι. 201. A  
Γαλάντι. 221. A  
Γαλάντι. 211. A

Δαλάντι. 43. C  
Δαλάντι. 230. D  
Δαλάντι. 7. A  
Δαλάντι. 226. D  
Δαλάντι. 376. D  
Δαλάντι. 223. A  
Δαλάντι. 234. D  
Δαλάντι. 228. C  
Δαλάντι. 775. B

Ε

Εβαντόνιον 81. A  
Εβαντόνιον 16. C  
Εβαντόνιον 704. D  
Εβαντόνιον 247. A  
Εβαντόνιον 241. A  
Εβαντόνιον 271. A  
Εβαντόνιον 98. C  
Εβαντόνιον 271. A  
Εβαντόνιον 259. A  
Εβαντόνιον 278. C  
Εβαντόνιον 252. C  
Εβαντόνιον 729. B  
Εβαντόνιον 237. A  
Εβαντόνιον 259. B  
Εβαντόνιον 266. C  
Εβαντόνιον 254. D  
Εβαντόνιον 250. C  
Εβαντόνιον 279. A  
Εβαντόνιον 256. C  
Εβαντόνιον 261. A  
Εβαντόνιον 243. A  
Εβαντόνιον 245. A  
Εβαντόνιον 314. C  
Εβαντόνιον 239. A  
Εβαντόνιον 358. C  
Εβαντόνιον 268. C

Ζ

Ζεϊά. 282. C  
Ζεϊά. 128. C  
Ζεϊά. 287. A  
Ζεϊά. 295. A  
Ζεϊά. 243. A  
Ζεϊά. 285. A  
Ζεϊά. 297. A

Θ

Θεϊά. 308. C  
Θεϊά. 305. A  
Θεϊά. 298. C  
Θεϊά. 128. C  
Θεϊά. 303. A  
Θεϊά. 316. C

Ι

Ιβαντί. 314. D  
Ιβαντί. 16. C  
Ιβαντί. 591. A  
Ιβαντί. 318. D  
Ιβαντί. 328. D  
Ιβαντί. 310. D  
Ιβαντί. 326. D  
Ιβαντί. 321. B  
Ιβαντί. 316. C  
Ιβαντί. 259. A  
Ιβαντί. 330. C  
Ιβαντί. 132. C  
Ιβαντί. 333. A  
Ιβαντί. 450. C

Κ

Καλαμίντι. 433. A  
Καλαμίντι. 81. A  
Καλαμίντι. 392. C  
Καλαμίντι. 337. B  
Καλαμίντι. 351. B  
Καλαμίντι. 324. D  
Καλαμίντι. 397. A  
Καλαμίντι. 397. B  
Καλαμίντι. 378. C  
Καλαμίντι. 347. A  
Καλαμίντι. 376. D  
Καλαμίντι. 410. D  
Καλαμίντι. 385. C  
Καλαμίντι. 797. A  
Καλαμίντι. 426. C  
Καλαμίντι. 349. B  
Καλαμίντι. 339. A  
Καλαμίντι. 529. A  
Καλαμίντι. 341. A  
Καλαμίντι. 421. A  
Καλαμίντι. 359. A  
Καλαμίντι. 105. A  
Καλαμίντι. 410. C  
Καλαμίντι. 123. A  
Καλαμίντι. 402. C  
Καλαμίντι. 367. A  
Καλαμίντι. 373. A  
Καλαμίντι. 445. A  
Καλαμίντι. 358. C  
Καλαμίντι. 820. D  
Καλαμίντι. 344. C  
Καλαμίντι. 448. C  
Καλαμίντι. 405. A  
Καλαμίντι. 412. D  
Καλαμίντι. 437. B  
Καλαμίντι. 363. B  
Καλαμίντι. 442. C  
Καλαμίντι. 429. A  
Καλαμίντι. 339. A  
Καλαμίντι. 388. C  
Καλαμίντι. 427. A  
Καλαμίντι. 375. A  
Καλαμίντι. 450. C  
Καλαμίντι. 443. A  
Καλαμίντι. 407. A  
Καλαμίντι. 443. A  
Καλαμίντι. 558. C  
Καλαμίντι. 452. D  
Καλαμίντι. 493. A  
Καλαμίντι. 454. D  
Καλαμίντι. 460. D  
Καλαμίντι. 495. A  
Καλαμίντι. 466. D  
Καλαμίντι. 363. B  
Καλαμίντι. 472. C  
Καλαμίντι. 450. C

Β

λεκυ-



GRAECARVM NOMENCLATIONVM INDEX.

λίανθος 618. C	πῖπλος 604. C	σκήλα 781. A	χαμαίδους 868. C
λεπίδιον 483. A	πρόδιον 278. C	σκόλυμος 791. A	χαμαεικίος 877. A
λεπιδόφυτον 397. B	πριμύλινον 645. A	σκόρδιον 775. B	χαμαεικυνάριος 873. B
λεονκένθον 563. A	πριμορίον 591. A	σκόροδον 735. A	χαμαελίον λευκός 880. C
λεονκένθον διοσκορίδιον 456. D	πρόσκιμνιον 602. C	σμίλαξ λάπε 719. A	χαμαελίον μέλας 881. C
λεονκένθον θιαφράς 485. A	πυλαίτις 643. B	σμίλαξ τραχύς 717. B	χαμαίμελον 42. D. C
λεονκένθον 477. A	πυροσίλινον 654. C	σμίλαξ λεπταία 707. A	581. C
λεονκένθον 488. C	πυροσίλινον άγριον 573. A	σμίριον 759. B	χαμαίπιτις 884. C
λεονκένθον και λιμνών 386. C	πυροσίλινον 598. D	σπυρίτις 318. D	830. C
λεονκένθον 474. C	πύανον λεπυτήν 615. B	σπυρίτις 673. A	χαράδραν 324. C
λεονκένθον άγρια άγρίων 443. A	πίσος 628. C	σπυρίτις 668. C	χλιδένιον μάγα 864. C
λίον 470. C	πίνα 474. C	σπυρίτις 759. A	χλιδένιον μικρόν 866. C
λόπιμον 376. D	πυλινόνιον άγριον 613. B	σπυρίτις 295. A	χουκώθιμον 878. C
λουσιμάχιον 480. C	πυλινόνιον 587. A	σπυρίτις 419. A	χουκώθιμον 120. C
M	πυλινόνιον 81. A	σπυρίτις 785. A	Ψευδάριον 889. A
Μαλακία 510. C	πυλινόνιον 652. C	σπυρίτις 685. A	ψιλάριον 95. A
μαλακία γόρας 529. A	πυλινόνιον 589. A	σπυρίτις 765. B	ψυλλίον 887. B
μαλακία 500. C	πυλινόνιον 153. B	σπυρίτις 652. C	ψυχότροπον 349. B
μαλακία 153. B	πυλινόνιον 633. A	σπυρίτις 777. B	Ωκυμώδης 895. A
μαλακία 502. D	πυλινόνιον 71. B	σπυρίτις 779. A	ώνων 60. C
μαλακία 526. C	πυλινόνιον 638. C	σπυρίτις 691. A	ΛΑΤΙΝΑ- RVM APPELLA- tionum Index.
μαλακία 497. A	πυλινόνιον 594. D	σπυρίτις 511. B	A
μαλακία 517. B	πυλινόνιον 643. A	σπυρίτις 754. C	Brotonii. 8. C
μαλακία 521. A	πυλινόνιον 640. C	σπυρίτις 694. C	Abinthii. A
μαλακία 514. D	πυλινόνιον 647. B	σπυρίτις 392. C	Acanthus, si- ne Acantha
μαλακία 717. B	P	Τελίον 789. B	51. D
μαλακία 287. A	Ραφανίον, ή ραφανία. 658. D	τελινόνιον 828. C	Aconitum 86. D
μαλακία 521. B	ρδιάρια 664. C	τελινόνιον 804. D	Acorum 13. A
μαλακία 512. C	ρδιάρια 542. C	τελινόνιον 797. A	Adiantum 81. A
μαλακία 524. D	ρδιάρια 542. C	τελινόνιον 810. C	Albugo, siue Abiga 884. C
N	ρδιάρια 656. C	τελινόνιον 809. B	Alzoon 31. A
Ναπυ 537. A	Σ	τελινόνιον 820. D	Alcea 79. B
ναρδία άγρια 855. B	Σακκίον 666. C	τελινόνιον 561. A	Alcibiaceum 278. C
νεύριον 542. C	σακκία βαλάνος 376. D	τελινόνιον 816. C	Alisma 43. C
νευφάια 534. C	σακκία 729. B	τελινόνιον 820. C	Allium 735. A
Ξ	σακκία 709. B	τελινόνιον 795. A	Aloë 137. A
Ξανθόν 578. D	σακκία 709. B	τελινόνιον 691. A	Althaea 16. C
O	σακκία 709. B	τελινόνιον 822. C	Amaracus 666. C
οιανθή 575. A	σακκία 709. B	τελινόνιον 691. A	Amarantus 98. C
οιανθή 563. A	σακκία 709. B	τελινόνιον 822. C	Ambubecia 676. C
οιανθή 546. D	σακκία 709. B	τελινόνιον 691. A	Ammi 66. D
οιανθή 51. C	σακκία 709. B	τελινόνιον 822. C	Anagallis 17. A
οιανθή 542. D	σακκία 709. B	τελινόνιον 691. A	Anagallis aquatica 724. C
οιανθή 565. A	σακκία 709. B	τελινόνιον 822. C	Androsomon 75. A
οιανθή 573. A	σακκία 709. B	τελινόνιον 691. A	Anethum 29. A
οιανθή 551. A	σακκία 709. B	τελινόνιον 822. C	Anethum uaccinū 143. B
οιανθή 567. A	σακκία 709. B	τελινόνιον 691. A	Angelica 126. C
οιανθή 570. C	σακκία 709. B	τελινόνιον 822. C	Anguria 702. C
οιανθή 544. D	σακκία 709. B	τελινόνιον 691. A	Anisum 61. A
οιανθή 558. C	σακκία 709. B	τελινόνιον 822. C	Anonis 60. C
οιανθή 561. A	σακκία 709. B	τελινόνιον 691. A	Anthemis 24. D
οιανθή 578. C	σακκία 709. B	τελινόνιον 822. C	Aparine 51. C
Π	σακκία 709. B	τελινόνιον 691. A	Aphaca 676. D
Παιονία 201. A	σακκία 709. B	τελινόνιον 822. C	Aphace 109. B
παρθέριον 582. C	σακκία 709. B	τελινόνιον 691. A	Apiastrum 155. A
παραφύλλον 622. D	σακκία 709. B	τελινόνιον 822. C	Apium agreste 155. A
	σακκία 709. B	τελινόνιον 691. A	Apium hortense 743. A
	σακκία 709. B	τελινόνιον 822. C	Apium montanū 573. A
	σακκία 709. B	τελινόνιον 691. A	Apium palustre 271. A
	σακκία 709. B	τελινόνιον 822. C	Apium saxatile 654. C
	σακκία 709. B	τελινόνιον 691. A	Apios



# LATINARVM NOMENCLATIONVM INDEX.

Apios	132.C	Cicerbita	673.A	Fontumgræcum	797.A	Leporinus pes	493.A
Apollinaris	832.C	Cicuta	405.A	Fontalis	652.C	Leucoion Dioscoridis	456.D
Aristolochia	89.B	Cinara	791.A	Fragaria	854.C	Leucoion Theophrasti	485.A
Armoracia	661.A	Cinnamalis	81.A	Fumaria	317.B	Lolium	128.C
Arnoglossum	40.A	Citrigo	497.A	Fusus agrestis	123.A	Lichen	472.C
Artemisia	48.A	Clematis Daphnoides	359.A	G		Ligustrum	479.A
Arum seu aris	68.D	Cnicus & cneus	410.C	Galeopsis	193.A	Lilium	363.B
Afarum	9.B	Cnicus sylvester	123.A	Gallion	195.B	Limonium	466.D
Asclepias	130.C	Colubrina	334.D	Geminalis	367.A	Lingua canina	407.A
Ascyrum	73.B	Columbaris seu columbina	591.A	Genista	219.A	Lingua serpentina	578.C
Asparagus	59.C	Colutea	445.A	Genistella	219.A	Linum	470.C
Asphodelus	114.D	Coma	820.D	Geranium	210.C	Lithospermum	488.C
Aster articus	133.A	Consolida media	390.D	Gingidium	217.A	Lunaria minor	481.A
Attractylis	123.A	Consolida minor	145.B	Gith	502.D	Lupinus sativus	305.C
Atriplex	120.C	Conuolvulus	359.A	Gossipium	580.C	Lupus. salictarius uel repens	165.A
Auena	184.C	Corion seu coriannon	344.C	Gramen	135.A	Lychnitis	845.B
Auricula muris	30.C	Corona regia	516.C	H		Lycostomum	86.C
B		Corona Veneris	721.A	Halicacabum	691.A	Lysimachia	490.C
Ballote	153.B	Cotonea malus	375.A	Hedera	421.A	M	
Balsamine	188.C	Crambe	412.D	Hedera terrestris	877.A	Maiorana	666.C
Barba caprina	180.C	Crista gallinacea	591.A	Hedypnois	676.C	Mala insana	532.C
Batrachium	155.A	Crocus	442.C	Helxne	278.C	Malua	510.C
Beta	804.D	Cruciata	419.A	Helxine cissapelos	259.A	Malus cotonea	375.A
Beta sylvestris	466.D	Cucumis, seu cucumer	702.C	Hemionitis	295.A	Marrubium	589.A
Bellis siue bellius	145.A	Cucumis anguino	704.D	Hepatorium	243.A	Melilorus	526.C
Beronica	349.B. & 351.B	Cucurbita	367.A	Hiberis	324.D	Melones	702.C
Blattaria	182.C	Cucurbita sylvestris	373.A	Hieracium	318.D	Mentha	285.A
Blitum siue blitus	173.A	Cunila	303.A	Hieroborane	591.A	Menthastrum	287.A
Botrys	178.C	Cyanus	427.A	Hirci barba	820.D	Mercurialis	474.C
Bouis lingua	141.B	Cydonia	375.A	Hirudinaria	400.D	Mercurialis sylvestris	443.A
Brassica sativa	412.D	Cynia	443.A	Hordeum	437.B	Milium	410.D
Bubula lingua	141.B	Cynoforchis	558.C	Hordeum distichum	437.B	Millefolium	582.C
Buglossum	141.B	Cyperus & cypir	452.D	Hordeum polystichum	437.B	Mors uermium	5.B
Buglossum magnū	341.A	D		Hyacinthus	834.C	Morus	521.B
Bulbus sylvestris	168.D & 358.C	Damassonium	43.C	Hydropiper	842.C	Myrice	512.C
Bupthalmum	143.A	Daphnoides	226.D	Hyoisycamus	832.C	Myrrhis	524.D
Buxus	643.A	Daucus	230.D	Hypericum	830.C	N	
C		Dolichi	707.B	Hysopus	840.C	Napus	175.A
Calamintha	433.A	Dracunculus maior	234.D	I		Napus bunias sativus & sylvestris	175.A
Calitrichum	81.A	Dulcis radix	191.A	Ibiga	884.C	Nardus sylvestris	855.B
Caltha uel calthula	381.B	E		Ibiscus	16.C	Nasturnū agreste	324.D
Campanula	431.B	Ebiscus	16.C	Ilceebra	799.B	Nasturtium sativum	361.B
Canina brassica	443.A	Echium	263.C	Inguinalis	133.A	Nepeta	433.A
Canina malus	519.A	Elenium	241.A	Intubus	676.C	Nerion	542.C
Cannabis	392.C	Elleborus albus	271.A	Inula	241.A	Nigella	502.D
Capillaris	795.A	Elleborus niger adulterinus	276.C	Iouis glans	376.D	Nummularia	400.D
Capfella	303.A	Ephemerū	239.A et 358.C	Iris	254.C	Nux auellana	397.B
Carduus	791.A	Equinalis herba	321.B	Iris sylvestris	239.A	Nux Regia & Persica	378.D
Carduus Veneris	223.A	Equisetum	321.B	Isatis	330.C	Nux castanea	376.D
Carduus suarius	880.C	Erica	254.D	Iuglans	378.D	Nux Pontica	397.B
Carduus niger	882.C	Eruca	261.A	Juniperus	77.A	Nymphæa	514.C
Cardiaca	394.C	Eruum	570.C	Junonis rosa	363.B	O	
Caron uel careum	397.A	Eryngium	297.A	L		OCimum	546.D
Caryophyllata	383.A	Eupatorium	243.A	Labrum Veneris	323.A	Ocimastrum	895.A
Castanea	376.D	Eupatorium adulterinū	264.C	Lactaria herba	810.C	Oenanthe	563.A
Centūmorbia	400.D	F		Lactuca	298.C	Olus atrum	326.D
Centunculū aut centuncularis herba	221.A	Faba	388.C	Lactuca caprina aut marina	810.C	Ononis	60.C
Cepa	429.A	Farrago	767.A	Lactuca syluatica	318.D	Ophioglossum	578.C
Cerasus	426.C	Farsaria	139.B	Lamium	468.D	Ophris	565.B
Chamæcyparissus	873.B	Febrifuga	386.C	Lanaria herba	779.A	Orchis	558.C. & 561.A
Chamædaphne	359.A	Fel terra	386.C	Larix seu Larex	495.A	Origanum	551.A
Chamæleon albus	880.C	Ficus sativa	754.C	Laser, seu Laserpitium	762.C	Orminum	567.A
Chamæmelon	24.D	Filicula	587.A	Lathyrus	454.D	Osyris	542.D
Chelidonium maius	864.C	Filix	594.D	Laurus Alexandrina aut Idæa	237.A	Oxalis	465.A
Chelidonium minus	886.C	Feniculum	500.C	Lens, siue lenticula	858.D	Oxyacantha	542.D
Chrysanthemum	878.C			Lepidion	324.D	Oxylapathum	460.D
Cicer	266.C			& 483.A		Oxya	565.A



# LATINARVM NOMENCLATIONVM INDEX.

**P**  
**P**aeonia 301.A  
 Panicum 352.C  
 Papauer sariuum 517.B  
 Papauer corniculatum 521.A  
 Papauer nigrum 502.D  
 Papauer rhoeas 514.D  
 Parthenium 582.C  
 Pastinaca 685.A  
 Pedicularis herba 785.A  
 Peplos 604.C  
 Pepones 702.C  
 Petalites 641.B  
 Petroselinum 654.C  
 Petroselinum syluestre 573.A  
 Perfoliata 631.B  
 Persicaria 631.A  
 Persica malus 602.C  
 Personaria 71.B  
 Pes anserinus 652.D  
 Pes cornicis 448.C  
 Peucedanus 598.D  
 Phu 855.B  
 Pinaestellus 598.D  
 Piperitis 731.A  
 Pistolochia 89.B  
 Pisum 628.C  
 Pituaria 785.A  
 Plantago 40.A  
 Polygonatum 584.C  
 Polypodium 587.A  
 Polytrichon 628.D  
 Polytrichum 81.A  
 Porrum 633.A  
 Portulaca 111.A  
 Poramogeton 652.C  
 Prænestina nux 397.B  
 Proserpinaca 613.B  
 Prunus 402.C  
 Pseudonardus 889.A  
 Psilothrum 95.A  
 Pulegium 197.A  
 Pulicaris herba 887.B  
 Pulmonaria 636.C  
 Pyrethrū syluestre 638.C  
**Q**  
**Q**uercus 228.C  
 Quinquefolium 622.D  
**R**  
**R**adicula 658.D  
 & 779.A  
 Radix 658.D  
 Ranunculus 155.A  
 Raphanus 658.D  
 Raphanus syluestris 132.C  
 Rapum 211.A. & 450.C  
 Rhodia radix 664.C  
 Rhododendron 542.C  
 Ricinus 339.A  
 Rosa 656.C  
 Rosmarinus 477.A  
 Rubia 279.A  
 Rubus 151.A  
 Rumex 460.D  
 Ruta hortensis 615.B  
**S**  
**S**abina, siue Sauina 149.A  
 Saginialis herba 591.A  
 Saluaris 640.C  
 Salix 333.A  
 Salix equinalis 321.B

Salvia 247.A  
 Sambucus 63.A  
 Sanguinalis 613.B. & 448.C  
 Sanguinaria 448.C  
 Sanicula 672.C  
 Sardiana glans 376.D  
 Satyrium regium 711.B  
 Satyrium trifoliū 709.B  
 Saxifraga 729.B  
 Scandulaceum 305.A  
 Scilla 781.A  
 Scorpionum 86.C  
 Scythica radix 191.A  
 Secale 767.A  
 Sedum 31.A  
 Semen 282.C  
 Semen lumbricorū 5.B  
 Seminalis 613.B  
 Senerio 285.A  
 Sentes 151.A  
 Septifolium 259.B  
 Seriola 676.C  
 Seris 676.C  
 Serpentaria 400.D  
 Serpentaria maior 234.D  
 Serpyllum 250.C  
 Sertula campana 526.C  
 Sefeli Crencum 809.B  
 Sefeli Malsiliense 787.A  
 Sideritis prima 770.C  
 Siliquastrum 731.A  
 Sinapi 537.A  
 Sion 724.C  
 Sifer 750.C  
 Sisymbrium 721.A  
 Sisymbrium cardamine 721.A  
 Sitanium 647.B  
 Smilax aspera 717.B  
 Smilax hortensis 707.A  
 Smilax laxa 719.A  
 Smyrnium 759.B  
 Solanum 691.A  
 Solidago 694.C  
 Solis oculus 582.C  
 Sonchus 673.A  
 Sorbus 575.A  
 Spartum 759.A  
 Spina alba 54.B  
 Spinacia, uel spinaceum olus 668.C  
 Spina mollis 341.A  
 Strachys 765.B  
 Sternuramentaria 638.C  
 Stichas, 777.B > (762.C  
 Strariotes millefolia  
 Strobilus 791.A  
 Succisa 714.C  
 Superciliū terræ 81.A  
 Sylux mater 645.A  
 Symphytum 694.C  
**T**  
**T**amarix 512.C  
 Telephium 799.B  
 Terminalis 392.C  
 Terræ capillus 81.A  
 Terræ corona 877.A  
 Terrestrius malus 529.A  
 Testiculus serapias, siue orchis 561.A  
 Teucrium 828.C  
 Teucrion Plinij 295.A  
 Thlaspi 305.A

Thymbra 303.A  
 Thymus 826.C  
 Thyrallis 845.B  
 Tilia 863.A  
 Tintinabulū terræ 466.D  
 Tithymalorum genera plura 810.C  
 Tordylon, siue tordylon 809.B  
 Trichomanes 795.A  
 Trifoliū odoratū 816.C  
 Triticum 647.B  
 Trifolium pratense 820.C  
 Trifago 868.C  
 Trixago palustris 775.B  
 Tuber terræ 450.C  
 Tusilago 139.B  
 Typha 822.C  
**V**  
 Veratrū album 271.A  
 Verbascum 845.A  
 Verbascula duo 845.B  
 Verbenaca 591.A  
 Vernilagium 881.C  
 Vesicaria 691.A  
 Veronica 349.A  
 Vicia 171.A  
 Victoriola 237.A  
 Viola 456.D  
 Viola alba 485.A  
 Viola matronalis 312.D  
 Viola muraria uel purpurea 310.D  
 Viscum 328.D  
 Vitis alba 95.A  
 Vitis nigra 96.D  
 Vitis uinifera 83.B  
 Umbilicus terræ 450.C  
 Volucrum maius 645.A  
 Vreolaris 278.C  
 Vrtica 105.A  
 Vrtica labeo 193.A  
 Vva crispa 186.C  
**X**  
 Xanthium 578.D  
 Xylon 580.C  
**Z**  
 Zea 282.C  
**INDEX NO**  
**MENCLATIONVM**  
 quibus officinæ se-  
 plasiariorū, & her-  
 barij nostri tempo-  
 ris utuntur.  
**A**  
 Brotonū. 8.C  
 Abinthiū. 3.A  
 Acorū 13.A  
 Acus pasto-  
 ris 210.C  
 Acetosa 465.A  
 Acutella 60.C  
 Affodillus 114.D  
 Agrimonia 243.A  
 & 620.C  
 Alchimilla 613.A  
 Alliaris & alliaria 103.A  
 Alleuya 565.A  
 Allium 735.A  
 Alkakengi 691.A

Aloë 137.A  
 Altaraxacon 676.D  
 Altercum 832.C  
 Amcos 66.D  
 Amoris poma 532.C  
 Anethum 29.A  
 Anisum 61.A  
 Apium hortense 743.A  
 Apium agreste 155.A  
 Aquilegia 101.B  
 Archangelica 468.D  
 Arcocus 791.A  
 Aristologia 89.B  
 Armoracia 661.A  
 Artemisia 48.A  
 Arthanita 450.C  
 Arthetica herba 845.B  
 Articolalus 791.A  
 Asa fœtida 762.D  
 Asarum 9.B  
 Aspergula 51.C  
 Asprella 321.B  
 Atriplex 120.C  
 Avena 184.C  
**B**  
 Balsamita 721.A  
 Baptisecula 427.A  
 S. Barbaræ herba 745.A  
 Bardana 71.B  
 Basilicon 546.D  
 Bedegarim, siue Bede-  
 guar 54.B  
 Belzuinum 761.D  
 Benedicta herba 383.A  
 Berberis 543.D  
 Betonica 349.A  
 Bipennula 607.B  
 Bistorta 259.B.  
 & 772.D  
 Bismalua 16.C  
 Bombasum 580.C  
 Bombax 580.C  
 Bonifacia 237.A  
 Bonus Henrichus 465.A  
 Borrage 141.B  
 Branca ursina 51.D  
 Bruscandula 165.A  
 Bryonia 95.A  
 Bucheiden 711.B  
 Buglossa 341.A  
 Buglossū syluestre 268.C  
 Bursa pastoris 305.A  
**C**  
 Calamentum 433.A  
 Calendula 381.B  
 Camomilla 42.D  
 Campana 241.A  
 Campanella 719.A  
 Canapus 392.C  
 Candela regis, quæ & can-  
 delaria 845.A  
 Capillus Veneris 81.A  
 Caprifolium 645.A  
 Caputi caules 412.D  
 Cardo fullonū, seu Car-  
 duus fullonius 223.A  
 Cardoparium 880.C  
 Cardus benedictus 123.A  
 Carota 685.A  
 Carramum 410.C  
 Carramū syluestris 123.A  
 Cartafilago 729.A  
 Carui 397.A  
 Castrangula 193.A  
 Gatapu-



OFFICINIS SEPLASIARIORVM CONSVETAE NOMENCLATVRAE.

<p><b>C</b>  <i>Cataputia maior</i> 339.A  <i>Cataputia minor</i> 454.D  <i>Cauda equina</i> 321.B  <i>Caulis</i> 412.D  <i>Cauta</i> 582.C  <i>Cepa</i> 439.A  <i>Cepa sylvestris</i> 168.D  <i>&amp; 839.B</i>  <i>Centauria minor</i> 386.C  <i>Centuinodia</i> 613.B  <i>Centumcapita</i> 297.A  <i>Chamaedrys</i> 868.C  <i>Charefolium</i> 217.A  <i>Cheiri</i> 456.D  <i>Chelidonia</i> 864.C  <i>Cherudla</i> 750.C  <i>Cicer</i> 266.C  <i>Cichorea</i> 676.C  <i>Cicuta</i> 405.A  <i>Cicuraria</i> 524.D  <i>Cironia</i> 375.A  <i>Citruli uel citreoli</i> 702.D  <i>Coloquintida</i> 373.A  <i>Colubrina</i> 773.D  <i>Conditi</i> 779.A  <i>Consolida maior</i> 694.C  <i>Coriandrum</i> 344.C  <i>Cornu ceruinu</i> 443.C  <i>Corrigiola</i> 613.B  <i>Cotula fetida</i> 582.C  <i>Cotula non fetida</i> 142.A  <i>Corum</i> 580.C  <i>Crassula maior</i> 799.B  <i>Cresio hortensis</i> 361.B  <i>Crocus</i> 442.C  <i>Crocus hortensis</i> 410.C  <i>Cuculus</i> 691.A  <i>Cucumer, seu Cucumis</i> 702.C  <i>Cucumer asininus</i> 704.D  <i>Cucurbita</i> 367.A  <i>Cuscuta</i> 347.A  <i>Cyclamen</i> 450.C  <i>Cynoglossum</i> 407.A  <i>Cypripus</i> 452.D  <i>Cypripus</i> 873.B</p>	<p><b>F</b>  <i>Flos amoris</i> 98.C  <i>Flos february</i> 495.A  <i>Flos omnium mensium</i> 381.B  <i>Feniculum</i> 500.C  <i>Feniculus porcinus</i> 598.D  <i>Fenugracum</i> 797.A  <i>Fortis, seu fortis herba</i> 719.A  <i>Fuga demonum</i> 830.C  <i>Fumus terre</i> 337.B  <i>Funis arborum</i> 719.A  <b>G</b>  <i>Gallitrichum</i> 81.B  <i>&amp; 567.A</i>  <i>Genesta, siue Genestra</i> 219.B  <i>Gentiana</i> 199.A  <i>Glastum</i> 330.C  <i>Gratia Dei</i> 210.C  <i>Guadum</i> 330.C  <b>H</b>  <i>Hederaterristris</i> 877.A  <i>Hepatica</i> 472.C  <i>Herba diui Ioan.</i> 830.C  <i>Herba fortis</i> 729.A  <i>Herba fullonum</i> 779.A  <i>Herba paralytis</i> 845.B  <i>Herba Roberti</i> 210.C  <i>Herba stellæ</i> 448.C  <i>Hernodactylus</i> 358.C  <i>Hirundinaria</i> 130.C  <i>Hipanach</i> 668.C  <i>Hipanicum olus</i> 668.C  <i>Hordeum</i> 437.B  <i>Humulus</i> 165.A  <i>Hypericum</i> 830.C  <i>Hyssopus</i> 840.C  <b>I</b>  <i>S. Iacobi flos</i> 741.B  <i>Iarum</i> 68.D  <i>Indicum</i> 330.C  <i>Iungus</i> 297.A  <i>Iris</i> 316.C  <i>Iua muschata</i> 884.C  <i>Iuniperus</i> 77.A  <i>Iulianum</i> 832.C  <b>K</b>  <i>Keirim</i> 456.D  <i>Kerua</i> 339.A  <b>L</b>  <i>Lactuca</i> 392.C  <i>Lactucella</i> 673.A  <i>Lapathum acutu</i> 460.D  <i>Lanaria</i> 845.A  <i>Lappa maior</i> 71.B  <i>Lappa inuersa</i> 578.D  <i>Lappa minor</i> 573.D  <i>Larga</i> 495.A  <i>Laureola</i> 226.D  <i>Lens</i> 858.D  <i>Leusticum</i> 759.B  <i>Lilium album</i> 163.B  <i>Lilium conualliu</i> 239.A  <i>Lilium inter spinas</i> 645.A  <i>Linaria</i> 544.D  <i>Lingua bonis</i> 341.A  <i>Lingua ceruina</i> 395.A  <i>Linum</i> 470.C  <i>Liquiritia</i> 191.A  <i>Luparia</i> 86.C  <i>Lupinus</i> 308.C  <i>Lupulus</i> 165.A  <b>M</b>  <i>Maiorana</i> 666.C</p>	<p><b>M</b>  <i>Malua</i> 510.C  <i>Maluanisicum</i> 16.C  <i>Mandragora</i> 529.A  <i>Marrubiu nigrum</i> 153.B  <i>Marrubiastrum</i> 153.B  <i>Marsylua</i> 645.A  <i>Matricaria</i> 48.A  <i>Melanzana</i> 532.C  <i>Medilotum</i> 526.C  <i>Melissa</i> 497.A  <i>Mentha</i> 287.A  <i>Mentha aquatica</i> 721.A  <i>Mentha Romana</i> 287.A  <i>Mentha Saracenicæ</i> 287.A  <i>Mercurialis</i> 474.C  <i>Milium</i> 410.D  <i>Milium solis</i> 488.C  <i>Millefolium</i> 726.C  <i>Millemorbia</i> 193.A  <i>Mora uaticana</i> 151.A  <i>Morella</i> 691.A  <i>Morus diaboli</i> 714.C  <i>Morus gallinæ</i> 20.C  <i>Morus celsi</i> 521.B  <i>Muralis</i> 278.C  <b>N</b>  <i>Nasturtium</i> 361.B  <i>Nasturtium aquaticum</i> 721.A  <i>Nasturtium testorum</i> 305.A  <i>Nenuphar</i> 534.C  <i>Nigella</i> 502.D  <i>Nil</i> 330.C  <i>Nilech</i> 330.C  <b>O</b>  <i>Ocularia</i> 245.A  <i>Oculus bouis aut uaccæ</i> 145.A  <i>Oleander</i> 542.C  <i>Ophthalmica</i> 245.A  <i>Orobis</i> 570.C  <i>Organum</i> 551.A  <i>Os mundi</i> 109.B  <i>Ofatis</i> 330.C  <i>Osteritium</i> 762.C  <b>P</b>  <i>Paconia</i> 201.A  <i>Pagana lingua</i> 237.A  <i>Palma Christi</i> 339.A  <i>&amp; 711.B</i>  <i>Pampinula</i> 607.B  <i>Panis cucull</i> 565.A  <i>Panis porcinus</i> 450.C  <i>&amp; 132.D</i>  <i>Panis terre</i> 450.C  <i>Papauer</i> 517.B  <i>Papauer cornutu</i> 521.A  <i>Papauer rubrum</i> 514.D  <i>Parietaria</i> 278.C  <i>Pastinaca</i> 750.C  <i>Pastoria bursa</i> 610.C  <i>Pentadactylon</i> 339.A  <i>Pera pastoris</i> 610.C  <i>Perforata</i> 830.C  <i>Persica</i> 602.C  <i>Peruinca</i> 359.A  <i>Pes asserinus</i> 652.D  <i>Pes asinus</i> 103.A  <i>Pes columbinus</i> 210.C  <i>Pes corui</i> 155.A  <i>Pes leonis</i> 613.A  <i>Pes uulvi</i> 68.D  <i>Petroselinum</i> 573.A</p>	<p><b>P</b>  <i>Phasioli</i> 707.B  <i>Pilosella</i> 604.D  <i>Pimpinella</i> 607.B  <i>Piper Hispanum, seu Indicum</i> 731.A  <i>Piperitis</i> 483.A  <i>Plantago</i> 40.A  <i>Podagra lini</i> 347.A  <i>Polypodium</i> 587.A  <i>Polytrichon</i> 795.A  <i>Porrum</i> 613.A  <i>Portulaca</i> 311.A  <i>Potentilla</i> 620.C  <i>Praffum</i> 589.A  <i>Praffum fortidum</i> 153.B  <i>Primula ueris</i> 145.B  <i>Prunella</i> 622.D  <i>Prunella, siue Prunella</i> 402.C  <i>Prunus</i> 402.C  <i>Pseudomelanthion</i> 128.C  <i>Psyllium</i> 887.B  <i>Pulegium</i> 197.A  <i>Pulegiu sylvestre</i> 431.A  <i>Pyrethrum</i> 640.C  <i>Pyrethru sylvestre</i> 638.C  <i>Pyrola</i> 460.D  <b>Q</b>  <i>Quercus</i> 228.C  <i>Quinquefolium</i> 622.D  <b>R</b>  <i>Raphanus minor &amp; maior</i> 661.A  <i>Rapistrum</i> 256.C  <i>Rapum</i> 211.B  <i>Rapunculus</i> 211.B  <i>Remora atrati</i> 60.C  <i>Resa bouis</i> 60.C  <i>Rhabarbaru monachorum</i> 460.D  <i>Ribe</i> 662.D  <i>Roberti herba &amp; Robertiana</i> 210.C  <i>Rosa canina</i> 656.D  <i>Rosmarinus</i> 477.A  <i>Rosmarinus aculeatus</i> 210.B  <i>Rosmarinus ciconia</i> 210.C  <i>Rostrium porcinu</i> 670.D  <i>Rubea tinctoru</i> 279.A  <i>Ruta</i> 615.B  <b>S</b>  <i>Sacerdotis urile</i> 62.D  <i>Salicaria</i> 490.C  <i>Salvia</i> 247.A  <i>Salvia uita</i> 729.B  <i>Sanamunda</i> 383.A  <i>Sancti spiritus radix</i> 126.C  <i>Sandaracha Arabu</i> 77.A  <i>Sanguisorba</i> 790.C  <i>Sanicula</i> 672.C  <i>Saponaria</i> 779.A  <i>Sardianæ glandes</i> 376.D  <i>Satureia</i> 103.A  <i>Sauina uel Sabina</i> 149.A  <i>Saxifraga lutea</i> 748.D  <i>Saxifraga maior</i> 743.C  <i>Saxifraga rubra</i> 563.A  <i>Scabiosa</i> 717.A  <i>Scariola</i> 676.C  <i>Sceler</i></p>
--	--	---	---



GERMANICARVM APPELLATIONVM INDEX.

Scrophularia maior  
193. A  
Semperuium 31. A  
Semperuium maritimum  
137. A  
Sena 445. A  
Serpentaria minor 68. D  
Serpentaria officinarum  
772. D  
Serpillum 250. C  
Serpillu romanu 826. C  
Seruilla 750. C  
Serullum 750. C  
Sigillu Salomonis. 584. C  
Siler montanum 787. A  
Simeonis herba 79. B  
Sinapi 517. A  
Sinapi rusticum 305. A  
Sinapi syluestre 256. C  
Sitanium 647. B  
Solatrum 691. A  
Solidago Sarracenia  
729. A  
Sorba 575. A  
Sorgi 772. C  
Sparagus 59. C  
Spelra 282. C  
Sphatula fetida 793. B  
Squilla 781. A  
Staphisagria 785. A  
Stella herba 448. C  
Strichas arabica 777. B  
Strichas citrina 98. C  
Stramonia 691. B  
Succus cyrenaic. 762. D  
T  
Tamariscus 512. C  
Tanacetu 48. B. & 49. C  
Tanacetu syluestre. 620. C  
Tapius barbatus 845. A  
Taraxacon 676. D  
Testiculus canis 558. C  
Testiculus uulpis, aut sa-  
cerdotis 709. B  
Tilia 861. A  
Tinctorius flos 809. A  
Tormentilla 259. B  
Trifoliu. 816. C. & 820. C  
Trifoliu acetosum. 565. A  
Trifolium humile. 493. A  
Trinitas 493. A  
Trinitatis herba 802. D  
Triticum 647. B  
Tunica 351. B  
Turcicu frumentu. 824. C  
V  
Valeriana 855. B  
Vernix 77. A  
Verbena 591. A  
Veronica 168. C  
Vincaperuinca 359. A  
Vincetoxicum 130. C  
Viola 310. D  
Virga pastoris 223. A  
Viscum 328. D  
Vitalis 259. A  
Vitia syluestris 109. B  
Viticella 95. A  
Vngula caballina 139. B  
Volubilis maior 719. A  
Volubilis media 259. A  
Vrnalis herba 544. D  
Vrtica 105. A  
Vrtica iners, mortua uel

alba 468. D  
Vua lupina 691. A  
Vua uersa seu uulpina  
86. C  
Vua uulpis 691. A  
Vuularia 237. A  
Z  
Zingiber caninum  
731. A

GERMANI-  
CARVM APPEL-  
lationu Index.

A  
Aethon 795. A  
Ackerpfirren  
809. A  
Affolter 328. D  
Alant 241. A  
Alraun 529. A  
Amelkorn 647. B  
Andorn das weibie  
589. A  
Apostemkraut 717. A  
Arneoca 791. C  
Auffenblatt 237. A  
Augentrost 245. A  
Augenwurtzel 855. B  
B  
Bachmünz 721. A  
Baldnon 855. B  
Balsammünz 287. A  
Balsamkraut 287. A  
S. Barbara fraut  
745. B  
Basilien 546. D  
Basilgram 546. D  
Baumfarr 587. A  
Baumwoll 580. C  
Baurenepich. 271. A  
Baurnsenf 305. A  
Beinhölzlin 479. A  
Benedicte wurtz. 383. B  
Bergmünz 551. A  
Bertram 640. C  
Beerwurtz 809. B  
Besemkraut 305. A  
Beutlerseuf 578. D  
Biberkraut 386. C  
Bibinellen/ oder Bis-  
bernellen 607. B  
Bilsamkraut 832. C  
Bingelkraut 474. C  
Bismünz 785. A  
Baumopheo 421. A  
Blaternkraut 866. C  
Blaw gilgen oder blaw  
schwertel 36. C  
Blaw foenblumen  
427. A  
Blawmenderle. 868. D  
Blaw merzenblümle  
834. C  
Blaw veiel 310. D  
Blutkraut 790. C  
Bluttröpfle 351. B  
Boberellen 691. A  
Bockobart 820. D  
Bockshorn 797. A  
Bonon 388. C  
Brachendissel 297. A

Braun betonick. 349. B  
Braun doften 551. A  
Braun melanzä. 532. D  
Braunellen 622. C  
Braun weiderich. 490. C  
Braunwurtz 193. A  
Brauner fingerhüt  
892. C  
Brennkraut 845. A  
Bryllauch 633. A  
Buchwurtz 243. A.  
631. B  
Bunnen leberkraut  
472. C  
Bübenleuf 578. D  
Büchampffer 565. A  
Büchbrot 565. A  
Büchflee 565. A  
Buchsbäum 643. A  
C  
Cassani 376. D  
Calecutischer/ oder  
Indianscher pfeffer  
731. A  
Christwurtz 276. C  
Citronen 702. D  
Cypress 873. B  
Coloquint 373. A  
Coriander 344. C  
Creutzbaum 339. A  
Creutzsalbey 247. A  
Creutzwurtz 285. A  
419. A  
Cucumern 702. C  
D  
Dubekropff. 337. B  
Deumet/ oder frug  
deymet 287. A  
Denngras 613. B  
Dennenmarck 855. B  
Deschelkraut 610. C  
Dinkelkom 282. C  
Dondernegele 351. B  
Doften 551. A  
Dratblüm 878. C  
Dräselsteyrblumen  
802. D  
Droffwurtz 587. A  
Durchwachß 631. B  
E  
Eberwurtz 880. C  
Edel salbey 247. A  
Einkorn 282. C  
Eisenkraut 591. A  
Eisernhart 591. A  
Engelsfuß 587. A  
Egelkraut 400. D  
Ephew 421. A  
Eppich/ oder Eppich  
271. A. 743. A  
Erbs 628. C  
Erbsell 542. D  
Erdapffel 450. C  
Erdebeer 854. C  
Erdtrophew 421. A.  
877. A  
Erdenkrenzlin 877. A  
Erdauch 337. B  
Erdrwurtz 868. D  
Erdrwurtz 450. C  
Erdgall 386. C  
Ernroß 510. C  
Ernen 570. C

Esels cucumber 704. D  
F  
Fagbon 308. C  
Feigebäum 754. C  
Feigwarzefraut 866. C  
felber 333. A  
feldnegele 351. B  
fenchel 500. C  
fenich 252. C  
ferbblumen 809. A  
feberkraut 386. C  
filzfraut 347. A  
fingerhüt 892. C  
fischmünz 721. A  
Fotzwang/ oder Fotz  
wein 799. B  
flachß 470. C  
flachsfraut 544. D  
flachseiden 347. A  
flöckfraut 631. A  
Frauenveiel 312. D  
freyschamkraut. 802. D  
fremdder Petersilien  
654. C  
fünfblatt 622. D  
fünf fingerkraut 622. D  
G  
GAmenderle 868. D  
Garben 726. C  
Garten oder heimisch  
Benedictenwurtz.  
383. B  
Gartenkress 361. B  
Garten hyfop 303. A  
Gartensenff 537. A  
Gauchblüm 324. D  
Gauchbrot 820. D  
Gauchflee 565. A  
Geißblatt 645. A  
Geeler fingerhüt. 892. C  
Geeler/ oder goldener  
flee 748. D  
Geelmünz 433. A  
Geel melanzan. 532. D  
Geel ölmagen 521. A  
Geel rüben 685. A  
Geel schlüsselblumen.  
845. B  
Geel seelblumen. 534. C  
Geel weiderich. 490. C  
Genßfuß 652. D  
Genßpappel 510. C  
Genferich 620. C  
Gerlin/ oder Geirlin  
750. C  
Gersten 437. B  
Gerwel 726. C  
Gilbblumen 809. A  
Gilgen 363. B  
Glatte winden. 719. A  
Glasfraut 278. C  
Gladkraut 770. C  
Glutchen 514. D  
Goldblüm 878. C  
Gottheyl 622. C  
Gotts vergeß 589. A  
Grasblumen 351. B  
Grindkraut 285. A  
Grindwurtz 460. D  
Groß bathengel. 828. C  
Große beinwell. 694. C  
Groß eppich 326. D  
Groß feigwarzen-  
fraut



GERMANICARVM APPELLATIONVM INDEX.

Ercein.



Steinklee 748. S	526. S	Weisser ephew 421. A	Wilden poley 433. A
Steinleberfraut 472. C	Vogelneft 685. A	Weyde 330. C	Wild rofen 656. S
Steinmünz 433. A	<b>W</b> Andlüßkrut 793. B	Weyssen 647. B	Wilde salbey 567. A
Steinrauten 729. B	Waldfarz 594. S	Weyssenfolb 647. B	Wild scharlach 567. A
Steinsomen 488. C	Waldelilgen 645. A	Welsch vael 312. S	Wild senff 256. C
Stendelwurtz 709. B	Waldelöl 466. S	Welsch linsen 445. A	Wild schwarzer conian der 502. S
Stuchasfraut 777. B	Waldmägolt 466. S	Welsch nuß 378. S	Wild wullkraut 845. B
Streyffwurtz 460. S	Walwurtz 694. C	Welscher hirs 772. C	Windenkraut 719. A
Streichblumen 809. A	Wasserbatenig 775. B	Welscher steinklee 526. S	Wintergrün 466. S
<b>T</b> Ag vñ nacht 278. C	Wasserdost 264. C	Welscher weyssen 647. B	Wysenflee 820. C
Tamarisk 512. C	Wasserepff oder eppich 271. A	Widertodt 795. A	Wysenfümel 397. A
Taubnessel 468. S	Wassermähnen 534. C	Wilderbalsam 287. A	Wolffomilch mancher ley 810. C
Tausenblatt 726. C	Wassermünz 721. A	Wild Basilg 895. A	Wolgemüß 551. A
Teuffels abbiß 714. C	Wasserpfeffer 843. C	Wild Benedictē wurtz 383. B	Wolricheder flee 816. C
Teuffelomilch 604. C	Wegdant 613. B	Wild bertram 638. C	Wüterich 405. A
Thym 826. C	Weggras 613. B	Wild bingelfraut das mennle 443. A	Wullkraut 845. A
Todtern 347. A	Wegwarten / oder weg weiß 676. C	Wild chamillen 582. C	Wunderbaum 339. A
Todnessel 468. S	Weiden 333. A	Wild cucumer 704. S	Wunderkraut 799. B
Tormentill 259. B	Weiderich 490. C	Wild flasche 544. S	Wurmkraut 48. A
Treibkörner 454. S	Weingartenwinden 259. A	Wild gelgan 452. S	Wundtscherling 405. A
Triack 855. B	Weinrauten 615. B	Wild gartensaffran 410. C	Wuzerling 405. A
Türkisch Cucumern 702. S	Weiß Andom 589. A	Wild Himmelschlüssel 845. B	<b>M</b> E lenger selieber Ingrün 359. A (884. C)
Türkisch Korn 824. C	Weiß Glocken 719. A	Wilden flee 526. S	<b>N</b> apff lin kraut 237. A
<b>M</b> iel 456. S	Weiß Himmelschlüssel 845. B	Wilden forstfell 524. S	<b>P</b> am Pastiney 685. A
Veichwurtz 316. C	Weiß Hornungß blü men 485. A	Wilden freß 324. S	<b>S</b> am / oder gartensenff 537. A
Vergiß mein nit 868. S	Weiß lilgen 363. B	Wilden fürbß 373. A	<b>S</b> amer saffran 442. C
Verich 542. S	Weiß morelen 750. C	Wild maen 514. S	<b>S</b> eitlosen 358. C
Vnholden fertz 845. A	Weiß nißwurtz 271. A	Wild moren 750. C	<b>S</b> eunling 645. A
Vnser frauen flachß 544. S	Weiß seeblumen 594. C	Wild müng 287. A	<b>S</b> iffern 266. C
Vnser frauen mantell 613. A	Weiß senff 261. A	Wild negelblümē 351. B	<b>S</b> itterwurtz 460. S
Vnser frauen münz 287. A	Weißwurtz 584. C	Wild ochsenzungen 269. C	<b>S</b> zweyblatt 565. B
Vnser frauen schüchlin	Weiß steinbrech 748. C	Wild pastiney 685. A	<b>Z</b> wibel 303. A 429. A

Sequentes duæ appendices suis capitibus adiſſiantur.

*Appendix in caput de Colutea. Pag. 445.*

Dum hosce cōmentarios conscriberemus non erat ad manū græcus Theophrastus: quare cum latino tantū utendum esset exemplari Theophrasti, nō satis cōſicere potuimus an per y aut per *eu* uox ipsa scriberetur, cum nō raro Latini eas uoces in quibus græcū est, per u efferant. Quare latine dici hanc herbam Coluteam & Colyteam putauimus. Sed nacti tandem græco Theophrasti codice, statim deprehendimus *κολυτρία* à *κολυτρία* diuersam esse: idipsum enim Theophrastus manifestè innuit. In latina uerò Theodori uersione perperam pro Colytea scribitur Colycea: id quod nobis etiam tenebras offudit. Legendum itaq; initio capitis de Colutea in eum modum erit: *κολυτρία* Græcis, Colutea Latinis dicitur &c. Expungenda itaq; dictio Colytea, & passim in hoc capite pro Colytea legendum Colutea.

Colutea  
differt à  
Colytea*Appendix in caput de Trifolio odorato. Pag. 816.*

Non laet hanc herbam propè accedere ad descriptionē Loti syluestris. Caulem namq; fert bicubitalem, & aliquando maiore, numerosis alarum cauis. Folia Trifolio quod in pratis nascitur similia: semen Fornogræco ita respondens, ut nisi minus esset, uix ab inuicem discerneres: sapore item medicato. Tamen non minus accedit etiam ad Trifolij acutipetituram. Frutex enim uerius esse quàm herba uidetur, cubito maior, uirgas habens tenues, nigras, iuncosa adnata obrintes, in quibus sunt folia Loti, in singulis pediculis tria, in ambitu cuspidibus serrata, ut hinc cōmodissime dici mereatur *δρυφολλον*. Hæc etiam odorata sunt uehementer, ut nonnullis caput offendant: & ad bituminis certè odorem proximè accedunt, sed non parum tamen suauior & iucundior est. Florem præterea ex se mittit purpureum, hoc est, ad purpuræ colorem non nihil accedentem: ex albo enim purpureus, aut subcæruleus est. Semen etiam modicè latum, & subhirsutum, ex altero sine ueluti cornu obtinens. Quod ego non de ipso quidem nudo semine, sed de eius potius folliculo, quod in cacumine planè aculeatum ac ueluti cornutum existit, intelligendum puto. Radix deniq; illi longa, gracilis, & tenax existit, nihilq; est in tota descriptione quod ei aptissime nō quadret. Accedit præterea amaritudo quæ in semine non est obscura, pulchrè sibi etiam Trifolij odorati facultates uendicans: mouent enim quæ amara sunt uri nam, menses ducūt, comitialibus profunt, aliæq; quæ Dioscorides Trifolio huic adscribit efficere possunt. Quare ijs rationibus motus, à concepta sententia discedere nondū queo, nisi contingat nobis aliam intueri stirpem, cuius semina, atque adeo grana ipsa hirsuta, & cornuta existant. Quamquā non lateat parum admodum referre utram sententiā, nostram aut aliorum amplectaris, cum Lotus & Trifolium facultatibus non multum aut ferè nihil distent. In hoc tamen semine, quod nos Trifolij odorati esse contendimus, nulla inesse apparet adstrictio, quam tamen in Loti semine Dioscorides requirit. Quod pro confirmanda nostra sententia adſicere uoluimus.

Errata quædam momentanea ad finem operis quære.





ABSINTHIUM  
VULGARE

Wermüt.

A





Welsomen.

SERIPHIVM  
absinthium.



## NOMINA.



Ἐνθιον græcè, Absinthium latinè appellatur. In officinis suam appellationem retinuit. Germanicè *wermsit* / quasi prohibens hilaritatem & alacritatem, ob immensam suam amaritudinem, nominatur. Nomen hoc Græci ab ἀντίφρασι, id est, contrectando, per ἀντίφρασι deflexerunt, quod nulum animal, ob eximiam amaritudinem, hanc herbam attingat. Veteres Græci Comici ἀπίνθιον quoque conformi etymo, quasi impotabilem dixerunt, quod hanc nemo, propter insignem amarorem, bibere possit.

*Absinthium uero de dictum.*

## GENERA.

Absinthij genera sunt tria, Galeno & Dioscoride testibus. Vnum quod Romanum, uulgare seu cōmune uocant, & est id quod passim in Germania nostra nascitur, & cuius picturam hic damus. Huius generis est quod à Ponto regione, in qua nascitur, Ponticum cognominatur, estq; ceteris multo præstantius. Alterum genus est marinū, quod Seriphium nominant. Germani *welsomen*. Tertium Santonicū, à Santonibus Galliæ populis, apud quos plurimum gignitur, dictum est. Hinc nonnulli eius semen corrupta uoce Sanctum, quoniam Sanctonicum dicendum esset, appellant. Nisi id nominis ob insignē eius efficaciam, quam in necandis lumbricis obtinet, illi imposuerint. Hodie semen lumbricorū nuncupāt, germanicè *wurmsomen*.

*Vulgare Absinthium.*

*Ponticum.*

*Seriphium.*

*Santonicum.*

## FORMA.

Absinthiū uulgare, herba est caule ramoso, folijs incanis, multipliciter sectis, aureo flore, semine rotundo, racematim coherente. Seriphium uerò herba est præternues ramos citròsue habens, minori similis Abrotono, exiguis referta seminibus, subamara, & graui odore. Ex qua deliniatione omnibus perspicuum fit, herbam cuius effigiem damus esse Seriphium. Siquidem herba est tenuibus cirris, Abrotono fœminæ similis, semine in siliquis paruo, grauiter odorata, & subamara. Santonicū simile est Absinthio, sed non adeo copioso semine scatens, & subamarum.

*Vulgare Seriphium.*

*Santonicum.*

## LOCVS.

Nascitur, Oribasio & Apuleio autoribus, locis cultis, montosis & saxosis: plurimum autem præstantissimumq; in Ponto, Cappadocia, & Tauro monte. Seriphium passim circa itinera, macerias uinearum, & sepes provenit: ut uerum sit quod à Plinio dictum est, plerasq; herbas pedibus cōculcamus, quarum si nobis uirtus perspecta esset, eas in cœlum laudibus ferremus, Santonicum in Gallia, ut diximus, copiose gignitur.

## TEMPVS.

Colligendum in fine Iulij mensis, ac in umbra exiccandum, quo etiam tempore floribus & semine prægnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Ponticum minus calefacit, quod adstrictionis multæ sit particeps. Minus etiam cæteris generibus extenuat, nō minus tamen resiccat. Galeno itaq; autore calidum in primo gradu, & siccum in tertio statuitur. Succus autem eius longè quàm herba ipsa calidior est. Vulgare quidem adstrictoriam, amaram & acrem qualitatem obtinet, haud secus atq; Ponticum. In hoc tamen ab eo differre uidetur, quod in illo maior sit amaritudo quàm adstrictio. Quamuis neque Ponticum modicè amarum sit, quod Ouidius satis ijs innuit uersibus:

Turpia deformes gignunt Absinthia campi,

Terraq; de fructu, quàm sit amara docet.

Loquitur autē de Ponto. Seriphium ipsum Abrotono minus est calidum, uerum Absinthio calidius. Santonicum in extenuando & calefaciendo desiccandoue, Seriphio paulò imbecillius.



## VIRES. EX DIOSCORIDE.

c Absinthium calfacit, adstringit, bilemque stomacho & uentri inhaerentem expurgat. Vrinam cit. Crapulam praesumptum arcet. Inflationibus, uentrisque & stomachi doloribus, cum Sefeli & Nardo Gallico potum prodest. Fastidia discutit. Morbo regio correptos, dilutum aut decoctum eius per singulos dies cyathis tribus haustum sanat. Menses cum melle sumptum aut appositum euocat. Strangulationibus fungorum ex aceto potum subuenit. Ixiæ, cicutæ, muris aranei moribus, & draconi marino cum uino aduersatur. Anginis cum melle & nitro inungitur. Contra epiphyctidas ex aqua, sugillata uero & oculorum caligines cum melle, similiter auribus ex quibus manat sanies, illinitur. Decocti eius uapor suffitusue, dentium auriumque dolores lenit. Decoctum cum passo dolentibus oculis oblinitur. Præcordijs, iecinori, & stomacho dolenti, ac longo tempore affecto, cum cerato Cyprino tritum illinitur. Stomacho autem cum rosaceo subactum. Cum ficis, nitro, & farina loliacea, aqua inter cutem, lienosisque subuenit. Præterea uestiarijs arcisque inditum Absinthium, uestes ab erodentium iniurijs seruat. Culices cum oleo perunctum à corporibus abigit & arcet. Atramentum librarium ex diluto eius temperatum, literas à murium erosione tuetur. Par est etiam succum hæc omnia facere, attamen in potionibus improbatur, stomacho enim obest, & capitis dolores adfert. Seriphium uero per se, uel cum oryza decoctum, & cum melle sumptum, ascaridas & rotundos lumbricos necat, aluum simul leuiter subducens. Eadem potest præstare cum edulio aut lenticula decoctum. Santonicum eadem quæ Seriphium potest.

## EX GALENO.

D Absinthium adstrictoriam, amaram, & acrem simul qualitatem possidet, exalfaciens pariter & extergens, roborans & desiccans. Proinde biliosos uentris humores per egestionem infernam propellit, ac per urinam euacuat. Magis uero quod in uenis est biliosum per urinas expurgat. Ideo contentam in uentre pituitam, sumptum nihil iuuat. Sic neque si in thorace aut pulmone contineatur: nam adstringens in eo facultas, quam amara ualentior est.

## EX PLINIO.

Stomachum corroborat, & ob hoc sapor eius in uina transfertur. Bibitur decoctum in aqua, & postea nocte & die refrigeratum sub dio: decoctis sex drachmis foliorum cum ramis suis in cœlestis aquæ sextarijs tribus. Oportet & salem addi. Tritum, ut aiunt, raro in usu est, sicut & succus expressus. Bibitur & madefacti dilutum. Exprimitur autem cum primum semen turgescit, madefactum aqua triduo recens, aut siccum septem diebus, deinde coctum in æreo uase ad tertias, decem heminis, in aquæ sextarijs quadragintaquinque, iterumque percolatum, herba cicta, lente coquitur ad crassitudinem mellis, qualiter ex minore Centaurio quaeritur succus. Sed hic Absinthij succus inutilis stomacho capitique est, cum (ut tradunt) sit illud decoctum saluberrimum: nam stomachum adstringit, bilemque detrahit, urinam cit, aluum emollit, & in dolore sanat, uentris animalia pellit. Malaciam stomachi & inflationes cum exiguo Sili & Nardo Gallico, addito aceto, discutit. Fastidia abstergit, concoctiones adiuuat. Cruditates detrahit cum ruta, & pipere, & sale. Antiqui purgationis gratia dabant cum marinæ aquæ ueteris sextario, seminis sex drachmis, cum tribus salis, & mellis cyatho. Efficacius purgat duplicato sale. Quidam in polenta dedere supradictum pondus addito Pulegio. Alii contra paralyin. Alii pueris folia in fico, sic ut amaritudinem fallerent. Facile thoracem purgat cum Iride sumptum. In regio morbo crudum bibitur cum Apio, aut Adianto. Aduersus inflationes calidum paulatim sorbetur ex aqua. Iecinoris causa cum Gallico Nardo, lienis cum aceto, aut pulce, aut fico sumitur. Aduersatur fungis ex aceto. Item uisco, cicutæ ex uino, & muris aranei moribus, draconi marino, scorpionibus. Oculorum claritati multum confert. Epiphoris cum passo imponitur, sugillatis cum melle. Aures eius decoctum



A decoctum uaporis suffitu sanat: aut si manat sanies, cum melle tritum. Vrinam ac menses ciunt tres quatuorue ramuli, cum Gallici nardi radice una, cyathis aquae vi. menses priuatim cum melle sumptum, & in uellere appositum. Anginis subuenit cum melle & nitro. Epinyctidas ex aqua sanat: uulnera recentia, priusquam aqua tangantur impositum: pretereaque capitis ulcera. Peculiariter ilibus imponitur, cum cypria cera, aut cum fico. Sanat & pruritus. Non est dandum in febris. Nauseas maris arcet in nauigationibus potum: inguinum tumorem in uentrali habitum. Somnos allicit olfactum, aut inscio sub capite positum. Vestibus insertum tineas arcet. Culices ex oleo perunctis abigit, & fumo si uratur. Atramentum librarium ex diluto eius temperatum, literas à musculis tuetur. Capillum denigrat absinthij cinis, unguento rosaceoque permixtus. Marinum, quod quidam seriphium uocant, stomacho inimicum. Aluum mollit, pellitque animalia interaneorum. Bibitur cum oleo & sale, aut in farinae trimestris sorbitione dilutum. Coquitur quantum manus capiat, in aquae sextario ad dimidias.

## VINI ABSINTHITIS VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Absinthites uinum stomacho accommodatum est, urinam cit. Tarde concoquentibus utile: iecinorosis itidem, nephriticis, & regio correptis morbo. Cibum non appetentibus, & stomacho male affectis, & longis praecordiorum distensionibus ac inflationibus, rotundis lumbricis, & suppressis mensibus auxiliatur. Contra ixiæ uene na hausta, copiosius potum, & uomitionibus redditum prodest.

## CONFECTIO.

Variae uini absinthitis sunt confectiones, ut ex Dioscoride constare potest. Optimum tamen fit, si tulae Pontici absinthij drachmae octo, linteo raro ligatae, in amphoram uini coniunguntur. Mustum deinde mittitur, relicto uno uasis spiraculo ne effervesceat foras exiliat.

## APPENDIX.

Santonici, quod ut commemoratum est, hodie semen lumbricorum uocant, praecipuus hoc tempore ad lumbricos ex corpore pellendos & enecandos usus est. Et si genuinum est, magna efficacia cum melle assumitur tam à pueris, quam adultis. Seriphium quoque aduersus lumbricos à multis commendatur, eoque nomine mors uermium appellatur. Sunt etiam qui lumbricorum semen nomenclant.

Semen lumbricorum.

Mors uermium.







ABROTONVM  
MAS.

Stabwurtz mennle.





ABROTONVM  
FOEMINA

Stabwurtz weiblich.



## NOMINA.

Abrotonum m.  
de dictum.



ΒΡÓΤΟΝΟΝ Græcis, Abrotonum Latinis nominatur. Officina antiquū nomen retinuerunt. Germanis Garthagen/ Stabwurz/ Schoßwurz/ Gertwurz/ Rutelkraut/ Affrusch/ appellatur. Hoc autem nomen sibi usurpauit, ut Nicandri testatur interpret, *ὅτι τὸ πῶς ὁ μὲν ἀβρότον, καὶ ἀπαλὸν φαίνεται. ἔλκει καὶ ὅτι τὸ δύσκεινον ἔσται.* hoc est, quod conspectu tenerum, molle & delicatum appareat, aut quod grauem, acremue & difficilem halitum prospiret.

## GENERA.

Abrotonū duorum est generum, ueterum & recentiorū omnium sententia, mas & fœmina. Plinius lib. xxi. cap. vii. mas quidem campestre uocat Abrotonum, fœminam uero mōtanum. Vulgus, syluestrem Cypressum, à similitudine & odore foliorum eiusdem, nomenclaturæ herbæ fruticisue uocat. Germanicè *weißgarthagen/oder wilder cypress.*

## FORMA.

Abrotonū mas.

Abrotonū, quod mas appellamus, sarmentosum, minutis folijs, minus album quàm fœmina, tenui semine ac numerofo uti Absinthiū. Semen autem nō quouis tempore producit, sed ad Septembris duntaxat mensis initia, quo si diligenter obseruabis tempore, semine prægnaus esse comperies. Recte igitur *λεπτόκαρπον* in Dioscoride legitur, huic lectioni nō solum ueterum codicum fide, uerumetiā sensu suffragante. Fœmina frutex est, arboris speciem habens, candicantibus folijs, Seriphij modo minutim circum ramulos incisis, floribus refertus, in summo auri fulgore comantes corymbos obtinens, odoratus etiam cum grauitate quadam.

Abrotonum  
fœmina.

## LOCVS.

Mas passim apud Germanos in hortis, & in campestribus nascitur: fœmina uero in collibus & montibus sua sponte prouenit.

## TEMPVS.

Floret utrunq; Augusto. Colligitur autem in autumnno, potissimum Septembri mense; hoc enim tempore semen, ut diximus, profert.

## TEMPERAMENTVM.

Abrotonū calidum & siccum, inq; tertio ordine seu recessu post media situm est, id quod amaritudo eius, quam gustu præ se fert, facile monstrat.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Vtriusq; abrotoni semen feruefactū, & crudum tritum, cum aqua potū, nō nisi recta ceruice spirantibus, ruptis, conuulsis, ischiadicis, urinæ difficultatibus, & suppressis mensibus auxiliatur. Potum in uino exitialium uenenorum antidotum est. Cum oleo rigentibus illinitur. Serpentes lecto instratum & suffitum fugat. Cum uino potum aduersus eorundem morsus, peculiariter autem scorpionum & phalangiorum, prodest. Oculorum inflammationibus cum cotoneo cocto, aut pane illitum subuenit. Tritum cum farina hordeacea decoctumq; tubercula discutit. Admisctur irino unguento.

## EX GALENO.

Non instrenue excalfacit & desiccatur. Nam siue comā cum floribus (reliqua enim eius palea inutilis est) cōtusam ulceri puro illinas, mordax & irritans uidebit, siue eo in oleo macerato, caput aut uentrem perfundere uoles, admodū calefacere reperies. Quin & si qui per circuitum rigoribus capiuntur, eos ante inuasionem rigorum hoc uoles confricare, minus utiq; rigore concutientur, imò & sensus confestim ubi admotum fuerit ipsum calfacere percipit. Porro quod lumbricos interimat par est, nimirū quum sit amarum. Protinus uero quod & digerendi & incidendi uim habeat scies. Præterea abrotonum ustum calidum & siccum facultate est, magis etiam quàm cucurbita sicca usta, & anethi radix. Illa enim ulceribus humidis simul



**A** simul & citra phlegmonem callo induratis profunt, ac proinde maxime ulceribus ijs quæ in pudendorum præputijs sunt competere uidentur: at cinis Abrotoni ulceribus omnibus mordax est, ac idcirco cum oleo tenuium partium, Cicino scilicet, aut Raphanino, aut Sycionio uetere, potissimum Sabirio, ad alopecias confert. Barbam etiam segnius tardiusque enascentem cum aliquo dictorum oleorum elicit: sed nec minus illis, lentiscino maceratum. Rarefaciendi enim uim, eò quod tenuium est partium, obtinet, & mordax est, & calidum. Abrotonum uero inimicum stomacho existit.

## EX PLINIO.

Vtus est & folijs, sed maior semine, ad calefaciendum, ideo nervis utile, tussi, orthopnoicis, urtica, torminibus, conuulsis, ruptis, lumbis. Datur bibendum manualibus fasciculis decoctis ad tertias partes. Ex his quaternis cyathis bibitur. Datur & semen tustum in aqua drachmæ pondere. Prodest & uulua. Concoquit panos cum farina hordeacea, & oculorum inflammationibus illinitur cotoneo malo cõcocto. Serpentes fugat. Contra ictus eorum bibitur in uino, illiniturque. Efficacissimum contra ea quorum ueneno tremores & frigus accidunt, ut scorpionum & phalangiorum, & contra alia uenena. Prodest quoquomodo argentibus, & ad extrahenda ea quæ in herent corporibus. Pellit interaneorum mala. Ramo eius si subiiciatur puluino, uenerem stipulari tradunt: efficacissimamque herbam esse contra omnia ueneficia, quibus coitus inhibeat.

## DE ASARO CAP. III.

**B**

## NOMINA.



**ASARON** græcè, Asarū latinè dicitur. Officinis hodie nomen retinet. Germanicè *Naselwur*. Asaron autem dictum est, quod in ornatū non ueniat, uel ut Plinius lib. xxi. cap. vi. inquit, quoniam in coronas atque sertas non addatur: uel quod manualibus scopis, quæ odoris gratia gestantur, minimè solitum sit inscri.

*Asaron cas  
dictum.*

## FORMA.

Folia hederæ similia habet, longè tamen molliora, rotundioraque. Flores inter folia ad radicem purpureos, odoratos, Hyoscyami cytino similes, in quo semen acino non dissimile. Radices multas, geniculatas, tenues, obliquas, gramini persimiles, longè tamen graciliores, odoratas, calefacientes, & linguam admodum erodentes. Cæterum hic admonendum esse lectorē duximus, omnia Dioscoridis exemplaria hoc in loco deprauata esse, perperamque habere uel *μικρότερα* uel *μελαινότερα*, cum potius scribendum sit *μελανότερα*, id quod partim Plinii testimonio, partim etiam iudice sensu ipso comprobari potest. Plinius siquidem lib. xii. cap. xii. Asarum sic depingit: Est hederæ folijs, rotundioribus tantum, mollioribusque. Si quis uero ea de re ad iudicem sensum referat, Asarumque cum hederâ conferat, Asari certè folia neque densiora, neque minora hederæ folijs esse comperiet, quum Asari folia maiora multò sint quàm hederæ. Proinde cum folia hederæ illorum comparatione multò minora sint, euidentissimum est pro *μικρότερα* legendum esse *μελανότερα*, huic nimirum lectioni ad stipulantibus Plinio & sensus iudicio, ut dictum est: ad tactum enim huius folia longè sunt hederæ molliora. Accedit quod ab una dictione in aliam facilis sit transitus. His itaque rationibus motus, Asari folia *μελανότερα*, hoc est, molliora hederæ folijs esse dixi, ut reuera etiam sunt.

*Dioscoridis loc  
cuius emendatus.*

## LOCVS.

Nascitur in umbrosis locis, montibus potissimum & syluis: aspera enim macraue & sicca loca amat.

## TEMPVS.





ASARVM

Gäfelwurtz.



A

## TEMPVS.

Bis anno, uere nimirum & autumnus floret. Colligendum in fine Augusti, à die uidelicet decimoquinto eius mensis, usque ad octauum Septembris.

## TEMPERAMENTVM.

Asarum in calefaciendo & exiccando ordinis tertij existit, radices potissimū eius.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Radices Asari calefaciunt, & urinam mouent. Hydropicis & ischiadicis diuturnis profunt. Ducunt menses pondere drachmarum sex cum mulso pota. Purgant Ellebori albi modo. Ruptis præterea, conuulsis, tussi ueteri, difficultati spirandi, & urinæ conferunt. Cum uino pota ferarum moribus salutare. Folia adstringunt. Illita capitis doloribus, oculorum inflammationibus, agilopis incipientibus, mammis à partu tumentibus, ignibusque sacris profunt. Coma somnum etiam conciliat. Sic Crateias herbarius de Asaro proditum reliquit.

## EX GALENO.

Asari radices utiles sunt, facultate similes radicibus Acori, intensiores tamē. Itaque ex ijs, quæ de illis prodita sunt, hic faciendā coniectura.

## EX PLINIO.

Nardi uim habet Asarum, quod & ipsum aliqui syluestre Nardum appellant.

## EX MARCO AEMYLIO.

*Est Asaron græcè Vulgago dicta latine.*

*Hæc calidæ & siccae uirtutis dicitur esse.*

*Tertius est illi gradus, ut dicunt, in utroque.*

*Prouocat urinam, potatæque menstrua purgat.*

*Hocque modo iecoris medicatur sumpta dolori.*

B *Hydropicosque inuat, schiasm fugat hausta frequenter.*

*Et uulnæ morbis decoctio subuenit eius.*

*Dicitur ictericum potata repellere morbum.*

*Elleborique modo uomitu præcordia purgat.*

*Sed non est huius purgatio tam uiolenta,*

*Nec metuenda quidem, si fiat taliter illa:*

*De folijs eius triginta recentia tollens,*

*Adde meri tantum quo possunt cuncta recondi.*

*Tota nocte mero factas macerentur in illo,*

*Mane terens, uino quo sunt macerata resolue.*

*Tunc olus excoctum cum pingui carne recenti*

*Porcina, prius ægroto da sufficienter,*

*Et sumat uini uult quantum fortis & albi,*

*Sic Asari succum colatum trade bibendum.*

*Fortibus & magnis est hic numerus foliorum*

*Sufficiens, reliquis, ut diximus, est minuendus*

*Iuxta quod uires, ætas, & cætera poscunt.*

## APPENDIX.

Lixiuum in quo Asarum decoctum est, si eo caput lauetur, cerebrum roborat, & memoriam. Succus etiam eius cum Pompholyge, caligantibus oculis confert.





ACORVM  
officinarum.

Drachenwurtz.



## NOMINA.



**A**KOPON græcè, Acorū latinè appellatur. Officinis nomen retinet. Germanicè Gel lilgen/Drachenwurz oder Ackerwurz uocatur. Acoron aphrodisiam quasi ueneream Græci etiam uocant. Apuleius, quicumq; ille fuerit, in cōmentariolo quod de aliquot herbis scriptū à se reliquit, Piper apium dictam fuisse hanc herbam testatur, quod ea in aluearijs suspenſa, nunquam diffugiant apes.

## FORMA.

Folia Iridis habet, angustiora tamen. Radices non diſſimiles, implicatas, neq; in rectum enatas, sed obliquas, & in superficie existentes, geniculis seu internodijs diſtinctas, subalbas, gustu acres, odore non ingratas. Præſtat denſum, candidum, nō carioſum, plenum & odoratum, cuiusmodi eſt in Colchide & Galatia. Ex qua ſanè Dioſcoridis deſcriptione ſatis liquet Acorum noſtrum, quo hodie officinæ utūtur, etſi nō uerū ſit, tamen aliquā ſaltem Acori ſpeciem eſſe: Iridis enim folia obtinet, angustiora tamen. Radices quoq; ſimiles, implicatas & inuicem adnatas, nō in rectū, ſed in obliquum tendentes: non in profundo deliteſcentes, ſed in ſuperficie exiſtentes, & modico cespite teſtas: deniq; geniculis seu internodijs interceptas. Neq; etiam in colore ab eo quem Dioſcorides pingit uariare uideur: noſtrū enim Acorū nō raro ὑπολευκός, hoc eſt, ſubalbas ſeu candicantes radices habere conſpicitur. Accidit autem ut & rubentes intus habeat radices, quæ tamen cum candicantes paſſim intercurrentes uenas obtineant, recte ſubalbæ dici poſſunt, quod nimirū neq; uere rubeſcant, neq; candidum etiam prorſus colorem referant, ſed eum potius qui ex rubro & candido mixtus ſit. Cæterū radices Acori quæ intus candicant, foris ut plurimū ſubrubet. Hinc eſt quod Serapion in Acori deſcriptione Dioſcoridis uerba referēs, ὑπολευκός dictionē ita uertere uoluit: Et color radicū exterior tendit ad rubedinem. Proinde qui hac ſola ratione, quod Acori radix intus interdum rubeſcat, mouētur, ut diuerſum noſtrū prorſus à Dioſcoridis credant, ij non utuntur argumento quod tanti momenti ſit, ut quod conātur, perſuadere alijs poſſit. Cum enim Dioſcorides Acori radices ὑπολευκός, hoc eſt, albicantes faciat, noſter certe nunquam non tales habere deprehenditur: uel enim uere candicantes ſunt, uel ſubrubentes, quas etiam ὑπολευκός recte dici poſſe iam oſtendimus. Porro quamuis odoratæ non ſint eius radices, tamen nihil obſtare poſſet odor, quo minus noſtrum uerum eſſe putaremus Acorum, quum abunde conſtet illum, haud aliter quàm colorem, ſecundum diuerſas regiones in eadem ſæpe herba mutari: ſi non eſſet aliud, quod ut diuerſum certo crederemus nos urgeret, hoc nempe, quod noſtri Acori radices gustu acres nō ſint, quod tamen omnes ueteres uno ore de Acoro affirmant, ſed potius adſtringentes. Quapropter etſi tota ſerè deſcriptio illi reſpōdere uideatur, tamen quia acris nō eſt, uires eas quas uero Acoro tribuunt ueteres, habere non poteſt: ut hoc nomine uehementer errent qui à ſolis deſcriptionibus tantū pendent. Nec minus hallucinantur officinæ quæ ad urinas mouendas, aut menſes euocandos, lienē ſue minuendos eo utuntur. Perperam etiam Diacori compositionem ex eodem conficiūt. Curent itaq; ut uerum Acorum habeant, quod iam in multis Germaniæ officinis proſtare puto. Nam radix illa quæ à nonnullis ſeplasiarijs nunc ſub nomine maioris Galangæ uenditur, ſi cætera etiam reſpondeāt, haud dubie radix ueri Acori eſt. Et debent ſeplasiarij ea uti, quoties in compositionibus medicamentorū Acori ſit mentio, præcipuè autem in Diacori compositione apparanda, quod hæc calefaciendo cōcoctionem ſtomachi ſupra modum iuuat. Et hoc eò confidentius faciendum eſſe hortor, quod Galangam maiorē ueri Acori radicem eſſe exiſtimem: geniculis enim ſcatet, foris ſubrubra, intus ſubalba, gustu acris, odore nō ingrata, ut hoc nomine illa tutò & ſine errore officinæ pro Acoro uti queant.

Acorum officina  
rium non eſt uerū  
Acorum.



## LOCVS.

Apuleius locis cultis, pratis ac hortis nasci, raramq; inuentu herbam hanc tradit. Nostrum Acorum iuxta amnes, & passim in aquosis & palustribus locis prouenit.

## TEMPVS.

Legitur radix Acori aestatis initio, & siccatur in umbra digitalibus frustis.

## TEMPERAMENTVM.

In calefaciendo & desiccando tertij est ordinis. Nostrum quidem desiccatur, at citra calefactionem.

## VIREs. EX DIOSCORIDE.

Acori radix calefaciendi uim habet. Decoctum eius potum, urinam cit. Prodest lateris, thoracis & iccoris doloribus: torminibus, ruptis, conuulsis. Lienes minuit. Vrinae stillicidio, & uenenatorum moribus subuenit. In scissu, quemadmodum Iris, ad muliebria utilis est. Succus radices caligines oculorum discutit. Antidotis praeterea radix utiliter miscetur.

## EX GALENO.

Acori utimur radice quae gustu acris est, & modicè amara, odoreq; non iniucunda. Hinc manifestum est hanc facultate calidam, & consistentia tenuium partium esse. Huic consentaneum est, ut urinam moueat, & lienes induratos iuuat, tum corneae membranae crassitiem detergeat simul atq; extenuet. Ad hoc autè melior est ipsius succus, Omnino uero siccificum esse darum est.

## EX PLINIO.

Vis ei est ad calefaciendum extenuandumq; efficax, contra suffusiones & caligines oculorum succo eiusdem potu, contraq; serpentes. Pectoris doloribus subuenit, & ideo antidotis miscetur. Iecinori medetur, thoraci quoq; & praecordijs. Vrinam cit eius decoctum, & omnia uesicae uitia sanat. Testium tumores radix decocta in uino, tritaq; & illita mirè discutit. Duritias & collectiones omnes sanat, decocto huius herbae fouentibus. Cōtusis & eueris pota duobus obolis in mulsi cyathis tribus radix prodest. Acoron quoq; utile est interioribus foeminarum morbis.

## ACORI OFFICINARVM VIREs.

*Acori absterini  
facultates.*

Gustus abunde monstrat eius radicem immensam adstringendi facultatem obtinere. Hinc est quod diuersam planè à ueri Acori radice uim sortita sit. Nam ut hec tenuium est partium & facultate calida, atq; adeò detergit, extenuat atq; discutit: ita illa consistentia crassarum partium, ac facultate frigida, constringit, densat, cogit & contrahit. Quare urinam non cit, ut uerum Acorum, nec menses euocat, sed potius suppressit. Sanguinem etiam undecumq; manantem cohibet. Proinde rectè Pandectarum autor scribit, eum qui secum Acori radicem gestet, à nullo sanguinis profluvio corripit. Et ex recentioribus aliqui hanc facultatem Acori nostri obseruarunt, atque hinc adeò tradunt eius succum igne expressum, menses nimium promanantes constringere posse, id quod certè de Acoro affirmare uanissimū erit. Ex his itaq; intelligentiam seplasiarum, quis usus nostri etiam in medicina sit Acori: nec committent, ut fanatici cuiusdam, qui nuper Morophrasti impudentis hominis pestilentissimas nugae & ineptias tegere, atq; adeò epistola aliqua operi illius temerè praefixa commendare, ac prae illo monstro reliquos omnes medicos, si dijs placet contemnere ausus est, consilio obsecuti, hoc prorsus abijciant, cum illius immensa sit adstringendi, quod demonstrauius, facultas.

De Althaea





ALTHAEA

Eibisch.

B 2



# DE ALTHAEA CAP V

## NOMINA.



Bismalua.  
Maluauiscus.

Althea unde  
dicitur.

ΑΘΑΙΑ, ἰβίσκος, ἰβίσκος græcè: Althæa, Ebiscus, Ibiscus latinè dicitur. Officinæ, quæ ut plurimū barbaris uocibus gaudent, Bismaluam, Maluauiscum, & simpliciter Euisum nominant. Maluauisci autem uox corrupta est, ex malua nimirū & euisco composita, quasi dicat aliquis Malua ebiscus, hoc nomine illam ab alijs maluis, quæ sanè multæ sunt, segregans. Germanicè Ibisch/oder Eibisch/Groß oder wild pappelst. Althæa uero à multiplici remediorū potestate & usu, uel ut Plinius ait, ab excellentia effectus nominata est. Siquidē ἁλθαία Græcis idem ualeat, ac si à medendo medicā simpliciter dicas. Nam ἁλθαίαν illis mederi significat, ἁλθός uero remedium & medicinam.

## FORMA.

Syluestris Maluæ genus est, cui folia ut Cyclamino rotunda, lanuginosa, flos roseus, caulis cubitorum binū, radix lenta uiscosaq̃, intus candida.

## LOCVS.

Locis humentibus, pinguibusq̃ gaudet.

## TEMPVS.

Radices, ut reliquarum ferè herbarum omnium, inter autumnii initia, hoc est, in fine Augusti, & Septembris mensis principio, legendæ. Folia uero & semen in æstate. Floret Iulio & Augusto mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Folia & flores calidi & sicci primo excessu seu ordine. Radices uero in principio secundi.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Radix in aqua multa aut uino cocta, aut per se pota, ad uulnera, parotidas, strumas, abscessus, mammarū inflammationes, sedis contusiones, inflationes, neruorum distentiones, efficax est. Siquidem discutit & maturat, aut rumpit, & ad cicatricem perducit. Cocta quo dictū est modo, & cum adipe anserino aut suillo, uel terebinthina subacta, ad uterū inflammationes & præclusiones utiliter admouetur. Decoctum eius idem præstat, secundasq̃ à partu relictas educit. Decoctum radice cum uino potum, urinae difficultati, calculosorū cruditati, dysentericis, ischiadicis, tremulis, & ruptis succurrit. Dentium mitigat dolorem cum aceto decocta, colluto inde ore. Semen autem uiride siccumq̃ tritum, cum aceto in sole perunctum alphas extergit. Cum aceto & oleo inunctum à uenicatorū moribus præseruat. Valet ad dysenteriam, sanguinis reiectionē, & alui fluores. Seminis decoctum in posca aut uino contra omnes apum & minutarū ferarum ictus bibitur. Folia cum exiguo oleo, moribus & ambustis illinuntur. Addensat aquam sub diuo radix trita & admixta.

## EX GALENO.

Digerendi, laxandi, phlegmone leuandi, mitigandi, concoquendi coctu difficilia tubercula. Porro radix eius & semen cætera quidem pari herbae uiridi modo agunt, uerum tenuiorum partium, magisq̃ exiccatoriam, ad hæc magis exterforiam quàm illa facultatē ostendunt, ut & alphas detergent, & semen renum calculos confringat. Radicis autem decoctum, dysenteriae, alui profluuio, & sanguinis reiectioni uile est, nempe cum adstringentem quandam facultatem possideat.

## EX PLINIO.

Althæa contra omnes aculeatos ictus efficacior uis, præcipuè scorpionum, uersparum, similiumq̃, & muris aranei. Quin & trita cum oleo, hac peruncti ante, uel habentes eam, non feriuntur. Eius radix præcipuè cōuulsis ruptisq̃ efficax est. Cocta in aqua aluum sistit. Ex uino albo strumas & parotidas, & mammarum inflammationes, & panos in uino folia decocta & illita tollunt. Eadem arida in lacte decocta,



A cocta, quamlibet perniciosæ tussi citissimè medentur. Hippocrates uulneratis, si-  
tientibusq; defectu sanguinis, radice decoctæ succum bibendum dedit. Et eam uul-  
nerib. cum melle & resina, item cōuulsis, luxatis, tumentibus, & musculis, neruis,  
articulis imposuit. Et asthmaticis ac dysentericis in uino bibendam dedit. Mirum,  
aquā radice ea addita addensari sub dio, atq; elatescere. Efficacior aut quo recētor.

## EX THEOPHRASTO.

Vsus eius ad rupta, & tusses ē uino dulci, & ad ulcera in oleo. Aliàs si carnibus  
concoquas, in idem aggregare, ac ueluti conglutinare posse affirmant.

## DE ANAGALLIDE CAP. VI.

## NOMINA.



ANAGALLIS græcè, Anagallis latinè, officinis inusitata, germanicè Gaud-  
heyl/ oder Colmartraut. Hoc nominis fortè à Germanis inditum est,  
quod Anagallis in limine uestibuli suspensa malchiorum introitū pe-  
lere credita sit. Errant qui Morsum gallinæ seu Passerinā uulgò dictam  
herbam, Anagallida putant: haud secus atque h, qui Auriculam muris pro Anagal-  
lide depictam ostendunt herbarij.

Gaudheyl  
Germanis quas  
rediffit.

Anagallis non  
est Morsus galles  
ne, neque Auris  
gula muris.

## GENERA.

Duo duntaxat Anagallidis esse genera ueterum omniū testimonio constat, ma-  
rem scilicet & fœminā, quæ sanè nullo nisi florū discrimine distant. Mas enim puni-  
ceo, fœmina uero cœruleo flore conspicitur. Proinde hallucinari iuniores ac barba-  
ros medicos euidentissimū est, qui plura duobus Anagallidis genera constituunt.

## FORMA.

B Frutices sunt Anagallides parui in terra iacentes, folia in quadrangulis caulibus  
pusilla habentes, & modicè rotunda ad Helxines similitudinem. Semen gerunt ro-  
tundum. Non quicquam sanè certius hac scriptorum pictura respondet, cum du-  
plex sit in flore color, puniceus nimirū & cœruleus, quadranguli caules per terram  
sparsi, folia non toto ambitu rotunda, & semen coriandro nō dissimile circinatum.  
Non est tamen quod sic humi prostratos hos frutices intelligas, ut prorsus nō sup-  
pullulent. Nam in altum etiam surgunt, non tamen altius, quàm ipsa tibi examul-  
sim pictura monstrat.

## LOCVS.

Pedibus in aruis uineisq; ubiq; calcatur, necq; quicquam nunc Anagallide despe-  
ctius est, cum tamen in antiqua medicina multus eius fuerit usus. Licet autem ubi-  
que ferè proueniat, in uliginosis tamen latior.

## TEMPVS.

Per æstatem utriusq; prouentus maximus est, potissimum autem mense Augu-  
sto. Florent autem à Maio mense usque in autumnum.

## TEMPERAMENTVM.

Anagallidis uterq; sexus calidam & siccam facultatē obtinet, quod scilicet exter-  
gere possint. Mulieres nancq; quæ asperiorē & decolorē à natura cutem acceperunt,  
ad leuorem nitorēq; uultus harum succo utuntur, ut hac ratione errare necesse sit,  
qui Anagallidas frigidas & humiditas esse statuunt.

Error quorundā  
detegitur.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Vtraq; mitigandi facultatē habent. Inflammationes arcent, surculos extrahunt, ul-  
cera serpentina cōpescunt. Succus earū gargarissatus pituitā capitis purgat. Per na-  
res infusus dolorē dentiū lenit, si in contrariā narem iniiciat. Argema cum Attico  
melle emendat, & oculorū caligines iuuat. Contra uiperarū morsus, renum & icci-  
noris uitia, ex uino potus prodest. Tradunt nonnulli eam quæ cœruleum florem  
habet, prociduum sedem reprimere: quæ uero puniceum, illitu euocare.





ANAGALLIS  
MAS.

Bauhhohl mennle.





ANAGALLIS  
FOEMINA.

Sauchheyl weible.



C

## EX GALENO.

Anagallis utraq; tam ea quæ florem parit cœruleum, quàm ea quæ puniceum, admodum extergendi facultatem obtinent. Quendam etiam calorem attractoriū possident, ita ut impactos corpori refigant aculeos. Succus earum ex naribus purgateadem de causa. Et ut summam dicatur, exiccatoriam citra mordicationē facultatem habent, quamobrē uulnera glutinant, & putrida adiuuant.

## EX PLINIO.

Vtriusq; succus oculorum caliginem discutit cum melle, & ex ictu cruorem, & argema rubens, magis cum Attico melle inunctus. Pupillas dilatat, & ideo hoc inunguntur antè, quibus paracentesis fit. Iumentorū quoq; oculis medentur. Succus caput purgat per nares infusus, ita ut deinde uino colluat. Bibitur & contra angues succi drachma in uino. Mirum, quod sceminam pecora uicant. At si decepta similitudine (flore enim tantum distant) degustauere, statim eam quæ Asyla uocatur, in remedio quærunt. Ea à nostris ferus oculus nuncupatur. Præcipiunt aliqui effossuris, ante solis ortum, priusquā quicquid aliud loquantur, ter salutare eam, tunc sublata exprimere, ita præcipuas esse uires. Vrinam cient Anagallides. Iecinori mirè profunt. Cohibent quas nomas uocant. Viles & recentib; plagis, præcipuè senum corpori. Ad recentia quoq; uulnera tanta traditur uis, ut sanien ossibus extrahant. Anagallis cœrulea procidentia sedis retro agit, è diuerso rubens proritat.

Superstitio-  
sum.

## DE ALSINE CAP. VII

## NOMINA.

Morsus gela-  
line.

D

Alsine cur-  
culæ.

Auricula  
muris.



ΑΣΙΝΗ græcè, Auricula muris latinè, Morsus gallinæ uulgò appellatur. Paučina Italicè, quod paueris, id est, iunioribus anseribus gratum pabulum sumministret. Auiculas caueis inclusas, cum fastidiunt escā, aucupes hac herba recreare solēt. Hinc germanicè Vogelkranz/ Hünserferb/ Hünserderm/ Hünserbiß uocatur. Alsine autem dicta est, quod lucos, quæ Græci δρυς nominant, nemorosaq; & umbrosa loca amet. Auricula uero muris, quod musculorum auribus folia similia habeat.

## GENERA.

Quamuis Dioscorides & alij unam tantum Alsinen faciunt, nos tamen tria eiusdem genera, licet plura adhuc inueniantur, damus. Primum genus Alsinen maiore uocauimus, quod scilicet uera sit Alsine, & alijs maior, germanicè Hünserderm nominatur. Alterius generis plantam Alsinen mediā appellauimus, germanicè Hünserferb. Hæc quod ad flores attinet, qui cœrulei sunt, à descriptione uariat: eiusdem tamen cum priore facultatis. Tertij generis herbam Alsinen minorem uocauimus. Hæc, quidem, ut prima, pulchrè descriptioni respondet, germanicè Kleinvo-gelkranz nuncupatur.

## FORMA.

Helxine dus-  
plex.

Cauliculis serpit rotundis, è quorum geniculis exiles ramuli profiliūt, folijs Helxines minoribus, minusq; hirsutis, flore exiguo, candido, foris herbaceo. Hæc cum teritur cucumis odorem refert. Non autem illam Peponis maturi iucunditatem, sed herbaceum cucumeris odorem subolet. Porro cum Dioscorides Helxinæ similem esse Alsinen tradit, non de ea Helxine quæ uulgò Parietaria, sed ea potius quæ alio nomine Cissampelos dicitur, intelligas oportet: hæc enim folia Hederae haud dissimilia obtinet. Adeò ut liquidò iam cōstet, Alsinen esse eam herbam quam passim hodie Morsum gallinæ appellant. Huc accedit quod facultates, ut ex sequentibus patebit, quas uulgius Morsui gallinæ tribuit, ab Alsinis uiribus nihil uariant.

## LOCVS

Nascitur in lucis, hortis, & maximè in parietibus, macerijis, opacisq; locis.

## TEMPVS.





ALSINE  
MAIOR

Günerdem.

BIBLIOTHECA NAZ.  
ROMA  
VIT. ORIO EMANUEL.





ALSINE  
MEDIA.

Günseserb.





**ALSINE**  
MINOR.

Kleinnogelkraut.



C

## TEMPVS.

Incipit à mēdia hyeme. Arescit autē æstate media. Cum proreperit, muscutorū aures imitatur folijs.

## TEMPERAMENTVM.

Refrigerantem & humectantem haud secus quā Helxine obtinet facultatem: est enim aqueæ essentia frigida: quare & citra adstrictionem refrigerat.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Al sine refrigerandi facultatem obtinet. Oculorū inflammationibus cū polenta illita cōuenit. Succus eius aurium doloribus instillatus prodest. In uniuersum eadem quæ helxine potest.

## EX GALENO.

Ad feruentes phlegmonas, & mediocria erysipelata competit.

## EX PLINIO.

Vsus eius ad collectiones inflammationesq̃. Quin emendat omnia quæ Helxine, sed infirmius. Epiphoris peculiariter imponitur: item uerendis ulceribusq̃ cum farina hordeacea. Succus eius auribus infunditur.

## APPENDIX.

Easdem facultates, herbis quas morsus gallinae uulgò nominant, nostri temporis herbarij tribuunt, quod scilicet ad feruentes inflammationes, ac erysipelata prosint. Omnes enim, ut dictum est, refrigerant atque humectant. Hinc est quod minorem aliqui Germanorū siebertr aut uocent, quia scilicet febribus accommoda, & utilis sit.

## DE ANTHEMIDE CAP. VIII.

## NOMINA.

D  
Chamæmelon  
cur dictum.



ANΘΗΜΙΣ, ἡ χαμαίμηλον græcè, Anthemis, Chamæmelon latinè, officinis corrupto nomine Camomilla dicitur, Germanicè Camillen. Chamæmelon, quoniam odorem habeat mâli, appellant, id quod de primo genere potissimum intelligendum uenit.

## GENERA.

Tria eius genera, floribus tantum distantia, inueniuntur. Hi enim etsi intus aurei sint, tamen foris per ambitū illis adiacent folia aut candida, aut lutea, aut purpurea. Quæ foris in orbem candida folia obtinet, ea est quæ à Dioscoride propriè λευκάνθημον, & uulgò hodie Camomilla uocatur. Quæ uero luteis per ambitum folijs cōstat, ea haud dubie est, quā priuatim Dioscorides à suis floribus χρυσάνθημον nominat, Germani autem, pulchrè ad græcam appellationem alludētes, Goldtblumen / Gelcamillen / Streichblumen appellant. Tertia species chamæmeli, quæ nimirū purpurea per orbem folia habet, nulla alia est nisi ea quam hodie uulgi medicorum Consolida regalis solidam regalem, Germani autē à similitudine calcaris, cui respondet flosculus eius herbæ, & à colore lepido regioq̃, qui aspectari nunquā satīs potest, Kittersporn uocant. Dioscorides peculiariter ἀρωάνθημον, eo quod uere floreat, dici tradit. Tria itaq̃ in uniuersum Anthemidis seu Chamæmeli genera sunt, quorum sanè primum Chamæmelon leucanthemon, alterū Chamæmelon chrysanthemon, tertium Chamæmelon eranthemon Dioscoridi nominatur. De duobus primis generibus neminē dubitare, quin uera & legitima sint, arbitramur, quod nihil in ijs sit quod Dioscoridis descriptioni, quam mox subiiciemus, non respondeat. Tertium fortè nonnullis qui morosius omnia obseruant, minime genuinum Chamæmeli genus esse uidebitur: ideoq̃ quibus simus argumentis & cōiecturis impulsī, ut tertium Anthemidis esse genus credamus, necesse erit ostendere. Potissimū autem quod nos in hanc sententiam pertraxit est, quod singula in Dioscoridis descriptione illi congruant, rami scilicet palmum non excedentes, fruticosi, multas alas habentes, parui & exigui, capitula





CHAMAEMELON  
LEVCANTHEMON.

Camillen.





CHAMAEMELVM  
CHRYSANTHEMON.

Gel camillen.





CHAMAEMELVM  
ERANTHEMON.

Ritterspohn.

C 2



C pitula rotunda, aurea, foris purpureis folijs, magnitudine in nullo alio genere Rutę folijs magis similibus circumdata. Deinde sententiam hanc nostram cōfirmavit antiquissimus codex manuscriptus, in quo pictura exquisitissimē Regalem dictā consolidā refert, quam ijs sanē uerbis describit: Herba est quam quidā Monachellā, siue Capucariā uocant (à cucullo haud dubiē monachorū, quem flores illius herbę referunt, nomen imponentes) Dioscorides Eranthemon appellat, & est una species Anthemidis, quę folia instar Camomillę habet, nigriora tamen: florem autem uiolę similē. Hęc ille. Quibus omnibus illud etiā accedit, nostram de hac herba sententiam mirificē corroborans, quod uulgus hodie medicorū Consolidā regalē calculosis, & oculis prodesse tradat, adeo ut illius etiā conspectū multos ex oculis laborantes sanasse dicant. Atq; hinc fit ut studiosi passim eam herbā in suis musæis suspensam habeant, oculis hac ratione cōsulere uolentes. Has autem omnes facultates ut ex sequentibus patebit, Eranthemo suo Dioscorides etiā adscribit. Quamobrem nihil certius est, quā Consolidam regalem tertium esse Anthemidis genus, id quod argumenta nostra iam adducta palām cuincunt.

## FORMA.

Rami palmum non excedunt, fruticosi, frequentes alas habentes, parui, tenues & multi, capitulis rotundis. Flores intus aureos continent, foris uero per ambitum candidos, aut luteos, aut purpureos, foliorum Rutę magnitudine.

## LOCVS

Nascuntur in aspero, sicco, macroq; solo, & iuxta semitas atq; itinera.

## TEMPVS.

Colliguntur uere, in calidis potissimum regionibus, in nostris inter æstatis initia, hoc est, Iunio mense.

D

## TEMPERAMENTVM.

Calefaciunt & desiccant in primo ordine.

## VIRES. / EX DIOSCORIDE.

Vim habent radices, flores & herba calfaciendi, extenuandi q; . Potu & infusione menses, fœtus, calculos & urinam pellunt. Aduersus inflationes, & tenui intestini dolores bibuntur. Bile suffusos expurgant, & icinorosis medentur. Decocto earum uesicę uitia fouentur. Efficacius ex omnibus generibus est, quod florem fert purpureum, ceterisq; maius existit, idq; propriē Eranthemon uocatur. Quod uero Leucanthemon & Chrysanthemon cognomināt, uehementius urinam ciunt. Aegilopijs illitę medentur. Commanducata oris ulcera sanant. Nonnulli in clysteribus ex oleo utuntur, terentes ipsas ad pellendos febrium circuitus. Folia & flores reponi debent, & separatim contusa in pastillos conformari. Radix quoq; sicatur, & usu poscente interim partes duas herbę, floris aut radice modò unam: interim contrā floris duas, & herbę unam, alternis diebus duplicantes pondus, dare conuenit. Bibere autem oportet in uino diluto mulso.

## EX GALENO.

Tenuium est partium, quamobrem digerendi, rarefaciendi, & laxandi facultatē obtinet. Est itaq; Chamęmelon tenuitate Rosę per simile, calore uero ad olei facultates magis accedit, animali familiares, & temperatas. Quapropter lassitudinib; ut si quid aliud, cōfert, doloresq; mitigat. Pręterea tensa remittit & laxat, quęq; medicriter dura sunt emollit, quęq; cōstipata cōdensatę sunt rarefacit. Ad hęc febres quę citra uisceris alicuius inflammationē infestant, dissoluit, pręsertim quę ex humorib; biliosis, aut cutis densitate cōsistunt. Qua de re & ab Aegyptiorū sapientissimis Soli cōsecrata est, febriumq; omniū remediū putat. Verum hac quidem in re à ueritate aberrāt: solas enim quas diximus febres sanare potest, easq; quę iam cōcoctę sunt. Iuuat autem pulchrē reliquas etiā omnes quę melancholicę sunt aut pituitosę, aut ex uisceris inflammatione prognatę: nam & harum remediū Chamęmelon



A melum uel strenuissimū est, ubi iam cōcoctis adhibetur: quapropter & hypochondrijs, ut si quid aliud, gratum existit.

## EX PLINIO.

Medici uere folia tusa in pastillos digerunt: item florem & radicem. Dantur omnia mixta drachmæ unius pondere contra serpentum ictus. Pellit mortuos par-  
tus, item menstrua in potu, & urinam, calculosq: inflationes, iecinorū uitia, bilem  
suffusam, ægilopia. Cōmanducata ulcerum manantes in ore eruptiones sanat. Ex  
omnibus ijs generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet,  
cuius & foliorum & fruticis amplitudo maiuscula est. Hanc propriè quidem Eran-  
themum uocant.

## DE ANETHO CAP. IX.

## NOMINA.



ANETHON græcè, Anethum latinè appellatur. Nomen in officinis genui-  
num retinet. Germanicè Dyllen & Hochtraut nominatur.

## FORMA.

Anethum sesquicubitali proceritate assurgit, multicaule, ramosum, exi-  
litate folij in staminis penè modum extenuata, luteolo flosculo, semine lato & qua-  
si foliato, radice lignosa, neque adeò prolixa, umbella fœniculi, cui cognatum quasi  
genus, propter similitudinem uideti potest.

## LOCVS.

In hortis seritur: interdum & sponte, fœniculi modo, prouenit.

## TEMPVS.

B Floret in æstate, Iunio & Iulio mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Anethum adeò calefacit, ut habendum sit aut secundi ordinis intensi, aut tertij  
remissi. Exiccantiū uero ordinis est secundi incipientis, aut primi finientis. Vstum  
autem tertij tum calfacientium, tum desiccantium ordinis fit.

## VIREŚ.

## EX DIOSCORIDE.

Anethi aridi comæ seminisq: decoctum potum lac euocat. Tormina & inflatio-  
nes sedat. Aluum leuesq: uomitiones sistit. Vrinam cit. Singultus lenit. Oculos he-  
betat, & genituram assidue potum extinguit. Decoctum eius mulieribus præfoca-  
tione uulvæ laborantibus ad insidendum utile. Semen eiusdem ustum & illitum  
condylomata tollit.

## EX GALENO.

Anethum in oleo decoctum digerit, sedat dolores, somnum conciliat, crudos &  
incoctos tumores concoquit. Fit enim ex eo oleum, cuius propinqua sit temperies  
pus mouentibus, & maturantibus uocatis medicamentis, nisi quatenus paulò illis  
tum calidius, tum tenuiorum partium est, atque adeo digerēdi facultate præditum.  
Vstum ulceribus admodum humidis illitum prodest, potissimum ijs quæ in pu-  
dendo consistunt. Quæ autem in præputio sunt inueterata, ijs probè cicatricem in-  
ducit. Cæterum uiride humidius est, & minus calidum, itaq: magis cōcoquit sicco,  
& somnum cōciliat, sed minus digerit. Idcirco mihi uidentur ueteres coronis ex eo  
concinatis in symplosijs usi esse.

## EX PLINIO.

Anethū ructus mouet, & tormina sedat. Aluum sistit. Epiphoris radices illinun-  
tur ex aqua uel uino. Singultus cohibet semen feruens olfactum. Sumptū ex aqua  
sedat cruditates. Cinis eius uuam in faucibus leuat, oculos & genituram hebetat.

## EX SIMEONE-SETHI.

Ad crassorū humorū inflationes prodest. Quidā sanè ipsum stomacho bonum





ANETHVM

Dill.



A esse, alij uero minime, dixerunt. Illi quidem ad eius caliditatem, & facultatē quæ humiditatem cōcoquit, & flatus qui sunt in uentriculo discutit, respexerunt: ij uero ad substantiam eius, quæ crassarum est partium, concoctu difficilis, & nauseosa. Oleo incoctum discutit, & somnum conciliat. Inunctū tumores crudos concoquit. Inflationes quoque quæ in uentriculo generantur, digerit. Corpus ex immodico labore defatigatum, curat. Renes uero, ut quidam aiunt, lædit.

## DE AIZOON CAP. X.

NOMINA.



AIZOON græcè: Aizoon, Sedum, Semperuiuum latine nominatur. Postremum nomen officina obtruncatum. Vulgò louis barba, Germanicè *Naupswurz* / *Donderbar* dicitur, quòd scilicet nonnullis locis plebis animos iam pridem inuaserit opinio, non feriri fulmine domum, in cuius tegulis uireat Sedum. Porro Aizoon & Semperuiuum appellant, quod perpetuò, tam æstate quàm hyeme uirescat, nec ullis frigoribus, aut cæli iniuria quantumuis frigida, emoriatur.

GENERA.

Dioscoridem sequentes tria eius genera statuimus. Primum Aizoon seu Sedum maius, quod folia latiora habeat. Alium Sedum minus, quod Græcis etiam *τρυβαλές*, quia ter floreat in anno, uocatur. Vultu Vermiculatis, a similitudine foliorum, quæ rotunda sunt, & figuræ oualis, ut uermiculos putet, & Crassula minor nominatur. Huius iterum duo sunt genera: alterum enim mas est, quod nimirum floribus luteis spectatur, & Germanis *Flein haupswurz* das mennle appellatur. Alterum foemina, quod pallidis seu candidis conspicitur floribus, Germanicè *Flein haupswurz* das weible uocatur. Tertium genus est quod Aizoon syluestre, ab alijs Portulaca syluestris, aut Illecebra minus rectè & improprie dicitur. Nam Portulaca syluestris diuersa ab hoc tertio Sedi genere herba est, ut suo dicemus loco. Illecebræ autem nomen aliæ debetur herbæ, quæ Telephion uocatur, ut in eiusdem historia docebimus. Nomina uero hæc generi illi indiderunt, seducti errore eorum qui Portulacam syluestrem cum tertio Aizoon apud Dioscoridem confuderunt, atque adeò quæ debent Portulacæ & Telephio nomina, Aizoon temerè assignarunt. Ut enim uiribus diuersa est Portulaca syluestris ab hoc genere tertio Aizoi, ita etiam nomine & forma. Quare meritò reprehendendi sunt qui duo hæc capita sic sibi temerè miscuerunt. Vulgares herbarij Vermiculatē minorem uocant, Germani *Ragentreuble* oder *Waurpseffer*.

FORMA.

Semperuiuum maius caules profert cubitales, interdū etiam maiores, pollicis crassitudine, pingues, egregiè uirentes, incisuras Characiæ Tithymalli instar habentes. Folia pingua, pollicis magnitudine, in cacumine linguæ similia, alia in terram resupinata, alia in capite inuicem contracta, circulo oculi figuram circumscribunt. Minus Aizoon caules ab una radice exeuntes multos habet, tenues, folijs plenos rotundis, pinguibus, paruis, in summo acuminatis. Emitterit autē e medio caulem palmi altitudine, umbellam & flores pallidos luteosue sustinentem: *χλαρά* enim hoc loco, ut aliàs sepe, pro *ἀγὰ* accipitur, id quod ex Serapione etiam abunde constare potest, qui hunc Dioscoridis locum ita reddidit: Et habet uirgam in medio longam, circa longitudinem palmi, super quam est capitellum, in quo est flos citrinus, subtilis. Eam autem Semperuiui minoris speciem quæ flosculis luteolis spectatur, dilucidioris doctrinæ gratia, marem appellauimus. Alteram uero quæ candidos obtinet flores, foeminā. Tertium Semperuiui genus syluestre dictum, foliola habet pinguiora, ad Portulacæ figuram accedentia, & hirsuta, breuiori quæ cacumine. His uerbis ex-





SEDVM MAIVS

Grosßhaufswurtz.





SEDUM MINVS  
MAS.

Klein haufswurtz  
mennle.





SEDVM MINVS  
FOEMINA.

Klein haufwurz weiblich.





**SEDI TERTIVM**  
GENVS.

*Katzentreuble.*



C

## TEMPVS.

Incipit à mēdia hyeme. Arescit autē æstate media. Cum prorepat, musculorū aures imitatur folijs.

## TEMPERAMENTVM.

Refrigerantem & humectantem haud secus quàm Helxine obtinet facultatem: est enim aqueæ essentia frigida: quare & citra adstrictionem refrigerat.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Al sine refrigerandi facultatem obtinet. Oculorū inflammationibus cum polenta illita cōuenit. Succus eius aurium doloribus instillatus prodest. In uniuersum eadem quæ helxine potest.

## EX GALENO.

Ad feruentes phlegmonas, & mediocria erysipelata competit.

## EX PLINIO.

Vfus eius ad collectiones inflammationesq̃. Quin emendat omnia quæ Helxine, sed infirmius. Epiphoris peculiariter imponitur: item uerendis ulceribusq̃ cum farina hordeacea. Succus eius auribus infunditur.

## APPENDIX.

Easdem facultates, herbis quas morsus gallinæ uulgò nominant, nostri temporis herbarij tribuunt, quod scilicet ad feruentes inflammationes, ac erysipelata prosint. Omnes enim, ut dictum est, refrigerant atque humectant. Hinc est quod minorem aliqui Germanorū sieberer aut uocent, quia scilicet febribus accommoda, & utilis sit.

## DE ANTHEMIDE CAP. VIII.

## NOMINA.

D  
Chamæmelon  
cur dictum.



ΝΘΕΜΙΣ, ἡ χαμαίμηλον græcè, Anthemis, Chamæmelon latinè, officinis corrupto nomine Camomilla dicitur, Germanicè Camillen. Chamæmelon, quoniam odorem habeat mālī, appellant, id quod de primo genere potissimum intelligendum uenit.

## GENERA.

Tria eius genera, floribus tantum distantia, inueniuntur. Hi enim etsi intus aurei sint, tamen foris per ambitū illis adiacent folia aut candida, aut lutea, aut purpurea. Quæ foris in orbem candida folia obtinet, ea est quæ à Dioscoride propriè λευκάνθημον, & uulgò hodie Camomilla uocatur. Quæ uero luteis per ambitum folijs cōstat, ea haud dubie est, quā priuatim Dioscorides à suis floribus χρυσάνθημον nominat, Germani autem, pulchrè ad græcam appellationem alludētes, Goldtblumen / Gelcamillen / Streichblumen appellant. Tertia species chamæmeli, quæ nimirū purpurea per orbem folia habet, nulla alia est nisi ea quam hodie uulgi medicorum Consolidam regalem, Germani autē à similitudine calcaris, cui respondet flosculus eius herbae, & à colore lepidio regioq̃, qui aspectari nunquā satis potest, Kittersporn uocant. Dioscorides peculiariter ἡρανθήμον, eo quod uere floreat, dici tradit. Tria itaq̃ in uniuersum Anthemidis seu Chamæmeli genera sunt, quorum sanè primum Chamæmelon leucanthemon, alterū Chamæmelon chrysanthemon, tertium Chamæmelon eranthemon Dioscoridi nominatur. De duobus primis generibus neminē dubitare, quin uera & legitima sint, arbitramur, quod nihil in his sit quod Dioscoridis descriptioni, quam mox subiiciemus, non respondeat. Tertium fortè nonnullis qui morosius omnia obseruant, minime genuinum Chamæmeli genus esse uidebitur: ideoq̃ quibus simus argumentis & cōiecturis impulsī, ut tertium Anthemidis esse genus credamus, necesse erit ostendere. Potissimū autem quod nos in hanc sententiam pertraxit est, quod singula in Dioscoridis descriptione illi congruant, rami scilicet palmum non excedentes, fruticosi, multas alas habentes, parui & exigui, capitula





CHAMAEMELON  
LEVCANTHEMON.

Camillen.



CHAMAEMELVM  
CHRYSANTHEMON.

Hel camillen.







CHAMAEMELVM  
ERANTHEMON.

Bittersporn.

C 2



c pitula rotunda, aurea, foris purpureis folijs, magnitudine in nullo alio genere Rutę folijs magis similibus circumdata. Deinde sententiam hanc nostram cōfirmavit antiquissimus codex manuscriptus, in quo pictura exquisitissimē Regalem dictā consolidā refert, quam ijs sanē uerbis describit: Herba est quam quidā Monachellā, siue  
 „ solidā refert, quam ijs sanē uerbis describit: Herba est quam quidā Monachellā, siue  
 „ Capucianā uocant (à cucullo haud dubiē monachorū, quem flores illius herbę referunt, nomen imponentes) Dioscorides Eranthemon appellat, & est una species  
 „ Anthemidis, quę folia instar Camomillę habet, nigriora tamen: florem autem uiolę similē. Hęc ille. Quibus omnibus illud etiā accedit, nostram de hac herba sententiam mirificē corroborans, quod uulgus hodie medicorū Consolidā regale calculosis, & oculis prodesse tradat, adeo ut illius etiā conspectū multos ex oculis laborantes sanasse dicant. Atq; hinc fit ut studiosi passim eam herbā in suis musæis suspensam habeant, oculis hac ratione cōsulere uolentes. Has autem omnes facultates ut ex sequentibus patebit, Eranthemo suo Dioscorides etiā adscribit. Quamobrem nihil certius est, quā Consolidam regalem tertium esse Anthemidis genus, id quod argumenta nostra iam adducta palām euincunt.

## FORMA.

Rami palmum non excedunt, fruticosi, frequentes alas habentes, parui, tenues & multi, capitulis rotundis. Flores intus aureos continent, foris uero per ambitum candidos, aut luteos, aut purpureos, foliorum Rutę magnitudine.

## LOCVS

Nascuntur in aspero, sicco, macroq; solo, & iuxta semitas atq; itinera.

## TEMPVS.

Colliguntur uere, in calidis potissimum regionibus, in nostris inter æstatis initia, hoc est, Junio mense.

D

## TEMPERAMENTVM.

Calefaciunt & desiccant in primo ordine.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habent radices, flores & herba calfaciendi, extenuandi q; . Potu & infusione menses, fœtus, calculos & urinam pellunt. Aduersus inflationes, & tenui intestini dolores bibuntur. Bile suffusos expurgant, & tuncinorosis medentur. Decocto earum uesicę uicia fouentur. Efficacius ex omnibus generibus est, quod florem fert purpureum, ceterisq; maius existit, idq; propriē Eranthemon uocatur. Quod uero Leucanthemon & Chrysanthemon cognomināt, uehementius urinam ciunt. Aegilopijs illitę medentur. Commanducata oris ulcera sanant. Nonnulli in dysteribus ex oleo utuntur, terentes ipsas ad pellendos febrium circuitus. Folia & flores reponi debent, & separatim contusa in pastillos conformari. Radix quoq; sicatur, & usu poscente interim partes duas herbę, floris aut radicis modō unam; interim contrā floris duas, & herbę unam, alternis diebus duplicantes pondus, dare conuenit. Bibere autem oportet in uino diluto mulso.

## EX GALENO.

Tenuium est partium, quamobrem digerendi, rarefaciendi, & laxandi facultatē obtinet. Est itaq; Chamęmelon tenuitate Rosę persimile, calore uero ad olei facultates magis accedit, animali familiares, & temperatas. Quapropter lassitudinib. ut si quid aliud, cōfert, doloresq; mitigat. Præterea tensa remittit & laxat, quęq; medicriter dura sunt emollit, quęq; cōstipata cōdensatę sunt rarefacit. Ad hęc febres quę citra uisceris alicuius inflammationē instant, dissoluit, præsertim quę ex humorib. biliosis, aut cutis densitate cōsistunt. Qua de re & ab Aegyptiorū sapientissimis Soli cōsecrata est, febriumq; omniū remediū putat. Verum hac quidem in re à ueritate aberrāt: solas enim quas diximus febres sanare potest, easq; quę iam cōcoctę sunt. Iuuat autem pulchrē reliquas etiā omnes quę melancholicę sunt aut pituitosę, aut ex uisceris inflammatione prognatę: nam & harum remediū Chamęmelon



A melum uel strenuissimū est, ubi iam cōcoctis adhibetur: quapropter & hypochondrijs, ut si quid aliud, gratum existit.

## EX PLINIO.

Medici uere folia tusa in pastillos digerunt: item florem & radicem. Dantur omnia mixta drachmæ unius pondere contra serpentum ictus. Pellit mortuos par-  
tus, item menstrua in potu, & urinam, calculosq: inflationes, iecinorū uitia, bilem  
suffusam, ægilopia. Cōmanducata ulcerum manantes in ore eruptiones sanat. Ex  
omnibus ijs generibus ad calculos efficacissima est, quæ florem purpureum habet,  
cuius & foliorum & fruticis amplitudo maiuscula est. Hanc proprie quidem Eran-  
themum uocant.

## DE ANETHO CAP. IX.

## NOMINA.



ANETHON græcè, Anethum latinè appellatur. Nomen in officinis genui-  
num retinet. Germanicè Dyllen & Hochkraut nominatur.

## FORMA.

Anethum sesquicubitali proceritate assurgit, multicaule, ramosum, exi-  
litate folij in staminis penè modum extenuata, luteolo flosculo, semine lato & qua-  
si foliato, radice lignosa, neque adeò prolixa, umbella sceniculi, cui cognatum quasi  
genus, propter similitudinem uideti potest.

## LOCVS.

In hortis seritur: interdum & sponte, sceniculi modo, prouenit.

## TEMPVS.

B Floret in æstate, Iunio & Iulio mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Anethum adeò calefacit, ut habendum sit aut secundi ordinis intensi, aut tertij  
remissi. Exiccantiū uero ordinis est secundi incipientis, aut primi finientis. Vstum  
autem tertij tum calfacientium, tum desiccantium ordinis sit.

## VIREŚ.

## EX DIOSCORIDE.

Anethi aridi comæ seminisq: decoctum potum lac euocat. Tormina & inflatio-  
nes sedat. Aluum leuesq: uomitiones sistit. Vrinam cit. Singultus lenit. Oculos he-  
betat, & genituram assidue potum extinguit. Decoctum eius mulieribus præfoca-  
tione uulvæ laborantibus ad insidendum utile. Semen eiusdem ustum & illitum  
condylomata tollit.

## EX GALENO.

Anethum in oleo decoctum digerit, sedat dolores, somnum conciliat, crudos &  
incoctos tumores concoquit. Fit enim ex eo oleum, cuius propinqua sit temperies  
pus mouentibus, & maturantibus uocatis medicamentis, nisi quatenus paulò illis  
tum calidius, tum tenuiorum partium est, atque adeo digerēdi facultate præditum.  
Vstum ulceribus admodum humidis illitum prodest, potissimum ijs quæ in pu-  
dendo consistunt. Quæ autem in præputio sunt inueterata, ijs probè cicatricem in-  
ducit. Cæterum uiride humidius est, & minus calidum, itaq: magis cōcoquit sicco,  
& somnum cōciliat, sed minus digerit. Idcirco mihi uidentur ueteres coronis ex eo  
concinatis in symplosijs usi esse.

## EX PLINIO.

Anethū ructus mouet, & tormina sedat. Aluum sistit. Epiphoris radices illinun-  
tur ex aqua uel uino. Singultus cohibet semen feruens olfactum. Sumptū ex aqua  
sedat cruditates. Cinis eius uuam in faucibus leuat, oculos & genituram hebetat.

## EX SIMEONE-SETHI.

Ad crassorū humorū inflationes prodest. Quidā sanè ipsum stomacho bonum





ANETHVM

Dill.



**A** esse, alij uero minimè, dixerunt. Illi quidem ad eius caliditatem, & facultatē quæ humiditatem cōcoquit, & flatus qui sunt in uentriculo discutit, respexerunt: h̄ uero ad substantiam eius, quæ crassarum est partium, concoctu difficilis, & nauseosa. Oleo incoctum discutit, & somnum conciliat. Inunctū tumores crudos concoquit. Inflationes quoque quæ in uentriculo generantur, digerit. Corpus ex immodico labore defatigatum, curat. Renes uero, ut quidam aiunt, lædit.

## DE AIZOON CAP. X.



**A**IZON græcè: Aizoon, Sedum, Semperuium latine nominatur. Postremum nomen officinæ obtruncatum. Vulgò louis barba, Germanicè *Hauswurß* / *Donderbar* dicitur, quod scilicet nonnullis locis plebis animos iampridem inuasit opinio, non feriri fulmine domum, in cuius tegulis uireat Sedum. Porro Aizoon & Semperuium appellant, quod perpetuò, tam æstate quam hyeme, uirescat, nec ullis frigoribus, aut cœli iniuria quantumuis frigida, emoriatur.

## GENERA

Dioscoridem sequentes tria eius genera statuimus. Primum Aizoon seu Sedum *Aizoon maius.* maius, quod folia latiora habeat. Aliud Sedum minus, quod Græcis etiam *τρυβαλῆς*, quia ter floreat in anno, uocatur. Vulgò *Vermicularis*, à similitudine foliorum, quæ rotunda sunt, & figuræ oualis, ut uermiculos putes, & *Crassula minor* nominatur. Huius iterum duo sunt genera: alterum nimirum mas est, quod nimirum floribus luteis spectatur, & Germanis *Hein hauswurß das mennle* appellatur. Alterum fœmina, quod pallidis seu candidis conpicitur floribus, Germanicè *Hein hauswurß das weible* uocatur. Tertium genus est quod Aizoon syluestre, ab alijs *Tertium genus Aizoi.* *Portulaca syluestris*, aut *Illecebra* minus rectè & improprie dicitur. Nam *Portulaca syluestris* diuersa ab hoc tertio Sedi genere herba est, ut suo dicemus loco. *Illecebræ* autem nomen aliæ debetur herbæ, quæ *Telephion* uocatur, ut in eiusdem historia docebimus. Nomina uero hæc generi illi indiderunt, seducti errore eorum qui *Portulacam syluestrem* cum tertio Aizoo apud Dioscoridem confuderunt, atque ad eò quæ debent *Portulacæ* & *Telephio* nomina, Aizoo temerè assignarunt. Ut enim uiribus diuersa est *Portulaca syluestris* ab hoc genere tertio Aizoi, ita etiam nomine & forma. Quare meritò reprehendendi sunt qui duo hæc capita sic sibi temerè miscuerunt. Vulgares herbarij *Vermiculatē* minorem uocant, Germani *Kagentreuble* oder *Maurpfeffer*.

## FORMA

Semperuiū maius caules profert cubitales, interdū etiam maiores, pollicis crassitudine, pingues, egregiè uirentes, incisuras *Characi* & *Tithymalli* instar habentes. Folia pingua, pollicis magnitudine, in cacumine linguæ similia, alia in terram resupinata, alia in capite inuicem contracta, circulo oculi figuram circumscribunt. Minus Aizoon caules ab una radice exeuntes multos habet, tenues, folijs plenos rotundis, pinguibus, paruis, in summo acuminatis. Emitterit autē e medio caulem palmi altitudine, umbellam & flores pallidos luteosue sustentem: *χλωρὰ* enim hoc loco, ut aliàs sepe, pro *ὀχρὰ* accipitur, id quod ex *Scrapione* etiam abunde constare potest, qui hunc *Dioscoridis* locum ita reddidit: Et habet uirgam in medio longam, circa longitudinem palmi, super quam est capitellum, in quo est flos citrinus, subtilis. Eam autem *Semperuii* minoris speciem quæ flosculis luteolis spectatur, dilucidioris doctrinæ gratia, marem appellauimus. Alteram uero quæ candidos obtinet flores, fœminā. Tertium *Semperuii* genus syluestre dictum, foliola habet pinguiora, ad *Portulacæ* figuram accedentia, & hirsuta, breuioriꝝ cacumine. His uerbis ex-





SEDUM MAIUS

Grosßhaufswurtz.





SEDVM MINVS  
MAS.

Klein haßwurtz  
mennle.





SEDI TERTIVM  
GENVS.

Katzentreuble.





PLANTAGO  
MAIOR.

Biegt wegrich.

D



PLANTAGO  
MINOR.

Spitziger weg-  
rich.





## NOMINA.



ARNOGLOSSON Græcis: Arnoglossum, Plantago Latinis nominatur. Nomen latinū Plantaginis officinæ retinuerūt. Germanicè Wegerich/ Schafzungen/ quod nomen græco pulchrè respondet, dicitur. Arnoglossum, quod eius folia agninae linguae simillima sint, appellarūt Græci. Latini autem Plantaginem, ducto à planta uocabulo, nuncuparunt. Sunt tamen qui à multitudine neruorum, quibus quasi costis in dorso per longitudinem folia eius distincta sunt, Polyneuron uocant.

Arnoglossum uen  
de dictum.

Plantago.

Polyneuron.

## GENERA.

Duo Plantaginis sunt genera, ueterum omnium sententia, maior & minor. Maior, quam peculiariter à septenis quæ in folijs apparent costis, græcè ἐπιδυλλιον, id est, Septineruiā uocant, Germanis nostris à foliorum latitudine grosser oder breyter wegerich nominatur. Minor, eo quod eius folia fibris quinq; tanquā neruis distincta sunt, πεννυλλιον, id est, Quinqueneruia dicitur. Officinæ, quoniam folium arctius desinit in acumen, & uelut in lanceæ mucronē fastigiatur, Lanceolatam, uulgus autem Lanceolam appellat. Germanicè Klein oder spiziger wegerich/ quia scilicet acuminatior & longior est, & ab equinæ costæ similitudine, Rosripp uocat.

## FORMA.

Minor Plantago angustiora, minora, molliora, leuiora & tenuiora folia habet, caule anguloso, in terram inclinato: flores pallidos: semen in summis caulibus. Maior contra crassior uegetiorq; latiore folio, betaceo. Folia siquidem maioris Plantaginis betaceorum effigiem, nō alterius oleris referunt, quod Dioscorides λέχνην dicit. Nam apud Athenienses λέχνην pro Beta sæpe sumi solet, à cuius folijs non multum Plantaginea uidentur abhorrere. Non itaq; olus intelligere potuit, cum in exprimenda similitudine speciatim loqui, non generatim conueniat. Huius caulis angulosus, subruber, altitudine cubitali, à medio sui ad uerticē usq; tenui semine circumdatus, flosculum in spica luteum, nōnunquam herbaceum ostentat. Radices subsunt illi teneræ, hirsutæ, candidæ, digitali crassitudine. Descriptiones hæ Dioscoridis pulchrè, picturæ respondent. Antiquus etiam herbarius easdem pro maiori & minori Plantagine herbas exhibet.

## LOCVS.

Maior in palustribus potissimum nascitur. Vtraq; autem circum sepes, aggeres, prata, & lacunosa loca.

## TEMPVS.

Herba & flores in æstatis initio, Maio & Iunio mensibus, semen uero Augusto capitur mense.

## TEMPERAMENTVM.

Mixtæ est temperaturæ Plantago, habet enim quiddam aqueū frigidum: habet uero & austerum quiddam, id quod terreum est, siccum, frigidum. Itaq; refrigerat simul & desiccet, & in utroq; secundi recessus à medijs est.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Vim habent folia exiccatoriā & adstringentē, ideo ad omnia ulcera maligna, elephantica, quæ humore scatent, & sordida, cōferunt. Eruptiones sanguinis, nomas, carbunculos, herpetas, epinyctidasq; cohibent. Vlceres ueteres & inæqualia cicatrice obducunt. Medentur & ijs quæ Chironia nuncupantur. Sinus glutinant. Moribus canis, ambustis, inflammationibus, parotydi, panis, profunt. Strumis & ægilopis cum sale illita cōferunt. Olus coctū cum aceto & sale dysentericis & celiacis sumptum subuenit. Datur & in locum Betæ cum lenticula coctum. In leucophlegmatia post aridas epulas in medio herba decocta datur. Comitialib. & asthmaticis data proficit. Foliorū succus oris ulcera continua collutione purgat. Cum creta cimo-

D 2 lia &



c lia & cerusa ignibus sacris medetur. Fistulas infusus sanat. Auriū doloribus & lip-  
pitudinibus succus instillatus, & collyrijs additus prodest. Gingiuis sanguinolen-  
tis, & sanguinē reſcientibus potus cōfert. Dysentericis subter per aluum inſicitur.  
Bibitur contra tabem. Aduersus uteri strangulationes in lana apponitur: item uul-  
uæ fluxiones. Semen cum uino potum alui fluxiones, & sanguinis excreationes ſi-  
ſtit. Radix decocta collutione, & cōmanducata, dentiū dolores sedat. Eadem cum  
folijs in paſſo ad ueſicæ renumq̃ ulcera præbetur. Ferunt tres radices cum tribus  
uini cyathis, & pari aquæ potas, tertianis auxiliari, & quatuor quartanis. Sunt qui  
radice è collo ſuſpenſa ad ſtrumas diſcutiendas utantur.

## EX GALENO.

Quæcunq̃ medicamenta cum hoc quod refrigerant unā etiam adſtringunt, ea  
& ad ulcera maligna omnia, & ad fluxiones, & putredines profunt, atque adeo etiā  
ad dysenterias: nam & sanguinis eruptiones ſiſtunt, & ſi quid aduratur refrigerant.  
Sinus quoq̃ glutinant, & alia ulcera recentia ſimul & uetera. In omnibus ferē id ge-  
nus medicamenti primas tenet, aut certē nulli ſecundū eſt Arnogloſſum, idq̃ tem-  
peraturæ ſymmetria. Nam ſiccitatem obtinet morſus expertem, & frigiditatē quæ  
nondum obſtupefaciat. Semen eius & radix ſimilis ſunt facultatis, attamen ſiccio-  
ris, & minus frigidæ. Semen etiam ſubtilium eſt partium, radices autem craſſiorū.  
Et huius herbe folia exſiccata, ſubtilioris & minus frigidę facultatis ſiunt, nempe diſ-  
ſolato ex eo ac digeſto excremento aqueo. Hac ratione radicibus utuntur ad dentiū  
dolores, tum manducantes, tum collutionibus incoquentes. Præterea ad iecinoris  
& renum obſtructiones non has tantum adhibent, ſed folia quoque & multò ma-  
gis ſemen: hæc enim quandam abſtergendi in ſe facultatē habent, quam & in her-  
ba uiridi ineſſe ſatis conijci poteſt, uerum ab humiditatis copia uinci.

D

## EX PLINIO.

Vis mira in ſiccando denſandoq̃ corpore, cauterij uicem obtinens. Nulla res æ-  
que ſiſtit fluxiones, quas græci rheumatismos uocant. Stomachū corroborat Plan-  
tago per ſe ſumpta in cibo cum lente alicæuē ſorbtione. Strumis medetur. Semen  
eius in uino tritum, uel ipſa ex aceto cocta, aut alica ex ſucco eius ſumpta dysenteri-  
cis datur. Lichenis ſcedo malo medetur trita. Vitia ſedis & attritus celerrimē sanat.  
Ex aqua mulſa duabus horis ante acceſſionem pota duabus drachmis, tertianas le-  
niores facit, uel ſuccus radicis madefactæ uel tuſæ, uel ipſa radix trita in aqua ferro  
calefacta. Quidam ternas radices in tribus cyathis aquæ dederunt. Iidem in quar-  
tanis quaternas fecerunt. Hydropicos sanat in cibo cum prius panem ſiccum come-  
derint ſine potu. Folia podagras refrigerant, & in primo impetu podagrę rubentis,  
hoc eſt, calidæ, conueniunt. Oris ulcera ſuccus emendat, & folia radicesq̃ cōman-  
ducata, uel ſi rheumatismo laboret os. Vitio reiectionis ſanguinis idem medetur.  
Phthiſim ſanat ſi bibatur, & ipſa decocta in uino cum ſale & oleo à ſomno matuti-  
no refrigerat. Luxatis dolores & tumores tollunt folia tuſa, addito ſale modico. Fi-  
ſtulis infuſus ſuccus auxilio eſt. Sanguinis profluuium ſiſtit ſemen, ſi ore reijciatur,  
ſiue aluo fluat, ſiue ſceminarum utero. Succus uomentibus ſanguinem datur.

Contuſis, euerſis omnibus modis ipſa ſumitur. Medetur omnium ge-  
nerum ulceribus, peculiariter ſceminarum, ſenum, & infan-  
tium, igne mollita, melior & cum cerato.

DE ALI-





PLANTAGO  
AQUATICA.

Wasserwegrich.



C

## NOMINA.

Plantago aquatica.



**A**LISMA, ἡ ἀλυσματίνη γράει: Alisma, Damasonium latine nominatur. Sunt qui eam herbam esse putent, quam herbarij & uulgi nominant Barbam syluanam, & Plantaginē aquaticam: nonnulli uero eam, quam multi pastorem fistulam uocāt. Prior Germanis Wasser wegrich / & Stroschlöffel / quod scilicet in palustribus nascatur, ubi frequentes sunt ranæ. Altera uero hsdem Hirtenpfeiff nominatur. Plantaginē autem aquaticā, ob natales & similitudinem quæ illi cum uera Plantagine est, dixerunt: quemadmodū fistulam pastorem, quod singulari scapo rudis fistulæ & longitudinē & effigiem quandam uideatur imitari. Quæ uero nostra de hīs sit sententia paulō post indicabimus.

## FORMA.

Alisma folia Plantagini similia habet, angustiora tamen & in terram reflexa, demissaq̃. Caulis illi est tenuis, simplex, altitudine cubitum excedente, thyrsi similis, capitula habens. Flores tenues, candidos & aliquatenus pallidos obtinet. Radices ut Ellebori nigri tenues, odoratas, acres, modiceq̃ pingues. Ex qua quidē delinitione satis constat neutram herbarum quarum picturas damus, esse Alisma. Nam herba quam hodie Plantaginē aquaticam uocant, non per omnia historię respondet. Vt enim alia præteream, radix eius neque odorata, neque acris est. Alterius autem, quam pastorem fistulam nominauimus, etsi radix odorata sit, minimē tamē acris existit. Quicquid tamen sit, hac potius quā altera pro Alismate utendum esse cenſeo. Eius effigiem suo loco dabimus.

## LOCVS.

Aquosa amat loca, in quibus passim nascitur.

## TEMPVS.

**D** In æstate colligi potest, tum enim floribus abundat.

## TEMPERAMENTVM.

Calidam esse hanc herbam satis monstrant radices, quas acres esse constat. Absterſoriam etiam quandam in se facultatem obtinent.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Radix unius aut alterius drachmæ pondere cum uino pota, his qui leporem marinum deuorauerunt, prodest, & quos rubeta rana momorderit, quiq̃ opium hauserunt. Torminibus & dysenterię per se, aut cum Dauco pari pondere pota confert. Conuulsis itidem & uteri strangulationibus. Herba sistit aluum, menses ducit, & cedemata illita lenit.

## EX GALENO.

Damasonium aut Alisma. De hac herba in tertio libro tradit Dioscorides, quod radix eius epota dysenterias sanet, & aluum sistat, atq̃ cedemata mitiget. Nos uero ea experti non sumus. Quod autem cōstitutos in renibus calculos aqua in qua decocta fuerit pota cōminuat, casu experti sumus. Ex quo liquet, quod absterſoriam quandam facultatem obtinet.

## EX PLINIO.

Vſus in radice aduersus ranas & lepores marinos. Lepori marino aduersatur in uino potum. Strumis imponitur ex aqua cœlesti folium tritum, uel radix cum axungio tusa, ita ut imposita folio suo operiatur. Sic & ad omnes ceruicis dolores, tumoresq̃, quacuncq̃ in parte.





ARTEMISIA  
LATIFOLIA

Beifuß.



45



ARTEMISIA  
TENVIFOLIA.

Mettram.





ARTEMISIA  
MONOCLONOS.

Reinfarn.






TAGETES  
INDICA

Indianische  
negelen.



A

## NOMINA.



ARTEMISIA Græcis, Artemisia latinis, Germanis Bey süß/Bucken/  
S. Johans gürtel/Sonnenwend gürtel/oder Grosser reinfarn ap-  
pellatur. Officinę ueterem appellationē retinent. Nomen herbę indi-  
tum putant ab Artemisia uxore Mausoli regis, quę sibi hanc herbam  
adoptauit, cū antē Parthenis, id est, uirginalis, quod uirgo dea illi no-  
men dederit, uocaretur. Non desunt qui ab Artemide cognominatā arbitrentur,  
quod priuatim sceminarū malis, quibus ἀρtemis, hoc est, Diana præest, medeatur.  
Nomen Germanicū S. Johans gürtel, quasi diui Ioannis zonam dicas, à supersti-  
tiosis nonnullis monachis & mulierculis herbę huic impositum est. Nam fuerunt  
qui non coronas duntaxat, sed etiam zonas ex ista herba cōfecerunt, quas tandem  
in ignem, qui in die diuio Ioanni baptistę sacro, in singulis plateis urbium succende-  
batur, nescio in quem euentū, proiecerunt, haud dubiē hac herba in deserto diuum  
Ioannem cinctum fuisse somniati.

Artemisia uide  
dicta.

## GENERA.

Tres sunt, Dioscoride teste, Artemisię species, quę etiam hodie apud nos passim  
reperiuntur. Prima πλατύφυλλον, latinē Artemisia latifolia dici potest. Ea autem est  
quę simpliciter hodie Artemisia uocatur. Huius iterū duo sunt genera colore dun-  
taxat distantia: unū caule & floribus rubens, Germanis Rot bucken/uel Rot bey-  
süß dicitur: alterum candicans caule, floribus uero flauis, Germanicē weiß bucken  
appellatur. Altera gręcē λεπτόφυλλον, latinē uero Tenuifolia nominatur: quod quidē  
genus uulguş hodie Matricariā, Germani Mutterkraut/& Mettram, quod uteri,  
quem matricē uocant, morbis medeāt. Tertia species Artemisia monoclonos dici-  
tur, Tanacetū corrupto nomine pro Tagetē hodie nominant, Germani Reinfarn,  
quod filicis ferē speciem referat, & in aquarum ripis nascatur. Alio nomine Wurm-  
kraut, quoniā lumbricos ē uentre pellat. Esse uero hanc herbam aliquam Artemi-  
się speciem uel hinc etiam cōstare potest, quod primam speciem, ut diximus, nonnulli  
Germanicē Grosse reinfarn uocant: hac enim nomenclatura manifestē docent, &  
eam quam Tagetem appellant Artemisię esse congenerem, quod scilicet eandem  
habeat appellationē. Huius haud dubiē generis est herba quę elegantissimos pro-  
fert flores, garyophyllos Indos uocatos: nulla enim in re nisi floribus, qui sunt ele-  
gantiores & longē maiores, ab hac nostra distat: odore tamē nostrā hanc etiam uin-  
cit. Hinc est quod Tagetē Indicam appellauerimus, Germanicē autem Indianische  
negelen. His autē herbis tribus cōuenire Dioscoridis descriptiones faciliē unusquisque  
ex ijs quę paulō post dicemus cognoscet. Esse autem Artemisię genera ex ma-  
nuso scripto codice, quem ob uetustatem lubens cito, manifestē colligi potest. Is enim pi-  
ctas ordine tres iam cōmemoratas herbas ita ob oculos ponit, ut nemo qui illas uel  
semel saltem uiderit, non agnoscat. Picturę accedunt descriptiones, & nomenclatu-  
rę hodie etiam usitata. Primam enim Artemisiam, alteram Leptophyllum & Ma-  
tricariam, tertiam uero Tagetem, quo nomine Apuleius usus est, & Tanacetum  
appellat, ita ut nemo deinceps quin uera sint Artemisię genera dubitare debeat,  
aut meritō possit.

Artemisia latia  
folia.Artemisia tenuis  
folia.

Matricaria.

Artemisia mono-  
clonos.

Tanacetum.

Tagetes.

## FORMA.

Prima species quę priuatim Artemisia dicitur, fruticosa est herba, Absinthio si-  
milis, maiora tamen & pinguiora folia habet, quę supernē ex nigro uirescunt, sub-  
ter autem candicāt, crebrō etiam resecta sunt. Flos illi tenuis, & semen rotundū. Al-  
tera, folia tenuiora obtinet, flores exiguos, tenues, albos, & grauiter olentes. Porro  
Sampfuchi odorem cōfricata eius folia & flores referūt. Quę utiq; descriptio ita Ma-  
tricariā uulgō dictam herbā exprimit, ut nemo non, nisi talpa cecior sit, hanc esse al-  
teram

Artemisia



**C**teram Artemisiæ speciem uideat. Fruticosa enim herba est Matricaria, folijs quàm sit Artemisia propriè dicta gracilioribus, floribus tenuioribus, per ambitum albis, (intus enim lutei existunt) grauius cum uniuerſa herba olentibus. Hallucinant itaque qui Serapionis interpretem secuti, Dioscoridis Parthenium esse putant, ut suo loco abundè demonstrabimus. Tertia *μονόκλων*, hoc est, unicaulis dicta, simplici caule confurgit, folijs minutim scissis. Caulis in summo floribus luteis & tenuibus abundat. Hæc odoris iucunditate priorem uincit. Quæ sanè descriptio pulchrè herbam Tanacetum appellatam hodie, deliniat, ita ut tertiam esse Artemisiæ speciem nemo dubitare debeat, aut saltè iure queat. Tagetes Indica caule exurgit rubescente, ramulis multis brachiato, folijs tenuibus, minutim scissis, & grauius odoratis, floribus in summo caule luteis, & croci ferè colorem referentibus, elegancia nulli alteri cedentibus.

*Parthenium non est Matricaria.*

*Tanacetum.*

#### LOCVS.

Prima nascitur in aquosis, incultis, asperisq; locis. Altera in hortis, locis siccis & lapidosis. Tertia in aquarum ripis, atque uinearum aggeribus passim prouenit, unde Germanicè appposito uocabulo *Reinfarn* uocatur. Indica Tagetes non nisi sata prouenit in Germania.

#### TEMPVS.

Singula genera tria æstate, potissimū cum uua matureſcit, tunc enim abundant floribus, colliguntur. Indica paulò tardius in nostra regione floret.

#### TEMPERAMENTVM.

Calefaciunt & modicè desiccant, & sunt, quod ad calefactionem attinet, ordinis secundi: quod uero ad resiccationem, aut primi intensi, aut secundi remissi. Sunt etiam modicè tenuium partium.

#### VIRES.

#### EX DIOSCORIDE.

**D**Excalfaciunt & extenuant. Feruefactę profunt ad infessus muliebres, ducendos menses, secundas, & sectus. Vteri præclusionem atque inflammationē iuuant, lapides frangunt, & urinæ suppressionem tollunt. Herba ipsa imo uentri illita copiosa, menses mouet. Succus eius cū myrrha subactus & admotus, ex utero elicit quæcunq; & infessio. Bibitur etiam coma trium drachmarum pondere eorundem ducendorum gratia. Si quis stomacho laborans Artemisiam leptophyllon contuderit probè cum oleo amygdalino, & ueluti malagma confecerit, stomachoq; impoſuerit, sanabitur. Neruorum quoque dolore si quis affectus fuerit, ac succum eius cum oleo rosaceo miscens inunxerit, curabitur.

#### EX GALENO.

Ad renum calculos mediocriter, & ad uteri fomentationes profunt.

#### EX PLINIO.

Artemisia priuatim sceminarum malis medetur. Eandem quoq; secum habentibus, negant nocere mala medicamenta, bestiamue ullam, ne solem quidem. Bibitur & hæc ex uino aduersus opium. Alligata priuatim potens traditur, potaue aduersus ranas. Alligatam qui habet uiator, negatur lassitudinem sentire.

#### APPENDIX.

Præter dictas facultates usu compertum est, flores Tanaceti pueris ex uino uel lacte datos, mirificè ex uentre lumbricos pellere, ideoq; Germanis herba lumbricorū, ut paulò antè diximus, appellata est hæc Artemisiæ species.





APARINE

Klebkraut.

E



C

## NOMINA.

Errant qui putant  
legendū esse ὀμ-  
φαλόκαρπον,  
nam Dioscoridis  
& Pauli exem-  
plaria castigatio  
ra omnia habent  
ὀμφαλόκαρπον  
Cui sane lectio-  
nis ratio ipsa sub-  
scribit, cū sic no-  
minata sit ab um-  
bilici specie, quā  
fructus eius re-  
fert. Quare cum  
altera lectio ra-  
tione omni desti-  
tuta sit, immerito  
ab Orosio Hispa-  
no Hermolaus,  
Marcellus, et Ru-  
ellius Dioscoridis  
interpretes ὀμ-  
φαλόκαρπον  
legētes laxantur.



APARIN, ὀμφαλόκαρπος, ὀφιλιανθρῶπος græcè, Aparine latinè, Klebtraut Germanicè nominat. Omphalocarpos ab umbilici similitudine, quam semē eius refert, rectè dicta est. Philanthropos autem uox humanitatis, amoris & comitatus illi imposita est, quod blanda, comis, & hospitalis herba sit, nec aliter prætereuntiū uestes apprehendat, quā solent amici & hospita-  
liores à se discedentes comprehensa ueste retinere, aut si id nequeant, aliquandiu se-  
qui. Quam appellationem pulchrè Germani exprimentes, Klebtraut nominant:  
est enim illis kleben / quod latinis tenaciter adhærere. Officinæ & herbarij nōnulli  
Aspergulam hodie uocant: rectius tamen una detrita litera nominarent Asperulā,  
quod asperitate sua attingentiū uestimentis pertinaciter hæreat.

## FORMA.

Ramulos habet Aparine multos, exiguos, quadrangulos, & asperos. Folia per  
ambitum orbē mæ Rubiæ modo per interualla, circumposita. Flores albos. Semē  
durum, candidum, rotundum, à medio, umbilici modo, leniter cōcauum. Ipsa her-  
ba uestibus adhærescit.

## LOCVS.

Nascitur in frumentario agro, aut hortis circa sepes & maceries.

## TEMPVS.

Colligitur æstate dum semine prægnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Aparine modicè extergit & desiccatur, habetq; nonnihil tenuium partium: unde  
satis constat hanc aliquam etiam caloris in se portionem habere.

D

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Aparines seminis, caulium & foliorum succus cum uino potus, phalangiorū &  
uiperarū moribus auxiliatur. Infusus doloribus aurium medetur. Herba ipsa cum  
axungia trita coacta, strumas discutit.

## EX PLINIO.

Efficax Aparine contra serpentes, semine potio ex uino drachma: & contra pha-  
langia. Sanguinis abundantiam ex uulneribus reprimunt folia imposita. Succus  
auribus infunditur.

## DE ACANTHO. CAP. XV.

## NOMINA.

Branca ursina.



Marmoraria.  
Dioscoridis lo-  
cus emendatus.

KANTOS, ἄκανθα Græcis, Acanthus siue Acantha Latinis dicitur.  
Officinæ à similitudine, quam eius folia cum anterioribus urforum  
pedibus habent, Brancā ursinam uocant. Ad quam etiam similitudi-  
nem respicientes Germani, Bernflaw oder Berntrag nominant. Il-  
lud non prætereundū esse putauī, hanc herbam olim etiam Roma-  
nis Marmorariam esse dictam: quæ uox in omnibus Dioscoridis exemplaribus de-  
prauata est, ac in Mamolariam detorta: quod eius folia columnarū maximè Corin-  
thiarum capitulis insculpebantur, quarum identidem tam scapi quā uertices mar-  
more splendebant. Antiqui etiam Acantho pateras pingebant.

## GENERA.

Duo Acanthi genera damus. Primum quidem legitimam Acanthum nomina-  
uimus, quod scilicet descriptioni per omnia respondeat. Germanis dicitur Welsch  
bernflaw. Alterum Germanicā, quod nimirum in Germania officinæ omnes pro  
Acantho hanc usurpent herbam, Germanis simpliciter Bernflaw uocatur.

## FORMA.



ACANTHVS  
VERA.

Welsch bernflaw.



E 2





ACANTHVS  
GERMANICA

Teutsch bernflaw.



## FORMA.

**A** Folia habet multò quàm Lactuca latiora & longiora, Erucae modo incisuris diuisa, nigricantia, pingua, leuia. Caulem leuem, binum cubitorum, digitali crassitudine, ex interuallis sub ipsum usq; uerticem foliolis quibusdam oblongis ueluti nucamentis, aculeatis, ex quibus candidus promitur flos. Semen illi est oblongum, luteum, caput thyrsi specie. Radices subsunt glutinosae, mucosae, rubentes, longae. Haecenus Dioscorides. Si autem ueri Acanthi picturam diligenter spectare uolueris, huic descriptioni prorsus quadrare uidebis, ita ut nulla sit nota quae illi non ad amissum respondeat. Neque impedit quod Acantha spinam significet, spinosa enim & haec quidem herba est, sed mollibus duntaxat spinis, ideoq; à Vergilio mollis Acanthus dicitur. Germanicam tamen Acanthum ad Dioscoridis picturam non penitus accedere, est euidentissimū. Potest tamē in prioris inopia, huius etiam comodus esse usus, ut ex ijs quae paulò post dicemus, patebit.

## LOCVS.

Nascitur uera in hortis, petrosis & humentib; locis. Germanica in hortis & pratis undique.

## TEMPVS.

Colligitur in aestate dum floribus & semine abundat, Iunio praecipue & Iulio mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Folia Acanthi mediocriter digerentem facultatem obtinent. At radix exiccatoria est, & leuiter incisoria, & tenuium partium. Hanc uim Acantho etiam Germanico inesse, gustus abunde monstrat. Folia enim eius modicè amara, radix autem subacris est.

## VIREs.

## EX DIOSCORIDE.

**B** Acanthi radices uetis & luxatis illitae profunt. Potae urinam mouent, & aluum sistunt. Tabidis, ruptis, conuulsis, mirè utiles sunt.

## EX PLINIO.

Radices Acanthi uetis luxatisq; mirè profunt. Item ruptis, conuulsis, & phthisin metuentibus incoctae cibo, maxime ptisana. Podagris quoq; illinuntur tritae & calefactae calidis.

## APPENDIX.

Et si nostrae Brancae ursinae facies picturae Acanthi non undiquaq; respondeat, tamē eius radicem eandem habere cum Acanthi ueri radice facultatē est euidentissimum. Cum enim gustu subacris sit, necesse est ut exiccet, incadat, & tenuium sit partium. Errant itaq; nostrae aetatis medici, qui neglecta prorsus radice, folijs tantum utuntur, quae quidem mediocriter discutere ualent.

## DE SPINA ALBA CAP. XVI.

## NOMINA.



ΚΑΝΘΑ λευκή graece, Spina alba latine, Officinę Bedegarim seu Bede. *Bedegar.*  
guar Peno nomine appellant, Germani Weisdistel/oder Storchkraut.

Nomen herba haec ab albis folijs seu lacteis maculis, quibus folia conspersa sunt, accepit. *Spina alba uero de dista.*

## GENERA.

Quamuis Dioscorides Spinæ albae duntaxat unum faciat genus, tamen cū plures inueniantur apud nos herbae quae descriptioni respondent, plura etiam ut illius statuamus genera necesse est. Vnum itaq; genus est, quod hodie uulgo Carduus Mariae dicitur, Germanis uero Mariendistel oder Srawendistel nominatur. Nos spinam albam hortensem, quod nimirum in hortis tantum proueniat, appellauimus.



**C**mus. Alterum genus sylvestre est, proximè ad Dioscoridis deliniationē accedens, ideoq̃ à Germanis Weiswegdistel uocatur. Cæterum uidimus herbam peregrinā siccam, quæ sylvestri, quod ad formam attinet, per omnia respondebat, quæ haud dubiè uera spina alba erat, & descriptioni prorsus cōueniebat. Picturam eius, quod uiridi destituebamur, dare non potuimus.

## FORMA.

Folia albo Chamæleonti similia habet, angustiora tamen & candidiora, subdensa, subasperaue, & aculeata. Caulem binos cubitos excedentē, digiti magni aut minoris crassitudine, subalbum, intus cauum. In cacumine eius caput est aculeatum, Echino marino non absimile, minus tamen & oblongū. Flores purpureos, in quibus semen Cnici forma, sed rotundius. Quæ descriptio in uniuersum quadrare uidetur herbæ quæ uulgò Carduus Mariæ appellatur. Folia siquidem Chamæleonti non dissimilia, angustiora, candidioraq̃ (albis enim maculis undiq̃ cōspersa, unde tam Græcum quàm Latinum, adde etiam Germanicum nomen Weisdistel/ut diximus, illi impositum est) subdensa, subasperaue, & minimè mollia, & mirum in modum aculeata sunt, ita ut contrectata immodicè pungant. Caulis eidem supra bina cubita altus, digiti maioris aut minoris crassitudine, & inanis. In summo uertice Echino marino haud dissimile caput aculeatum obtinet. Flores denique purpureos, in quibus semen Cnico simile, sed rotundius habet, id quod ex utriusq̃ seminis collatione pulchrè deprehendes. His accedit, quod facultates quas albæ Spinæ Dioscorides tribuit, similes sint ijs quæ Carduo Mariæ à nostris hodie herbarijs assignantur, ut ex sequentibus innotescet clarius. Sylvestri sic quadrat descriptio ut nihil magis. Nam, ut cætera omittā, radix desiccatoria est & modicè adstringens, atque adeo genuinas Spinæ albæ facultates obtinet.

D

## LOCVS.

Nascitur in montibus & syluosis locis. Hodie in hortis passim etiam plantatur, ut alia quædam Carduorū genera. Sylvestre in locis incultis & arenosis prouenit.

## TEMPVS.

Colligenda est herba in æstate dum semine pregnans est. Floret autem Iunio & Iulio mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Radix eius desiccatoria est, & modicè adstringens. Semen uero tenuis essentia, & calidæ facultatis.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Radix huius pota, sanguinē excreantibus, stomachicis & coeliacis prodest. Vrinam cit. Oedematis illinitur. Decocto eius dentes in dolore colluuntur. Semen potum conuulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur. Ferunt etiam quod amuletum ex eo uenenatas bestias abigat.

## EX GALENO.

Radix coeliacis & stomachicis succurrit. Sanguinis reiectiones cohibet, & cedemata illita contrahit, ac dentes dolentes iuuat, si decocto eius colluantur. Semen potum ijs qui conuelluntur prodest.

DE ASPA-





SPINA ALBA  
HORTENSIS.

Marion distel.





SPINA ALBA  
SYLVESTRIS.

Weißweddistel.





ASPARAGVS

Spargen.



## NOMINA.

Asparagus inde  
dictus.



ΑΣΠΑΡΑΓΟΣ græcè, Asparagus latinè uocatur. Officinæ extrita priore litera Sparagum nominât, Germani Spargen. Sic autem potissimū altis fatiuusq̃, de quo nobis hic sermo est, nominatur, eò quod coliculos hos, qui prima germinatione prodeunt è terra, præcipuos habeat.

## FORMA.

E radiculis thyrsus primum exilit, cacumine in torulos turbinato, quod tandem increfcens explicatur in prægrandes ramos, quibus insunt folia capillamenti modo, & ut Fœniculi tenuata, quæ per uetustatem occalescunt in spinulas. Florem fundit paruulum, quo decusso baccae dependent primum uirides, quæ tandem maturitate rubescunt, seminibus refertæ. Radices spongiosæ, longæ & rotundæ.

## LOCVS.

In hortis seritur & plantatur, inq̃ nōnullis locis lapidosis sponte prouenit.

## TEMPVS.

Thyrso primū cum uer appetit emicante uiret, spica tum cibus expetita. Recentes hos thyrsulos in uoluptatem gulæ uerterunt helluones. Hodie decoctus in iure Asparagus, aceto, sale, & oleo conspersus, magno gulæ delectamento comeditur, & in principum delicijs est. Semen suo legitur tempore, nimirum æstate.

## TEMPERAMENTVM.

Abstergerendi facultatem habet Asparagus, idq̃ citra manifestam aut caliditatem, aut frigiditatem.

## VIREs.

## EX DIOSCORIDE.

Asparagi coliculi cocti & comesti aluum molliunt, & urinam mouent. Radicum uero decoctum, difficultati urinæ, regio morbo correptis, nephriticis, ischiadicis: cum uino autem idem decoctum phalangiorum moribus auxiliatur. Si decoctum super dente retineatur, eius dolori medetur. Facit ad eadem omnia semen etiam potum. Ferunt mori canes decoctum eius bibentes.

## EX GALENO.

Renes ac iecur infarctū liberat Asparagus, & maximè herbæ ipsius radices & semen. Quin & dentiū dolores sanat siccitatis nomine, quam uel maximè dentes requirunt.

## EX PLINIO.

Vtilissimus stomacho cibus, ut traditur, Asparagi. Cumino quidem addito inflationes stomachi coliq̃ discutiunt. Idem oculis claritatē adferunt. Ventrem leniter molliunt. Pectoris & spinæ doloribus, intestinorumq̃ uitijs prosunt. Vino cum coquuntur addito, lumborū & renum dolores mitigant. Venerem stimulant. Vrinam cient utilissimè, præterquā quod uesicam exulcerant. Radix quoq̃ plurimorum prædicatione trita, & in uino albo pota, calculos exturbat. Quidam ad uulvæ dolorem, radicem cum uino dulci propinant. Eadem in aceto decocta contra elephantiam proficit. Asparago trito cum oleo perunctum pungi ab apibus negant.

## EX SIMEONE SETHI.

Asparagus olerum omniū maximè nutrit. Proinde si quis dicat eius naturā positam esse mediā inter olera & carnes, non procul à uero aberrabit, propter nutriendi facultatem plantarū & carniū, quæ similiter se habet. Vrinam quoq̃ cit, & obstructions iecoris & renum aperit: id quod manifestū ex eo, quod urinæ odorem in suum transmutat, ut hunc qui aliquantulū eius ederint, sentiant. Neq̃ quispiam admiretur illum statim urinæ suam qualitatem indere: nam & rubea tinctorum si manibus contineatur, urinam in suum colorem transmutat: quod paradoxum etiam esse uidetur, ut extrinsecus impositum urinam tingat. Asparagi colicis & renum affectibus, qui à pituita proueniunt, auxiliantur: semen genitale augent, & celerius quàm reliqua olera in sanguinem mutantur. Menses ciunt. Cordis palpitationib. succurrunt: dentibus prosunt: sed nō semper stomacho boni sunt, propterea garo & oleo conditis, cum mediocriter cocti sunt, ijs uti oportet.





ANONIS

Sawhechel.



# DE ANONE CAP. XVIII

## NOMINA.

Resta bouis.  
Remora aratri.  
Acutella.



Anonis cur  
dicta.

Ononis unde.

ANONIS, ἀνώνης Græcis: Anonis & Ononis Latinis appellatur. Vulgus herbariorū Restam bouis, quod in opere arantes boues subinde sistat, nominare solet. Nōnulli Remoram aratri, quod altis & duris radicib. in agris aratrum remoretur, appellant. Sunt qui Acutellam uocent, quod suis scilicet spinis ingredientium pedes pungat & offendar. Germanis Hawhechel nuncupatur, & Dhsenbrech / quia crebris inter folia aculeis, haud secus ac instrumentum hoc quo mulieres linum carmināt, & à crassiore purgant stuppa, horreat: uel quod ligone ad aculeatam hanc herbam eruendam & extirpandam cum in altum agitur, & sese propagat, opus sit. Equites Germani Staltraut / eò quod decoctum eius meiere nequeuntib. equis offeratur, uocant. Binominis autem antiquis est scriptoribus, una tantum litera mutata. Sunt enim qui Ononim, ut Theophrastus & Galenus: sunt etiam qui Anonim, ueluti Dioscorides & Plinius, nominent. Anonis haud dubiè à non iuuando, quod nullo iuuamine polleat, dicta est. Siquidem aratoribus inimica est, uiuaxq̃ nimis fruges opprimit, suisq̃ aculeis nocet. Ononis uero, quod asinos, quos Græci ὄνους uocant, sese terentes ad illam scabentesq̃ iuuet. Complures quoq̃ Grañ herbam sic appellari prodiderunt, quod in ea se uolutantes, spinis eius dorsum libenter affricent & scabant. Officinis prorsus ignota, & inusitata.

## FORMA.

Ramos habet palmares, aut maiores, fruticosos, frequentibus geniculis cinctos, cauis alarū multis, capitula rotunda. Folia exigua, tenuia ceu Lentis, ad Rutæ, aut scenarij Loti figuram accedentia, subhirsuta, odorata, nec iniucundè olentia. Ramuli acutas spinas, spiculis acuminatis similes, solidasq̃ gerunt. Radice candida nittitur. Theophrastus toto caule foliatam esse tradit, ut ueluti coronam ex interuallis tota species repræsentet. Florem quoque illi esse minutulum, & in siliqua non undique septum scribit. Quæ sanè singula pulchrè picturæ respondent, & Anonim esse hanc herbam quam Restam bouis hodie herbarij nominant, euidenter, nulla reclamante nota, ostendunt. Nam hæc ramos spargit fruticosos, palmo longiores, frequentibus cinctos articulis, à quibus alæ funduntur. Capitula exerit orbiculata, folia Lentis parua, ad Rutæ uel pratenis Loti figurā accedentia, hirsuta, iucundum odorem expirantia, inter quæ nocentiores, & mucronatæ cuspidis aculei quasi spicula subrigunt. Flos ferè Pisi dilutiore micat purpura, in siliqua non undique septus. Radix in nigro candicans.

## LOCVS.

Nascitur culto solo, pingui, & glutinoso, præcipuè autem in segetibus & aruis, inimica agricolis, uiuaxq̃ supra modum. Cum enim altam lætāmue nacta tellurem fuerit, protinus in altum agitur, & singulis annis, furculis in latus emissis, rursus anno postero deorsum uersus acta pluribus ramis luxuriat, ideoq̃ runcanda & radicitus extirpanda uenit.

## TEMPVS.

Aestate germinare incipit, à frugibus perficitur, autumno sui incrementi finem faciens. Floret autem Iulio mense, & Augusto.

## TEMPERAMENTVM.

Ononis radix tertio quadantenus ordine exalfacit.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Antequam spinosa sit sale conditur, & est cibus gratissima. Radix eius calefacit, et extenuat, cuius cortex cum uino potus urinā ciet, calculos rumpit, crustasq̃ abstergit. Decocta radix in posca dentium dolorem collutione mitigat. Huius decoctum potum, hæmorrhoidas sanare creditur.

## EX GA



A

## EX GALENO.

Radicis cortex maximè utilis est, habens quippiā absterforiū & incisorium. Proinde non tantum urinas ducit, sed & lapides confringit. Eadem facultate & crustas cōfestim detrahit. Vtuntur quoq; ea ad dentium dolores in posca decoquentes, & collui decocto eius iubentes.

## EX PLINIO.

Radix decoquitur in posca dolori dentium. Eadem cum melle pota, calculos pellit. Comitialibus datur in oxymelite, decocta ad dimidias.

## DE ANISO CAP. XIX.

## NOMINA.



ANIZON græcè, Anisum latinè uocatur. Officinis nomen genuinum retinuit, germanicè Eniſ appellatur.

## GENERA.

Anisum caule, folio, flore, Apio par esse uidetur. Caulem nanque tenuiter striatum, rotundum, multisq; ramulis brachiatum obtinet. Folium ubi primum enascitur, rotundum, sed deinceps Apij modo dissectum. Florem candidum, muscarium fœniculi. Tota herba, haud aliter quàm semen, odorata est.

## LOCVS.

Ex Syria originè habet, iam autem passim satum in Germaniæ hortis prouenit.

## TEMPVS.

Iunio ac Iulio mensibus floret, semineq; prægnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccatur in tertio ordine.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

B Anisum in uniuersum calefacit, exiccat. *ἄνισον* rectius mea sententia interpretabitur pro eo quod est, facile spirare facit. Oris halitum iucundiores facit. Anodynum est, dolorè mue leuat. Urinā cit. Diffundit. Hydropicis potum sitim arcet. Prodest ad uenenata animalia, & inflationes. Alium, & album fœminarū profluuium sistit. Lac ad mammas elicit, & Venerem stimulat. Suffitum naribus capitis dolorem sedat. Tritum, cumq; rosaceo instillatum, aurium medetur rupturis.

## EX GALENO.

Anisi semen maximè utile est, acre & subamarum, ut propè ad urentium accedat caliditatem. Proinde & urinam cit, & digerit, atq; uentris inflationes sedat.

## EX PLINIO.

Anisum aduersus scorpiones ex uino bibitur, à Pythagora inter pauca laudatū, siue crudum, siue decoctum. Item uiride aridū mue, omnibus quæ cōdiuntur, quæque intinguntur desideratū. Panis etiam crustis inferiorib. subditum. Saccis quoq; additur. Cum amaris nucibus uina cōmendat. Quin ipsum oris halitum iucundiores facit, foetoremq; tollit manducatum matutinis cum Smyrneo, & melle exiguo. Mox uino collutum uultum iuniorem præstat. Insomnia leuat suspensum in puluino, ut dormientes olfaciant. Appetentiā ciborum præstat. Dolores capitis leuat suffitum naribus. Epiphoris oculorū radicem eius tusam imponit lollas: ipsum cum croco pari modo & uino, & per se tritum cum polenta, ad magnas fluxiones, extrahendaq; si qua in oculis inciderint. Narium quoq; carcinôdes consumit illitum ex aqua. Sedat anginas cum melle & Hyssopo ex aceto gargarizatū. Auribus infunditur cum rosaceo. Thoracis pituitas purgat tostum, cum melle sumptum melius. Cū acetabulo Anisi nuces amaras quinquaginta purgatas tere in melle ad tussim. Præcipuum autem est ad ructus, ideo inflationib. stomachi & intestinorū torminibus, & coeliacis medetur, Singultus & olfactum decoctū potumq; inhibet. Potum

F somnum





ANISVM

Eniſ.



A somnum concitat. Calculos pellit. Vomitiones cohibet, & præcordiorum tumores. Et pectorum vitij, neruis quoque quibus succinctum est corpus, utilissimum. Prodest eius & capitis doloribus instillari succum cum oleo decocti. Non aliud utilius uentri & intestinis putant, ideo dysentericis & tenasmiis datur tostum. Dalion herbarius dedit bibendum cum anetho parturientibus. Phreneticis quoque illinunt recens cum polenta. Sic & infantibus comitialia uitium aut contractionem sentientibus. Pythagoras quidem non corripi uitio comitiali in manu habentes, ideoque quamplurimum domi ferendum. Parere quoque facilius olfactantes. Sosimenes contra omnes durities ex aceto usus est. Semine eius potio, lassitudinis auxilium uiatoribus spondit. Strangulationes uulvae, si manducetur & linatur calidum, uel si bibatur cum castoreo in aceto & melle, sedat. Vertigines à partu cum semine cucumeris & lini pari mensura trinum digitorum, uini albi tribus cyathis, discutit. Vrinam ciet. Venerem stimulat. Cum uino sudorem leniter præstat. Vestes quoque à uincis defendit.

EX SIMEONE SETHI.

Prodest ad uetustos ex frigore iecoris affectus, & ad spirandi difficultatem quæ ex pituita proficiscitur. Flatus qui in uentriculo sunt, digerit. Obstructiones tollit, & lactis copiam facit.

## DE ACTE CAP. XX.

## NOMINA.



ΚΤΗ Græcis, Latinis Sambucus nominatur. Reliqua nomina dicemus paulò post, ubi huius genera indicabimus. Sambucus porrò uidetur ab authore appellata, cui nomen Sambyx fuit: uel à fabuca musico instrumento, quod alij peccida nominant, alij magadin. Atque hinc est quod Sabucus potius quam Sambucus, si Serenio Quinto credimus, scribendum sit.

Sambucus uide  
dist.

## GENERA.

B Duo eius genera. Vnum arborefcit, quod priuatim officinæ Sambucum, Germani Holder à cōcauitate uocant. Alterum Græcis χαμαιακτι, quasi humilis, & co- χαμαιακτι.  
actæ breuitatis Acte nominatur, Latinis Ebulus, Germanis Attich / uel niderer Ebulus.  
holder.

## FORMA.

Sambucus in arborem assurgit, uirgis harundinum modo rotundis, subcauis, can-  
dicantibus, proceris. Folia tria, aut quatuor, aut quinque, aut sex, aut septem per in-  
terualla circa uirgas obtinet, nucis iuglandis similitudine, graueolentia, pluribus  
incisuris, in summis ramis siue caulibus umbellas rotundas ferentia. Flores albos,  
fructum acinumue Terebinthi in nigro purpureum, racemosum, succosum, & ui-  
nosum. Ebulus humilis minorque est, herbaceo generi propius accedens, quadran-  
gulo caule, densis geniculis. Folia ex interuallis circa singulos geniculos Amygda-  
læ similia alæ instar expanduntur, per ambitum serrata, longiora, graueolentia. Um-  
bellam in summo fert Sambuco similem, flores itidem & fructum. Radice nritur  
longa, digitali crassitudine.

Sambucus

Ebulus.

## LOCVS.

Vtrunque genus in opacis, asperisque potissimum locis, & iuxta aquas emicat. Ebulus uero in agris etiam quibusdam prouenit.

## TEMPVS.

Parum ante Solstitium æstiuum floret Sambucus. Tardius autem Ebulus, Iunio nimirum & Iulio mensibus. In Augusto uero baccas suas profert.

## TEMPERAMENTVM.

Sambucus uterque calefaciendi ac desiccandi facultatem habet, id quod amaritudo, & adstrictio modica abunde monstrant.





SAMBUCUS

Golder.





EBVLVS

Attich.

F. 3



C

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Eadem utrisq; facultas, & par usus, exiccās scilicet, aquā educens, stomacho nocens. Folia olerum modo decocta, pituitam & bilem purgant. Quinetiā teneri caules in olla cocti, eadem præstant. Radix in uino decocta & in cibis data hydropicis auxiliatur. Eodem modo pota uiperarum moribus subuenit. Vuluas emollit & aperit: & quæ circa eas sunt affectiones, decocta cum aqua in fessione corrigit. Fructus cum uino potus eadem efficit. Illitus capillos denigrat. Folia recentia ac tenera cum polenta illita inflammationes mitigant. Ambustis etiam, & canis moribus illita succurrunt. Profunda & quæ in cauernas dehiscunt ulcera agglutinant. Podagricis, cum taurino hircinōue adipe illita, auxiliantur.

EX GALENO.

Utraq; Sambucus, & arborefcens & herbacea, exiccandi, conglutinandi, modice digerendi facultatem obtinent. Paulus Aegineta hæc adiicit: Potæ & manducatæ aquam per aluum educunt.

EX PLINIO.

Utriusq; decoctū in uino ueteri, foliorū, uel seminis uel radice, ad cyathos binos potum stomacho inutile est, aluo detrahēs aquā. Refrigerat etiam inflammationē, maximē recentis ambusti: & canis morsum cum polenta, mollissimis foliorū illitis. Succus cerebri collectiones, priuatimq; membranæ quæ circa cerebrū est, lenit infusus. Acini eius infirmiores quā reliqua: tingunt capillū: poti acetabuli mensura, urinam mouent. Foliorū mollissima ex oleo & sale eduntur ad pituitam bilemq; detrahendam. Ad omnia efficacior quæ minor. Radicis eius in uino decoctæ duo cyathi poti, hydropicos exinaniunt: uuluas emolliunt foliorū decocto insidentium. Caules teneri minoris Sambuci in patinis cocti, aluum soluunt. Resistunt folia serpentū ictibus in uino pota. Podagris cum seuo hircino uehementer profunt cauliculi illiti. Idemq; in aqua macerantur, ut ea sparsa pulices necentur. Foliorū decocto si locus spargatur, muscæ necantur. Boa appellatur morbus papularū, cum rubent corpora, Sambuci ramo uerberatur. Cortex interior tritus, ex uino albo potus, aluum soluit. Ebuli fumo fugantur serpētes. Tenerum cum folijs tritum, ex uino potum, calculos pellit. Impositum testes sanat.

## DE AMMI CAP. XXI.

NOMINA.



AMMI Græcis, Ammi Latinis, Ameos officinis corruptè, Germanis Amey appellari potest.

FORMA.

AMMI caule rotundo & herbaceo cōstat, surculis multis & exiguis: folio oblongo, angusto, per ambitū incisuris diuiso: flore paruo, candido, umbella Anethi: semine exiliori multò quā Cuminū, gustu Origanū præ se ferente, acris & subamaro: radice candida & multifibra. Esse autem hanc herbam uerum Ammi, seminis in gustu sapor, qui subamarus & acris est, omniū maximē ostendit: talem enim in eo saporē Galenus requirit. Origanū etiam gustu referre uidet. Quibus accedit antiqui & manuscripti herbarij testimoniū, cuius pictura & descriptio satis docent, hanc herbam esse Ammi genuinū. Inter cætera enim semen Ammios piper gustu referre, ideoq; à nonnullis piperculā dictā esse ait. Id quod certe uerissimum esse cōperies, si semen gustaueris: miram enim huic acrimoniā inesse senties.

LOCVS.

Nusquam in Germania sua sponte nascitur. Satum tamen facile & magna copia prouenit, sic ut deinceps extirpari uix queat.

TEMPVS.

Augusto mense floret, ac deinceps ubi defloruit, semen abundē producit.

TEMPERA-





67

AMMI

Almey.

F 4



C

## TEMPERAMENTVM.

Ammi semen in calefaciendo desiccandoq; ex ordine tertio intenso existit.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Vis semini excafactoria, feruens & exiccās. Facit ad tormina, urinæ difficultatē, uenenatorū morsus cum uino potum. Menstrua ciet, Miscetur derodentib. ex cantharidibus confectis medicamentis, ut inde exortis urinæ difficultatibus resistat. Sugillata cum melle illitum tollit. Colorem potum & inunctū in pallorem mutat. Suffitum cum uua passa aut resina uulvas purgat.

## EX GALENO.

Herbæ quam uocant Ammi, semē maximē est utile. Facultatis est excafactorie & desiccatorie, tenuiumq; partium. Sed & gustu subamarū est, & acre. Et clarum est quod digerat, & urinam moueat.

## EX PLINIO.

Inflationes & tormina discutit. Vrinam & menstrua ciet. Sugillata & oculorum epiphoras mitigat. Cum lini semine scorpionū ictus in uino potum drachmis duabus: priuatimq; cerastrarum cum pari portione myrrhæ. Colorem quoque bibentium similiter mutat in pallorem. Suffitum cum uua passa, aut resina, uulvas purgat. Tradunt facilius concipere eas, quæ odorentur id per coitum.

## DE ARO CAP. XXII

## NOMINA.



D  
Pes uituli.  
Serpentaria  
minor.

Sacerdotis uirile.

PON, ἄριον, græcè, Arum & Aris latinè dicitur. Officinè corrupto, ut solent, uocabulo Iarum appellāt. Quidam, quod folium effigie bubuli uestigij prodeat, Pedem uituli uocarunt. Alij, quod dracunculū æmulator, solamagnitudine discrepans, Serpentariā minorem appellant: neq; id sanè temerè. Videtur enim Aron esse Dracunculus minor, cui Dioscorides folia *μυροειδῆ*, hoc est, Hedere similia esse dicit, quæ prorsus Ari sunt, nisi quod paulò sint longiora. Plinius etiam Aro eas facultates tribuit, quas Dioscorides Dracunculo minori. Vt hinc conijcere liceat, Arum cum Dracunculo minori miscuisse ueteres. Vulgus, quod pistillum promit exerti ferè genitalis effigie, Sacerdotis uirile nominat. Id quod & Germani nostri faciunt, qui sua lingua *Pfassenpint* nuncupant. Aliàs Aron, & ob uehementem acrimoniam, *teütschen Ingber* uocant.

## FORMA.

Obiectionis dissolutio.

Folia emittit Dracunculo similia, sed longiora & minus maculata: caulē dodrantalem, purpurascētē, pistilli figura, à quo croci colore fructus exit. Radix illi candida, Dracunculo similis, quæ quod minore acrimonia est, cocta comeditur. Hæ utiq; deliniationes ad amussim, nulla reclamante nota, nostro Aro cōueniunt. Siquidem folia promit Dracunculi, longiora, & pauciorib. maculis respersa, caulem dodrantem altum, in purpuram leniter tendentem. Ante seminis partum, sagaci nature artificio dignum, erumpit inuolucrum & cucullum, quod mucronata in turbinem uaginula pistillum complectitur, & suo fouet sinu. Verum ubi fructu prægnans fatiscit in hiatum, solida pistilli facies dilutiore purpura rutilans emergit, & anfractu penitus tandem patente, primum uiridia, dein crocea spectantur semina, quæ in coronæ modum concinnè contexta, imam eius partem ambiunt. Radicem etiam obtinet albam, ad Dracunculi radicem accedentem, ut pictura graphice monstrat. Neque obstat quod Galenus radicem Ari elixam mandi scribat, nostri autem tam acris sit ut uix gustari ob miras & diutinas, quas in lingua ac palato excitat puncturas, possit, tantum abest ut edendo esse queat. Siquidem Galeno libro secundo de alimentorum facultatib. teste, non parem in omnibus regionibus acrimoniam obtinet, sed in nonnullis minimam, ut Cyrenis. Et Plinio quoque lib. xix.







c lib. xix. cap. v. teste, in Aegypto Aron nascitur radice mollioris naturæ, quæ etiam cruda editur. In quibusdam, ut Germania nostra, maximam. Verba Galeni paulò post in facultatum cōmemoratione citabimus. Hinc discendū erit, multa nobis in scriptoribus rei herbariæ, primo statim obtutu pugnantiâ uideri, quæ, si ad cœli regionumq; diuersitatē respexerimus, nihil prorsus pugnantiæ aut absurditatis habebunt. Quod nisi diligenter animaduertas, multas genuinas herbas pro adulterinis abijcias necesse erit. His accedit quod Galenus nō simpliciter dicat mandi Ari radicem, sed elixam. Non est autem mirum si acria etiam edendo fiant, si elixentur. Bis enim aut ter in aqua decocta, Galeno lib. ij. de aliment. facul. cap. ultimo teste, acrimonia spoliantur. Porro si ista sciolis quibusdam haud satisfecerint, dicendū planè erit Arum Germaniæ nostræ esse Arisaron, quod gustu, Dioscoride & Galeno autoribus, acrius est. Quamuis ego cum Ruellio, diligentissimo earum rerum inquisitore, Arisaron ab Aro differre haud putem, quod scilicet forma utriusq; eadem sit. Cuius etiam rei fidem facit ipsa nomenclatura, quæ utriusq; retinuit appellationem: duobus tandem uocabulis in unum coalescētibus, dici cœpit Arisaron. Apud ueterrimos enim Aris primum; dein posterioribus, copulatis unâ nominibus, Arisaron confictum est nomen.

## LOCVS.

Nascitur in syluis, locis umbrosis, humidis & frigidis.

## TEMPVS.

Folia statim in Martio, inter primas herbas ueris exiliunt, in Iunio dispereunt, ita ut haud facilè hoc nomine herba ipsa reperiri queat. Semen Iulio & Augusto mensibus reperitur, primum, ut diximus, uiride, mox croceum.

## TEMPERAMENTVM.

D Arum Galenus in calefaciendo & desiccando primi ordinis esse statuit. Et locus est de Aro qui non uehementi acrimonia pollet. Nostrum haud dubiè in tertio ordine calidum & siccum est, ob multam, qua præditum est, acrimoniam.

## VIREs.

## EX DIOSCORIDE.

Radix, semē, & folia Ari eadē Dracunculo uires habent. Radix priuatim cum fimo bubulo illita podagricis prodest. Dracunculi more reponitur. In totū, ob mitiorem eius acrimoniam edendo est.

## EX GALENO.

Arum terrena essentia cōstat, sed calida: proinde extergendi facultatē possidet, uerum non ualentē, sicut Dracontium. Radices eius maxime sunt utiles. Siquidē crassiem humorū mediocriter incidunt, adeò ut excreationib. ex pectore idoneæ sint: sed magis tamen aptum est Dracontium. Et in libro secundo de alimentorū facultatibus sic de Aro scribit: Ari radix rapi modo manditur. Quibusdam autem in regionibus acrior nascitur, ut Dracontio ferè similis sit. Dum rectè parare uoles, prioris decoctionis aqua effusa, repente in alteram calidam iniicere oportet, ut in Bralsica & Lente dictū est. Cyrenis cōtrā quàm in nostra regione planta se habet: nam illic minimū medicamentosi, minimūq; acrimoniæ habet, adeò ut uel rapis utilior reputetur: idcirco radicē quoq; in Italiam cōportant, ut quæ absq; ut putrescat aut regerminet, longo tempore perdurare possit. Perspicuū uero est alendis corporibus hanc accommodatiorē esse. Si quis autem in thorace ac pulmone collectos crassos lentosq; humores extussire studeat, acrior ac medicametosior magis cōueniet. In aqua elixa estur cum sinapi aut aceto, ex oleo & garo. Quinetiā cum obsonijs, & sale, & ijs quæ caseo cōstant, sumitur. Haud uero obscurū est, succum eius qui in iecur ac uniuersum corpus diffunditur, quo uno animal nutritur, crassiores esse, idq; maxime quum radix, quemadmodū sunt quæ Cyrenis aduehuntur, medica uicauerit. Apud nos namq; in Asia, plerq; Ari radices acriores sunt, & medicamento-  
sam iam uim obtinent.

## EX PLINIO.



A

EX PLINIO.

Aron miris laudibus extulere Græci, primum in cibis † fœminarum præferen- † diis fœminâ.  
tes, quoniam mas dulcior esset, & in coquendo lentior, pectorisq; uitia expurgaret:  
aridum in potionem inspersum, aut ecligmate, urinam & menses cieret. Sic & in oxy-  
melite potum, stomacho: interaneis exulceratis ex lacte ouillo bibendum, ad tussim  
in cinere coctum ex oleo dedere. Alij coxere in lacte, ut decoctum biberetur.  
Epiphoris elixum imposuere: item sugillatis, tonsillis. Ex oleo hæmorrhoidum  
uitio infudere, lentigines ex melle illinentes. Laudauit Cleophrantus & pro anti-  
doto contra uenena, pleuriticis, peripneumonicis quoque & tussientibus. Semen  
intritum cum oleo aut rosaceo infundens, aurium dolori Dieuches. Cleophrantus  
tussientibus aut suspiriosis & orthopnoicis, & purulenta excreantibus, farina per-  
mixtum in pane cocto dedit. Diodotus phthisicis è melle ecligmate, & pulmonis ui-  
tijs, ossibus etiam fractis imposuit. Partus omnium animalium extrahit naturæ cir-  
cumlitum. Succus radices cum melle Attico, oculorum caligines, ac stomachi uitia  
discutit. Tussim decocti ius cum melle. Vlcera omnium generum siue phagedæne  
sint, siue carcinomata, siue serpant, siue polypi in naribus, succus miræ sanat. Folia  
ambustis prosunt ex uino & oleo cocta. Alium inaniunt ex sale & aceto sumpta.  
Etiam luxatis cocta cum melle prosunt. Item articulis podagricis cum sale, recentia  
uel sicca. Hippocrates ad collectiones cum melle imposuit. Ad menses trahēdos se-  
minis uel radices drachmæ duæ in uini cyathis duobus sufficiunt. Eadem potio si  
à partu nō purgantur, & secundas trahit. Hippocrates & radicem ipsam apposuit.  
Dicunt & in pestilentia salutarem esse in cibis. Ebrietatem discutit. Serpentes nido-  
re cum crematur, priuatimq; aspides fugat, aut inebriat, ita ut torpentes inuenian-  
tur. Perunctos quoq; Aro ut lauro oleo fugiunt, ideo & contra ictus dari potu in  
uino nigro putant utile. In folijs Ari caseus optimè seruari traditur.

## APPENDIX.

Posteriores medici Aron discutiendi, extenuandi, extergendiq; facultatem habe-  
re tradunt: ideoq; tumoribus aurium, ficibus, strumis, scirrhisq; mederi, faciei de-  
formitatem cutisq; auferre, eius denique radicem in puluerem redactam supercre-  
scentem in uulneribus carnem minuere scribunt. Id autem posse prestare, acrimo-  
nia ipsa uehemens quæ gustu sese exerit, abundè monstrat. Dioscorides etiam Ari-  
saron acrimonia haud exigua præditum scribit, ideoq; illitum nomas sistere, colly-  
riaq; efficacissima ex eo cōtra fistulas fieri. Deniq; radicem cuiuscunq; animalis pu-  
dendo impositam, id corrumpere tradit. Plinius quoq; Arisaron ulceribus mederi  
manantibus, item cōbustis & fistulis, scriptum reliquit. Præterea cōmixtum colly-  
rio nomas sistere ait.

Recentiores quas  
facultates Aro  
tribuant.

## DE ARCIO. CAP. XXIII.

## NOMINA.



ΠΕΡΙΟΝ, ἡ περὶ τὴν ὄψιν Græcis, Personatia Latinis dicitur. Offici-  
næ Lappam maiorem, uulgo Bardanam uocat, Germani Groß Elet. Lappa maior.  
ten. Personatia hac quondam ad personas utebatur, quoties in theatris Personatiana  
alijs uel locis qui cognosci à populo nollent, egisse quidpiā uolebant. Est de dicto.  
enim foliorū eius tanta amplitudo, ut tota humana facies nō tegi possit: atque hinc  
haud dubiè tam Græci quàm Latini, nomen illi Prosopij & Personatiæ indiderūt.

## FORMA.

Personatia folia Cucurbitæ similia habet, maiora tamen, duriora, nigriora & hir-  
suta. Caulem subcandidum, interdum nullum. Radicem grandem, candidā intus,  
foris nigram, Ex qua descriptione nemo nō intelligit, Personatiā esse eam herbam  
quam





PERSONATIA

Gros Flecken.



A quam hodie uulgus Bardanam uocat, quæ folio constat omnium lapparum maxi- Bardana.  
mo, parte auersa herbido, aduersa cano, caule in purpureo albicante, grandibus lap-  
pis, quæ transeuntium uestibus adhærent, in quibus flos purpureus nascitur, non  
euidens, sed occultus, intra se germinans, radice grandi, intus candida, foris atra.

## LOCVS.

Nascitur ubiq; potissimū circa margines pratorum, & agrorum.

## TEMPVS.

Mense Iulio lappas cum floribus suis producit Personatia.

## TEMPERAMENTVM.

Digerit simul & desiccat, sed & adstringit nonnihil.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Radix Personatiæ drachmæ pondere cum pineis nucibus pota, sanguinē & pu-  
rulenta excreantibus auxiliatur. Articulorū quoq; dolores, qui ex membrorū fra-  
ctionibus collisionibúsue fiunt, trita & illita sedat. Quinetiam folia uetustis ulceri-  
bus utiliter illinuntur.

## EX GALENO.

Arcium, quod Prosopida uocāt, cuiusq; folia Cucurbite simillima sunt, nisi qua-  
tenus tum maiora, tum duriora, discutit simul & desiccat, sed & adstringit medio-  
criter: quamobrem folia eius ueteribus ulceribus mederi possunt.

## EX APVLEIO.

Personatiæ herbæ succus cum uino ueteri in potionem datus, omnes morsus ser-  
pentium mirificè sanat. Eiusdem folijs cinges febricitantē, & statim febrem mitigat,  
caloremq; sanat. Vulnus, etiam si cancer erit, cum aqua decoctionis foliorū eius so-  
ueto; deinde ipsam cum nitro & axungia, cum aceto tere, & in panno inducito &  
imponito. Ad canum rabidorū morsus radix cum modico sale trita imponit mor-  
B sui, & statim eger liberabitur. Succus foliorum eius cum melle potui datus, urinam  
prouocat, & uesicæ dolorem tollit. Puluis seminis eius cum uino optimo per qua-  
draginta dies datus, ischiadicis mirabiliter sanat. Folia trita cum albumine oui &  
imposita, ambusta mirificè curant.

## EX L. COLUMELLA.

Venena uiperæ pellit super scarificationē ferro factam herba Personatia trita &  
cum sale imposita. Plus etiam eiusdem radix contusa prodest contra serpentes. Ex  
uino bibitur duū denariorum pondere. Strumis radix eius medetur: item cum  
axungia operitur folio suo imposita.

## DE ASCYRO CAP. XXIII.

## NOMINA.



ΣΚΥΡΟΝ, ἢ ἀσχυρόν, græcè, Ascyron latinè nominatur. Officinis igno-  
rum. Germanicè Harthōw/id est, durum scenum appellatur. Græci à Ascyron car-  
dictum.  
cōtrario, huic herbæ nomen imposuisse uidentur, σκῆψις enim illis aspe-  
ritatem significat. Pulchrè igitur ad Græcam appellationem Germani-  
ca alludere uidetur.

## FORMA.

Hyperici species est Ascyron, magnitudine differens, maioribus ramis, frutico-  
sius, puniceo colore rubens. Flores fert luteos, semē Hyperico simile, odore resinæ,  
quod cum atteritur digitos ferè cruentat.

## LOCVS.

In cultis & asperis locis prouenit.

G TEMPVS.





ASCYRUM

Gärthow.



## TEMPVS.

A Aestate, potissimum uero Iulio & Augusto mensibus, floret.

## TEMPERAMENTVM.

Essentia tenue est, ideoq; calefacit & desiccant.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Semen Ascyri potum in hydromelitis heminis duabus, ad ischiadicos prodest dolores: biliosa enim multa excrementa ducit. Sed assidue dari oportet donec conualescant, Præterea illitum ad ambusta conducit.

## EX GALENO.

Semen eius purgatoriū. Foliorum uero facultas modicè extergens & desiccans, ut & ambusta sanare credantur. Cæterum in uino austero decocta, uinum ipsum magnorum uulnerym glutinatorium efficiunt.

## EX PLINIO.

Vsus seminis ad ischiadicos, potus duabus drachmis in hydromelitis sextario. Aluum soluit, bilem detrahit. Illinitur & ambustis.

## DE ANDROSAEMO CAP. XXV.

## NOMINA.



ΝΑΡΟΣΑΙΜΟΝ Græcis, Androsæmon pariter Latinis dicitur. Officinis incognitum. Germanis Kunrath / quasi græcè dicas Thrasibula, nominatur. Dictum Androsæmon, quod aut coma, aut floribus eius tritis, hominis sanguinem referat.

Androsæmon  
unde dictū.

## FORMA.

B Differt ab Hyperico & Ascyro Androsæmon. Frutex est prætenuib. ramis, surculosus, puniceo colore rubentibus uirgis, folijs triplo quadruplæ maioribus quàm Rutæ, quæ contrita sanguineum succum remittunt. Alarum caua habet plura, in summo alarum auium modo pennata expansæ, circa quas flosculi pusilli lutei. Semen in calyce, nigro papaueri simile, ueluti punctis depictum distinctumue. Coma trita resinofum odorem reddit.

## LOCVS.

Locis iisdem quibus Ascyron prouenit.

## TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

## TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccant.

## VIRES EX DIOSCORIDE.

Androsæmi semen tritum, potumq; duarum drachmarum pondere, biliosa alui excrementa ducit. Ischiadicis autem potissimum medetur, sed à purgatione aquam sorbere oportet. Herba illita ambusta sanat, & sanguinem compescit.

## EX GALENO.

Easdem cum Ascyro facultates obtinet.

## EX PLINIO.

Vsus ad purgandam aluum tuscæ cum semine, potèq; matutino, uel à ccena duabus drachmis in aqua mulsa, uel uino, uel aqua pura, totius potionis sextario. Trahit bilem, prodest ischiadicis maximè. Sed postera die, capparis radicem resine permixtam deuorare oportet drachmæ pondere, iterumq; quatridui interuallo idem facere. A purgatione autem ipsa robustiores uinum bibere, infirmiores aqua. Imponitur & podagris, & ambustis, & uulneribus, cohibens sanguinem.



ANDROSAEMON

Kunrath.





## NOMINA.



ΠΚΕΥΘΟΣ, ἡ ἀρκευθὶς græcè, Juniperus latinè uocatur. Officinæ latinam appellationem retinuerunt, Germanicè Weckholder / Rramatber / id est, turdorum bacca uocantur, quod fructibus eius turdi pinguescant. Juniperus autem dici uidetur, quod iuniores & nouellos fructus pariat: *Juniperus de dicta.* sola enim ferè arborum fœtus suos in biennium prorogat, qui ne maturescunt quidem, nouis superuenientibus.

## GENERA.

Juniperus Dioscoridi duplex est, maior & minor, sola arboris & seminis magnitudine inter se differentes. Minor humilis est, sessilibus in terra ramulis, baccis minoribus, radicibus summo cespite fusis. Maior altius adolescit, & in iustam arboris magnitudinē exurgit, caudice procero, cortice fragili, ligno fuluo, odorato, latioribus ramulis, aculeorum aceruo stipatis, baccis alteri similibus, maioribus tamen.

## FORMA.

Vtriusque facies horrida, coma uirent perpetua, spinae potius quàm folio, sed herbacea uestiuntur. Cortex illis membraneus, fragilis, nec difficulter fatiscens, materies fulua, quæ si ignibus dicatur, non iniucundū fumum expirat, qui odoris suauitate grassantia pestilentia cōtagia depellit. Ex ea etiam, ut recentiores Græci tradunt, æstiuis temporibus lachryma thuris odorem atque colorem æmulans sudat, quæ caloris officio durata, coëat in gummi. Arabum familia, non sine magna cōfusione nominum, Sandaracham appellat. Officinæ uero Vernicem uocant. Baccas ferunt primum uirentes, deinde per maturitatem nigras, quæ biennio antequam maturescant in ramis pendent. Hinc sunt qui baccas in ijs esse ternas eodem tempore dicant, anni proximè exacti nondum maturas, & tertij ante præsentem iam maturas, tertias nouas & recentes. Cæterum nō desunt qui nostram Juniperū non genuinam putēt, quod bacca eius ad Dioscoridis magnitudinē, quæ nucis est ponticæ aut fabæ, non accedant. Sed cogitent locum in causa esse cur minores producantur: ut plurimum enim omnia quæ in Germania proueniunt, ijs quæ in Græcia nascuntur minora sunt. Nobis etiam Juniperi grana aliunde allata uisa sunt, quæ nucis auellanae quantitatem æquabant: ob id ut magnitudinem ac formam eorundem etiam exprimeret pictor, curauimus.

## LOCVS.

Amant Juniperi montes, & maritima loca, in planisq; & cultis nasci recusant.

## TEMPVS.

Autumno fructus Juniperorū decerpuntur, sed ad bimatum prorogati.

## TEMPERAMENTVM.

Juniperus calida & sicca, utrinque tertij ordinis. At fructus similiter quidem calidus est, sed non similiter siccus: uerum in hoc primi fuerit ordinis. Vernix calefacit & exiccat secundo recessu.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Acris utraque est, calefacit, & urinam mouet. Incensæ suffitu serpentes fugant. Earum fructus, hic quidem fabæ, alius uero nucis ponticæ magnitudine inuenitur, rotundus, odoratus, in mandendo dulcis, & subamarus. Modicè calefacit & adstringit, stomacho utilis. Potus ad uitia thoracis, tusses, inflationes, tormina, & uenenata, prodest. Vrinam cit. Conuulsis, ruptis, & uulug strangulationibus confert. Folia acria obtinet Juniperus, ideoq; tam ipsa quàm eorum succum ex uino contra uiperarum morsus illini & bibi prodest. Cortex præterea crematus & cum aqua illitus, lepras eximit. Ramentum uero ligni deuoratum, interficit.





Baccæ Juniperi maioris.

JUNIPERVS  
MINOR.

Weckholder.



A

## EX GALENO.

Iuniperi fructus iecur renesq; expurgat, nimirum crassos & glutinosos humores extenuando, eaq; de causa salubribus medicamentis immiscetur. Perexiguum corpori humano alimentum ex eo apponitur. Assatim sumptus hic fructus stomachū mordicat, caputq; calefacit: ex quo illud quandoq; implens, dolore diuexat. Alui excrementa nec retinet, nec propellit. Vrinam ciet mediocriter.

## EX PLINIO.

Viraq; excafacit & extenuat. Accensa serpentes fugat. Semen stomachi, pectoris, laterisq; doloribus utile. Inflationes languoresq; discutit, tussis concoquit & duritias. Illitū tumores sistit: item aluum, baccis ex uino nigro potis: item uentris tumores illitis. Miscetur & antidotis oxyporis. Vrinam ciet. Illinitur & oculis in epiphoris. Datur conuulsis, ruptis, torminibus, uuluis, ischiadicis cum uino albo potum pilulis quaternis, aut decoctis uiginti in uino. Sunt & qui perungant corpus e semine eius in serpentum metu.

## VERNICIS VIRES EX RECENTIORIBVS GRAECIS.

Profluentem enaribus sanguinem sistit, si ex candido ouiliquore trita temporibus & fronti illinatur. Eadem uomitionē ex polline thuris & oui albo excepta supprimit. Item profluentem aluum cum eisdem illita firmat. Stomachum in biliosos uomitus effusum, deuorata in ouo sorbili polenta eius cohibet, cruentamq; alui proluuiem retinet. Destillationes suspendit sufficit nidor, arcetq; ne praecipites ad ima decumbant. Pituitam quā in stomacho aut intestinis coit, digerit. Humore etiam coëcet, qui pernix à cerebro deuoluitur. Tineas & cetera uentris animalia necat. Vliginosos fistularum sinus indita resiccat. Menstruos continet fluxus. Grauedini suffitus eius auxiliatur. Hiantibus manuum & pedum rimis illitu succurrit. Et in summa Succini pollet uiribus, sed paulo efficacioribus; quā si desit, duplo pondere in uicem substituitur.

## DE ALCEA CAP. XXVII

## NOMINA.



ALCEA Graecis, Alcea Latinis uocatur. Officinis ignota. Vulgares herbarij & Empirici Simeonis herbam, Germani nostri Sigmarstraut/oder Sigmundswurz & Hochleuchten appellant.

Simeonis  
herba.

## FORMA.

Syluestris maluae species est Alcea, folia Verbenacae modo secta habens, caules ternos aut quaternos, corticem Cannabi similem obtinentes, Florem exiguum Rosae similem. Radices albas, latas quinque aut sex, cubitales.

## LOCVS.

Nascitur in pingui loco, nec sicco.

## TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Ex emplasticorum medicamentorum numero esse Alceam, & folia, quae glutinosum quid ac lentorem quandam prae se ferunt, & radix ipsa quae glutinosa, dulcis, & modice adstringens apparet gustantibus, abunde monstrant. Hinc satis constat Alceam extra omnem insignem tum caliditatem, tum frigiditatem siccare, ac plane emplasticorum consistentiam obtinere. Vide Galenum lib. iij. de simpl. medi. facult. cap. iij. & sequenti.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Alcae radices in uino aut aqua potae, dysentericis & ruptis medentur.

G 4

EX PAVLO.





ALCEA

Sigmarostraut.



## EX PAVLO.

**A** Alcea syluestris maluae genus est. In uino pota dysenteriae & rupturis medetur, potissimum ipsius radix.

## EX PLINIO.

Vsus radice Alceae ex uino uel ex aqua, dysentericis, aluo citae, ruptis & coeulsis.

## APPENDIX.

Celebratur ad caliginem oculorum ab Empiricis, ita ut non desint qui credant radicem Alcae e collo suspensam, aciem oculorum supra modum acuere, & tueri posse.

## DE ADIANTO CAP. XXVIII.

## NOMINA.



ADANTON, ἡ πολύτριχον, ἡ καλίτριχον, ἡ ἐβρότριχον græcè: Adiantum, Polytrichum, Callitrichum, Cincinnalis, Terræ capillus, & Supercilium terræ latinè appellatur. Officinæ hodie Capillum Veneris uocant, quo etiam nomine appellari Latinis Apuleius testatur. Germani Strawenhar /

Capillus Veneris.

uel Jundstrawenhar. Adiantum nomen ab euentu accepit, quod folium eius persusum aqua ἢ ἄλινται, id est, non madeat, sicco semper simile, ut autor est Theophrastus libro septimo de Plantarum historia, cap. xiiij. Id quod minimè intelligendum erit de mersione longiore in aqua: nam diutius mersum ac irrigatum, ac quæ ac aliæ herbæ madescit. Quare rectius de imbre descendente e cælo, cuius stillicidium folijs eius non insidet, ut testis est in Theriacis Nicander, accipiendū uenit. Vel, quod magis arridet, ab interioribus puteorum parietibus, & fontium marginibus quas coronat, dictum est Adiantum, quod nimirum quasi sitiens illorum aquas, quas tamen odit & respuit, quærat. Polytrichon autem quasi multicomum, quod capillos multos ac densos faciat, eiusque defluuia expleat. Callitrichon uero quasi pulchricomum, quod capillos tingat, pulchrioresque reddat. Nec alia ratione capillus Veneris hæc herba dicta est, quam a speciosis reddendis capillis: nec alio nomine Veneris uox adiecta est, quam quod hæc pulchricoma pingat. Hinc patet maximus pharmacopolarum nostri temporis error, qui sub tribus nominibus, unam & eandem duntaxat herbam significantibus, tres diuersas herbas designatas esse putant. Aliam enim Polytrichum, aliam Callitrichum, quam tamen corrupto uocabulo Gallitrichum uocant: aliam etiam Capillum Veneris esse herbam existimant. Quales autem herbæ sint, Polytrichum, & Gallitrichum illis nominatae, suis locis ostendemus.

Adiantum unde dictum.

Polytrichon.

Callitrichon.

Capillus Veneris cur dictus.

Pharmacopolarum error.

## FORMA.

Folia albicantia Coriandro similia habet, in summo incisuris diuisa. Caules ex quibus nascuntur prodeuntque, nigros, admodum tenues, dodrantes, nitentesque. Neque florem, neque semen creat. Folij uero Coriandri iam quidem erumpentis, uel paulo antea enati, necdum caulescentis, quæ quidem in infima eius parte quodammodo lata sunt, & in extremitatibus incisa, constare Adiantum sciendum erit. Ex qua nimirum descriptione manifestissimum est, eam herbam qua ferè omnes Officinæ pro Capillo Veneris utuntur, & quam nos à muris in quibus prouenit, Germanicè Mauerauten / & Steinrauten uocamus, non esse uerum Capillum Veneris, aut Adiantum: caules siquidem eius non sunt nigri, sed uirides: neque admodum tenues, sed pro herbæ quantitate crassi: neque splendentes. In summa, neque figura, neque magnitudo, neque color, nec natales etiam respondent, quia in siccis & soli expositis muris nascitur, in humidis contra Adiantum.

Ruta muraria non est Adiantum.

## LOCVS.

Locis opacis, palustribusque, & humentibus muris, & prope fontes nascitur. In Germania





ADIANTUM

Frawenhar.



A Germania tamen nostra, quod sciam, non prouenit: copiose autem in Narbonensi Gallia, & Italia.

## TEMPVS.

Aestate uiret, bruma non marcescit.

## TEMPERAMENTVM.

Adiantum in caliditate quidem & frigiditate symmetrum est, uerum desiccat.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Decoctum eius herbe potum, asthmaticis, difficultate spirandi laborantibus, ictericis, lienosis, & urinae difficultatibus auxiliatur. Calculos conterit, & aluum cohibet. Venenatorum moribus, & stomachi fluxionibus cum uino potum prodest. Menses cit & secundas. Sanguinis reiectionem sistit. Cruda herba ad uenenatorum morsus illinit. Alopecias capillis explet. Strumas dissicit. Furfures & achores cum lixiuio exterit. Cum ladano, myrrhino & fusino, aut hysso & uino, capillos defluentes continet. Decoctum eius cum lixiuio & uino abstergit. Gallinaceos & coturnices cibis eorum additum pugnaciores facit. Seritur & magna utilitate circa ouilia.

## EX GALENO.

Extenuat Adiantum & discutit. Alopecias capillis uestit, strumas & abscessus digerit, lapidesque frangit epotum. Viscosorum crassorumque ex thorace pulmoneque excreationibus non mediocriter confert, & uentris fluxiones sistit.

## EX PLINIO.

Vide infra caput de Trichomane.

## DE VITE VINIFERA CAP. XXIX.

## NOMINA.



ΜΠΕΛΟΣ οἰνοφόρος καὶ ἡμερῶς græcè, Vitis uinifera & satiuua seu culta latine appellatur. Germanicè Weinreb. Vitis autem, quod inuitetur ad u- vitis unde dicta.  
uas paricendas, dicta esse primo uidetur.

## GENERA.

Innumera uitium reperiuntur genera, quæ singula persequi superuacaneum esse uidetur. Si quis tamen illa disquirere desiderat, rei rusticæ scriptores, Pliniumque libro xiii. naturalis historiae, qui diligentissime de his scripsit, legat.

## FORMA.

Vitis caduca est, & nisi sit fulta, ferrur ad terram. A radice eius caudex unus contortus exit, qui in ramos frequentes scinditur. Multiplici cortice cingitur, rimoso, flagellis longè lateque uagantibus, quibus se quasi suis manibus erigit, & quicquid nata est complectitur. Sarmentis, folijs latis, & in extremitatibus incisis, lasciuientibus. Floribus fructum ambientibus lanugineis. Vua compluribus acinis aceruata, qui interdum purpureo, nonnunquam roseo, aliquando uiridi colore fulgent. Seminibus tunica clausis.

## LOCVS.

Passim & in multis Germaniæ nostræ regionibus nascitur: & uix hortum inuenies in quo non proueniat.

## TEMPVS.

Floret solstitio uitis, autumnno autem uuas maturas profert.

## TEMPERAMENTVM.

Omniū partium uitis temperamentum ex facultatum enarratione patefcet. Vug tamen immaturæ & acerbæ frigida & sicca sunt; maturæ uero calidæ & humidæ in primo gradu, autore quidem Simeone Sethi,

## VIRES





VITIS VINIFERA

Weinreb.



## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

- A** Vitis uiniferæ folia capreoliq̃ trita & illita capitis dolores, stomachiq̃ inflamma- Folia & Capreoli.  
 tiones & ardorem cum polenta mitigant. Folia etiam per se imposita, utpote quæ  
 refrigerant & adstringunt. Succus ex ipsis potus dysentericis, sanguinem expuen-  
 tibus, stomachicis, & citta laborantibus mulieribus prodest. Madefacti in aqua ca-  
 preoli & poti, eadem efficiunt. Lachryma uero eius quæ ueluti gummi in caudici- Lachryma.  
 bus cõcrescit, pota cum uino calculos pellit. Illita lichenas, scabies & lepras sanat.  
 Oportet tamen locum antea nitro cõfricasse. Eadem cum oleo frequenter inuncta,  
 pilos denudat: potissimum ichor, aquosusue humor, qui ex incensis uiridibus sar-  
 mentis exudat. Hic etiam myrmecias inunctus eijcit. Cinis sarmentorũ & uinaceo-  
 rum circa sedem quæ antea ablata amputatæue sunt condylomata & thymia, cum  
 aceto illitus sanat. Confert luxatis & uiperarũ moribus. Lienis inflammationibus  
 cum rosaceo & ruta, & aceto illitus. Vua recens quæuis aluum turbat, & stomachũ Vua.  
 inflat. Minus horum particeps quæ aliquandiu decerpta pependit, quod in ea co-  
 pia humoris exaruerit. Stomacho accõmodata est, appetentiãq̃ cibi excitat, & im-  
 becillis cõuenit. Quæ autem in uinaceis, aut uinario uase seruata sunt, ori & stoma- Vide Galenũ li-  
bro ij. de alimen-  
torũ facul. tripli-  
cem hunc seruã-  
darum uuarum  
modum expli-  
cantem.  
 cho gratæ sunt. Aluum sistunt, uesicam tamen & caput tentant. Profunt sanguinẽ  
 excreantibus. Similes ijs sunt quæ in mustum cõiectæ sunt. Quæ uero sapa aut mu-  
 sto cõditæ, stomachum magis infestant. Reponunt & coelesti cum aqua prius pas-  
 sæ factæ, minusq̃ uinosæ fiunt, siticulosi, ardentibus & longis febribus utiles. Vi-  
 nacei earum reconditi, inflammatis, duris, turgentibusq̃ mammis cum sale illinun-  
 tur. Vinaceorũ decoctum dysentericis, coeliacis, & fluxui muliebri infusum cõfert.  
 Ad infessiones quoq̃ ac dysenteres assumitur. Nuclei acinorum adstringunt, stoma-  
 cho grati. Tosti autẽ & triti & pro farina illiti, dysentericis, coeliacis & stomacho re-  
 solutis profunt. Vua autem passa alba magis t̃ extenuat. Caro illarum comesta, ar- Serapion legit,  
adstringit.  
**B** teriæ, tussi, renibus ac uesicæ con fert. Estur in dysenteria per se cum nucleis. Admi-  
 xta milij & hordei farinæ & ouo, accum melle frixa, & per se etiam sumpta, atque  
 cum pipere cõmanducata, ad capitis pituitam purgandam ualet. Testium inflam-  
 mationes sedat, cum fabarum & cumini farina illita. Epinyctidas, carbunculos, fa-  
 uos, & in articulis putredines & gangrænas, sine nucleis trita, & cum ruta imposi-  
 ta, sanat. Podagræ cum opopanace illita auxiliatur. Mobiles ungues illita celeriter  
 adimit. Vini facultates tu ipse ex Dioscoride, Galeno, & Plinio pete: superuaca-  
 neum enim, imò tẽdio plenum esset eas in uniuersum omnes cõmemorare.

## EX GALENO.

Vitis satiuæ & cultæ adsimilis facultas est syluestri, sed ad omnia imbecillior. Vi-  
 tis uero syluestris racemi, extergendi uim obtinẽt, ut ephelos & nauios, & id genus  
 quæcunq̃ in cutis superficie fiunt, curare possint. Habent uero & adstrictionem  
 quandam ipsi, & extrema germina, quæ & sale condiri assolent. Plura de uuis ha-  
 betidem Galenus lib. ij. de aliment. facul. cap. de uuis.

## EX SIMEONE SETHI.

Vuæ plus nutriunt reliquis oporis, minus tamẽ ficis: neq̃ mali succi sunt, si ma-  
 turæ fuerint exquisitẽ. Tamen his nõ robusta, nec densa, sed laxa & flaccida caro gi-  
 gnitur. Maximum quidem harum bonum, ait Galenus, quod celeriter subeunt,  
 atque ideo si retineantur, lædunt: nec enim tunc probẽ cõcoquuntur, sed crudum  
 gignunt humorem, qui non faciliẽ in sanguinẽ transmutetur. Nucleorum natura,  
 sicca & quodãmodo adstringens est. Pertranseunt igitur omnia intestina, non alte-  
 rati. Pensiles uero uuæ, neq̃ sistunt uentrem, neque proritant, cæteris autem faci-  
 lius cõcoquuntur. Neq̃ uuarum parua est in dulcedine, & austeritate, & aciditate  
 differentia. Dulces quidem calidiorem habent succum, austeræ uero & acidæ frigi-  
 dum Aluum subducũt dulces, & maximẽ quando humidæ fuerint. Omnium itaq̃  
 tutissimus usus est quãdo carnosæ fuerint & maturæ, & mediocriter quis ipsas assu-

H mat.



mat. Vuæ quæ albæ sunt, magis subducunt aluum quàm nigrae. Omnes uero ciborum appetentiâ excitant, & uenerem. Conuenit cum eduntur membranâ & nucleos expuere, quod difficulter cōficiantur. Quæ immaturæ sunt, uentrem sistunt, & stomacho bonæ. Caliditatem à flaua bile ortam sedant. Minus uero nutriunt. Oportet autem nō solum uuas, sed etiam omnes fructus molli cortice præditos humidos, ante reliquos cibos apponere.

## DE ACONITO CAP. XXX.

## NOMINA.

*Aconitum cur  
diciam.*



KONITON Græcis, Aconitum Latinis dicitur. Sic autem Theophrasto lib. ix. de Plantarū historia teste, non ἀπὸ τῆς ἀκονίως, id est, à cautibus, sed ab Aronis Periandynorū pago, ad Heracliam Ponti sito, uocatum est. Alij quod uis eadem in mortem esset, quæ cotibus ad ferri aciem detrahendam, statimq; admota uelocitas sentiretur. Sunt qui aliam ob causam, quam referre minimè necessarium duco, sic nominatum fuisse existiment.

## GENERA.

*Pardalianches.* Duo Aconiti sunt genera: unum Græcis Pardalianches dictum, quod pardi concidentur. Vocatur etiam Scorpionium, quod radicē Scorpioni similem habeat. *Scorpionium.* Vulgus herbariorū Vuam uersam, & uulpinā, Germani *Wolfsbeer* / & *Dolwurz* nominant. *Vua uersa.* Alterum Lycoctonon Græcis dicitur, quoniam deuoratum lupos confestim interficit. *Lycoctonon.* Vulgus Lupariam, Germani *Wolfswurz* appellant. *Luparia.*

## FORMA.

*Pardalianches  
descriptio.* Pardalianches folia habet tria aut quatuor Cyclamino uel syluestri Cucumeri similia, minora tamē, & subaspera. Caulem dodrantalem. Radicem scorpionis caudæ similem, alabastris modo nitentem. Ex hac descriptione omnibus liquidò apparet, herbam eam quam Vuam uersam aliqui nominant, cuiusq; hic picturam exhibemus, primum esse Aconiti genus: habet enim tria aut quatuor folia, eaq; Cyclami ni specie. Caulem palmi altitudine, & radicem incuruam, scorpionum caudæ similem, alabastrisq; modo splendentē. Quibus etiam accedit quod manuscriptus & uetustissimus herbarius planissimè eam herbā quam hic damus pro Aconito pingat. Germanica etiam nomenclatura satis indicat hanc herbam ob suam facultatē perniciosam esse Aconiti speciem. *Lycoctonon.* Lycoctonon Platani folia habet, magis tamen incisa diuisaue, longiora & nigriora. Caulem ueluti Filix, cubiti altitudine, aut maiorē: pediculum glabrum. Semen in siliquis aliquatenus longis. Radices cirris marinarum squillarum similes, nigras. Vnde iterum constat Lupariam uulgò appellatam, esse alteram Aconiti speciē: ea enim folia Platani, quæ Cici aut Vitis folijs similia sunt, multas habentia diuisuras, obtinet. Caulem Filici similem, pediculū glabrum. Florem oblongum, luteum, post quem longæ proueniunt siliquæ, in quibus est semen. Radices etiam nigras, ut nemo subinde quin uerum sit Aconitum dubitare possit. *Luparia.*

## LOCVS.

Primum Aconiti genus passim in nemoribus & collibus quibusdam nascitur: alterum autem in montium uallibus altissimis. Magna autem illius copia est circa montem haud ultra unum lapidem à Tubinga situm, quem Germanica uoce *Sarrenberg* nominant.

## TEMPVS.

Aconiti primum genus Maio mense potissimum erumpit. Alterum autem æstate, Iunio & Iulio mensibus florēt.

## TEMPERAMENTVM.

Erosione & putrefactione enecant Aconita, ideo toto genere letalia sunt.





ACONITVM  
PARDALIANCHES

Dolwurtz.



• ACONITVM  
LYCOCTONON

Wolffenurtz.





## VIREB EX DIOSCORIDE

A

Ferunt Aconiti primi radicem scorpioni admotam cum resolueret, & e diuerso admoto elleboro excitari. Ocularibus medicamentis dolorem tollentibus miscetur. Enecat pardos, fues, lupos, & feras omnes, carnibus impositum & obiectum. Alterius radice ad luporum uenationes utuntur. Insetta carnibus crudis, & à lupis deuorata, eos enecant.

## EX GALENO.

Aconitum Pardalianches putrefaciendi facultatem obtinet & letale est, itaq; in cibo potuq; fugiendum: attamen ad putrefaciendū colliquandūue quædam extra corpus, aut circa sedem, idoneum est. Herbae uero radix ad hæc utilis est. Alterum similem priori facultatem habet, sed peculiariter lupos, sicut illud pardos, interficere consuevit.

## EX PLINIO.

Constat omnium uenenorū ocysimum esse Aconitum, & tactis quoq; genitalibus sceminini sexus animalium, eodem die inferre mortem. Hoc tamē in usus humanæ salutis uertere, scorpionū ictibus aduersari experiendo aconitum datum in uino calido. Ea est natura ut hominē occidat, nisi inuenerit quod in homine perimat: cum eo solo colluctatur, uelut pari intus inuento. Sola hæc pugna est cum uenenu in uiscerib. repperit: mirumq; exitialia per se ambo cum fuerint, duo uenena in homine cōmoriuntur, ut homo supersit. Imò uerò etiam ferarum remedia antiqui prodiderunt, demonstrando quomodo uenenata quoque ipsa sanarentur. Torpescunt scorpiones Aconiti tactu, stupentq; pallentes, & uinci se confitentur. Auxiliatur eis elleborum album, tactu resolvente: ceditq; aconitum duobus malis, suo & omnium. Tangunt carnes aconito, necantq; gustatu earum pantheras, ob id quidam Pardalianches appellauere.

Legendum enim  
τινὰ τῶ ἐκ τῶ  
σὺ μὲν, &  
non τινὰ τῶ σὺ  
μὲν, ut ha-  
bet exemplar Al-  
dinum: astipulan-  
tibus huic lectio-  
ni Aëtio, Paulo,  
& antiquo inter-  
prete latino.

B

## DE ARISTOLOCHIA CAP. XXXI

## NOMINA.



ARISTOLOCHIA Græcis, Aristolochia Latinis, barbaris & officinis corrupta uoce Aristologia, quemadmodū etiam Germanis Holwurg, & Osterluccey nominatur. Dicta autem est Aristolochia, quod ἀρίστη τοῖς λο-  
χοῖς, id est, optima puerperis sit, utpote quæ remoratos menses, hæren-  
tes secundas, & reliquias omnes à partu expellat.

Aristolochia un-  
de dicta.

## GENERA.

Aristolochiæ Dioscorides & alij Græci tria esse genera statuunt. Vna est que rotunda & scemina dicitur. Altera longa & mascula. Tertia Clematidis, quasi dicas sarmentaria, appellatur. Harum certè nullam præter longam officinæ Germaniæ nostræ agnoscunt. Nam qua sub Aristolochiæ rotundæ nomine utuntur herba, minimè genuina est, ut paulò post evidentissimis argumentis ostendemus. Plinius tribus ijs generibus addit quartum, ac Pistolochiā uocat, quæ certè ea est quam nostræ officinæ Aristolochiam rotundam, & Germani Xunde Holwurg falso appellat, ut in eius descriptione fusiùs docebimus.

Germaniæ offi-  
cine solam lon-  
gā Aristolochiā  
agnoscunt.

Pistolochia  
quæ.

## FORMA.

Aristolochia rotunda folia Hederæ similia habet, cum acrimonia odorata, subrotunda, tenera, cum multis in una radice germinibus: sarmenta illi sunt oblonga, flores candidi, pilcolis similes, in quibus quod rubet grauiter odoratū est. Radix illius rotunda, rapo similis. Ex ijs quidem uerbis sole clarius sit Aristolochiā rotundam officinarum, & qua cōmuniter omnes utuntur, non esse eam quam Dioscorides atque alij ueteres pingunt. Hæc enim non Hederæ folia, sed Rutæ potius, maiora tamen habereprehenditur. Neque etiam odorata, neq; subrotunda sunt. Grauis

Aristolochia ro-  
tunda.





ARISTOLOCHIA  
ROTVNDA

Lang holwurcz.





PISTOLOCHIA

Runde holwurz.

Radix rotunda & solida.



*Aristolochia  
longa.*

*Obiectionis dis-  
solutio.*

*Earundē etiam  
herbarum flores  
non ubiq; terrarū  
esse similes.*

*Obiectionis dis-  
solutio.*

*Clematidis.*

*Pistolochia.*

*Aristolochia no-  
stra rotunda, est  
Pistolochia.*

etiam qui ex floribus exhalat odor, in nostrae Aristolochiae floribus nusquam apparet. Radix denique etsi rotunda sit, tamen quia concaua est, globiq; formam obtinet, rapo, quod solidum est & oblongum, similis dici non potest. Non latet tamen interdum etiam reperiri eius generis radices prorsus rotundas ac solidas, ut altera pictura monstrat: uerū cum reliquae Dioscoridis notae absint, legitima Aristolochia esse haud potest. His accedit, quod manuscripti herbarij pictura planē hanc Aristolochiā Hederæ folia habere doceat, ut hinc etiam euidentissimū sit nostram nō esse genuinā. Aristolochia longa, folia quā rotunda longiora habet. Ramulos tenues, altitudine dodrantales. Florē purpureū, grauit̄ odoratū, qui cum defloruerit pyro similis sit. Radicē digiti crassitudine dodrantalē, aut longiorē. Tam huius uero quā prioris radix colore bux̄o, gustu amara, & odore uiroso est. Hęc sanē descriptio non abhorret à nostra Aristolochia, quā Hederę etiam folijs cōstat, ramulisq; tenuibus. Neq; obstat quod hęc non purpureos, sed luteos potius flores habeat: nam ut in Symphyto magno uberius dicemus, non ubiq; terrarum, earundem etiam herbarum flores similes esse, euidentissimū sit in Boragine, & Consolida maiore hodie nominatis herbis. Quamuis autem lutei sint, grauit̄ tamen odoratos esse constat. Dein ubi flos nostrę etiam Aristolochiæ defloruerit, tum pyro similis sit, ut pictura etiam pulchrē monstrat. Sed hic obtrudet nobis quispiam Dioscoridem, qui Gentianæ radicem Aristolochię longę similem, crassamq; esse scribit: huius autem nostræ nedum digiti crassitudinē obtinet, tantum abest, ut quantitate Gentianæ radici similis esse queat. Respondeo, hęc quidem uera esse, sed nihil mirum esse si apud nos minor reperiatur: uariatur enim in una etiam & eadem herba iuxta regiones diuersas radicū magnitudo. Sic uisa est nobis radix Aristolochiæ rotundę multo quā sit maximus digitus maior & crassior. Hęc tamē in Italia pro uenerat. Neq; dubiū est quin nostræ etiam radix maior futura sit ubi cultus, & terra apta admodum accesserit. Nam ut Theophrastus lib. i. de histo. plant. cap. v. auctor est, quædam ob culturam diuersa efficiuntur, atque à sua natura discedunt. Sic Malua in altum se attollit, & arborescit, atq; in longitudine & crassitudine instar hastæ grandescit. Quid multa: cum nostra maxima etiam prædita sit amaritudine, tutò illa prouera & genuina, nihil obstantibus floribus luteis, & radice minima, uti licebit. Clematidis ramulos habet tenues, folijs subrotundis, minori Semperuiuo similibus, plenos: flores Rutę haud dissimiles. Radices longiores, tenues, corticem crassum habentes, & odoratum. Pistolochia à Plinio lib. xxv. cap. viij. ijs pingitur uerbis: Est & quæ Pistolochia uocatur, quarti generis, tenuior quā tertia, densis radicis capillamentis, iunci plenioris crassitudine. Hanc quidam Polyrhizon cognominant. Ex ijs autem uerbis nemo nō intelligit, Aristolochiam rotundam uulgo uocatam, esse Pistolochiam: hęc enim supra modum tenuis, uel ut apertius dicam, tenera herba est. Radix etiam multis capillamentis uestita, crassioris etiam iunci magnitudine, atque adeo concaua, ut pictura monstrat. His accedit, quod hęc quæ rotunda uocatur cauis ulceribus profit, quam etiam facultatem Pistolochiæ, ut paulò pōst patebit, Plinius tribuit. Et quid multis opus est uerbis: nomē ipsum abundē docet esse Pistolochiam: creditur enim, quamuis reuera non sit, esse Aristolochia hodie quoq; haud secus quā Plinij temporib. Hęc, ut totam eius faciem teneas, caulem habet rotundum, leuem, folia Rutæ hortensis, latiora tamen, flores ferē Eranthemi, purpureos: illa candidos, ut pictura quæ utrosque unā complectitur, pulchrē monstrat, quibus abeuntibus, siliquas profert refertas semine atro, lentibus haud dissimili: radices, ut ostensum est, hęc rotundam & cauam, illa uerò rotundam, at omni tempore solidam obtinet, colore subcroceam.

#### LOCVS.

Vera rotunda, quod sciam, nusquā in Germania nostra nascitur. Longa passim in uincis, ac hortis alijs prouenit. Pistolochia in syluis & locis umbrosis.

#### TEMPVS.



## TEMPVS.

A Longa Iunio & Iulio mensibus floret. Pistolochia in Martio & Aprili, quo præterito statim etiam disperit.

## TEMPERAMENTVM.

Cum supra modum amaræ & subacres sint Aristolochiæ, calidas & siccas esse in secundo, uel, quod magis credibile est, in tertio ordine rectè statuemus.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Rotunda contra alia uenena ualet. Longa uero drachmæ unius pondere cum uino pota & illita, duersus serpentes & letalia. Menses, secundas & fetus omnes in utero consistentes cum myrrha & pipere pota pellit. In pello subdita eadem potest. Rotunda ad eadem omnia ad quæ prædicta conducit: ampliusq; asthmatis, singultui, rigori, lieni, ruptis, cōuulsis, laterisq; doloribus ex frigida aqua pota auxiliatur. Surculos & spicula extrahit. Squamas ossium illita educit. Putrescentia excarificat, & sordida ulcera expurgat. Caua cum Iride & melle explet. Exerit gingiuas & dentes. Creditur & Clematidis ad eadem prodesse, efficacia tamen prædictis minor inferiorq; est.

## EX GALENO.

B Aristolochiæ radix ad medicationes utilissima est, amara & subacris. Sed ex illis tenuissima est rotunda, & in omnibus efficacior. Aliarum uero duarum Clematidis uocata magis odorata est: itaque ea ad unguenta utuntur unguentarij: sed ad sanationes infirmior. Longa uero minus quidem tenuis est quàm rotunda, sed nec ipsa inefficax, uerum abstergendi & calefaciendi facultatem possidet, minus tamen quàm rotunda abstergit atque digerit: sed non minus calefacit, imò fortassis etiam plus. Itaque in quibus usus est mediocriter abstergere, cōmodior est longa, quemadmodum in carnis exulcerationibus, & in uteri fomentationibus. In quibus autem crassum humorem ualidius extenuare oportet, illic usus est rotundæ. Quapropter dolores ab obstructione aut crassitie crudorum flatuum natos magis curat rotunda, & surculos extrahit, & putredines sanat, & sordida ulcera repurgat, ac dentes gingiuasq; candidas efficit. Auxilio est asthmaticis, singultientibus, comitialibus, podagricis cum aqua frigida pota. Ruptis etiam conuulsisq; ut si quod aliud medicamentum, idonea est.

## EX PLINIO.

Valent radice tantum. Rotunda contra serpentes. Oblonga in summa tamen gloria est etiam modo. A conceptu admota uuluis in carne bubula, mares figurat, ut traditur. Quæ Pistolochia & Polyrhizos cognominat, cōuulsis, contusis, ex alto præcipitatis, radice pota ex aqua, utihissima esse tradit. Semine pleuriticis & neruos confirmare, excalfacere. Putrida ulcera exest, sordida expurgat, uermesq; extrahit Aristolochia. Clauos in ulceribus natos, & infixæ corporis omnia, præcipue sagittas, & ossa fracta, cum resina. Caua ulcera explet per se, & cum Iride: recetia uulnere ex aceto.

## APPENDIX.

Et si nostram Aristolochiā rotundam nō genuinam esse dixerimus, tamen ob id in medico usu non repudianda erit. Quum enim habeat & in folijs & in radice acrimoniam, eamq; non leuem quidem, si genuina desit, sine omni discrimine illa uti licebit ad omnia ea ad quæ uera usurpatur.





VITIS ALBA

Stickwurtz.



## NOMINA.



ΜΡΕΛΟΣ λευκή, ἢ Βρυονία, ἢ Ψιλοθρύον græcè: Vitis alba, Psilothrum latine appellatur. Officinis & herbarijs Bryonia. Vulgus Viticellam nominat. Germanicè Stickwurz / Schießwurz / Kapwurz / Hunds kurb / Römisch kurb / Wilder zitwan / Teufels kurb uocatur. Vitis alba uero dicta, non quod uitis sit, sed quod uiti similis existat. Sic etiam Viticella. Psilothrū, quod ex eius acinis coria depilari ac cōfici possint. Bryonia uero à βρύον fortè, quod est pullulo atque adeo extollo, & exalto, eò quod in adiacentes sibi frutices scandens se exaltet atq; latè pullulet.

Bryonia.

vitis alba cum dicta.

psilothrum

inde.

Bryonia.

## FORMA.

Sarmenta, folia, capreoli, satiuæ uiti similia sunt, hirsutiora tamen omnia. Propinquis fruticibus se implicat capreolis apprehendens. Fructum habet racemosum, rubentem, quo coria depilant. Radix alba, crassa & magna.

## LOCVS.

Passim in sepibus & senticetis nascitur, eosq; quos prope se nanciscitur frutices scandit, ut eleganter in carmine suo Columella cecinit, dicens:

*Quæq; tuas audax imitatur Nyse uiteis,  
Nec metuit senteis: nam uepribus improba surgens  
Achradon, indomitas bryonias alligat ulmos.*

## TEMPVS.

Floret tota æstate in bonam usq; partem autumnī, in quo fructum producit, qui primum uiridis est, dein ubi maturitatem consecutus fuerit, rufus esse incipit.

## TEMPERAMENTVM.

Prima germina subamaram & modicè acrem adstrictionem habent. Radix autem desiccata & moderatè calefacit.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Bryoniæ in prima germinatione asparagi elixi manduntur, urinam & aluum cientes. Folia, fructus & radix, acrem uim habent: eapropter chironijs, gangranicis, phagedenicis, & tibias putrefacientibus ulceribus cum sale illita auxiliantur. Radix abstergit corpus & erugat. Vitia faciei, uaros, lentigines, & cicatrices nigras, cum eruo, terra chia, & scenograeco emendat. Ad eadem prodest decocta in oleo usquedum liquecat. Sugillata tollit, & digitorū pterygia compescit. Cum uino illita inflammationes discutit, & abscessus rumpit. Ossa extrahit, trita & illita. Miscetur aptè medicamentis quæ exedendo sunt. Bibitur comitialibus drachmæ pondere quotidie per annum. Attonitis & uertigine laborantibus consimiliter assumpta prodest. Cōtra uiperarum ictus pota drachmis duabus prodest. Foetus necat. Mentem aliquando suburbat. Cit urinam pota. Eclegma ex ea fit cum melle, quod præfocatione oppressis, tussientibus, latera dolentibus, & ruptis datur. Apposita utero, foetus & secundas trahit. Lienem trium obolorum pondere ex aceto triginta diebus pota consumit. Illinitur utiliter cum fico ad eadem. Ad infessus decoquitur: uulvas siquidem purgat, & abortum facit. Vere ex radice eius exprimitur succus, bibiturq; cum aqua mulsa ad eadem, pituitam ducens. Fructus eius ad psoras & lepras illitus & inunctus facit. Lactis abundantiam efficit succus eius fructus, si cum tritico decocto sorbeatur.

## EX GALENO.

Vitis albæ, quam etiam Bryoniā uocant, prima quidē germina ab omnibus pro more peruereduntur, utpote eduliū stomacho eò quod adstringat gratū. Habent etiam amaram & modicè acrem adstrictionē, quare urinā moderatè mouent. Radix autem abstergentem nonnullam, desiccantem & tenuium partium, ac moderatè ca-



c ratè calidam uim obtinet, quamobrè & lienes induratos liquefacit tum epota, tum foris cum ficubus imposita. Pforam etiam ac lepram sanat. Racemosus eius fructus pelles tingentibus utilis est.

## EX PLINIO.

Bryoniae asparagi decocti in cibo aluum & urinam cient. Folia & caules exulcerant corpus: utique ulcerum phagedænis, & gangrænis, tibiærumq; tædio cum sale illinuntur. Semen in uua raris acinis dependet, succo rubente postea croci. Nouere id qui coria perficiunt: illo enim utuntur. Pforis & lepris illinitur. Lactis abundantiam facit coctum cum tritico, potumq;. Radix numerosis utilitatibus nobilis: contra serpentium ictus trita drachmis duabus bibitur. Vitia cutis in facie, uarosq; & lentigines, & sugillata emendat, & cicatrices. Eademq; præstat decocta in oleo. Datur & comitialibus potus. Item mente cōmotis, & uertigine laborantibus, drachmæ pondere quotidie anno toto. Et ipsa autem largior aliquanto, purgat sensus. Illa uis præclara, quod ossa infracta extrahit in aqua imposita, ut Bryonia: quare qui dam hanc albam Bryoniam uocant. Suppurationes incipientes discutit, ueteres maturat & purgat. Cit menses & urinam. Eclegma ex ea fit suspiriosis, & cōtra lateris dolores, uulsis, ruptis. Splenem ternis obolis pota triginta diebus cōsumit. Illinitur eadem cum fico & pterygijs digitorum. Ex uino secundas foeminarum apposita trahit: & pituitam, drachma pota ex aqua mulsa. Succus radice colligi debet ante feminis maturitatem: qui illitus per se & cum eruo, lætiore quodam colore, & cutis teneritate mangonizat corpora: serpētes fugat. Tunditur ipsa radix cum pingui fico, erugatq; corpus, si statim bina stadia ambulentur. Aliàs urit, nisi frigida abluaē.

## DE AMPELOMELAENA CAP. XXXIII.

## NOMINA.

D  
Vitis nigra unde  
dicta.



ΜΡΕΛΟΖ μέλαινα Græcis, Vitis nigra Latinis nominatur. Officinis in cognita. Germanis Waldbreen/oder Lynen/oder Lenen uocat. Nigra uero uitis dicta est à radice nigra, & quod uitis similitudinē obtineat.

## FORMA.

Folia Hederæ similia habet, magis tamen ad Smilacis folia accedentia, cui & caules similes obtinet: maiora tamen eius folia quàm illius sunt. Clauiculis hæc etiam arbores amplectitur. Semen racemosum, initio herbaceum, cum maturuit deinde nigrum. Radicem foris nigram, intus buxei coloris. Ex qua deliniatione omnibus cōstat herbam hanc cuius picturā exhibemus, esse uitem nigram. Folijs enim Hæderæ, maioribus tamen, Smilaci proximioribus, caulibus quoq; cognatis. Clauiculis suis arbores perinde atque adminicula comprehendit. Semen racematim cohæret, inter principia uirens, post maturitatem nigrescens. Radix foris atra, intus buxeo colore nitet. Flores eius, quod omisit Dioscorides, sunt candidi, & odorati, quibus decidentibus semen subnascitur plumis quasi uestitum, aut barbæ canæ effigiem præbens.

## LOCVS.

In frutetis & dumetis potissimum nascitur.

## TEMPVS.

Floret Iulio mense, Augusto uero semen profert.

## TEMPERAMENTVM.

Idem quod uitis alba temperamentum habet.

## VIRES EX DIOSCORIDE.

Huius caules in prima germinatione olerum modo manduntur, urinæ & mensibus ducendis utiles. Idem lienes minuunt. Comitibus, uertiginosis, & resolutis accōmodati sunt. Radix eadem præstat quæ uitis albæ, minus efficax tamen. Folia cum





VITIS NIGRA

Lynen.

I



lia cum uino illita ad iumentorum ceruices exulceratas conducunt. Quinetiam luxatis eodem modo imponuntur.

EX GALENO.

Viti albae ad omnia similis, nisi quod imbecillior.

EX PLINIO.

Asparagi eius in cibo urinae ciendae, lienique minuendo utiles. Radix ossa infracta efficacius extrahit quam supra dicta. Caeterum eidem peculiare est, quod iumentorum ceruicibus unice medetur. Aiunt si quis in uilla extruxerit, fugere accipitres, tutasque fieri aues uillaticas. Aliter eadem in iumento homineque flegma aut sanguinem qui scretur, talos circumligata sanat.

## DE AMARANTO CAP. XXXIII.

NOMINA.



AMARANTOS Græcis, Amarantus Latinis dicitur. Medicis & herbarijs nostrae aetatis ex amore & anthos dictionem componi credentibus, Flos amoris uocatur. Hanc appellationem usurpantes Germani, Gloramo nominant, alias Samarblim & Tausentschön appellatur. Amarantus autem non alio nomine dici cepit, quam quod flos eius nunquam marcescat. Hinc est quod puellae hyemales sibi corollas ex eo conficiant; id quod Erfordiae, ubi non solum aestate, uerumetiam hyeme gestant coronas, fieri potissimum solet.

GENERA.

Duplex est Amarantus: unus luteus, qui Dioscoridi *ἡλίουροσ*, Galeno Amarantus, officinis & imperitis Stichas citrina, uel ut ipsi loquuntur, Sticados citrinum, Germanis Rheimblimen / quod in regionibus quae Rheno adiacent, potissimum uero quae intra Spiram & Vuormaciam sunt, proueniat: oder Wottenblim / oder Jungling appellatur. Helichryson dictum, quod ad solis repercussum comantibus in orbem florum folijs, fulgorem auri praeseferat. Alter purpureus, qui hodie Flos amoris uulgò, & Germanis Gloramo / oder Samarblim uocatur, ut paulò antea nobis dictum est.

FORMA.

Amarantus luteus qui Helichryson alio nomine dicitur, uirgam habet tenuem, uirentem, rectam, solidamque. Folia angusta ex interuallis, Abrotono similia. Coma orbicularem, auri modo fulgentem. Umbellam rotundam, ueluti corymbos arescentes. Radicem tenuem. Ex qua descriptione planum sit eam herbam quam hodie officinae solocismo utentes Stichada citrinam nominant, esse Helichryson. Est enim herba surculosa, exilibus ramulis, folio ut Hyssopus angusto, gustu amaro, & instar Abrotoni albicante: coma orbiculari, auri modo splendente: umbella rotunda ueluti corymbos arescentes: radice gracili. Et ut paucis dicam, non est nota quae illi non aptissime quadret. Purpureus uero pedali altitudine surgit, caule purpureo, folijs Ocymo similibus, maioribus tamen & longioribus, spica purpurea, uerius quam flore, inodora, qua nihil gratius aspectu cernitur.

LOCVS.

Nascitur in asperis, sabulosis, siccis & conuallibus locis luteus. Alter autem in hortis & ficilibus feritur.

TEMPVS.

Helichrysum Iunio & Iulio mensibus floret. Amarantus uero purpureus aestate, potissimum autem Augusto mense.

TEMPERAMENTVM.

Luteus calidus & siccus haud dubie est, id quod amaritudo in gustu & facultates eius abundè demonstrant. Purpureus autem recentiorum herbariorum sententia frigidus est & siccus.

VIRES.



AMARANTVS  
LVTEVS.

Rheinblumen.







AMARANTVS  
PURPUREVS

Gamatblum.



A

## VIRES EX DIOSCORIDE.

Coma Helichrysi cum uino pota difficultatibus urinæ, serpentium ictibus, coxendicum doloribus, & ruptis auxiliatur. Menfes ducit, & sanguinis grumos in uesica aut aluo cum oxymelite pota liquefacit. Destillationem trium obolorum pondere cum uino diluto albo ieuno data compescit. Reponitur etiam cum uestibus, quas ab erosione integras seruat. Vnde iterum colligere licebit, herbam quam Rheinblumen uocant, esse Helichrysum, quod illam hac facultate ut uestes à tinea tueatur præditam esse, omnibus in confesso est.

## EX GALENO.

Amarantus, luteus nempe, facultatis est incidentis & extenuantis. Quapropter coma eius cum uino pota menfes educit, & sanguinis grumos liquare creditur, non solum in uentre, sed & in uesica. Sed tunc potius illam cum mulso bibere conuenit. Omnes uero simpliciter fluxiones pota desiccat, stomacho tamen aduersa.

## EX PLINIO.

Heliochrysum ciet urinæ è uino pota, & menfes. Duritias & inflammationes discutit. Ambustis cum melle imponitur. Contra serpentium ictus & lumborum uitia bibitur. Sanguinem cōcretum uentris ac uesicæ absomit cum mulso. Folia eius trium obolorum pondere sistunt profluvia mulierum in uino albo. Vestes tuctur odore non ineleganti.

## APPENDIX.

Recentiores purpureum Amarantum uehementer siccare tradunt, ideoq; cum uino sumptum alui fluxiones sistere scribunt: sed, ut aiunt, stomacho aduersatur. Lutei floribus in uino decoctis, ad lumbricos educendos utuntur: & ad pediculos enecandos in lixiuio coctis.

B

## DE AQUILEGIA CAP. XXXV.

## NOMINA.



VAE Aquilegia uulgò ab omnib. appellatur herba, ea Germanis Acheley / Agley / & Ageley nominatur. Quo uero nomine Græcis aut Latinis medicis uocata sit, nobis nondum constare potuit. Non esse enim Græcorum Aegilopa, ut non solum uulgares herbarij, uerum etiam magni nominis medici putant, notius est quàm ut demonstrari à me debeat. Nam nihil in uniuersa Aegilopis, quæ alterum Auenæ genus est, historia reperitur, quod ad Aquilegiam referri queat. Neque enim tam ab anguilla cancer, quàm Aegilops ab Aquilegia dissidet: ut hoc nomine errare toto coelo euidentissimū sit, qui Aegilopa esse Aquilegiam arbitrantur.

*Aquilegia non est Aegilops.*

*Aegilops quid.*

## FORMA.

Folia Chelidonijs maioris habet, sed paulò rotundiora, ac molliora. Caulem cubitalem, & interdum proceriorem, in cuius summo flores purpurei sunt, ex caudis quibusdam ueluti muliebres oculi propendentes. His decidentibus capitula subnascuntur, haud secus atque in melanthio, in quibus semen atrum est. Radix eius crassa.

## LOCVS.

Nascitur passim in hortis, & pinguibus quibusdā pratis. Inuenitur etiam in montibus syluosis, & interdum in petris & muris.

## TEMPVS.

Maior & Iunio mensibus floret.

## TEMPERAMENTVM.

In gustu dulcedinem quandam præ se ferre uidetur, ut hoc nomine mediocriter





AQVILEGIA

McGeley.



A calidam esse, ac modicè digerendi uim habere uerisimile sit.

## VIREs.

## EX RECENTIORIBVS.

Recentiores omnes, tum herbarij, tum medici, Aquilegiæ omnes Aegilopis facultates tribuunt, at quàm rectè ipsi uiderint. Neque enim uerisimile est herbe quæ subacris non est, tantam discutiendi inesse facultatem posse. Quum uero modicè digeratur & exiccet, scabiei & fistulis, potissimum si illi farina cõmiscetur triticea, conferre potest.

## DE ALLIARIA CAP. XXXVI.

## NOMINA.



ONDVM constat quo nomine ueteribus Græcis & Latinis herba hæc appellata sit. Vulgo tamen, eò quòd trita eius folia ingratum ac planè aliaceum odorem redolent, Alliaris & Alliaria nominatur. Germanicè Knoblochtraut/oder Leuchel/oder Safftraut. Pandectarum autor

Alliaria unde dicta.

Pedem asininum uocat.

Pes asinus.

## FORMA.

Folia eius cum primum emicant subrotunda sunt, uiolæ similitudine, aliquantulum tamen maiora. Adulta autem in angulos exeunt. Herba ipsa bicubitali proceritate confurgit, caule tereti, folijs Vrticæ, nisi quod leuiores sunt, parcius simbriata, & à pediculo latiora, Allij odoratu cum teruntur, flore lacteo alboue, exili in siliquis semine, atro colore, radice oblonga, eiusdem cum folijs odoris.

## LOCVS.

B Passim propter sepes & agrorum margines prouenit.

## TEMPVS.

Folia statim primo uere, atque adeò Martio ipso erumpunt. Floret autem æstate, atque deinceps semen profert.

## TEMPERAMENTVM.

Quum prorsus suboleat Allium, necesse est ut temperamento eodem prædita sit. Calefacit igitur haud dubiè & desiccat, non tamen perinde atque Allium in excessu quareo.

## VIREs.

Easdem propè Allij facultates habere uel hinc conijci potest, quod nonnulli in iuribus tortiuiscæ succis pro Allio substituant. Proinde corpus calefacere, crassos humores in eo extenuare, glutinosos incidere potest. Omnia tamen hæc minori quàm Allium efficacia. Semen eius cum aceto emplastri modo mulieribus strangulatu uteri laborantibus impositum, & uulvæ admotum prodest, ac easdem excitat. Et summatim, omnia quæ Nasturtij semen, sed minori efficacia, potest.





ALLIARIA

Knoblochkraut.



## NOMINA.



ΚΑΛΥΘΗ, *κάλυθον* Græcis, Vrtica Latinis nuncupatur. Officinæ latino nomine utuntur, Germanis *Welschnessel* appellat. Acalyphe uero dicta est, Athenæo autore, quod iniucundo sit tactu, & pruriginem cieat. Cnide autē, quod uellicet, pungat, ac suo morfu sensum laceffat, à uerbō *κνίδω*, quod pungere & uellicare significat. Vrtica ab urendo, quod pruritus pustulasque igni similes excitet.

*Acalyphe una de dicta.*  
*Cnide.*  
*Vrtica.*

## GENERA.

Dioscorides duo facit genera. Vnam asperam, quam hodie Romanam uocant: & est ea quam pictam damus. Huius quidem semine in officinis utendum, non alterius quæ passim in sepibus ac dymetis nascitur. Germanicè *Welschnessel* appellatur. Alteram minus asperam, quam ob id mollem nominat. Hanc nondum uidere potuimus. In Germania nostra præter hæc genera, alia duo inueniuntur. Vnum maius, quod germanicè *Heyternessel* nominat: alterum minus, germanicè *Brennessel* uel *Habernessel* quod nimirum in auena nascatur, appellari solet. Harum etiam picturas adijcere placuit, quod non prorsus inefficaces esse putemus, quandoquidem haud secus atque Romana pungere uideantur.

*Vrtica romana.*

*Vrtica nostra maior.*  
*Vrtica minor.*

## FORMA.

Romana caule est rotundo & aspero, syluestrior etiam & asperior, latior & nigrior folijs, semine haud dissimili in globulis quibusdam semine lini, sed minore. Altera priori similis est, nisi quod non similiter aspera est, tenuiusque semen habet.

## LOCVS.

Romana apud nos non nisi sata prouenit, non secus atque mollis uocata urtica. Vulgares passim in dymetis ac sepibus gignuntur.

*Romana.*

## TEMPVS.

Semen melsibus colligi oportet.

## TEMPERAMENTVM.

Subtilium est partium, & temperaturæ siccae, non tamen tantum habet caliditatis ut iam mordicet.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Vtriusque folia cum sale illita canis morfib. gangrænis, malignis ulceribus, cancris, sordidisque, luxatis, tuberculis, parotidibus, phygeth. & abscessib. medentur. Lienosis cum cerato imponuntur. Profluvia sanguinis ex naribus cum succo trita & imposita sistunt. Cum myrrha trita & imposita menses mouent. Recentia ad mota uteri procidentias emendant. Semen cum passo potum uenerem stimulat, & uulvas aperit. Cum melle linctum orthopneas, pleuritidas, & peripneumoniā iuuat. Ea quæ in thorace sunt educit. Miscetur & exedentibus medicamentis. Folia cum conchulis decocta aluum molliunt, urinasque mouent. Cum prisana decocta ea quæ in thorace sunt educunt. Decoctum foliorum cum exiguo myrrhæ potum menses elicit. Succus gargarissatus, uiam inflammata reprimat.

## EX GALENO.

Herbæ semen & folia, nam hæc potissimum in usum adhibentur, digerentis sunt facultatis, adeo ut tubercula & parotidas sanent. Sed & quiddam flatuosum obtinent, quo & uenerem extimulant, maxime ubi cum passo semen bibitur. Porro quod non uehementer calefaciat, sed admodum tenuium sit partium, testatur crasforum uiscosorumque humorum ex thorace & pulmoneeductio, tum quod partes quas contigerit pruriant. Cæterum flatuosum eius, cuius particeps esse dicta est, dum concoquitur, nascitur: non enim actu flatuosa est, sed potentia. Ventrem autem mediocriter subducit ipsa duntaxat absterfione, ac ueluti titillatione, non purgatione.





VRTICA  
ROMANA

Welschnessel.





URTICA  
MAIOR

Heiternessel.



VRTICA  
MINOR

Biennessel.





**A**gatione. Gangrenosa & canerosa, & in totum quæ exicari citra mordacitatem possulant, ea conuenienter sanat.

## EX PLINIO.

Urtica plurimis scatet remedijs. Semen eius Cicutæ contrarium esse Nicander affirmat. Item fungis, & argento uiuo. Apollodorus & Salamandris cum iure decoctæ testudinis. Item aduerlari Hyoscyamo, & serpentibus, & scorpionibus. Quin illa ipsa amaritudo mordax, uuas in ore, procidentesq; uuluas, & infantium sedes, tactu resilire cogit. Lethargicos expergisci tactis cruribus, magisq; fronte. Eadem canis moribus addito sale medetur. Sanguinem trita naribus indita sistit, & magis radice. Carcinomata & sordida ulcera, sale ammixto: item luxata. Sanat & panos, parotidas, carnesq; ab ossibus recedentes. Semen potum cum Sapa, uuluas strangulantes aperit, & profluvia narium sistit impositum. Vomitiones in aqua mulsa sumptum à ccena, faciles præstat, duobus obolis. Vno autem in uino poto, lassitudines recreat. Vuluæ uitijs tostum, acetabuli mensura. Potum in sapa, resistit stomachi inflationibus. Orthopnoicis prodest cum melle, & thoracem purgat eodem edigmate. Et lateri medetur cum semine lini: addunt Hyssopum & piperis aliquid. Illinitur lieni. Difficilem uentrem tostum cibo emollit. Hippocrates uuluum purgari poto eo pronunciat. Dolore leuari tosto acetabuli mensura dulci poto, & imposito cum succo maluæ. Intestinorum animalia pelli cum hydromelite & sale. Defluuia capitis, semine illito cohonestari. Articularibus morbis & podagricis plurimi cum oleo uetere, aut folia cum ursino adipe trita imponunt. Ad eadem radix tusa cum aceto, non minus utilis. Item lieni. Et cocta in uino discutit panos, cum axungia uetere salsa. Eadem psilothrum exiccat. Condidit laudes eius Pharias phycus, utilissimam cibis coctam conditamue professus arteriæ, tussi, uentris destillationi, stomacho, panis, parotidibus, pernionibus: cum oleo sudorem, coctam cum conchulis ciere aluum, cum pitana pectus purgare, mulierumq; menses cum sale, ulcera quæ serpunt cohibere. Succus quoque in usu est. Expressus illitusq; fronti sanguinem narium sistit, potus urinam ciat, calculos rumpit. Vuam gargarissatus reprimat. Si quadrupedes foetum non admittant, urtica naturam fricandam monstrant.

## DE APHACE CAP. XXXVIII

## NOMINA.



**A**phace Græcis, Aphace Latinis, uulgò Syluestris uitis, & Os mundi, Germanis Wildwicken/oder S. Christoffelstraute uocatur. Alia est ab Aphaca Theophrasti, quæ syluestrium olerum genus est, de qua suo loco plura dicemus.

## FORMA.

Exiguus frutex est, lenticula altior, tenuioribus folijs. Quæ nascuntur in ea siliquæ lente maiores, terna aut quaterna semina nigriora & minora continent.

## LOCVS.

In aruis sponte nascitur.

## TEMPVS.

Maior mense floret, & subinde semen in siliquis producit.

## TEMPERAMENTVM.

Moderati caloris est, ualentius autem desiccatur.

## VIRES EX DIOSCORIDE.

Semina adstringendi uim habent, quapropter stomachi & alui fluxiones tosta, fracta, & decocta lentis instar sistunt.

K

EX GALE.





APHACE

Wild wicken.



A

EX GALENO.

Aphace facultatem obtinet adstrictoriam, sicut & ipsa lenticula. Sed & similiter ut lenticula edi solet: ceterum acrius quàm illa concoquitur. Aluum retinet.

EX PLINIO.

Natura ei ad spissandum efficacior quàm lenti. Reliquo usu eisdem effectus habet. Stomachi aluiq; fluxiones sistit semen decoctum.

## DE ANDRACHNE CAP. XXXIX.

NOMINA.



ΑΝΔΡΑΧΝΗ Græcis, Portulaca Latinis & Officinis, Germanis Burzeltraut dicitur, corrupta tamen uoce, cum efferendum esset Porzeltraut/ ac si porcellorū herbam dicerent, Aliàs Sawbon n̄sdem appellatur.

Portulaca.

GENERA.

Portulaca in duas distribuitur species: unam hortensem, & alteram syluestrem, quæ non est tertium Aizoi genus, ut aliqui seducti mendosis Dioscoridis exemplaribus credunt. Nam quod pleriq; nomina harum duarum plantarū cōfuderint, factum subinde est ut multa adulterina, quæ scilicet tertij generis Aizoo debentur, capiti de Portulaca syluestri inserta sint, quæ omnia prorsus expungenda ueniunt, ut paulò pòst clarius mōstrabimus. Hortensem Germani simpliciter Burzeltraut/ syluestrem uerò wild oder uetzerburzel uocant.

Portulaca hortensis.  
Syluestris.

FORMA.

Hortensis caules habet crassos, pingues, teretes, in altum erectos, lentè uergentes in puniceū, folia pinguia, à tergo candida, flores exiguos luteos, semina nigra in herbaceis calycibus cōtenta. Syluestris folia oleæ obtinet, minora tamen multo, numero siora & tenera, rubentes cauliculos ab una radice multos in terra sessiles, qui cōmanducati succo abundāt, glutinosiq; & sapore falsi sunt. Hæc est genuina apud Dioscoridē Portulacæ deliniatio, reliqua uero omnia sunt adulterina, & ab imperito aliquo rerū, ex capite de tertio Aizoo excerpta, & huic sine omni iudicio inserta.

LOCVS.

Prouenit in hortorum areolis, uincis, & alijs cultis locis, hortensis. Ceterum syluestris in petrosis & incultis etiam nascitur.

TEMPVS.

Iunio & Iulio potissimū mensib. carpenda folia & flores: semen uerò sequentib.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat utraq; quidem in tertio ordine à temperatis ac medijs, humectat uero in secundo: quare uiribus etiam non distant. Hinc quæ in Dioscoride leguntur non sunt propriae, sed Aizoi tertij generis, & à sciolo aliquo temerè Portulacæ syluestri attributæ.

VIRES.

EX DIOSCORIDE.

Portulaca uim habet adstrictoriam. Cum polenta illita, capitis doloribus, oculorum inflammationibus, & aliarum partiū, stomachi ardoribus, erysipelatis, & uesicæ doloribus auxiliatur. Cōmanducata dentium stuporē, stomachi & intestinorū æstuationem fluxionesq; sedat. Renes erosos & uesicā adiuuat. Veneris impetus exoluit. Pari effectū & succus eius prodest potus, & in febribus etiam ualens. Contra rotundos lumbricos, sanguinis excreationē, dysenterias, hæmorrhoidas, profluuiā sanguinis percocta efficax. Contra Sepis morsus. Ocularibus medicamentis utiliter cōmiscetur. Intestinis fluxione laborantibus, aut uulua erosionē affecta infunditur. Contra dolores capitis ex uisione cum rosaceo aut oleo ex alto destillatur. Exanthemata in capite cum uino exterit, Vulneribus ad syderationem spectantib. ex polenta illinitur.

K 2 EX GALE-





PORTULACA  
HORTENSIS  
Bartzelkraut.





PORTULACA  
SYLVESTRIS

Wilde burtzel.



C

## EX GALENO.

Portulaca frigida & aquea temperamento est, paucae cuiusdam austeritatis parti ceps. Proinde fluxiones reprimat, maxime biliosas & calidas, cum eo quod eas mutet, & in qualitate alteret, magnopere refrigerans. Hac ratione & aestuantes, ut si quid aliud, adiuuat, tum ventris osculo imposita, tum totis hypochondrijs, potissimum in hecticis febribus. Præterea dentium stuporem sanat, nempe quæ ab acidorum contactu asperè exiccata fuerant, leniens atque replens, utpote cum uiscosam habeat humiditatem. Similiter uero & succus eius. Itaque non foris modo impositus, sed epotus quoque refrigerat. Hoc sanè & toti herbae comestæ accidit. Quoniam autem adstringit, utiliter dysentericis editur, & in muliebri profluvio, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hæc multò quidem efficacior est herbae succus.

## EX PLINIO.

Portulacæ memorabiles usus traduntur. Sagittarum uenena, & serpentium hæ morrhoidum & presterum restringit, pro cibo sumpta, & plagis imposita extrahit. Item hyoscyamo potio, è passoque expresso succo. Cum ipsa non est, semen eius simili effectu prodest. Resistit & aquarum uitijs, capitis dolori, ulceribusque in uino tula & imposita. Reliqua ulcera cum melle comanducata sanat. Sic & infantium cerebro imponitur, umbilicoque prociduo. In epiphoris uero omnium, fronte temporibusque cum polenta. Sed ipsis oculis, è lacte & melle. Eadem, si procident, prodest, folijs tritis cum corticibus fabæ. Pustulis cum polenta & sale, & aceto ac cera. Et ulcera oris, tum moremque gingiuarum comanducata cruda sedat. Item dentium dolores. Tonsillarum ulcera succus decoctæ. Mobiles dentes stabilit comanducata. Cruditates sedat, uocemque firmat, & sitim arcet. Cervicis dolores cum Galla & Lini semine pari mensura sedat. Mammarum uitia cum melle aut cimolia creta. Salutaris & suspiriosis, semine cum melle hausto. Stomachum in acetarijs sumpta corroborat. Ardentibus febribus imponitur cum polenta. Et alias manducata refrigerat etiam intestina. Vomitiones sistit. Dysenterie & uomitis datur ex aceto, uel bibitur cum Cumitho. Tenasmis autem cocta, & comitialibus cibo uel potu prodest. Purgationibus mulierum, acetabuli mensura in sapa. Podagris calidis, cum sale illita, & sacro igni. Succus eius potus renes iuuat & uescas. Ventris animalia pellit. Ad uulnere dolores, ex oleo cum polenta imponitur. Neruorum duritias emollit. Venerem inhibet, Venerisque somnia. Prætorij uiri pater est, Hispaniæ princeps, quem scio propter impatibiles uuae morbos, radicem eius filo suspensam è collo gerere, præterquam in balneis, & ita liberatum incòmodo omni. Quinetiam inueni apud autores, caput inde litum destillationem toto anno non sentire. Oculos tamen hebetare putatur.

## DE ASPHODELO CAP. XL

## NOMINA.

Asphodillus.



Ἀσφοδελος Græcis, Asphodelus Latinis, Officinis corrupta uoce Asphodillus, Germanis Goldwurz nominatur.

## GENERA.

Duo Asphodeli genera.

Albus.

Hesiodus feminæ mentionem fecisse uidetur.

Duo esse Asphodeli genera, utcumque uno contentus sit Dioscorides, testatur Plinius libro xxi. cap. xvij. marem nimirum & fceminam. Mas propriè Albucus nominatur, fcemina uerò Hastula regia, quod scilicet dum floret prorsus regij sceptri effigiem referat, Germanicè Goldwurz. Marem depingit Dioscorides, & radicem eius acrem atque adeo cibo inutilem esse tradit. Fceminæ Theophrastus libro vii. de historia plantarum cap. xij. & Hesiodus mentionem facere uidentur, quandoquidem eius usum in cibo quotidianum fuisse scribant. Hoc enim de mare dici haud posse, radicis mirifica acrimonia facit. Galenus etiam libro secundo de ali





ASPHODELVS  
FOEMINA

Goldwurtz weiblich.



c dealiment. facult. Asphodelon foeminam cognouisse uidetur, dum scribit, Asphodeli radicem Scyllæ radici, magnitudine, figura & amaritudine quadantenus similem esse. Hæc enim de Dioscoridis Asphodelo uerè dici non possunt, cuius quidè radix non Scyllæ, sed Pæoniæ potius similis est. Deniq; non est ut foeminæ amara, sed acris. Neq; obstat quod nostra Hastula regia tantā amaritudinē, quantā ei Galenus tribuit, non habeat. Nam neq; ea quam Hesiodus suo carmine tantopere celebravit, tanta prædita fuit amaritudine: aliàs enim citra cocturā multam, cuius tamē ille non meminit, cibo quotidiano idonea esse non potuisset. Et certè ut Aron non in omnibus regionib. parem acrimoniā obtinet, ita nec Hastula regia parem amaritudinem omnibus in locis sortitur. Adeò ut dubium non sit Hesiodum de nostra Asphodelo, quæ foemina est, loquutū esse. De femina autem loquutū esse Hesiodū, cōfirmat quod alibi tradat in syluis nasci Asphodelū. Quod certè de ea quam foemina fecimus, rectè dici potest, quando raro alibi quàm in syluis nascatur. Sententiā nostram firmare uidetur Apuleius ille, qui in libro suo de herbis inscripto, seorsim & Asphodelum, & Hastulam regiam describit.

## FORMA.

*Asphodelus* Asphodelus mas folia habet Porro maiori similia. Caulem leuem in summo flo-  
*mas.* rem ferentē, Anthericū uocatum. Radices sublongas, rotundas, glandibus similes, gustu acres. Nos marem hac uice habere nō potuimus. Foemina folia habet oblonga, angusta, leuiter lenta, Plantagini minori non dissimilia: caulem leuem, in summo non unum, sed plures flores pingues retrorsum incuruos, plenos puniceis maculis, radicem itidem bulbosam, capillis Allij instar multis sub bulbo enascentibus, comatam, gustuq; glutinosam.

D

## LOCVS.

Mas non prouenit in Germania nisi in hortis culta & plantata. Foemina uero in montibus & syluis sua sponte ac copiose nascitur.

## TEMPVS.

Iunio mense florent.

## TEMPERAMENTVM.

Maris radix calida & sicca est. Foemine folia cum amara nōnihil sint & acria, itidem calida & sicca esse, quemadmodū etiam radicem, constat.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radices Albuci uim calefaciendi obtinent, urinas & menses potæ mouent. Late ris doloribus, tussibus, cōuulsionibus, ruptionibus, drachmæ pondere ex uino potè medentur. Cōmanducata astragali mensura uomitiones adiuuat. A serpente demorsis datur utiliter trium drachmarū pondere. Illinire autē oportet morsus folijs, radice, & floribus cum uino. Item ulcera sordida, & depascentia. Mammarū quoq; & testium inflammationes, tubercula & furunculos, decocta in uini fæce radice: ad recentes autē inflammationes cum polenta. Radicis succus, adiecto uetere uino dulci, myrrha & croco simul decoctis, perquam utile fit oculis medicamentū. Ad purulentas aures per se, & cum thure, melle, uino & myrrha tepesfactus prodest. In contrariam aurem per se infusus dentium dolorē mitigat. Cinis ē radice cremata illitus, alopecias capillis explet. Oleum in excauatis radicibus igni decoctum, illitum exulceratis pernionibus, & ambustis igni conducit. Dolori aurium instillatus auxiliatur. Candidam uutiliginem linteo antea perfrictam in sole, illita radix emendat. Semen & flores in uino poti, scolopendræ & scorpionum uenenis egregiè aduersantur. Alium quoque deijciunt.

## EX GALENO.

Asphodeli radix utilis est, perinde atq; Ari, Asari & Dracontij. Extergētis siquidem &



A dem & discutientis facultatis. Vstæ tamen cinis calidior, & exiccantior, magis tenuium partium, & ad discutiendum potentior efficitur, propterea & alopecias sanat. Inest itaq; ei extenuandi facultas, atq; obstructa demolienti, ueluti etiam Dracontio. Ideoq; ipsius coliculus arquatis tanquam summum præsidium exhibetur.

## EX PLINIO,

Defectis corporib. & phthisicis constat bulbos eius cum ptisana decoctos aptissimè mederi, panemq; ex his cum farina subactum saluberrimum esse. Nicander et contra serpentes & scorpiones, uel caulem uel semen, uel bulbos dedit in uino tribus drachmis: subtrauitq; somno contra hos metus. Datur & cōtra uenenata marina, & contra scolopendras terrestres. Folia quoq; illinuntur uenenatorū uulneribus ex uino. Bulbi neruis articulisq; cum polenta tusi illinuntur. Prodest & concisis ex aceto lichenas fricare. Item ulceribus putrescentib. ex aqua imponere. Mammarum quoq; & testium inflammationib. Decocti in fæce uini, oculorū epiphoris supposito linteolo medentur. Folijs in quocunq; morbo decoctis magis medici utuntur. Item ad tetra tibiæ ulceræ, rimasq; corporū quacunq; in parte, farina arefactorū. Succus quoq; ex tuis expressus, aut decoctus, utilis sit corporis dolori cum melle. Idem odorē corporis iucundū affectantibus, cum Iri arida & sale exiguo. Folia etiam supradictis medentur, & strumis, panis, ulceribus in facie, decocta cum uino. Cinis è radice alopecias emendat, & rimas pedum. Decoctæ radicis in oleo succus, perniones & ambusta. Et ad grauitatem aurium infunditur. A contraria aure in dolore dentium. Prodest & urinæ pota modicè radix, & menstruis, & lateris doloribus. Item ruptis, conuulsis, tussibus, drachmæ pondere in uino pota. Eadem & uomitiones adiuuat cōmanducata. Semine sumpto turbatur uenter. Chrysermus & Parotidas in uino decocta radice curauit. Item strumas, admixta cachry ex uino.

B Quidam aiunt, si imposita radice pars eius in fumo suspendatur, & quarta die soluat, una cum radice arefcere strumam. Sophocles ad podagras utroq; modo, cocta crudaq; usus est. Ad perniones decoctā ex oleo dedit, & suffulis felle in uino, & hydropicis. Venerem quoq; concitari cum uino & melle perunctis, aut bibentibus, tradiderunt. Xenocrates & lichenas & psoras, radice in aceto cocta tolli dicit. Item si cocta sit cum hyoscyamo & pice liquida, alarum quoq; & feminum uitia. Et capillum crispiorē fieri, raso prius capite, si radice ea fricetur. Lapidēs renū in uino decocta atq; pota eximit. Hippocrates semen eius ad impetus lienis dari censet. Iumentorū quoq; ulcera ac scabiem, radix illita, aut decoctæ succus ad pilum reducit.

## APPENDIX.

Animaduertendū facultates à Dioscoride & Galeno cōmemoratas, Albucō seu Asphodelo mari conuenire, huius enim radix gustu acris est. Quæ uero à Plinio recensentur, hæ partim mari, partim fœminæ debentur. Fœminæ, cuius radix & folia glutinosa & amara sunt, ulcera glutinandi, scabiem, rimasq; corporum, & si quæ similes sunt facultates conueniunt, quas periti methodi simplicium medicamentorū facilè discernent. Experientia etiam quotidiana testatur, huius usum esse in ulceribus malignis salutarem. Quæ autem mari sint tribuendæ, ex Dioscoride, Galeno, & gustu quiuis deprehendere poterit. Nos in transcurso tantum parum attentos monere uoluimus, ne indiscriminatim & promiscuè utriq; generi has facultates inesse putarent.





ATRIPLEX  
HORTENSIS

Molten.






ATRIPLEX  
SYLVESTRIS

Wild molten.



## NOMINA.

Atraphaxis  
quare dicta.



Chrysolachan  
non.

ΤΡΑΦΑΞΙΣ, ἡ χρυσολάχανον Græcis, Atriplex Latinis & Officinis, Germanis *Wolten* oder *Wiltten* nominat. Atraphaxis Atticis d literam in t mutare frequenter amantibus, dicta est, quod ἄσπρος αὐξάνω, id est, statim in amplitudinem adolescat. Siquidem octauo à satudie profilit, confestimque incremento proficere uidetur. Fidem celeris augmenti facit eripsum in confinio ceteris herbis alimentum. Ac ne in hortis quidem iuxta eam nasci quicquam tradunt, nisi languidum. Chrysolachanon uero, id est, aureum olus dixerunt, à luteo quem profert flore.

## GENERA.

Duo Atriplicis sunt genera, satiuua seu hortensis, & syluestris. Satiuam simpliciter Germani *Wolten* / syluestrum uero cum adiectione aliqua, *Wild molten* / oder *Ackermolten* / oder *Klein scheissmilten* nominant.

## FORMA.

Atriplex hortensis.

Syluestris.

Hortensis caulem fundit quadratum, ramis brachiatum, quibus primum flores lutei exigui, dein foliatum semen & obductum cortice promitur. Radicem unam habet in altum descendentem, non glabram, sed fibris quibusdam capillatâ. Syluestris tam luxuriosa proceritate prodit, ut quaternos saepe cubitos excedat: caule ut hortensis anguloso, ramoso, & purpurascete: folio hortensi non admodum dissimili, potissimum quod ad colorem attinet: flore luteo exiguo, semine race matim congesto, radice simplici in altum descendente, ex qua se multæ promunt.

## LOCVS.

Hortensis non nisi sata prouenit, Syluestris sua sponte nascitur. Vtraque autem d assiduo humore satiari amat.

## TEMPVS.

Vtraque Iunio & Iulio mensibus floret, deinde semen proferunt.

## TEMPERAMENTVM.

Atriplex humida in secundo ordine, frigida autem in primo. Hortensis tamen syluestri humidior frigidiorque existit.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Estur olerum modo elixum. Aluum mollit. Crudum uel coctum illitum panos discutit. Semen eius potum cum aqua mulla morbum regium sanat.

## EX GALENO.

Atriplex celeriter, ob lubricitatē, uentrem permeat. Parum autem omnino eius est, quod digerendi obtinet facultatem. Phlegmonis & phygethliis quidē incipientibus, crescentibus, & mollibus adhuc, ac ueluti feruentibus, hortensis: uigentibus uero, declinantibus, & indurescentibus comodior est syluestris. Semen eius abstergentis est facultatis, proinde ad morbum regium ex iccoris obstructione prognatum utilis est.

## EX PLINIO.

Coquit difficillimè. Addidere Dionysius & Diodes, plurimos gigni ex eo morbos, nec nisi mutata sapius aqua coquendum: stomacho contrarium esse, lentigines & papulas gignere. Hippocrates uuluarū uitijs id infundi cum Beta. Lycus Neapolitanus contra cantharidas bibendū dedit. Panos, furunculos incipientes, duritias omnes, uel cocto uel crudo illini utiliter putant. Item ignem sacrum, cum melle, aceto, nitroque. Similiter podagris. Vngues scabros detrahare dicitur sine ulcere. Sunt qui morbo regio dent semen eius cum melle, arterias & tonsillas nitro addito perfricent, aluum moueant, cocto aut per se, aut cum malua, aut lenticula concitantes uomitiones, Syluestri capillos tingunt, & ad supradicta utuntur medicina.

## EX SYMEO-





ATRACTYLIS  
MITIOR

Wilder feldsaffran.





ATRACTYLIS  
HIRSUTIOR.

Cardobenedict.



## A EX SYMEONE SETHI.

Ventrem quidem cit, prodest ad caliditatem iecoris, ac ictericis, & calidam temperaturam habentibus succurrit. Cōmodissima autem biliosis. Cum malua illita, inflammationes sedat.

## DE ATRACTYLIDE CAP. XLII

## NOMINA.



ΤΡΑΚΤΥΛΙΣ, ἡ λυγρὴ ἀγρία Græcis: Atractylis, Cnicus syluester Latinis dicitur. Atractylis autem ideo dicta, quod ea antiquæ mulieres pro fuso utebantur: ἀτρακτὸς enim fusus est Græcis, Syluestris uero Cnicus, quia Cnico urbano similis est.

Atractylis unde dicta.  
Syluestris cnicus.

## GENERA.

Syluestris Cnici seu Atractylidis, Plinio lib. xxi, cap. xv. & Theophrasto libro vi, cap. iij, autoribus, duæ sunt species. Vna mitior, & Cnico satiuo similior. Hanc propriè Græci Atractylida, Latini uero fusum agrestem, aut colum rusticam, quod eius caule rigido admodū & exili, ueteres mulieres pro colu, ut dictum est, utebantur, nominabant. Sunt qui Cartamū syluestrem appellant. Germanicè itaq; uocetur wilder feldsaffran/ ut hac ratione discernatur à Cnico, quem aliqui Cartamū, & Crocum hortensem nomināt. Altera hirsutior, caules & folia Soncho nō asperæ similia habens, quæ Officinis omnibus & uulgo Carduus benedictus nuncupatur. Germanicè Cardobenedict/ Bohnwurz/ oder gesegneter distel uocatur.

Atractylis propriè dicta.

Cartamus syluestris.

Carduus benedictus.

## FORMA.

Spina est Cnico similis, in summo autem uirgularū folia multò longiora habēs, caulem magna ex parte nudū, asperumq; quo etiam mulieres pro fuso utuntur. Capitula in cacumine aculeata, florē pallidū, radicē tenuem, inutilem. Ex qua sanè descriptione omnib. perspicuū esse putamus, spinā quam pictā exhibemus esse Atractylida, quod Cnico satiuo similis admodū sit, & in cacumine uirgularū folia quā Cnicus longiora habeat, caulem deniq; magna ex parte nudū, autumnī potissimū tempore, quo folia sua sponte decidūt, & minimè leuē, sed asperū striatūq; obtineat. Idem etiam rigidus & exilis est, ut fusi usum præbere queat. Summitati quoq; eius capitula insident spinosa, flos illi pallidus, radix tenuis: & in summa, nulla est nota quæ huic non respondeat. Carduum autem benedictum uulgò nominatum esse alteram Atractylidis speciem, ex Theophrasti & Plinij uerbis ostendi potest: hirsutus enim est, caulibus Soncheis, humi ferè reptantibus: propter sui enim mollitiem ueluti sessilis caducusq; solo procumbit, semine minuto, frequenti, amaro, & pilis barbato, quod molli lanugine operitur. Flos ei pallidus luteusq;.

Atractylis propriè dicta.

Carduus benedictus.

## LOCVS.

Mitior Atractylis in aruis & montibus, hirsutior autem in hortis iam passim prouenit.

## TEMPVS.

Prior Augusto mense apparet, eius tamen semen ante autumnum non maturefcit. Posterior citius nascitur, eius tamen semen serò etiam ad maturitatē peruenit.

## TEMPERAMENTVM.

Gustu cum amaræ sint spinæ hæ, euidentissimū est calido & sicco temperamento esse præditas, id quod ex earundem etiam facultatibus colligi potest.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Atractylidis folia, coma & semen trita cum pipere uinoq; pota, contra scorpionū ictus profunt. Sunt qui dicant à scorpionibus percussos quandiu teneant eam herbam, non sentire dolorem, deposita uero, dolore affici.

## EX GALENO.

Atractylis aut Cnicus syluestris. Hæc planta ex spinarū est genere. Facultatē habet desiccandi, & modicè digerendi.





ANGELICA  
SATIVA.

Sam angelick.





ANGELICA  
SYLVESTRIS.

Wild angelick.




## APPENDIX.

Prima spina in sanandis ulceribus & fistulis diuturnis efficacissima est. Altera quam Cardum benedictum uocāt, obstructions interiorū uiscerum tollit, urinā mouet, calculum frangit, ulcera, potissimū pulmonis, sanat. Percussis à feris uenenatis medetur. Negant etiā pestis experiri contagia, qui aut cum cibo, uel potu prae sumperit. Iam quoq; correptis magno fore remedio sibi uulgus persuasit. Ex quibus etiam omnibus sit perspicuū, easdem quas ueteres Atractyli tribuerūt, utranq; spinam habere facultates. Item herbam quam Cardum benedictum uocant, contra serpentum & scorpionū morsus ualere omnibus in confesso est: quam sanè facultatem cum Atractyli etiam assignet Dioscorides, cōsequitur ab eadem diuersam nō esse. Recentiores Cardum benedictum cōtra capitis uehementissimos dolores, uertiginem, memoriam amissam, in cibo aut potu sumptum ualere tradunt. Item ad putrescentia ulcera, mammarum potissimū, si in puluerem redactus inspergatur.

## DE ANGELICA CAP. XLIII.

## NOMINA.

Angelica nō est  
Smyrnion, neq;  
Silphion.



Sancti spiritus  
radix cur dicta.

VNQVID ueteribus cognita fuerit hæc herba, & quo nomine appellata sit, nondū scire licuit. Neq; enim Smyrnion est, quod scilicet umbellam Anethi & semen rotundum, aliāq; multa quæ descriptio requirit, nō habeat. Silphion etiam esse haud poterit, quod folia Apñ habere minimè deprehendatur. Recentiores autem uno ore omnes Angelicam, & Sancti spiritus radicem, à suauissimo eius radicle odore, quem spirat: aut ab immensa contra uenena facultate, appellant. Germanis Angelick / oder des Heiligen geysts wurz, oder der Brustwurz uocatur.

## GENERA.

Duo eius herbæ inueniuntur genera. Vna enim mitior est, cuius quidem radix ualde odorata, à Germanis sam Angelick nominatur. Altera syluestris, eius radix suauis odore restituitur, & à Germanis wilde Angelick nominatur.

## FORMA.

Caulem profert duūm cubitorum, cōcauum: folia oblonga, per ambitum serrata, subnigra: flores in purpura candidos, semen latum, foliaceum: radicem crassam & multam, foris nigricantem, intus candidam.

## LOCVS.

Mitior in hortis plantata prouenit, & in montosis etiam nonnullis locis, perinde atque syluestris.

## TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

## TEMPERAMENTVM.

Calefacientem & desiccatoriam uim in tertio ordine ei assignant herbarij recentiores.

## VIRES.

Aperit, extenuat, discutit, ut recentiores perhibent. Vnicè uenenis aduersatur. Pestilentia populatim fauientis arcet cōtagia. Corpora à lue pestifera uindicat, si tantū, ut affirmāt, in ore teneatur. Per hyemem ciceris magnitudinē cum uino, per estatē ex stillatitio rosarū liquore sumpsisse satis est. Nec sensurū eo die contagionē pollicentē, quo quis deuorarit: nam urina & sudore uenenū abigit. Lentitiā pituitæ digerit, quapropter tussi, quam frigus attulerit, medet. Crassa quæ in thorace coierint, discutit. Herba ipsa in uino & aqua cocta uulnera interna glutinat. Cōcretum sanguinē resoluit, stomachū esu corroborat, Cor recreat, Pituitā uentriculi deiecit, fastidia





LOLIVM

Ratten.

L 4



c fastidia ciborum discutit, & elanguescentē inuitat appetentiam. Rabiosi canis morfu, aut serpentis ictu liberat, si contrita cum ruta & melle folia indantur, dein cocta in uino bibantur. Libidinem extinguit ore ieiuno sumpta. Lassitudines reficit, thoracem expurgat. Supra febricitantis caput imposita, fertur ad se feruorē elicere. Valere contra falcinationes adfirmant, si quis eam secum gestarit.

## DE AER A CAP XLIII

## NOMINA.

Officinarum  
error.



ῬῬΑ, ῬῬΑ, ῬῬΑ, ῬῬΑ Græcis: Lolium Latinis dicitur. Officinæ nōnulae, non sine magno errore, pro Melanthio seu Nigella utuntur, ut non temerè etiam Pseudomelanthion dici queat. Germanis Ratten / oder Rönnegele appellatur.

## FORMA.

Pseudomelan-  
thion est Lo-  
lium.

Folio constat angusto, Theophrasto lib. viij. de plantarū historia, cap. viij. teste, pingui & piloso, flore subpurpureo, semine exili in siliqua hispida, uel ut Plinius ait, in cortice aculeato. Ex qua siquidem descriptione satis perspicuum fit omnibus, Pseudomelanthion hoc esse Lolium: folia nancq; Porri habet, oblonga, hirsuta, florem purpureū, semen in pilosa, longa, angulata, ac per interualla striata siliqua. Et ut paucis singula complectar, hordeo, cuius ut reliquarū frugum pestis & uitium est, tota effigie non dissimile est.

## LOCVS.

Non solum in triticea & hordeacea, sed in omni ferè alia segete per se prouenit. Frugum acerba pestis, ideoq; à Vergilio infelix appellatum.

D

## TEMPVS.

Iunio mense floret, & subinde semen profert.

## TEMPERAMENTVM.

Desiccat & calfacit efficaciter, ut propinquum sit acribus magis quàm Iris: sed non est perinde ut illa tenuium partium, uerum multum abest. Secundum hoc ponat ipsum quispiam in principio tertij ordinis excalescentium, in fine uero secundi exiccantium.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Lolium molitum nomas, putredines, & gangrænas cum raphanis & sale illitum compescit. Feras impetigines, & lepras cum sulphure uiuo & aceto sanat. Strumas quoque cum fimo columbino & lini semine in uino decoctum discutit. Quæ agrè maturantur rumpit. Decoctū ex aqua mulsa & illitum, ischiadicis prodest. Si cum polenta, aut myrrha, aut croco, aut thure suffitum, conceptiones adiuuat.

## EX PLINIO.

Lolium molitum ex aceto coctum impositumq; sanat impetigines, celerius quo sæpius mutatum est. Medetur & podagris, alijsq; doloribus cum oxymelite. Curatio hæc à cæteris differt. Aceti sextario uno dilui mellis uncias duas iustum est: ita temperatis sextarijs tribus, decocta farina Lolij sextarijs duobus usque ad crassitudinem, calidumq; ipsum imponi dolentibus membris. Eadem farina extrahit ossa fracta. Magis etiam cæteris purgat ulcera uetera, & gangrænas. Cum raphano & sale & aceto lichenas. Lepras cum sulphure uiuo. Et capitis dolores cum adipe anserino imposita fronti. Strumas & panos concoquit cum fimo columbino, & lini semine decoctum in uino.

## APPENDIX.

Iam cōmemoratas facultates huic etiam herbæ, quā Germani Ratten nomināt, recentio.





ASCLEPIAS

Schwalbenwurz.



c recentiores tribuunt. Mirificè enim hanc in sanandis impetiginibus, alijsq; scabiei generibus cōmendant. Item in uulneribus glutinandis, ac fistulis curandis, compescendoq; sanguine, eius esse usum tradunt, ut hinc etiam liqueat hanc ipsam à Lolio non esse diuersam.

EX SYMEONE SETHI.

Vim æqualem Iridi obtinet.

## DE ASCLEPIADE CAP. XLV

### NOMINA.

Asclepias unde dicta.

Hirundinaria.

Vincetoxicum.



ΣΚΛΗΡΙΑΣ Græcis, Asclepias Latinis, herbarijs Hirundinaria, Officinis Vincetoxicum, Germanis Schwalbenwurz appellatur. Asclepias autem ab Aesculapio antiquo medicine autore nominata est. Hirundinaria uerò à filiquis quas producit, quæ dehiscētes plumosum semen ostendunt, atque adeò hirundinis effigiem referūt. Vincetoxicū, uel rectius ~~νικητοξικόν~~ haud dubiè dicta est, quod illi insignis aduersus uenena uis sit, ut paulò post fusius docebimus.

### FORMA.

D Ramulos profert longos, in quibus folia longa Hederæ similia. Radices numerosas, tenues, odoratas. Flores grauiter olentes. Semē Securidacæ seu Hedyfari. Ex qua deliniatione nemini non perspicuū fit Vincetoxicū appellatā herbā, esse Asclepiada. Fruticosa siquidē herba est, caulem obtinens rotundū, leuem, tenuem, ac ferè iunceū, ramulis longis, folio hederaceo, sed oblongiori, in uiridi nigricante, florib. exiguis, candidis, aut uerius in albo palleſcentibus, grauiter odoratis, ex quibus filiquæ oblongæ fiunt, quæ dehiscētes semen plumosum Securidacæ simile, hoc est, rufum & latum ostendunt, radicibus multis, exiguis, tenuibus, & odoratis, adeò ut nulla sit prorsus nota quæ illi non respondeat aptissimè. His accedunt locus natalis & facultates, quæ singula cum Asclepiade illi communia sunt, quemadmodū ex ijs quæ statim subiiciemus manifestissimum fiet.

### LOCVS.

Prouenit in montibus asperis, altis ac arenosis. Copiosissimè autem nascitur in monte haud procul à Tubinga sito, in quo olim arx posita fuisse fertur.

### TEMPVS.

Augusto mense floribus abundat, ac subinde semina in folliculis oblongis, formam hirundinis cum dehiscunt referentibus, profert.

### TEMPERAMENTVM.

Asclepias, Paulo teste, calida, sicca, & tenuis substantiæ est. Quo sanè temperamento Hirundinaria etiam prædita existit, amara siquidē & parum glutinosa eius est radix, folia uero aliquam præ se ferunt adstrictionem: ut iterum euidenter appareat, Hirundinariam esse Asclepiada.

### VIRES.

### EX DIOSCORIDE.

Radices cum uino potæ, torminibus, & uenenatorū morſibus subueniunt. Folia uero illita maleficis in mammis & utero uitij opitulantur.

### EX PAVLO.

Torminibus in uino pota competit. Illita uero uenenatorum morſibus, & malignis mammarum & uteri uitij succurrit.

### EX PLINIO.

Radices torminibus medentur, & contra serpentium ictus non solum pota, sed etiam illita profunt.

### APPENDIX.

Recentiores radice eius magna efficacia ad mensū prouocationē utuntur, & ad rabidi





APIOS  
Erdnüssen.



c rabidi canis morsum, uenenisq̃ potenter resistere affirmāt, unde etiam haud temere *Victrix* toxici ab iisdem appellata est. Hydropicis etiam radicem in uino maceratam & subinde coctam, mirificè auxiliari tradūt. Flores præterea foliaq̃ siccata, mox trita, uulneribus utiliter inspergi aiunt. Sordida etiam ulcera purgare, & ad cicatricē perducere, genitaliumq̃ uitij & rupturis egregiè mederi docent. Quæ in uniuersum omnes facultates cum ijs quas *Asclepias* obrinet pulchrè quadrant, ut eandem esse *Hirundinariam* uocatam herbam, nullus deinceps dubitare debeat.

## DE APIO CAP. XLVI

## NOMINA

*Apios cur dicta.*

*Ischas.*

*Chamæbalanos.*



ΠΙΟΖ, ἰσχας, ἡ χαμαίβαλλος Græcis: *Apios*, *Raphanus sylvestris* Latinis dicitur. Officinis incognita. Germanis *Erduß* / *Erctelen* / *Erdselgen* / & *Ermandel* appellatur. *Apion* uero dixerunt Græci, quod radicis extremum in pyri formam turbinatur. Eadem etiam ratione *ischas* & *chamæbalanos* ab iisdem nominata est, quod in ficus, uel glandis effigiem radicis extremū turbinetur. Quapropter non ineptè Latinis etiam *glans* aut *ficus*, seu *carica sylvestris* nominabitur.

## FORMA.

Ramulos duos aut tres iunceos, tenues, rubentesq̃ profert, qui supra terram parum se attollunt. Folia rutæ similia, longiora tamen, & uirentia. Semen exiguū. Radicem *Asphodelo* similem, & ad pyri figuram accedentem, rotundiorē tamen, & liquore plenam, intus candidam, foris nigro cortice tectam. Hæc *Dioscorides*. Alij adijciunt *Apion* habere tenues capreolos, florem *Piso* nō dissimilem, sed longè minorem. Quæ singula satis declarāt herbam cuius picturam exhibemus, esse *Apion*: ramulos enim magna ex parte duos, uel ternos, imò ut *Theophrastus* ait quaternos, & interdum plures emittit, iunceos, tenuesq̃, & infima parte rubentes, qui supra terram parum se extollunt. Folia quoque Rutæ habet, at longiora & uirentia. Semen etiam exiguum. Radicem denique *Asphodelo* mari similem, & ad pyri effigiem accedentem: quod tamen nō de tota radice, quæ longissima est & tenuis, intelligendum uenit, sed de extremis eiusdem, hoc est, nucibus seu glandibus ab ea dependentibus, pyri aut ficus formam habentibus, qualibus etiam *Pæoniæ* foeminae radix assimilatur. Succosa quoq̃ radix est, intusq̃ candida. Quibus omnib. accedunt flores *Piso* similes, & mirificè odorati, minores tamen: necnon capreoli tenues. Cōueniunt etiam uires, ut ex sequentibus patebit, ita ut prorsus nulla sit nota quæ reclamare uideatur.

## LOCVS.

Prouenit in frumentaceis agris, hordeaceis potissimū, tritici & zeæ, quos interdum sues, ductæ cupiditate eius radicis, seu rectius nucum ex radice dependentiū, prorsus euertunt. Atque hinc est quod panis porcinus à quibusdam nominetur.

*Panis porcinus cur dictus.*

## TEMPVS.

Floribus abundat odoratis admodum Iunio mense.

## TEMPERAMENTVM.

*Apios* temperatura calida est & sicca mediocriter, id quod ex gustu facilè apprehenditur.

## VIREs.

## EX DIOSCORIDE.

Pars radicis superior sumpta, uomitione bilem pituitamq̃ extrahit. Inferior per aluum. Tota uero utrinque purgationes mouet. Succus eius sesquiboli pondere haustus, utraque parte, hoc est, suprâ & infrâ purgat. Cum uero liquorem colligere uolueris, tundito radices, coniectisq̃ in craterem aqua plenum misceto, tum pena collectum qui supernabit liquorem siccato.

EX PLT.



## EX PLINIO.

Succus purgat utraque parte sesquibolo in aqua mulsa. Sic & hydropicis datur acetabuli mensura.

## APPENDIX.

Experientia testatur nūces has nauseam atque ad vomitionem ciere, si quis illis uescatur.

## DE ASTERE ATTICO CAP. XLVII

## NOMINA.



ΣΤΗΡ ἁλὺς, βυβωνίος Græcis: Aster atticus, Inguinalis Latinis dicitur. *Inguinalis.*

Officinis ignota herba. Germanis Sterntraut cōmodè appellari potest. Asteris autem nomen, non à foliorum in caulibus, sed in floribus *Aster unde dicta.* potius figura & situ, accepit. Siquidem foliorum in huius herbe flore numerus & forma, stellam præ se ferunt, uel ut Plinius ait, capitula per ambitum diuisa folijs pusillis, stellæ modo radiata sunt. Errant itaque qui singula folia in caulibus stellæ formam representare putant. Bubonium & Inguinalis, quod inguinum *Inguinalis quare appellata.* præsentaneum sit remedium, dicta est.

## FORMA.

Cauliculus lignosus, purpureū & luteum in summo florem habens, ueluti Chamæmeli capitulum, undique per orbem incisuris diuisum, foliolis stellæ similibus. Quæ uero circa caulem sunt folia, oblonga & densa hirsutæ. Ex qua quidem deliniatione omnibus perspicuum sit, herbam cuius picturam exhibemus esse Asters atticum. Nam caulis eius lignosus est, folijs uestitus oblongis & densis, in cacumine flos illi purpureus & luteus, stellæ modo radiatus, qui subinde in pappos abit: radix fibris multis capillata.

## LOCVS.

Nascitur in collibus, montibus altis, & syluis.

## TEMPVS.

Augusto mense ut plurimum floret, durantiq; in magnam autumnii partem eius flores.

## TEMPERAMENTVM.

Mixtæ est potentiæ, uti rosa: refrigerat enim, non tamen uehementer, & digerit atque exiccat, quod scilicet illi amara insit qualitas.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Aestuanti stomacho illita cōfert. Succurrit etiam oculorum inflammationibus, bubonibus, & procidenti sedi. Tradunt partem in flore purpuream, si bibatur ex aqua, angina correptis, & puerorum comitialibus opitulari. Recens inguinum inflammationibus illita prodest. Siccæ sinistra manu dolentis decerpta, inguini adalligata doloribus liberat.

## EX GALENO.

Non tantum illitum, sed etiam suspensum bubonas sanare creditur. Habet uero quiddam etiam digerens, ut mixtæ sit facultatis, uerum id non adstringit.

## EX PLINIO.

Bibitur aduersus serpentes. Sed ad inguinum medicinam sinistra manu decerpi iubent, & iuxta cinctus alligari. Prodest & coxendicis dolori adalligata.

M DE AGRO-





ASTER  
ATTICVS.

Sternkraut.



## NOMINA.



ΓΡΟΣΤΙΣ Græcis, Gramen Latinis, Germanis Graß appellatur. Gramen uero dictum est, quod geniculatis internodijs mirifice serpat, à gra *Gramen unde dictum.* diendo, uel à gignendi fecunditate: siquidē crebrò ab ijs nouas spargit radices.

## FORMA.

Geniculatis per terram serpit ramulis, & ab ijs dulces geniculatasq; radices spargit. Folia eius acuminata, dura, & ut parue arundinis lata, quæ iumenta bouesq; pascunt. Ex quibus uerbis planum fit omnibus, plantam hanc, cuius picturā damus, esse ueri graminis genus: geniculatis enim ramulis per terrā serpit, & ab ijs dulces, geniculatas, & exiguas admodum ac tenues radices spargit. E dodrantalibus etiam ramulis circa unumquemq; geniculū bina folia acuminata, dura ac lata emittit. Floribus deniq; ad gramē Parnasi accedere uidetur: candidi enim sunt, & quinis distincti folijs, & his ipsis dissectis: quibus decidentibus folliculi rotundi lini instar, semine pleni exiguo, ut Parnasi gramen, prodeunt. Adeò ut nemo sit qui non uideat illi per omnia graminis respondere notas. Quare reprehensione digni sunt, qui Eurasiā esse putant. *Error quorundā septisariorum.*

## LOCVS.

Pasim nascitur in umbrosis locis, & dumetis.

## TEMPVS.

In fine ferè Aprilis floribus suis candidis & elegantibus ornatur.

## TEMPERAMENTVM.

Radix graminis mediocriter frigida & sicca est, mordacitatē quandam exiguam, & partium tenuitatem obtinens. Herba uero ipsa in primo quidem excessu refrigerat, in humiditate uero & siccitate moderata. Semen alibi quidem imbecillum est, in Parnaso uero desiccatorium, & tenuium partium & subacerbum.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Graminis radix trita & illita uulnera conglutinat. Decoctum eius in potu torminibus medetur, & urinæ difficultatibus. Calculosa etiam uesicæ excrementa cōminuit.

## EX GALENO.

Radix cruenta ulcera glutinat. Cæterū mordacitas & tenuitas quæ radici inest, exigua est quidem, sed interdum tamen frangere lapides assolet, si quis ipsam decoquens bibat. Semen autem alterius quidem imbecillum est, eius uero quod in Parnaso nascitur, urinam ciet, & fluxus uentris & stomachi resiccat.

## EX PAVLO.

Gramen Parnasi maximè utile est, siccatur, modicè refrigerat, tenuiū partiū, & subacerbum, eoq; uulnera cruenta glutinat, & decoctū eius uesicæ calculos confringit.

## EX PLINIO.

Decoctum gramen uulnera conglutinat, quod & ipsa herba tusa præstat: tuerq; & ab inflammationib; placat. Decocto adijcitur uinum ac mel: ab aliquibus & thuris, & piperis, & myrrhæ tertiæ portiones. Rursusq; coquitur in æreo uase ad dentiū dolores & epiphoras. Radix decocta in uino, torminibus medetur, & urinæ difficultatibus, ulceribusq; uesicæ. Calculos frangit. Semen uehementius urinā impellit. Aluū uomitionesq; sistit. Priuatim autē draconū morsibus auxiliatur. Sunt qui genicula nouē uel unius, uel è duabus tribusue herbis, ad hunc articulorū numerū inuolui lana succida nigra iubeāt, ad remedia strumę panorumue. Ieiunū debere esse qui colligat. Ita ire in domū absentis cui medeat, superuenienti q; ter dicere, Ieiunio ieiunū medicamentū dare, atq; ita alligare, triduoq; id facere. Quod è graminū genere septē internodia habet, efficacissimè capiti cōtra dolores adalligat. Quidā propter uesicæ cruciatus decoctū ex uino gramē ad dimidias è balneis bibi iubent.





GRAMEN.  
Gras.



## NOMINA.



ΑΟΗ Græcis, Aloë Latinis appellatur. Officinæ ueterem appellationē retinuerunt. Germani destituti peculiari nomendatura, pariter Latinis Aloën uocant. Sunt qui hanc a crassis folijs, & similitudine quam cum Semperuiuo habet, Semperuiuum marinum nomenent.

Semperuiuum  
marinum.

## FORMA.

Scyllæ folium habet Aloë, crassum, pingue, modicè latum, rotundū, repandumq̃. Folia utrinq̃ gerunt ex obliquis aculeos raros, & breues. Caulem profert Antherico similem, florem album, semen Asphodelo simile. Graui est tota herba odore, & gustu amarissima. Radice una, pali in terram adacti specie. Nostra pictura non nisi radicem & folia ob oculos ponit, reliqua hoc tempore habere non potuimus. Dabimus autem operam, modò Deo sic uisum fuerit, ut aliquando integræ plantę picturam studiosis exhibere liceat.

## LOCVS.

Nascitur copiosissima in India, præpinguisq̃, unde succus quoq̃ defertur. Prouenit etiam in Arabia Asiãq̃, & in maritimis aliquot locis, & insulis, ut in Andro. Nunc in aliquot hortis Germaniæ nostræ plantatur.

## TEMPVS.

Neque florem neque semen in stirpe nobis uidere contigit, quare de his quo nimirum proueniant tempore nihil certi monstrare possumus.

## TEMPERAMENTVM.

Aloë calefacientiū est primi ordinis intensi, aut secundi remissi, tertij autem exiccantium.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Duo sunt succi concreti genera. Vnum arenosum, quod sedimentū purissimæ aloës uidetur (hoc officinis Caballinū uocatur.) Alterum iecinoris modo coactum (Succotrinū barbari appellāt.) Eligito purā quæ nihil doli sensit, sine calculis, splendentem, subruffam, friabile, iecinoris modo concretā, facile liquefcentē, eximie amaritudinis. Reprobato autem nigram, & fractu contumacē. Est aloë uis adstringere, somnum cōciliare, exiccare, corpora densare, aluum soluere, & stomachū purgare. Pondere cochleariū duorū in aqua frigida, aut tepida pota, sanguinis excretaiones sistit. Regium morbū purgat tribus obolis ex aqua, aut drachmę pondere in potu. Deuorata cum resina, aut cum aqua, aut cocto melle excepta, aluū soluit. Trium drachmarū pondere perfectē purgat. Mixta alijs purgatorijs medicamentis, stomacho minus noxia ea reddit. Siccata & insparfa, uulnera glutinat, & ulcera ad cicatricem perducit, compescitq̃. Priuatim autem exulceratis genitalib. medetur, & rupta infantium præputia agglutinat. Condylomata, rimasq̃ sedis cum passo mixta sanat. Sanguinis eruptiones ex hæmorrhoidibus factas compescit. Digitorum reduuias ad cicatricem perducit. Liuios & sugillata cum melle delet. Palpebrarū scabrities, angulorumq̃ prurigines lenit. Dolorem capitis sedat temporibus & fronti ex aceto cum rosaceo inuncta. Capillos fluentes cum uino compescit. Tonsillis, gingiuis, & omnibus oris ulcerib. ex melle & uino prodest. Torretur oculorum medicamentis in testa pura & candente, rudiculāq̃ subinde uersatur donec equaliter torreatur. Lauatur ut quod est arenosissimum subsidat, tanquam inuile, & leue & pinguisimum assumatur.

## EX GALENO.

Hæc herba non admodum apud nos prouenit: & quæ in magna nascitur Syria aquosior est, & facultatis imbecillioris: attamen usque adeo desiccare potest, ut uulnera conglutinet. At in regionib. calidioribus, qualis est Cœlesyria & Arabia, multo est melior. Optima uero Indica, cuius liquor est id quod ad nos importatur medicamentū cognominatū aloë, ad plurimas res propter siccitatē mordicationis expertem utile. Est autem nō simplicis naturæ, sed, ut indicio est gustus, adstringit simul





ALOE  
Aloen.



A & amara est. Adstringit quidem mediocriter, sed uehementer amara est. Subducit & uentrem, utpote ex numero medicamentorum quæ Græci ab excernendo stercore uocant *inleptosoluxæ*. Verum & ipsius facultatis misturam attestantur particularia eius opera: nam & gratum stomacho est medicamen, ut si quid aliud, & sinus glutinat. Sanat & ulcera quæ ægrè ad cicatricem duci possunt, & maxime quæ in ano sunt & pudendo. Iuuat etiam eorum inflammationes aqua liquata, & uulnera ad eundem modum glutinat. Congruit similiter utenti & ad inflammationes in ore, naribus, & oculis. In summa, repellere & discutere simul potest, cum hoc ut paulum ex tergeat, quantum uidelicet ulceribus puris non sit molestum.

## EX PLINIO.

Natura Aloës spissare, densare, & leuiter calfacere. Vtus in multis & principalis, aluum soluere, cum penè sit sola medicamentorum quæ per se id præstant. Confirmat etiam stomachum, adeò ut non infestet ulla uis contraria. Bibitur drachma. Ad stomachi uerò dissolutionem, in duobus cyathis aquæ tepidæ uel frigidæ, cochlearis mensura, bis terue in die ex interuallis, ut res exigit. Purgationis etiam causa plurimum tribus drachmis. Efficacior, si pota ea sumatur cibus. Capillum fluentem continet cum uino austero, capite in sole contra capillum peruncto. Dolorem capitis sedat, temporibus & fronti imposita, ex aceto & rosaceo. Dilutiorque infusa, oculorum uitia omnia sanari ea conuenit. Priuatim prurigines & scabiem genarum, item insignita ac liuida, illita cum melle, maxime Pontico: tonsillas, gingiuas, & omnia oris ulcera. Sanguinis excreationes, si modicæ sint, drachmæ pondere ex aqua, si minus, ex aceto pota. Vulnerum quoque sanguinem, & undecumque fluentem sistit per se, uel ex aceto. Aliàs etiam est uulneribus utilisissima, ad cicatricem perducens. Eadem inspergit exulceratis genitalibus, uirorum cœdylomatis, rimisque sedis, aliàs ex uino, aliàs ex passo, aliàs sicca per se, ut exigit mitiganda curatio, aut coercenda. Hæmorrhoidum quoque abundantiam leniter sistit. Dysenterię infunditur. Et si difficilius concoquantur cibi, bibitur à cœna modico interuallo. Et in regio morbo tribus obolis ex aqua. Deuoratur pilulæ cum mellis decocto, aut resina terebinthina, ad purganda interiora. Digitorum pterygia tollit. Oculorum medicamentis lauatur, ut quod sit arenosissimum subsidat. Aut corretur in testa, pennaque subinde uersatur, ut possit æqualiter torreretur.

## DE BECHIO CAP. L.

## NOMINA.



BECHION Græcis, Latinis Tussilago aut Farsaria dicitur. Sic uocata quod *Βηχας*, hoc est, tusses iuuare credita sit. Herbarijs & officinis hodie Ungula caballina appellatur. Germanis *Rosshüb* / oder *Brandlatrich* / quod scilicet equinæ ungulæ persimilis sit, & ambustis medeatur.

Bechion unde dictum.

Ungula caballina.

## FORMA.

Folia hederæ habet, sed maiora, sex aut septem à radice prodeuntia, supernè uirentia, inferiore autem sui parte albida, plures angulos habentia. Caulem palmum altum. Florè uere prodeuntem pallidum, quem unam cum caule cœfestim abiicit. Inde non nulli existimauerunt sine caule hanc herbam nasci. Radix illi tenuis est, quæ minimè utilis esse potest, quandoquidè illius, ut ex sequentibus patebit, in rumpendis thoracis abscessibus, & eijciendo ex utero emortuo foetu usus sit. Subesse itaque errorè in Dioscoride manifestissimum est, ubi radicem Tussilaginis *αγανσας* esse inquit, quem tamen nemo interpretum, quod sciam, animaduertit. Hoc etiam adijciendum duxi pro confirmanda Dioscoridis descriptione, & confutanda erronea quorundam sententia, flores Tussilaginis esse fugacissimos: ipsi enim enatis breui uigor uitæque durat, longissimaque mora triduum aut quatrimum, post quod ilico tempus flaccescen-

Bechion non nascitur sine flore.

Dioscoridis locum emendatum.





TVSSILAGO

Koschub.



**A**tes in pappos euanescent, & caduci marcent, ita ut non nisi uere sese forte fortuna ferant obuiam, quo potissimum tempore flos & caulis sine folijs uident. Quapropter qui herbam ipsam hoc tempore non cōspexerunt, & tam subitam floris & caulis iacturam haud animaduenterūt, sine utriusq; nasci crediderunt. Nos tamen & florem & caulem sepius oculis contemplati sumus, ideoq; ut utriusq; pictura accederet diligenter curauimus.

## LOCVS.

Nascitur prope fontes, & in aquosis locis.

## TEMPVS.

Flores uere, & in Aprili colliguntur ab hoc enim tempore, ut paulò antè diximus, nusquam apparent. Folia & radix tota aestate durant.

## TEMPERAMENTVM.

Folia Tusilaginis uirentia aqueæ substantiæ admistionem habent, ut hac ratione frigida & humida dici possint. Sicca uero acriora sunt, ideoq; calida.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Tusilaginis folia trita cum melle illita, ignibus sacris, & inflammationibus cunctis medentur. Eadem sicca incensa, eos qui sicca tussi & orthopnoea infestantur, quum fumum per infundibulum hianti suscipiunt ore, sanant. Abscessus thoracis rumpunt. Eadem radix suffita potest, foetumq; emortuum in aqua mulsa cocta & pota eiicit.

## EX GALENO.

**B**echium ideo nuncupatum est, quod *βήχης*, id est, tusses & orthopnoeas iuuare creditum sit, si quis uidelicet folia arida aut radicem in prunis accendens, ascendentem inde fuliginē inspiratu attrahat. Est autem modicè acris, ut sine molestia noxae omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sanè folia uiridia partes cruda inflammatione obsessas illitu extrinsecus adiuuant, propter aquæ humiditatis admistionem, qua omnia uirentia tenera, alia plus, alia minus participant. Nam sicca Bechij folia acriora sunt, quàm ut inflammatione laborantibus partibus conueniant.

## EX PLINIO.

Tusilaginis aride cum radice fumus per arundinem haustus aut deuoratus, ueterem sanare dicitur tussim: sed & in singulos haustus passum gustandum est.

## DE BUGLOSSO CAP. LI.

## NOMINA.

**B**ΟΥΛΑΝΣΣΟΝ Græcis: Buglossum, Bubula lingua, Bouis lingua Latinis, quod scilicet eius folia bubulæ linguae similia sint: officinis & herbarijs Borrago, Germanis *Burzetsh* dicitur. Alia uero herba est quæ *Borago* hodie Buglossa uulgò nominatur, ut suo loco indicabimus.

## FORMA.

Buglossum Verbasco simile est, folium habens in terram depresso, asperum, nigrius, bubulæ lingue non dissimile. Florem cœruleum, speciosum. Quæ nimirum descriptio ita hodie uocata Borragini herbae quadrat, ut nemo non, nisi talpa cæcior sit, ueterum esse Buglossum uideat. Qui tamen eius rei plura argumenta desiderat, ea quæ libro primo, cap. xxxiij. nostrorum Paradoxorū produximus, legat, & nihil puto deinceps dubitabit.

## LOCVS.

Nascitur in planis & sabulosis locis. Passim etiam hodie in hortis seritur, ob id olitoribus optimè cognitum.

## TEMPVS.

Carpitur Iulio mense.

## TEMPERA-





BVGLOSSVM

Borragen.



A

Buglossum calidi humidique temperamenti est.

VIREB. EX DIOSCORIDE.

Folium Buglossi in uinum deiectum animi letitiam efficere creditur. Aiunt quæ tres caules emittat si cum radicibus & semine tota teratur, & in potu detur, contra tertianos rigores prodesse: ad quartanas uero quæ quatuor. Horum autem decoctio in uino fiat. Herbam abscessibus etiam utilem esse ferunt.

EX GALENO.

Buglossum uinis iniectum lætitiæ & hilaritatis causa esse creditum est. Sed & ijs qui ob faucium asperitatem tussunt, in melicrato coctum conuenit.

EX PLINIO.

Buglossum præcipuum quod in uinum deiecta, animi uoluptates auget, & uocatur Euphrosynum. Buglossum inarescente, si quis medullam e caule eximat, dicatque ad quem liberandum febre id faciat, & alliget ei septem folia ante accessione, aiunt à febre liberari.

EX SYMEONE SETHI.

Buglossum urinam cit, & sitim sedat. Caules eius cocti & crudi comesti iccoris affectibus profunt. A uiatoribus ex eo conficitur zupapion, & est utile.

## DE BUPHTHALMO CAP. LII.

NOMINA.

**B**ΟΥΘΑΛΜΟΝ Græcè, Buphthalmū Latine. Hodie oculus bouis aut uaccæ, & Cotula non foetida herbarijs uocatur. Germanis Rindsaug/oder Rindg. Buphthalmum autem non alia ratione dixerunt ueteres, quàm quod eius flores oculi imitentur formam, & bouum potissimū oculis similes sint. Germanicè etiam Rindill/hoc est, uaccinum anethum dicitur, quod scilicet uerum Anethum eius folia referre uideantur.

Cotula non foetida.  
Buphthalmum  
est dictum.  
Anethum uaccinum.

FORMA.

Buphthalmum caulem tenerum emittit, folia sceniculo similia, flores luteos Anthemide maiores, oculorum figura, unde & nomen traxit. Hæ siquidem notæ adambulsum conueniunt herbæ quam uulgus herbariorum Cotulam non foetidam uocant: caules siquidem eius teneri, folia sceniculo similia. Nec te moueat quod à Dioscoride Buphthalmo lutei flores tribuuntur, Cotulæ autem non foetide albi sint: ad discum enim mediumue Dioscorides respexit, quod luteum est, non ad ambitum, in quo folia radiata candida, ut in Chamæmelo, existunt. Quod dicimus, confirmant quæ Galenus lib. vi. de simpl. medic. facul. in hunc modum scribit: Buphthalmi, inquiens, flores colore Anthemidis floribus simillimi sunt, sed multò maiores. Serapion quoque florem eius magis luteum flore Chamæmeli esse ait. Si itaque Anthemidis floribus simillimi sunt, nec nisi sola magnitudine differunt, & Anthemidis propriè dictæ flores in medio lutei, & per ambitum candidi existunt, necesse est ut Buphthalmi etiam flores tales sint, ut scilicet candida illorum folia, luteum medium cingant. Quid multa? Buphthalmi flores ab Anthemidis floribus nō nisi sola magnitudine differunt: grandiores enim Buphthalmi flores quàm Anthemidis conspiciuntur, reliqua facie quam simillimi. Quod igitur ad colorem attinet, in nullo uariant. Iam dictis accedit, quod Serapionis interpres sub Cotulæ nomine Buphthalmum deliniat. Denique congenerem esse planè herbam Buphthalmum cum Anthemide Dioscoridis tractandi ordo abunde docet, quum constet illum tres herbas sibi admodum similes, Chamæmelū nempe, Partheniū, & Buphthalmū, uno in loco describere. Vnde iterum palnū fit Buphthalmū esse Cotulā non foetidam, quod scilicet Chamæmelo prorsus similis sit, excepto duntaxat flore, qui in illa maior est.

Obiectionis solutio.

LOCVS.





BVPHTHALMVM

Rindsaug.



A

## LOCVS.

In campis & circa oppida nascitur.

## TEMPVS.

Carpitur Iulio Augustoq; mensibus, & durat etiam usq; ad autumnii medium.

## TEMPERAMENTVM.

Flores Bupthalmi acriores sunt Chamemeli floribus, ob id illis sunt calidiores.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Bupthalmi flores cum cerato triti, cedemata & durities discutiunt. Ferunt post exitū à balneo potam, regio morbo correptis coloris bonitatē tractu temporis redere.

## EX GALENO.

Bupthalmi flores Anthemidis floribus uehementius discutiunt, adeo ut & durities ex cerato mixti sanent.

## EX PLINIO.

Bupthalmos cum cera scirrromata discutit.

## DE BELLIDE CAP. LIII.

## NOMINA.



BELLIS neq; à Dioscoride, neq; à Galeno, nec alijs etiam Græcis, quod sciam, descripta est, ideoq; græco nomine destituitur. Latinam itaq; duntaxat appellationem habet, & Bellis siue Bellius, autore Plinio, nominatur.

## GENERA.

Duorum est generum, maioris & minoris discrimine insignis. Minor Bellis est ea quam officinæ Consolidam minorem appellant. Hæc iterum duum est generum. Quædā enim hortensis & domestica est Bellis, hanc Germani *Wonnablim* le/oder rote blümle nominant. Altera syluestris, quam uulgus herbariorum Primulam ueris, quod scilicet uere inchoante mox erumpat, Germani autem *Wass-Primula ueris.* lieble/ & *Kleinzeitlöfle* nuncupant. Maiorem officinæ nonnullæ Consolidam mediam, quod credatur uulnera glutinare, Germani *Genßblüm* uocant. Nos aliam Consolidam mediam infra describemus. *Consolida media.*

## FORMA.

Minor hortensis, syluestri, præter florem qui rubicundus est, per omnia similis est. Constant uero flores si interdum simplici, interdum multiplici foliorum cōtextu, ut pictura affabre ostendit. Syluestris, Plinio lib. xxvi. cap. v. teste, flore cōstat albo, aliquatenus rubente, quinquagenis ternis, interdum etiam quinquagenis quinque barbulis circinato, folio pingui, in terra iacente, in rotundum oblongo, leuissimè serrato. Neq; obstat quod Plinius lib. xxi. cap. viij. Bellio luteum esse florē tradat, quia non ad ambitum, sed ad discum mediūm uel floris, quod sanè luteum est, respexit. Hinc est quod à quibusdam Plinij locus ita legatur: Luteum & Bellio, ut subaudiat semē. Maior Bellis procerior assurgit, folio non admodum diuerso, altioribus duntaxat crenaturis laciniato, coliculis tenuibus, surculosis, cubitū altis, flore prior non dissimili, maiore, paucioribus tantum barbulis, & in uniuersum candidis, medium luteum in orbem concinnè cingentibus. *Minor.* *Plinij locus explicatur.* *Maior.*

## LOCVS.

Pasim in pratis uterque nascitur Bellius. Iam & in hortis seritur, sed flore multiplici, barbularum stipatu densiore.

## TEMPVS.

Minor primo statim uere apparet, & tota ferè æstate durat. Maior autem in Maio mense floret, quo etiam tempore carpi debet.

## TEMPERAMENTVM.

Bellius uterque calidus & siccus est, id quod ex Plinio colligi potest, qui illorum

N

ad dis-





BELLIS MINOR  
HORTENSIS.

Monatblüm.





BELLIS MINOR  
SYLVESTRIS.

Maßliebent.

N 2





BELLIS <sup>AZ</sup> MINOR

Sensblüm.



Ad discutiendas strumas usum esse scribit. Acetosus tamen sapor quem in gustu minor præ se fert, aliquam frigiditatis in ea portionem esse monstrat. Quicquid tamē sit, exiccare Bellios euidentissimum est.

## VIRES.

Quotquot hodie uiuunt uulneratiā herbam Bellium esse nouerunt, ualetq̃ potissimū in capitis fractura admota. Succus etiam herbæ utiliter uulneratis bibitur. Laudatur etiam herba ad membrorum resolutionem, quam Græci paralylin uocant: itemq̃ ad podagras, ischiada, & aduersus strumas.

## DE BRATHY CAP. LIIII.

## NOMINA.



ΠΑΘΥΣ καὶ Βελυθρὸν Græcis, Sabina uel Sauina Romanis, Seuenbaum Germanis dicitur. Officinæ nomen uetus retinuerunt.

## GENERA.

Duūm est generum Sabina. Vnum quod hic pictum exhibemus: alterum Tamaricis folia habens.

## FORMA.

Primi generis Sabina folijs Cupresso similis est, spinosior tamen, graui odore, acris & feruens. Arbor breuis, & in latitudinem magis se fundens & explicans. Topiarius itaq̃ frutex est, immortalī coma uirēs, patulo fastigio, iuniperi similitudine.

## LOCVS.

Pæssim in hortis nascitur.

## TEMPVS.

Quouis tempore colligi potest, potissimū autē autūmno dum semine pregnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Tertij est ordinis excalescentiū & desiccantiū, & ex numero eorum quæ uel maximē tenuium sunt partium.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Prioris folijs nonnulli pro suffitu utuntur. Vtriusq̃ folia nomas sistunt. Inflammationes illita mitigant. Cum melle illita nigrities repurgant, itemq̃ sordes & carbunculos abstergunt. Cum uino pota sanguinem per urinam ducunt, fectumq̃ excutunt. Idem apposita & suffita præstant. Miscentur unguentis excalescentibus, priuatim Gleucino.

## EX GALENO.

Sabina ex numero est fortiter exiccantiū, idq̃ secundum tres qualitates quas in gustu præ se fert similiter Cupresso, nisi quod ea acrior est, & ut sic dicā, magis aromatica, seu odorator. Igitur huius quam modo dixi qualitatē est particeps, nempe acrimoniæ cōsistentis in calido temperamento, præterea amaritudinis & adstrictionis obscurioris quā in Cupresso. Siquidē quanto magis acrimonia superat, tanto etiam potētius digerit. Itaq̃ glutinare nequit ob siccitatis & caliditatis robur. Nam utriusq̃ illi tantum inest, ut etiam tendat, & inflammationē afferat. At putredinibus similiter Cupresso accommodari potest, maximē ijs quæ maligniores fuerint, & diuturniores. Nam hæ citra noxam medicamenti uehementiam perferunt. Quin & quæ atra sunt reddita, & admodum sordida, ea cum melle expurgat. Carbunculos item soluit. Porro ob essentiae partiūm tenuitatem mentes quoq̃ prouocat, ut si quid aliud. Et sanguinem per urinas mouet. Fectum etiam uiuentem interficit, & mortuum eijcit. Vnguentis inditur, & potissimū Gleucino, & in multas antidotos inijcitur. Quidam uero etiam Cinnamomi uice duplum eius adijciunt: est enim extenuandi & digerendi facultatis, si pota fuerit.

## EX PLINIO.

Sabina à multis in suffitus pro thure assumitur. In medicamentis uero duplicato

N 3 pondere





SABINA

Seuenbaum.



**A** pondere eisdem effectus habere quos cinnamomum traditur. Collectiones minuit, & nomas compescit. Illita ulcera purgat. Partus emortuos apposita extrahit & suffitu. Illinitur igni sacro & carbunculis. Cum melle & uino pota, regio morbo medetur. Gallinacei generis pituitas fumo eius herbæ sanari tradunt.

## DE BATO CAP. LV.

## NOMINA.



**B**ATOZ Græcis, Rubus aut sentes Latinis uocatur. Aliquibus Mora uaticana, corrupta uoce, eius fructus dicuntur, cum dicendum esset mora uacinia. Nam in hodiernum usque diem Græci mora illa à *Bato*, *Batonia* uel *Batonia* cognominant. testis Galenus libro sexto, de compos. medica. secundum locos, cap. primo. Vergilius in Bucolicis unius literæ immutatione uacinia uocauit, inquiens: Alba ligustra cadunt, uacinia nigra leguntur. Eclog. ij. A nostræ ætatis medicis barbaris & herbarijs mora bacci appellantur, cum illis dicendum esset mora bati. Theophrasto libro iij. de plantarum historia, cap. xviij. Chamabatos, quasi dicas humilis rubus, appellatur, Germanicè Bromber.

## FORMA.

Rubum omnes nouerunt, ubique enim uestibus prætereuntium sese affigit, remoramq; uiatoribus iniicit. Caulem habet minacibus ac pungentibus spinis & aculeis uestitum. Folia incisuris diuisa, nigricantia ab uno latere, altero candentia. Florem initio rubescentem, dein candidum profert, quo abeunte fructus exit, qui cum maturuerit moro persimilis fit nigrescens, auius gratus, nec hominibus insuauis cibis. Inest illi succus sanguineus, & ueluti cruore atro manus inficiens.

## LOCVS.

**B** Passim in dumis prouenit Rubus, qui protinus quàm paulò accreuit, retro uergit in terram, atque ita radicatur, iterumq; ex se nascitur.

## TEMPVS.

Diuersis temporibus folia, flores & fructus Rubi colliguntur. Folia nanque in uere: flores æstatis initio, Iunio nimirum & Iulio mensibus: fructus autem ubi iam maturuerit per messes & extrema æstate decerpitur.

## TEMPERAMENTVM.

Rubi folia, germina, flores, fructus & radix qualitate adstringente participant, eaq; non obscura. Sed hoc inter se differunt, quod folia potissimū & recens nata plurimum in se habeant aqueæ substantiæ, parum uero adstringant. Eadem ratione & germina. Est itaq; eorum temperies ex terrea frigida essentia, & aquea tepida. Fructus autem, si quidem maturus fuerit, non parum habet succi temperati calidi, qui dulcis est. Proinde eam ob rem, & propter modicam adstrictionem, esui non insuauis est. At immaturus à frigida terrea substantia uincitur, ac proinde acerbus est, & exiccatorius. Vterq; autem siccatus reconditur, ualidius quàm recens desiccans.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Rubus adstringit & desiccatur. Capillos tingit. Ramorum eius decoctum potum aluum sistit, & sceminarum profluuium cohibet. Presteris morsui utile. Gingiuas firmat. Oris ulceribus folia cōmanducata medentur. Cohibent herpetas, & in capite achoras, oculosq; procidentes, condylomata & hæmorrhoidas, illita folia sanant. Cardiacis & stomachi doloribus trita & imposita subueniunt. Succus ex caulibus, folijsq; eius expressus, & in sole coactus, efficacius omnibus iam dictis medetur. Fructus eius optimè maturi succus, ad oris medicamenta cōuenit. Sistit & aluum in media maturitate comestus. Flos quoq; eius in uino potus aluum sistit.





RVBVS

Bomber.



## EX GALENO.

Folia & germina Rubi si mandantur, aphthas & alia oris ulcera sanant. Quin & alia uulnera glutinare ualent. Flos eius eandem fructui immaturo facultatem possidet: utraq; ad dysenterias, & uentris profluvia, eiusq; robur deperditū, & sanguinis expuitiones, idonea remedia. Radix præter adstrictionē non paucā in se habet substantiam tenuem, propter quam etiam in renibus lapides comminuit.

## EX PLINIO.

Nec Rubos ad maleficia tantum genuit natura, ideoq; ex eis mora uel hominib; cibos dedit. Vim habent siccandi, adstringendiq; gingiuis, tonsillis, genitalibus accommodatissimi. Aduersantur serpentium sceleratissimis, hæmorrhoidi & presteri, flos & mora. Scorpionum uulnera sine collectionum periculo iungunt. Vrinam ciunt. Caules eorū tunduntur teneri, exprimiturq; succus, mox sole cogitur in crassitudinem mellis, singulari remedio contra mala oris, oculorumq; sanguinem excreantes, anginas, uulvas, sedes, celiacos, potus aut illitus. Oris quidem uitij etiam folia cōmanducata prosunt, & ulceribus manantibus, aut quibuscunq; in capite illinuntur. Cardiacis uel sic per se imponuntur à mamma sinistra. Item stomachi doloribus, oculisq; procidentibus. Instillatur succus eorum & auribus. Sanat condylomata cum rosaceo cerato. Calculorum ex uino decoctum præsentaneū est remedium. Item per se in cibo sumpti cymæ modo, aut decocti in uino austero, labantes dentes firman. Aluū sistunt & profluvia sanguinis. Dysentericis prosunt. Siccantur in umbra, ut cinis crematorum uuam reprimat. Folia quoque arefacta & contusa, iumentorum ulceribus utilia traduntur. Mora quæ in ijs nascuntur, uel efficaciorē stomacem præbuere quā satia morus. Eademq; compositione, uel cum hypocisthide tantum & melle bibuntur in cholera, & à cardiacis, & contra araneos. Inter medicamenta quæ styptica uocant, nihil efficacius Rubi mora ferentis radice decocta in uino ad tertias partes, ut colluantur eo oris ulcera, & sedis foueantur, tantaq; uis est ut spongiæ lapidescant,

## DE BALLOTE CAP. LVI.

## NOMINA.



ΒΑΛΛΩΤΗ, ἡ μέλας προειρημένη Græcis, Ballote Latinis, Officinis Marrubiū nigrum, aut Marrubiastrum, aut Prasium foetidum dicitur. Germanis *Marrubium nigrum* cur dictū. schwarz Andorn oder Andorn weib. Marrubium à similitudine foliorum, nigrum à caulis colore, qui niger est Marrubij respectu, dicta

Ballote est.

## FORMA.

Caules ex se mittit Ballote quadrangulos, nigricantes, subhirsutos, ab una radice complures. Folia Marrubio similia, maiora tamen, subrotunda, pilosa, per intervalla in caule disposita, Apiastro similia, graueolentia, unde aliqui Apiastrum eam uocarunt. Flores in rotæ speciem caules circumiacent. Theophrastus etiam lib. vi. cap. ij. de historia plantarum, Balloten folio herbido, ferrationi, incisurisq; profundioribus & conspectioribus discreto constare scribit. Vnde liquidò constat hanc quam pictam damus esse ueram Balloten, quod illa sit herba fruticosa, quadrangulis caulibus assurgens, nigris, hirsutis ferè, folio Marrubij, sed maiore, piloso, cingente per intercapedines caulem, odore graui, orbiculato florum purpureorū ambitu, qui scapos uerticillatim obducunt.

## LOCVS.

Nascitur propter uias, domos, sepes, cœmiteria, & alijs umbrosis in locis.

## TEMPVS.





BALLOTE

Schwartz andorn.



## TEMPVS.

A Floret in fine Iunij mensis, & initio Iulij, quo sanè tempore carpi cōmode potest.

## TEMPERAMENTVM.

Amara & acris est, ideoq̃ calefacit in secundo ordine iam completo, aut tertio remisso; desiccatur autem in tertio.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius folia cum sale illita, canis moribus medentur. Feruenti cinere flaccescencia, condylomata reprimunt, sordida q̃ ulcera cum melle purgant.

## EX PAVLO.

Ballote, quod alij Marrubium nigrum dicunt, acris est & absterforiæ facultatis. Illitum cum sale canis moribus medetur.

## EX PLINIO.

Vis eius efficax aduersus canis morsus, ex sale folijs tritis imposita. Item ad condylomata, coctis cinere, in folio oleris. Purgat & sordida ulcera cum melle.

## DE BATRACHIO CAP. LVII.

## NOMINA.



ATPAXION Græcis, Batrachium & Ranunculus Latinis dicitur. Apuleius Sceleratā nominat. Vulgus medicorum perperam Pedem corui uocat. Sunt etiam qui Flammulam, ab urendi facultate, appellant. Germani Hanensij. Batrachion autem siue Ranunculus dicta est haud dubie, quod limitibus humidis opacisq̃ marginibus ranarum more lætetur; aut quod aquis ubi ranæ degunt potissimū, gaudeat, aut quia inter eius frutices ranæ frequenter inueniantur. Agreste uero Apium seu Apiastrum, quod folijs apium emuletur.

Scelerata.

Flammula.

Ranunculus una de dictis.

B Scelerata, eo quod comesta noxia sit: uel, quod magis arridet, quia ualidi sceleratiq̃ mendicantes sibi crura & lacertos hac ipsa dilaniant, quò possint impudentius stipem extorquere, atque hac impostura pecuniolam aucupari.

Agreste apium.

Scelerata.

## GENERA.

Plura sunt Ranunculi genera, Dioscorides uero & Galenus quatuor potissimū esse tradunt. Primum duplex est: huius enim generis Ranunculus quidam syluestris est: & hic iterum duabus discriminatur differentijs. Vnus enim luteos flores profert, & Germanis weisser Hanensij dicitur. Alter uero purpureos, qui mihi, quod sciam, nondum uisus est. Quidam autem hortensis, qui nisi cultura accedat prouenire haud solet. Hic itidem duplex est. Vnus qui simplici florum textura constat, Germanicè vngesülter garten hanensij. Alter multiplicē foliorū in floribus cōpagem obtinet, ideoq̃ Germanis gesülter garten hanensij dictus est. Alterum quod à foliorum similitudine quam cum Apij folijs obtinet, à nōnullis *σέλινο ποτίζιον*, id est, Apium syluestre, uel Apium risus cognominatur. Germani Wasserhanensij uocāt. Tertium genus exiguum est, ob id etiam Germanis kleiner Hanensij nominatur. Quartum etiam minimum, germanicè Waldhenle appositissima uoce appellatur: est enim inter reliquas herbas quæ germanicè Pedes galli uocantur, & minima, & non nisi in syluis ut plurimum prouenit, adeoq̃ composita uoce rectissimè Waldhenle nominatur, quasi dicas minima inter pedes Galli, & in syluis prognata. Estq̃ duūm generum: unum quidem lacteo flore, alterum luteo, ut pictura docet. Primū autem quod lacteo flore ornatur, est id quod à Dioscoride pingitur, germanicè uocatur Weiß waldhenle. Alterum, das gelb waldhenle.

Syluestris ranunculus.

Hortensis.

Apium syluestre.

## FORMA.

Primum Ranunculi genus folia Coriandro similia habet, latiora, uel ut Plinius ait, ad maluæ latitudinē accedentia, subalbida & pingua. Florem luteum, interdū purpureum. Caulem non crassum, cubitali altitudine, Radicem paruam, albam, amaram,

Primum genus.





RANUNCULI PRIMA SPECIES SYLVESTRIS.

Weisser Hanenfuß.





RANUNCULI HORTENSIS  
SIMPLICIS PRIMA SPECIES.

Ungefülter garten ranensiß.



RANUNCULI PRIMA SPECIES  
HORTENSIS MULTIPPLICIS.

Gesalter hanenfüß.







159

RANUNCULI  
SECUNDA SPECIES.

Wasserhänensfuß.

O 1



RANUNCULI  
TERTIA SPECIES.

Kleiner hahnenfuß.





RANUNCULI  
QUARTA SPECIES LACTEA.

Weiß waldhenle.







RANUNCULI  
QUARTA SPECIES LUTEA.

Selbß waldhenle.



A amaram, adnascantias Ellebori modo habentem. Cæterum effecit cultura, ut qui in limitibus simplici foliorum compage flores oriantur, gemino quodam densoq; ac multiplici foliorum stipatu nunc in hortis collucescāt, quemadmodū pictura aefabrè monstrat. Alterum genus lanuginosius, uel ut Plinius inquit foliosius, altiorē caule, pluribus foliorum incisuris, copiosissimū in Sardinia, acerrimumq; quod iam Apium syluestre nominant. Tercium genus ualde paruum, graui odore, flore qui auri speciem refert. Quartum huic simile, flore autem lacteo aut luteo, radice longiore, & modo quodam nodosa, gustu acri.

Alterum.

Tercium.

Quartum.

## LOCVS.

Primum genus Ranunculi syluestris lutei sine cultura circa fluentia, & in limitibus pratisq; humidis & uliginosis prouenit. Hortensis uero adhibito cultura in hortis nascitur. Alterum genus secus aquas & fontes gignitur, & apud Sardos copiosissimum. Ea si comedatur, uescientibus neruos contrahit, rictuq; ora diducit, ut qui mortem oppetunt, uelut ridentiū facie intereant. Ob id Sardonijs risus in prouerbium cessit. Et si autem nostra non perinde efficax sit atq; ea quæ in Sardinia nascitur, tamen hanc uehementissima etiam erodendi facultate esse præditam, gustus ostendit. Tercium genus in pratis & campestribus passim prouenit. Quartum, ut Germanicum nomen palàm demonstrat, syluis familiare est. Luteum uero in ualle supra & infra Bebenhufum monasterium iuxta aquas copiosissimè nascitur.

Sardonijs risus.

## TEMPVS.

Primum genus hortensis Ranunculi lutei, statim inter initia Aprilis floret: Maio autem mense disperit, & nusquam subinde conspicitur. Secundum & tertium genus itidem tota æstate inueniri possunt. Quartum in uere, Aprilis nimirum mense, tantum apparet, quo sanè tempore hoc ipso sylus, luci & nemora scatent, floribusq; eius candicant.

B

## TEMPERAMENTVM.

Omniū tum radix, tum uniuersa herba uehementer calida & sicca est. Primitamen generis syluestris lutei, nō perinde ac reliquorū acris admodum est facultas.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Omniū folia & caules teneri si illinantur, exulcerandi, & crustas cum dolore creandi uim habēt. Proinde scabros ungues & scabiem tollunt, & stigmata delent, myrmecias, acrochordonas & alopecias modico tempore illita sanant. Tepido eorundem decocto perniones fouentur. Radix sicca tritaq; sternutamēta naribus admota ciet. Dentium dolores adhibita lenit, eos tamen conterit.

## EX GALENO.

Quatuor habet speciatim Ranunculus differentias. Omnes uerò uehementer acrem facultatem possident, adeò ut cum dolore exulcerēt. Hac itaq; ratione si moderatè utare, pforas & lepras excoriant, & ungues leprosos diuellūt, ac stigmata discutiant, & acrochordonas & myrmecias detrahunt. Quin & alopecias iuuant paucotēpore admota. Nam si diutius inhæreant, non excoriat solum cutis, sed & in crustam uritur. Atq; igitur hæc omnia caulis & foliorum sunt opera, si illinantur uiridia. Porro radix arefacta sternutatoriū est medicamentū similiter alijs quæ ualenter desiccāt. Sed & dentium dolores iuuat, ut & eos, uehementer scilicet exiccando, frangat.

## EX PLINIO.

Omniū uis caustica, si cruda folia imponantur, pustulasq; ut ignis faciūt. Ideo ad lepras & pforas utuntur, & ad tollenda stigmata, causticisq; omnibus miscent. Alopecijs imponunt, celeriter remouentes. Radix in dolore commanducata diutius, rumpit dentes. Eadem sicca concisa, sternutamentū facit. Nostri herbarij strumeam uocant, quoniam medetur strumis, & panis, parte in fumo suspensa.





LUPVUS SALICTARIUS.  
Hopfen.



## NOMINA.

**B**RYON Græcis recentioribus, Lupus salictarius Latinis, Lupulus officinis, uulgo Humulus uocatur. Aliquot Italiæ rura, ad græcam appellationem alludentes, Brusculam, quasi Bryon scansile nominant. Germani Hopfen. Græci autem Bryon à Bryoniæ similitudine haud dubiè nominarunt. Lupus uero salictarius, quia subit scanditque salices, & arbuta omnia circumuoluendo se circumplectitur, appellatus est. Hinc quoque Lupus reptitius nonnullis nominatur.

Lupulus.

Humulus.

Bryon.

Lupus salictarius.

Lupus reptitius

## FORMA.

Caules habet aculeatos, longissimosque. Folia uitis albæ, hispida, & nigriora. Flores cinereos seu candicantes, ac multis exilibus folliculis squamatim compactiles. Radicem subnigram, longam.

## LOCVS.

Passim & copiose in Germania nostra iuxta uepres & salicta prouenit, ex eaque ceruisiam potum, quo uini uice utuntur, Germani conficiunt. Ideoque in hunc usum in hortis plantatur.

## TEMPVS.

Augusto mense floret & Septembri.

## TEMPERAMENTVM.

Sunt qui refrigerare Lupulum dicant, alij temperamento medium esse putant. At utriusque, mea quidem sententia, falluntur: flores enim quorum potissimum usus est, calidos & siccos esse, odoris & grauitas, & immodica amaritudo testantur. Antiquus etiam herbarius calidum & siccum in secundo ordine esse tradit. Denique constat radices quoque eius calidas esse.

## VIRES.

## EX RECENTIORIBVS.

Bilem utranque detrahit. Abscessus discutit. Pituitam in aqua inter cutem per aluum ducit. Succus eius crudus haustus uentrem magis subducit, minus uero obstructions aufert. Coctus uero magis ab obstructionibus liberat, minusque uentrem subducit. Auribus instillatus eas à putredine uindicat, & à foetore liberat. Radices obstructions tollunt, lienis potissimum & iecoris.

DE VERO





VERONICA  
MAS.

Erenbreißmennle.





VERONICA  
FOEMINA.

Erenbreiß weible.



C

## NOMINA.

Veronica.



ETERIBVS Græcis & Latinis cognita fuerit nec ne hæc herba, nondum constat. Vulgus autem herbariorū hodie Veronicam, Germani Frenbreiß oder Grundheyl / ob mirificam sanandi ulcera & uulnera facultatem nominant.

## GÉNÉRA.

Duūm est generum Veronica; una mas, altera uerò fœmina. Discrimina earum ex descriptionibus patebunt.

## FORMA.

Veronica mas herba est per terram serpens, cauliculo dodrantali & nonnunquā etiam longiore, rubescēte & lanuginoso, folijs oblongis, nigris, hirsutis & serratis, floribus in cacumine purpureis, semen in uasculis loculi speciem habentibus, radice tenui. Fœmina itidem per terram serpit caule lanuginoso, folijs rotundis instar herbæ quæ Centummorbia & Nummularia hodie uocatur, minimè in ambitu incisis, paulò quā maris uiridioribus, floribus in luteo purpureis, semine in uasculis rotundis, radice, ut mas, tenui.

## LOCVS.

Nascitur incultis & syluestribus locis.

## TEMPVS.

Iunio mense floribus & semine abundat.

## TEMPERAMENTVM.

Amaritudinem quandam & uehementem adstrictionem in gustu præ se fert, ut hinc calidam & siccam esse coniicere liceat.

D

## VIREs.

Mirificè ad cruēta ac uetera uulnera & ulcera sananda confert. Scabiei denique & omnibus cutis uitijis medetur. Ferūt quondam huius herbæ adiuvento Regem Galliaë elephantiaë morbo correptum, à quodam uenatore sanatum esse, cum is ceruum à lupo uulneratum eius herbæ comestione, & assidua in illa uoluatione, curasse seipsum animaduertisset. Tumores etiam, in quacunq; corporis parte fuerint, potissimum autem in ceruice, discutere potest. Recentiores huius usum unicè commendant in febribus pestilentialibus, iecoris & lienis obstructionibus, potissimum uero pulmonis exulcerationibus.

## DE BVLBO SYLVESTRI CAP. LX

## NOMINA.

Cepa sylvestris.

Bulbi.



ΟΛΒΟΣ αἴθε Græcis, Bulbus sylvestris Latinis. Sunt quibus Cepa sylvestris appellatur. Germanicè Jeld / wild oder ackerzwibel. Bulbos autem nominant radices suis membranis tunicatas, siue pluribus capitulis coagmententur, uno folliculo omnes ambiente, siue quadantenus distinctæ separentur.

## FORMA.

Herba est caule dodrantali, cauo, folijs porraceis, floribus lilij sinuatim emicantibus, speciosis, sex folijs è calathò stellatim radiatis, ex uiridi in luteum tendentibus, capillo intus croceo, capitulo floribus decidentibus triangulari, seminibus pleno, radice bulbosa ceu Allium, citra odorem glutinosa.

## LOCVS.

In locis umbrosis, circaq; margines quorundam pratorū copiose prouenit. Quare in uallibus non procul à Tubinga iuxta monasteriū Bebenhusense sitis, & radice montis Austriaci ad pratum tenue uocatum, Bulbus plurimus nascitur.

## TEMPVS.





BVLBVS  
SYLVESTRIS.

Feldzwibel.

P



C

## TEMPVS.

Per initia ueris, Martio & Aprili mensibus erumpit, ac statim subinde euanescit. Semen non tantum in caulibus, uerumetiam iuxta radicem profert.

## TEMPERAMENTVM.

Amara austeraq; qualitate præditos inueniet, non hunc, sed & alios bulbos, qui gustum exactè consuluerit. Proinde hos abstergere simul & glutinare, & nimirum etiam exiccare posse, nemini non notum est.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Omnes bulbi acres sunt & calefaciunt, ueneremq; stimulant. Linguam & tonsillas exasperat. Multum nutriunt. Carnes procreant, flatusq; faciunt. Ad luxata, collisa, furculos, articulorumq; dolores illiti cōducunt. Gangrēnis & podagris cum melle, & per se, hydropicorūq; tumoribus & canum moribus prosunt. Cum melle pariter & pipere trito illiti, sudores cohibent, & stomachi dolores sedant. Furfures & achoras cum nitro tosto exterūt. Sugillata & uaros per se, aut oui luteo purgant, & lentigines cum melle aut aceto. Fractis auribus cum polenta, & cōtulis ungibus prosunt. Ficos in calidis cineribus tosti, & cum mænarum capitibus crematis appositi, tollunt. Cōbusti uerò & Alcyonio permisti uitia cutis in facie, & nigras cicatrices in sole illiti emendant. Cum aceto elixi & in cibo sumpti ad rupta faciunt. Cauere uerò eorum in cibo copiam oportet, quoniam neruosas partes tentant.

## EX GALENO.

Bulbi amaram austeraq; uim manifestam obtinent, quamobrem elanguescentis stomachi aliquatenus auiditatem excitant. At uerò neq; ipsi inutiles sunt, quibus è thorace & pulmone pus expuendum erit, quanquam crassiore ac glutinosiore sit corporis substantia: etenim amaritudo crassitudini aduersatur, lenta crassaq; nata incidere. Quapropter bis elixi uberius quidem alunt, sed excreare uolentibus reluctabuntur, utpote omni amaritudine exuti. Tum uerò ex aceto, oleo garoq; mistis, elitare satius fuerit: nam ita magis oblectabūt ac nutrient, minusq; inflabunt, & facilius cōcoquantur. Quidam horum cibo abunde & immodicè usi, planè seminis auctam copiam, inq; uenerem se esse promptiores senserunt. Hos quoq; homines uariè apparant. Non enim solum aqua elixos, uerumetiam patinas ex ipsis uariè conditas instruunt. Alij quidam in sartagine frigunt, multi in craticula assant. Verum hi multam coctionem haud sustinent, admodum pauca cōtenti. Sunt qui nihil prorsus præcoquant: delectat nanq; eos amaritudo ipsa ac austeritas integra, quippe qui amplius ab ea ad cibum alliciantur: quanquam ad huiusmodi illecebrā duo aut tres plus satis faciēt. Si uerò liberalius sic apparati sumantur, præsertim ubi, ut mos est, crudiores ingeruntur, amplius cruditatem generabūt. Quidam etiam non probè cocti, inflationes & tormina pariūt. Qui ad hunc modum esitantur, alimentum minimè boni succi procreant. At plurimum decoctorum, aut bis etiam, succus crassior quidem ille erit, cætera uerò melior ac alibilior reddetur.

## EX PLINIO.

Bulbi ex aceto & sulphure uulneribus in facie medentur: per se uero triti neruorum cōtractionem, & ex uino porrigines. Succū cum melle canum moribus. Erasi strato placet cum pice. Sanguinem idem eos sistere tradit illitos cum melle. Alij si è naribus fluat, Coriandrū & farinam adiçiūt. Theodorus & lichenas ex aceto bulbis curat, & erumpentia in capite cum uino austero aut ouo. Et bulbos epiphoris idem illinit, & sic lippitudini medetur. Aequè uitia quæ sunt in facie, eorum rubentes maximè in sole illitis, cum melle & nitro emendant. Lentiginem cum uino, aut cum cumino coctis. Vulnerib. quoq; mirè prosunt per se, aut, ut Damion, ex mulso, si quinto die soluantur. Iisdem & auriculas fractas curat, & testium pituitas. In articulorum doloribus miscet farinam. In uino cocti illiti uentri, duritiem præcordiorum emolliunt. Dysentericis in uino ex aqua cœlesti temperato dantur. Ad conuulsa



A uulsa intus cum Silphio pilulis fabæ magnitudine. Ad sudorē tusi illinuntur. Nervis utiles. Ideo & paralyticis dantur iuxta in pedibus. Qui sunt ruffi ex his, citissimè sanant cum melle & sale. Venerem stimulant. Sylvestres interaneorū plagas & uitia cum Silphio pilulis deuoratis sedant. Et satiuorum semen contra phalangia bitur in uino. Ipsi ex aceto illinuntur contra serpentū ictus. Semen antiqui bibendum insanientib. dabant. Flos bulborum tritus crurum maculas uarietatesq̃ igne factas emendat. Elixos asis minus utiles adijciunt esse, & difficilè concoqui ex uiuiusculisq̃ naturæ.

## APPENDIX.

Hic quem pictum damus Bulbus, facultatē emolliendi & discutiendi duros tumores habet. Humidis denique & depauperatis ulceribus tostus calido cinere, & cum melle tritus atque admotus prodest.

## DE BICIO CAP. LXI.

## NOMINA.

**B**IKION Græcè, Vicia Latine nominatur. Officinæ non sine maximo errore ea pro Orobo utuntur. Germani alludentes ad græcam appellationem, Wicken simpliciter, uel cum adiectione sam wicken uocant. Vicia autē, ut Varroni placet, dicta est à uinciendo, quod item ut uitis capreo, los habeat, quibus sursum uersus serpit.

## FORMA.

Cubitali altitudine surgit, folijs Aphaces, angustioribus tamen, flore Pisi, minutis nigricantibusq̃ in siliquis seminibus, quorum quidem figura non rotunda est, sed, similiter lenti, latiuscula.

## LOCVS.

Sicca loca maximè amat, inter autem segetes copiose prouenit.

## TEMPVS.

Iunio mense floribus & semine prægnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Medium tenet caliditatis & siccitatis, ualidius tamen siccatur, in secundo nimirum ordine.

## VIRES. EX GALENO.

Semina hæc non solum insuauia, sed concoctu etiam difficilia, & aluum retinentia. Perspicuum ergo est, quum huiusmodi naturam obtineant, alimoniam quoq̃ quæ ex ipsis in corpus permanat, improbi crassiq̃ succi esse, idoneam ad humoris melancholici generationem.







## NOMINA.



AITTON Græcis, Blitum siue Blitus Latinis uocatur. Officinæ hanc herbam cum Beta cōfundunt non sine magno errore. Germanis Waier dicitur. Blitum nomen inde traxit, quod iners & fatuum olus esset, sine sapore aut acrimonia ulla. Nam βλίτος stolidos & ignauos Græci dixerunt. Sic hodie græca imitatione socordes, & nullius momenti homines, bliteos appellamus. Ita Plautus in Truculento bliteam meretricem nominauit.

officinæ error.

Blitum unde dictum.

βλίτοι.

## FORMA.

Blitum non pingitur à Dioscoride, sed ab Hermolao Barbaro, homine non minus docto quàm diligente, in suo Corollario ijs uerbis describitur: Blitum erumpit ocysimè, folijs betaceis, sine acrimonia fatuis & insipidis, semine ut Beta corticeo, copioso, racemoso, ut Atriplex. Radice non una, non in rectum tendente, sed multiplici, obliqua, & proluxa. Ex quibus utiq; uerbis omnibus perspicuum fit, herbam quam depictam damus esse Blitum. Hæc siquidem ocysimè erumpit, atq; in altum tollitur, foliaq; Betacea prorsus habet. Insipida denique & sine acrimonia. Semen eius ut Betæ corticeum, copiosum, racematim singulis ramis insidens. Radice non una nititur, sed multiplici ac longa, non in rectum, sed obliquum tendente. Rectior tamen & magis descriptioni respondentē si quispiam protulerit, non grauabimur nostram mutare sententiam, ut qui probè perspectum habeamus in ijs herbis quæ à Dioscoride non descriptæ sunt, facillimè aliquem in tanta rerum penè omnium caligine aberrare posse.

## LOCVS.

Et si sponte sua interdum herba hæc proueniat, tamen ut de Blito etiam tradunt, si culto solo semel nata fuerit, ipsa se per multa secula seminis deiectione reparat, ut etiam si uelis uix possit aboleri, sic semel nata pluribus annis restibili fertilitate prouenit.

## TEMPVS.

Floret æstate & autumnno, semineq; prægnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Blitum frigidum & humidum in secundo ordine.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Blitum oleris uice in cibum uenit. Aluo utile est, nullam tamen medicamento, sam uim obtinet.

## EX GALENO.

Aquosum est olus, ac uti quis non absurdè dixerit qualitatis expers, & insipidum: quapropter non ex solo oleo garoq; sed addito aceto sæpius meliusq; assumitur. Nō nihil etiam ad leuigandā aluum momenti affert, uerum id ipsum perquam exiguum est, quoniam nulla ipsis acris nitrosaue adest qualitas, quæ aluum ad excretionē irritare possit. Liqueat etiā quod minima ab ipso alimonia in corpus dimanet.

## EX PLINIO.

Blitum iners uidetur ac sine sapore aut acrimonia ulla. Vnde cōuicium foeminis apud Menandrum faciunt mariti. Stomacho inutile est. Ventrem adeò turbat, ut choleram faciat aliquibus. Dicitur tamen aduersus scorpiones potum ē uino prodesse, & clauis pedum illini. Item lieni & temporum dolori ex oleo. Hippocrates menstrua sisti eo cibo putat.

P

DE BVNIA.





BLITVM

Walter.



## NOMINA.

**B**OVNIAZ Græcis, Romanis Napus, Germanis *Stectrûb* appellatur. *Napus.*  
 Buniadis autem appellationē à tumente figura quam præ se fert, Græ. *Bunias quare*  
 ci deduxerunt. Namq; radix Napi buniadis in amplitudinē excrescit, & *dictus.*  
 in rotundum extuberat. Cuius siquidem, colles, uerrucosaq; loca *Bovis Bovis.*  
 nominant.

## GENERA.

Napi buniadis, quem Galenus & alij ueteres in Raporum censum reponunt, duo sunt genera. Vnum satium, quod forma proximē ad Brassicam tertiæ speciei *Napus Bunias*  
 accedit, radicemq; oblongiorem obtinet. Germani huius generis Napos, *Truck en*  
*stectrûben* nominant. Alterum sylvestre, quod folijs suis Erucae non dissimile est, *sylvestris.*  
 radice ampliore, & rotundiore. Germanice *Nasstectrûben* appellantur eius ge-  
 neris Napi.

## FORMA.

Folia habet Rapi, leuiora, Erucae modo laciniata, caulem cubitalem, interdum  
 altiorem, rotundum, flores luteos, Brassicæ proximos, semen in siliquis, radicem  
 oblongam.

## LOCVS.

Bunias gaudet frigidis locis.

## TEMPERAMENTVM.

Cum easdem quas Rapum uires habeat Bunias, necesse est idem etiam ut obti-  
 neat temperamentum. Est itaq; Napus bunias in secundo ordine calidus, & in pri-  
 mo humidus.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Radix Buniadis elixa, flatu creat, minus tamen quàm Rapum nutrit. Semen  
 eius potum letalia uenena inefficacia reddit. Miscetur antidotis. Radix etiam eius  
 sale conditur.

## EX GALENO.

Easdem quas Rapa uires obtinent. Vide itaque caput de Rapis.





NAPVS BUNIAS  
SATIVVS.

Drucken Steckrüben.





NAPVS BVNIAS  
SYLVESTRIS.

Naßteckrüben.



## NOMINA.

Botrys unde  
dicta.

OTPVΣ Græcis, Botrys Latinis appellatur. Officinis & uulgaribus herbarijs incognita. Germanis haud ineptè Traubenkraut nominabitur. Botrys uerò dicta est à semine, quod racematim ramulis adnascitur.

## FORMA.

Herba tota est lutea, fruticosa, sparsa, multaꝝ alarum caua habens. Semen totis ramulis adnascitur. Folia Cichorio similia obtinet, totaꝝ ualde odorata est, ideoꝝ uestibus apponitur. Ex qua quidem descriptione omnibus manifestum fit, herbam cuius picturam exhibemus esse legitimā Botryn: uniuerſa enim herba ad luteum colorem uergit, fruticosa est, & multis stolonibus fusa, folijs Cichorij, odoratis, semine circa ramulos totos in racemos collecto nascente. Quid multa? nulla est prorsus nota, quæ illi non appositissimè quadret.

## LOCVS.

Nascitur circa profluentes aquas & torrentes. In Germania tamen, quod equidem sciam, non nisi ſata prouenit.

## TEMPVS.

Augusto & Septembri ad maturitatem maximè peruenit: quibus etiam mensibus, ut Ruellius annotauit, uenalis herba per Parisiensem urbem defertur. Odoris enim gratia Galli uestimentis, pannis, & linteis curiose interponunt. Apud Germanos tamen eius herbæ nulla est gratia, quod illis hætenus ignota fuerit.

## TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse Botryn amaritudo eius quæ gustui occurrit, facile monstrat. Item uis eius incidendi, quæ illi propter calorem, tenuitatemꝝ inest.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

In uino pota orthopnoeas lenit.

## EX PAVLO.

Planta est admodum odorata, quæ cum uino pota non nisi recta ceruice spirantibus auxiliatur.

## EX PLINIO.

Medetur orthopnoicis.

DE BARBA





BOTRYS

Traubenkraut.



## NOMINA.

Hec herba non  
est Pynocomo.

Barba capricur  
dicta.



V O nomine ueteribus Græcis & Latinis hæc herba uocata sit, nobis nondum compertum est. Neque enim Pynocomon est, quod à descriptione illius prorsus abhorreat. Quare Barbam caprinā interea donec certius nomen nacti fuerimus, nuncupabimus, à florum nimirum figura, quæ caprinam barbam referre uidetur. Germanicè Wald geißbart/ ut eam segregaremus ab altera eiusdem nominis, quæ non in syluis, ut hæc ipsa, nascitur, sed in pratis & senticetis, appellare nobis placuit.

## FORMA.

Caulem habet tricubitalem, angulosum, folia Castaneæ aut Corylo similia, in ambitu serrata, flores candidos, exiguos, racematim compactos, instar barbe canæ dependentes, radicem nigram, lignosam, intus candidam. Flores eius in iulos abeunt.

## LOCVS.

Prouenit in obscuris syluis, & uallibus nonnunquam minus apricis.

## TEMPVS.

Floret Iunio mense, ac subinde semen profert.

## TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse hanc herbam facile ex gustu deprehenditur; miram enim amaritudinem, in radice potissimum, gustata exhibet.

## VIREs.

Abstergit haud dubiè expurgatq;, & quæ in uenis est crassitiem incidit. Quamobrem menses ducit, educendoq; ex thorace, & pulmone puri auxiliatur. Et in summa, siue crassa in eis pituita, siue pus, siue aliud quippiam continetur eiusmodi, expurgat. Hac utiq; ratione & morbo comitiali competit. Extrinsecus illita & imposita, tumores ex pituita ortos discutit.

DE BLATTA-





BARBA CAPRI

Waldgeißbart.



## NOMINA.

Blattaria inde  
dicta.



VM Græcis autoribus cognita hæc herba fuerit, nondum cōpertum habeo. Plinius certè libro xxij. cap. ix. Blattariam nominat. Inuenit autem nomen hoc Latinum, à colligendis in se blattis. Ideoq̃ cōuenientissimo nomine Germanis appellabitur Schabenkraut.

## FORMA.

- » Plinius loco iam citato Blattariam sic pingit: Blattaria est similis Verbasci herba, quæ sæpe fallit pro ea capta, folijs minus candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Ex qua pictura satis constat, herbam cuius picturam damus esse Blattariam: sic enim Verbascum mentitur, ut pro eo sæpius ab imperitis decerpatur. Et sunt non pauci herbarij, qui hac similitudine decepti, eam inter Verbasci genera connumerent. Folia tamen, quæ minimè sunt hirsuta & candida, sed potius uiridia, facile ab hoc errore paulò attentiores reuocare possunt. Plures deniq̃ cauliculos habet, flores item luteos, ad Verbasci flores proximè accedentes. Folliculos quoque lini instar, in quibus semen continetur.

## LOCVS.

Nascitur iuxta aquas, & fluminum ripas.

## TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Vehemens amaritudo eius satis docet esse calidam & siccam.

## VIRES. EX PLINIO.

Hæc abiecta blattas in se contrahit, ideoq̃ Romæ Blattariam uocant.

## APPENDIX.

- » Non plura de huius herbæ facultatib. apud probatos autores inuenio, sed haud dubiè si quis ea uti uoluerit, eadē quæ alia amara, in corpore nostro efficere potest, Quæ qualia sint, ex capite præcedente facile intelliges.

DE BROMO.



BLATTARIA

Schabenkraut.

Q.





## NOMINA.



ΒΡΟΜΟΣ Græcè, Avena Latinis ac Officinis, Germanis Habern dicit.

## FORMA.

Folijs & culmo Tritico similis, geniculis intersecto. In summo uerò fructum habet ueluti locustas duplici crure diuarcatas, in quo semen includitur. Radicem copiosam.

## LOCVS.

Pasim in Germaniæ agris nascitur, ac iumentorum potius quàm hominum pabulum existit.

## TEMPVS.

Seritur Martio mense, metitur autem Augusto.

## TEMPERAMENTVM.

Avena ut medicamentum refrigerat, Galeno autore: ut alimentum uerò, eodem teste, calefacit sufficienter. Vtroque uerò modo exiccat.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Semen eius haud secus quàm hordeum ad cataplasmata utile. Puls etiam ex ea fit cohibendæ aluo accommodata. Succus eius in sorbitione acceptus, tussientibus prodest.

## EX GALENO.

Avena ut medicamentum similem hordeo uim obtinet. Nam illitum deficcat, & digerit mediocriter, & sine morfu. Nonnihil etiam ad strictionis obtinet, ut uentris profluvia iuuat.

## EX PLINIO.

Semen utile ad cataplasmata atque hordeum & similia. Prodest tussientibus succus. Auenæ farina in aceto tollit nauios.





AVENA

Habern.

Q 3



C

## NOMINA.

Vua crispa  
dicta.

ETERIBVS ne Græcis & Latinis frutex ille cognitus fuerit, me ignorare adhuc ingenuè fateor. Quare cum nomen aliud quo hunc appellaremus in promptu non esset, uulgare & qua omnes hodie herbarij utuntur nomenclaturam usurpare uoluimus. Vuam autem crispam fruticem hunc dixerunt ab intortis fereq; in circulum uersis (crispa alij uocant) folijs, & acinis quos producit. Quo etiam respicientes Germani nostri, *Krüßbeer* / oder *Krüßelbeer* uocant. Latinius fortè uua intorta nuncuparetur.

## FORMA.

Frutex est ramulis multis, aculeatus, rectoq; spinarū mucrone horridus, folijs in tortis ac circinata rotunditatis, Apij modo dissectis, flore ex herbido purpurascen- te, acinis candicantib. & splendescenubus, primum acerbis, à maturitate dulcibus. Ex ijs abunde constare putamus, fruticem hunc cuius picturā exhibemus, non esse primam, ut nonnulli arbitrantur, Rhamni speciem. Nam etsi cætera respondeant, tamen folia quæ rotunda & minimè oblonga sunt, ut Rhamni, repugnare manifestè uidentur. Posset tamen citra aliquod uitæ discrimen Rhamni generibus annu- merari, quod scilicet uiribus illi similis admodum sit, quas etiam illi suo loco adscri- bemus.

## LOCVS.

In frutetis & sepibus nascitur, non tamen passim. Nusquam autem copiosius quàm Tubingæ luxuriat, ubi circa omnes ferè sepes sese profundit.

## TEMPVS.

Veris statim initio frutex ille pubet, primum hoc tempore folia, dein flores, ac non diu post acinos seu baccas acerbitate gratas profert.

## TEMPERAMENTVM.

Haud dubiè idem quod Rhamnus temperamentum obtinet. Vt enim hic ad- stringit & refrigerat, sic etiam illa. Refrigerat autem in primo completo, aut secun- do incipiente, desiccat uerò in secundo.

## VIRE.

## E DIOSCORIDE.

Folia ignibus sacris & herpetis illita auxiliantur. Fertur & ramos eius foribus & fenestris appositos ueneficiorū arcere maleficia. E quibus Dioscoridis uerbis satis liquet, Vuam intortam non hoc tantum nomine sepibus apponi ut easdem mu- niat, atque adeò alienorum ingressum prohibeat, uerum etiam ut ueneficia ab hor- tis propulset. Vt hinc quoq; colligere liceat, eiusdem cum Rhamno esse facultatis.

## E GALENO.

Herpetes sanat, & erysipelata non magnopere calida. Porro ad hæc teneris uten- dum est folijs.

DE Balsa-





VVA CRISPA

Kruselbeer.



C

## NOMINA.



VO nomine ueteribus tum Græcis cum Latinis appellatæ sint hæ plantæ, me ignorare ingenuè fateor. Puto autem illis planè fuisse incognitas, quod de ijs ne uerbum quidem apud eosdem scriptum inueniatur. Hodie Balsamines nomine uocant. Causam indicabimus paulò pòst. Germani ad latinam nomenclationem alludentes, Balsamtraut/haud (arbitror) ineptè appellabunt.

## GENERA.

*Prima Balsamine.* Duo Balsamines genera damus. Primam, quam nos certioris discriminis gratia marem fecimus, Ligures Padani Balsaminā uocāt, Hierosolymitanū pomum Hetruria, Mirabile Gallia, uulguſ Itolorum Charantiam, quoniā septi modo in hortis fenestrisq̃ per cancellos opere topiario facillè digeratur. Alteram, quam fœminā nominauimus, Itali neutro genere Balsaminū appellāt, priori quidem quod ad fructum attinet similis, nisi quod minor est, in alijs dissimilis: neq̃ enim folijs, neque etiam floribus respondet. Vtraq̃ planta uisu pulcherrima est, ut hoc saltem nomine pingi meruerint. Et si præstet etiam harum habere picturas, ut de ijs plura inuestigandi posteris occasio aliqua sit.

*Hierosolymitanum pomum.*  
*Mirabile pomum.*  
*Charantia.*  
*Alter Balsamine.*  
*Balsaminum.*

## FORMA.

*Prima.* Prima tenuibus prælongisq̃ flagellis ultro citroq̃ reptantib. euagatur, folijs Vitæ albæ seu Bryoniæ, articulationibus, exilibus pampinis ex alarum sinu prodeuntibus, quibus illigantes sese cancellatim uicinis implicant pergulis: flore cucumeris ex albo in luteum languescēte, turbinato utrinq̃ fructu, carnosa cute, & per uersus uerrucosa, ac rigidioribus bullis intumescēte, cucumeris syluestris pusilli similitudine, puniceus maturo color, cartilago intus punicea uel lutea, sanguineusq̃ succus.

*D.* Pomum maturitate dissilit, inanitasq̃ contrafacto patet, semina intus pomi formam referentia continens. Altera caulem habet crassissimū, Portulacæ alsimilem, in herbaceo colore rufescentē, folia Salicis, in ambitu incis, flores magnos, purpureos, instar Consolidæ hodie regalis uocatæ herbæ caudatos, fructum priori non dissimilem, primo herbaceū, dein pallidum luteūm ue, pilosum, qui maturitate dissilit, inanitasq̃ contrafacto apparet, semina intus aliquot lenticulæ ferè figura continentē.

*Alterius.*

## LOCVS.

Non nisi satæ in Germania proueniunt. Sed iam in multorum hortis plantatæ nascuntur.

## TEMPVS.

Floribus & fructibus prægnantes sunt Augusto & Septembri mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Idem quod Telephium temperamentū, potissimum alteram, obtinere arbitror. Quare in secundo ordine intenso, aut certe principio tertij exiccare, nec insigniter calefacere, primo nimirum ordine, est uerisimile.

## VIREs.

Ex primi generis Balsamines feminibus oleum exprimitur, ad uulnera, quod in Corollario suo annotauit doctissimus Hermolaus, præcipuum. Nōnulli pomum oleo prius imbutum aliquot dies insolant, deinde uel fimo, uel terra tantisper obruunt, dum prorsus intabuerit, sic Balsami uires glutinandis uulneribus adsciscere pollicentur, inde tractum Balsaminæ uocabulum. Quid multa? in uulneribus sanandis Telephio non inferiores esse conijcio, hincq̃ Balsaminas appellatas. Nos tamen de ijs peculiarem experientiam nullam habemus. Poterunt itaque alijs, si lubet, earundem uirium facere periculum.

*Balsamine nox unde nata.*



BALSAMINE  
PRIMA.

Balsamkraut menle.







BALSAMINE  
ALTERA.

Balsamkraut weible.



A

## NOMINA.



ΑΥΚΥΡΡΙΖΑ Græcis, Dulcis radix Latinis, Liquiritia officinis, *Liquiritia.*  
Germanis Süßholz dicitur. Nomen tum apud Græcos, tum etiā *Glycyrrhizam*  
Latinos à dulcedine, qua radix eius prædita est, inuenisse notius *de dicta.*  
est, quàm ut dici debeat. Theophrastus nono de plantarū historia *Scythica radix.*  
libro, Scythicam nominauit radicem, quod in Scythia circa Mæo-  
tim paludem plurimum proueniat. Sunt etiam qui *ἀδύκω* uoci-  
tent, quod sitim retenta in ore arceat.

## FORMA.

Breuis frutex est, ramos binūm cubitorum altitudine spargens, in quibus folia densa, Lentisco similia, pingua, tactuq̃ glutinosa. Florem fert Hyacintho similem. Fructum pilularum Platani magnitudine, asperiores tamē, siliquas Lentis modo rubescētes, breuesq̃ habentē. Radices illi sunt longæ, colore buxæ ut Gentianæ, subacerbæ, sed dulces, quæ Licij modo in succum coguntur & densantur. Hæc delinatio ita Liquiritiæ hodie uocatæ quadrat, ut nulla penitus sit nota quæ in illa non reperiatur. Fruticosa enim est, ramos bicubitales emittens, folijs lentiscinis, densis, pinguibus, tactuq̃ sequaci lentore glutinosi. Flore Hyacinthi, fructu pilularū Platani crassamento, sed asperiore, siliquas Lentis figura, & breues habente. Radicibus prælongis, buxæo colore, & dulcibus.

## LOCVS.

Plurima & optima in Cappadocia ac Ponto nascit̃. Multa præterea nec ignaua aliquot Germaniæ nostræ locis, Pabenbergensi præsertim agro, IOACHIMI nostri Camera rñj, uiri doctissimi, patria, producit̃. Et hodie nusquam ferè nō seritur in hortis. His quæ semel comprehenderit, tam pertinaci fertilitate cohæret, ut uix unquam possit radicitus extirpari, tam restibili fecunditate regerminat.

*Pabenbergensis  
ager Glycyrrhi-  
zæ fecundus.  
Ioach. Camera-  
rius.*

B

## TEMPVS.

Carpitur Septembre mense, quando semine prægnans est, aut Vergiliarum occasu. Flores suos Iulio mense profert.

## TEMPERAMENTVM.

Natura eius nostræ temperaturæ familiaris est: nam tale monstratum est esse id quod dulce est. Sed quum adstrictio quædam adiuncta sit, uniuersum eius temperamentum quantum ex caliditate & adstrictione est, tepide potissimum caliditatis fuerit, quamproximè ad symmetrum temperaturæ accedens. Porro quum etiam dulcis sit, humida quoq̃ sit oportet.

## VIREs.

## EX DIOSCORIDE.

Succus radices ad arteriæ exasperationes utilis est, oportet autem ut linguæ subditus eliquescat. Ardori stomachi, & ad iecinoris thoracisq̃ uitia prodest. Vesicæ scabiem, & renum uitia cum passo potus emendat. Idem eliquatus sitim restinguit. Vulneribus prodest circumlitus. Cōmanducatus stomacho succurrit. Radicum recentium decoctum ad eadem conuenit. Radix uero sicca in puluerem trita, pterygij commodissimè inspargitur.

## EX GALENO.

Huius fruticis radicum succus in primis utilis est, similiter ut eius radices dulcis, simulq̃ modicè adstringens. Proinde asperitates lenire potest, nō solum in arteria, uerumetiam scabra uesica, idq̃ temperaturæ mediocritate. Quoniam autem temperie quoque humidum est quod modicè dulce est, iure sanè sitim arcens medicamentum est, nimirum modicè humidum, simul & natura humana frigidius. Refert Dioscorides, radicem siccam ad leuorem redactam, pterygiorum illitu idoneum esse remedium.

## EX THEO-





GLYCYRRHIZA

Güßholz.



## A EX THEOPHRASTO.

Dulcis & Scythica radix utilis ad suspiria, & tussim siccam, atq; in totum thoracis laborantis medicamento cōmoda redditur. Quin & ex melle ulceribus mederi potest. Sitim quoq; extinguit, si teneatur in ore. Qua de causa tum ea, tum Hippacce, Scythas decem & duodecim dies degere, & uitam prorogare affirmant.

## EX PLINIO.

Radicis usus in subditis decocta ad tertias, cetero ad mellis crassitudinē, aliquando & tusa. E quo genere & uulnerib. imponitur, & faucium uitij omnibus. Item uoci utilissimo succo, sic ut spissatus est linguæ subdito: item thoraci & iecinori. In ore habentes sitim non sentiunt: ob id quidam Adipson appellauerunt eam, & hydropicis dedere ne sitirent. Non parum auxiliij confert ijs qui perpetua siti excruciantur: ideo cōmanducata & stomatice est, & ulceribus oris inspergitur, sæpe & pterygijs. Sanat uesicæ scabiem, renum dolores, condylomata, ulcera genitalium. Dedere eam quidam potui in quartanis, drachmarum duarum pondere, & pipere, hemina aquæ. Cōmanducata sanguinem sistit ex uulnere. Sunt qui & calculos ea pelli tradiderunt.

## DE GALEOPSI .CAP. LXXI.

## NOMINA.



ΑΛΗΟΨΙΣ, ἢ γαλιόβδολον græcè: Galeopsis, Vrtica labeo latinè, uulgo & officinis Scrophularia maior, Ficaria, Millemorbia & Castrangula dicitur. Germanicè *Kraunwurk* / *Sauwurk* / *groß seigwarzenkraut*.

*Scrophularia maior.*

Appositè autem Galeopsis appellatur, nomine ex græco & latino composito, quod eius flores prorsus galeæ aspectum referant. Aut si græca cum latinis componi haud possunt, γαλιόψις cum ἢ & non ἰ, ut habent multa exemplaria, scribendum erit, ut idem ualeat ac mustelæ aspectum referens: flores enim nō dissimiles esse capiti illius animalis uidentur. Et ita legendum esse Plinius etiam testatur, qui Galeopsin hanc nominat herbam. Scrophulariam autem à curandis strumis, quas scrophulas uocant recentiores, dixerunt.

*Galeopsis cur dicta.*

## FORMA.

Totus cum suo caule & folijs frutex Vrticæ similis est, læuiores tamen habet folia, & cum teruntur grauiter odorata. Flores illi tenues, & purpurascens. Huius deliniationis notæ in uniuersum omnes, nulla prorsus reclamante, herbæ quam uulgi Scrophulariam maiorem nominat, conueniunt. Frutex enim est qui ad humani corporis ferè longitudinem interdum assurgit, foliaq; Vrticæ habet, sed læuiores, & quæ trita grauem fundunt odorem. Flores tenues, atque purpurascens. Respondet etiam locus natalis, ut ex sequentibus patebit. Esse autem ueterum Galeopsin uulgi Scrophulariam maiorem, præter ea quæ iam diximus, manuscriptus quoque codex euidenter ostendit, in quo pictura ita Scrophulariam refert, ut nemo sit qui eam non agnoscat. Huc accedit quod in descriptione, quam ex Dioscoride desumpsit, apertè testatur Scrophulariam maiorem alio nomine dictam esse Galeopsin & Galeobdolon. Neque facultates discrepant, sed utrarumque similes sunt, adeò ut haud dubiè ueterum Galiopsis, recentiorum herbariorum sit Scrophularia maior.

## LOCVS.

Nascitur circa sepes, semitasq; & in areis ædificiorum passim.

## TEMPVS.

Colligitur Iunio & Iulio mensibus, tum enim potissimum floret.

R

TEMPE-





GALEOPSIS

Braunwurz.



A

## TEMPERAMENTVM.

Desiccat, extenuat, & discutit, adeoq̃ partium est tenuium, id quod amaritudo quam in gustu prae se fert, satis indicat.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Folia, succus, caulis & semen, duritias, carcinomata, strumas, parotidas & panos dissiciunt. Oportet autem bis die cum aceto tepidum cataplasma imponere. Fouentur & decocto eius utiliter. Ad nomas, gangraenas, & putrescentia cum sale illita prosunt.

## EX PAVLO.

Galeopsis, quam alij Galeobdolon appellant, urticae similis herba est, maiorem tamen laeuorem habet, & odorem grauem. Scirrhosos tumores dissipat & emollit. Item ad nomas cataplasmatibus modo illita confert.

## EX PLINIO.

Galeopsis folia caulesq̃, duritias & carcinomata sanant ex aceto trita & imposita. Item strumas, panos & parotidas discutunt. Ex usu est & decocto succo fouere. Putrescentia quoque & gangraenas sanat.


## APPENDIX.

Recentiores etiam Scrophulariae tribuunt facultatem sanandi ulcera putrescentia, & mariscas. Succum eius mederi deformitati faciei iam ferè elephantice tradunt, ut inde satis constet à Galeopsi non diuersam esse. Semen in expellendis & enecandis lumbricis esse efficax adijciunt, id quod ab eius amaritudine non abhorret.

## DE GALLIO CAP. LXXII.

## NOMINA.

B



ΓΑΛΛΙΟΝ, γαλλίειον, γαλλάπρον Grecis, Gallion Latinis. Officinis, ut multa aliae optimae herbae, neglecta & incognita est. Germanis Unser lieben frauen weg/oder wal/oder berstro dicitur. Nomen inuenit ex eo quod uim coagulandi, ac spissandi lactis habeat.

Gallion unde dictum.

## FORMA.

Ramulos rectos, & folia Aparinae simillima habet. Florem in summo luteum, tenuem, frequentem, ualde odoratum.

## LOCVS.

Nascitur in aruis & humidis palustribusue locis.

## TEMPVS.

Iunio & Iulio potissimum mensibus floret.

## TEMPERAMENTVM.

Gallium siccum est & subacre.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Flos eius ambustis illinitur, & sanguinis profluvia cohibet. Idem cerato rosaceo miscetur, insolaturq̃ donec albescat, & sic lasitudines recreat. Radix uenerem stimulat.

## EX GALENO.

Gallium inde adeò nomen sortitum est suum, quod lac coagulet. Facultatem obtinet exiccatoriam & subacrem. Flos eius sanguinis profluijs competere uidetur, & ambustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei.

R 2

DE GLE-





GALLIVM

Unser frauen wegstro.



A

## NOMINA.



ΛΗΧΩΝ, ἢ Βλήχων Græcè, Pulegium Latine uocatur. Officinæ latinum nomen retinent. Germanicè Poley. Blechona autem appellarunt, quod *Blechona* gustatum à pecore cum floret, balatum concitet. Id quod Plinio lib. xx. cap. xiiij. autore, de syluestri uerè dicitur. Pulegiū uerò, quod eius flos recens incensus pulices interficiat.

## GENERA.

Plinius & Apuleius duo Pulegij faciunt genera, alterum sceminam, alterum mare: nec alia ratione differre scribunt, nisi quod mas candidum, scemina uerò purpureum florem habeat. Dioscorides Pulegium masculum, quod satium alio nomine in Dictamni descriptione uocat, duntaxat depingit. Syluestre autem secundam Calaminthæ speciem facit, quam Latini propriè Nepetam nominant, ut suo *Satium Pulegium.* *Syluestre.* loco dicemus.

## FORMA.

Pulegium mas seu satium, cuius hic picturā damus, fruticosum assurgit, & ad cubiti altitudinem increfcit, maximè si sit quo sustentetur: folijs Sampfychi, surculis hirsutis, rubicantibus, & per interualla purpureo flore orbiculatim coronatis.

## LOCVS.

Prouenit locis cultis & aquosis: semelq; satum diutina durat ætate.

## TEMPVS.

Carpitur dum floribus prægnans est, id quod Iulio & Augusto mensib. accidit.

## TEMPERAMENTVM.

Pulegium quum acre & subamarum sit, ualde tum excalefacit, tum extenuat, *B* ideoq; in tertio ordine calidum & siccum esse statuunt.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Extenuat, calefacit, & cōcoquit. Potum menses, secundas, & foetus trahit. Cum melle & aloë potum, ea quæ circa pulmonem sunt, educit, & conuulsis auxiliatur. Nauseas stomachiq; morsus cum posca potum lenit. Atram bilem per aluum educit. Cum uino potum uenenatorum morsibus succurrit. Defectos animo cum aceto naribus obiectum recreat. Siccatum & in puluerem tritum crematumq; gingiuas firmat. Illitum cum polenta inflammationes omnes mitigat. Podagris per se confert usquedum rubescat cutis. Cum cerato uaros tollit. Lienosis cum sale utiliter illinitur. Decoctum eius prurigines si eo lauantur sedat. Inflationes, duritias, & conuersiones uulvæ in defefsionibus iuuat.

## EX GALENO.

Pulegium calefacere abunde magnum est testimonium, quod illitum rubrificat, & quod, si quis diutius toleret, exulceret. Extenuare uerò satis indicat, quum humida, crassa & lenta ex thorace & pulmone excreatu facilia faciat, mensesq; moueat.

## EX PLINIO.

Magna societas cum Menta, ad recreandos defectos animo, Pulegio cum surculis suis in ampullas uitreas aceti utrisque deiectis. Qua de causa dignior è Pulegio corona uertigini quàm è rosis, cubiculis nostris pronunciata est. Nam & capitis dolores imposita dicitur leuare. Quin & olfactu capita tueri contra frigorū æstusq; iniuriam, & à siti traditur: neque æstuarē eos qui duos è Pulegio surculos impositos auribus in sole habeant. Illinitur etiam in dolorib. cum polenta & aceto. Nauseas cum sale & polenta in frigida aqua pota inhibet. Sic & pectoris ac uentris dolorem. Stomachi autem ex aqua item rosiones sistit, & uomitiones cum aceto & polenta. Intestinorum uitia melle decocta & nitro sanat. Vrinam pellit ex uino, &





PVLEGIVM

Poley.



**A** si aminæum sit, & calculos, & interiores omnes dolores, ex melle & aceto sedat. Menstrua & secundas, uulvas conuersas corrigit, defunctos partus eiicit. Comitialibus in aceto cyathi mensura datur. Si aquæ insalubres bibendæ sunt, tritum inspergitur. Salitudines corporis si cum uino tradatur minuit. Neruorum causa & in contractione, cum sale, aceto & melle confricat opisthotono. Bibitur ad serpentium ictus decoctum. Ad scorpionum, in uino tritum, maximè quod in siccis nascitur. Ad oris exulcerationes, ad tussim efficax habetur. Flos recentis incensus, pulices necat odore. Xenocrates Pulegij ramum lana inuolutum, in tertianis ante accessionem olfactandum dari, aut stragulis subijci, & ita collocari ægrum, inter remedia tradit.

## EX SYMEONE SETHI.

Pulegium attenuat & calfacit uehementer, quapropter humida & crassa in thorace, & in pulmone humida & glutinosa iuuat, & ut excreentur efficit. Cum uino albo coctum & potum, calidumq; syncerum menses prouocat. Extrinsecus illitum ischiadicis, & alijs partibus frigore affectis auxiliatur.

## DE GENTIANA CAP. LXXIII.

## NOMINA.



**G**ENTIANA hæc græcè, Gentiana latinè appellatur. Nomen apud omnes officinas retinet. Germanicè *Enzian* oder *Bitterwurz* nominatur. Sic à Gentio Illyriorum rege, qui in bello primus eius uires reperit, dicta est.

*Gentiana uita  
de dicta.*

## FORMA.

**F**olia Gentianæ iuxta radicem erumpunt iuglandi aut Plantagini similia, subrubentia: sed quæ à medio caule, præsertim autem cacumine prodeunt, breuioribus incisuris secta sunt. Caulis illi inanis, leuis, digiti crassitudine, binum cubitorum altitudine, geniculis intersectus, ex maioribus interuallis folia proferens. Flores eius lutei primum calycibus conclusi, postea intumescences explicantur. Semen in calycibus obtinet latum, leue, glumosum, ad Spondilij semen accedens. Radicem mittit longam, similem Aristolochiæ longæ, crassam, & amaram.

## LOCVS.

Nascitur in altissimis montium cacuminibus, umbrosis locis & aquosis. Plurima uerò & copiosissima sub Alpinis montibus in Illyrio, & in monte *Sarrenberg* haud procul à *Tubinga* sito.

## TEMPVS.

Floret æstate, Iunio potissimum mense, dein Iulio semen producit.

## TEMPERAMENTVM.

Amaritudo immensa satis monstrat radicem eius esse calidam & siccam.

## VIREs.

## EX DIOSCORIDE.

Gentianæ radix calefactoriam & adstringentem uim habet. Venenatorum moribus succurrit duarum drachmarum pondere cum pipere, ruta & uino pota. Succus drachma, laterum doloribus, ex alto cadentibus, ruptis & couulsis opitulatur. Hepaticis, stomachicis pota cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita foetus eiicit. Vulneraria est, imposita ut lycium, uulneribusq; sinuatim depascentibus, potissimum succus, medetur. Oculis inflammatione laborantibus illinitur. Promeconio collyrijs acribus miscetur succus. Radix alphas abstergit. Contusa radix diebus quinque aqua maceratur, postea in eadem decoquitur, dum aquæ radices superstent emineant; deinde ubi refrixerit aqua linteolo percolatur, iterumq; decoquitur, dum mellis crassitiem contrahat; demum in uase testaceo reconditur.

R 4

EX GALE-





GENTIANA  
Engelm.



## EX GALENO.

Radix Gentianæ herbæ admodum efficax est quum opus est extenuatione, purgatione, abstersione, obstructionis liberatione. Nec mirum si hæc possit, quum impense amara sit.

## EX PLINIO.

Vfus in radice & succo. Radicis natura est exsiccatoria, sed prægnantibus non bibenda. Præcipuè aduersus angues duabus drachmis cum pipere & ruta, uini cyathis sex, siue uiridis siue sicca pota prodest. Tanta huic uis est, ut iumentis etiam nō tulsientibus modo, sed ilia quoq; trahentibus auxilietur pota. Stomachum corroborat ex aqua pota. Farina eius ex aqua tepida fabæ magnitudine pota, interaneorum uitij occurrat. Radix trita uel decocta, à ruptis, conuulsis, & ex alto deiectis potatur.

## DE GLYCYSIDA CAP. LXXV.

## NOMINA.



ΛΥΚΥΣΙΑΗ, ἡ παωνία Græcis, Pæonia & Casta herba Latinis dicitur. Nomē Pæoniæ in officinis seruat. Germanis Peonienblum / Königsblum / Gichtwürz / Benignenros / Venedischros / Benedictenros / Pfingstros uocatur. Glycyda porro dicta est, quod grana mali punici acinis similia habere uideatur. Nam sidia mali punici grana à Bæotis nominantur. Pæonia ab eius inuentore, medicinæ peritissimo, Pæone appellata est.

Glycyda una de dictis.

Pæonia cit dicta.

## GENERA.

Duo eius genera sunt, mas & fœmina. Mas in uulgaribus herbarijs *Viniuenwurz* / fœmina uero *Peonienblum* / alijsq; nominibus Germanicis paulò antè commemoratis nuncupatur. Idem, magno errore, Pæoniam à Pionia differre putant, atque adeo diuersis etiam capitibus, imò & uiribus disiungunt. Ferendus tamen is error esset nisi utriq; etiam herbæ, hoc est, Pæoniæ & Pioniæ, duplex genus assignarent, marem nimirum & fœminam, cum tamen sub una Pæoniæ nomenclatura, utrunq; genus Dioscorides & alij ueteres complexi sint.

Error herbariorum.

## FORMA.

Caulis duorum ferè dodrantū altitudine nascitur, multas propagines habens. Mas Iuglandi nuci folia similia obtinet: fœmina uero Smyrni modo diuisa. Summo caule siliquas quasdam Amygdalis similes profert, in quib. quum aperiuntur, grana rubra, multa, exigua, punici mali acinis similia inueniuntur, in medio nigra, purpurea, quinq; aut sex. Radix maris digiti crassitudine, dodrantali uero longitudine, gustu adstringens, alba. Fœminæ propagines sobolēsue ceu glandes septem aut octo, ut Asphodelus habet. Ex qua siquidem descriptione abundè liquet, Pæoniam quæ passim in hortis nascitur, & cuius hic picturam damus, esse fœminam, quod eius folia Smyrni modo sint laciniata, & quod radix septem aut octo ueluti glandibus constet. Reliquæ notæ, potissimum quod in siliquis grana alia rubentia, alia nigra sint, utriq; generi cōmunes existunt.

## LOCVS.

Nascitur in altissimis montibus, & passim hodie, fœmina potissimum, in hortis prouenit.

## TEMPVS.

Maior floret mense.

## TEMPERAMENTVM.

Pæonia radicem habet leuiter adstringentem cum quadam dulcedine. Si uero plusculum dentibus mandas, acrimoniā item quampiam subamaram subesse percipies, id quod in radice etiam nostratis Pæoniæ, quam fœminā esse diximus, deprehendes.





PAEONIA  
FOEMINA

Peonienblum.



A hendes. Pæoniæ uerò in uniuerfum temperamentum tenuium est partium, exicatorium, haud tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut paulò calidius.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Datur radix mulieribus à partu non purgatis. Cit menses Amygdalæ magnitudine pota. Ventris doloribus cum uino pota auxiliatur. Regio morbo correptis prodest, renum ac uesicæ doloribus. Decocta in uino & pota, aluum sistit. Seminis grana rubra decem aut duodecim pota in uino austero, nigro, rubentem fluxionē sistit. Stomachicis & erosionibus comesta prosunt. A pueris pota & comesta, initia calculorū eximunt. Grana nigra nocturnis suppressiōibus, ephialtas nominant, uulua stranguationibus, & uteri doloribus in aqua mulsa aut uino quindecim pota, opitulantur.

## EX GALENO.

Radix Pæoniæ menses cit ex mulsa Amygdalæ quantitate pota. Sanè tundere eam oportet ac cribare, & sic inspergere. Expurgat etiam iecur obstructū & renes. Sed hæc efficere nata est quā acris & subamara est, quā uerò quiddam etiam adstrictorium obtinet, fluxiones uentris sistit. Oportet autem tunc in austerorum uinorum quopiam eam decoctam bibere. Est omnino resiccatoria uehementer, ut non desperaui eam ex collo pueris suspensam, meritò comitalem morbum sanare. Equidem uidi puellum quandoque octo totis mensibus morbo comitali liberum, *Historia.* ex eo quo gestabat radicem tēpore. Vbi autē forte fortuna quod à collo suspensum erat decidisset, protinus morbo correptus est: rursusq; suspensio in illius locum alio, inculpatē postea se habuit. Visum uerò est mihi satius esse denuò id certioris experientiæ gratia detrahare, id quum fecissem, ac puer iterum esset cōuulsus, magnam ac recentem radicis partem ex collo eius suspendimus, ac deinceps prorsum sanus effectus est puer, nec postea conuulsus. Rationabile itaque erat aut partes quaspiā à radice defluentes, ac deinde per inspirationem attractas, ita affectos locos curare, aut aërem à radice assidue mutari & alterari. Nam hoc pacto succus Cyrenaicus columellam phlegmone affectam iuuat, & Nigella fricta palam destillationes & grauedines desiccant, si quis eam in calidum linteam rarum liget, assidueq; calorem ex ea per inspirationem quæ per nares fit, attrahat. Quinetiam si compluribus linis, maximè marinæ purpuræ, collo uiperæ inieceris, illis uiperam præfocaueris, eaq; postea cuiuspiam collo obuinceris, mirificè profuerit tum tonsillis, tum omnibus rjs quæ in collo expullulant.

## EX PLINIO.

Pæonia medetur Faunorum in quiete ludibrijs. Rubra grana rubentes menses sistunt quindecim ferè pota in uino nigro. Nigra grana uuluis medentur, ex passo aut uino totidē pota. Radix omnes uentris dolores sedat in uino, aluumq; purgat. Sanat opisthotonum, morbum regium, renes, uesicam. Matricem autem & stomachum decocta in uino, aluumq; sistit. Estur etiam contra malum mentis, sed in medendo quatuor drachmæ satis sunt. Grana nigra auxiliantur & suppressiōib. nocturnis in uino pota quo dictum est numero. Stomacho uerò & erosionibus, & esse ea & illinire prodest. Suppurationes quoq; discutiuntur recentes nigro semine, ueteres rubro. Vtruncq; auxiliatur à serpente percussis, & pueris contra calculos incipiente stranguria.





GERANIVM  
PRIMUM.

Storckenschnabel.





GERANIUM  
ALTERUM.

Daubenfuß.

S





GERANIVM  
TERTIVM.

Ruprechtstauden.





GERANIVM  
QVARTVM.

Kranichhalz.





GERANIVM  
QVINTVM.

Sottengnad.





GERANIVM  
SEXTVM

Blutwurz.



## NOMINA.

**C**  
Roſtri ciconie.  
Geranium unde  
dictum.



GERANION græcè, Geranium latinè, uulgo & herbarijs Roſtrum ciconiæ appellatur. Geranium autem à gruini capitis imagine, quæ ſummo eius plantæ capitulo ineſt, Græcis aptiſſima ſimilitudine dictum eſt. Sic recentioribus à ciconiæ roſtri effigie, Roſtrum ciconiæ nominatū eſt.

## GENERA.

- Primum genus.** Duo Geraniꝝ Dioſcorides tradit genera. Primum quod longioribus roſtris, & in mucronem acuminatis conſtat. Hoc hodie officiis & herbarijs Acus paſtoris & **Secundum.** Muſcata, Germanis uerò *Stordenschnabel* dicitur. Alterum quod maluæ folia habet, **Pes columbinus** uulgo nominatur. Sunt qui turpiter aberrantes, **Amomū** eſſe exiſtimant. Germanicè *Taubenſüß/oder Schartenkraut* appellatur. Præter **Tertium.** hæc duo alia adiecimus genera, inter quæ id quod tertium ordine eſt, folijs *Artemiſiæ tenuifoliæ* uel *Chærephylo* ſimile exiſtit, herba **Roberti & Robertiana** à nonnullis, haud dubiè à ſuperſtitione aliqua Diui, qua ſuperior ætas mirificè imbuta fuit, appellatur, germanicè *Rüprechtskraut*. **Quartum** folia obtinens laciniata, germanicè pro certiori diſcrimine *Kranichhalß* uocari poteſt. **Quintum,** quod folia *Ranunculi* habet, gratia Dei nominatur, germanicè *Gottes gnad* / ab **Sextum.** in ſigni in ſanandis uulneribus effectū. Sextum, quod forma quarto generi ſimillimum eſt, nec ferè ab illo niſi ſola magnitudine foliorū, florum & radicis diſtat, germanicè *Blutwurz* / à rubro colore aut mirifica in liſtendo ſanguinis profluuiō facultate uocatur.

## FORMA.

- Primi.** Geranium primum caules habet à radice rubentes, lanuginoſos, folia *Anemones*, diuiſuris incifa, flores purpureos, & in cacumine caulium ſaſtigia capitulis ciconiæ aut gruini cum roſtellis longitudine acus emicantia. Radicē oblongā & ſubrotundā dulcemq̃. **Secundi.** Alterū ut præcedēs caules tenues, rubentes à radice ſtatim, lanuginoſosq̃ obtinet, folia maluæ ſimilia, candidiora, ſoſculos ſubpurpureos, capitella gruini capitis modo roſtrata, radicem tenuem & oblongam. **Tertij.** Tertium, caules habet à radice rubeſcentes, lanuginoſos, geniculatos, ſaporis & odoris iniucundi, folia *Chærephylo* aut *Artemiſiæ tenuifoliæ* ſimilia, flores purpureos, capitella gruini capitis modo roſtrata, radicem intus uiridem, & adſtringentem. **Quarti.** Quartum, cauliculos itidem ut reliqua rubentem, lanuginolum, folia laciniata admodū, flores purpureos, ex quibus capitella gruini capitis inſtar roſtrata, & in ijs ſemina **Quinti.** quinq̃ naſcuntur: radicem intus candidam, extrā ſubluteam. Quintum reliqua omnia magnitudine excedit, caules emittit oblongos, rotundos, modicè lanuginofos, à radice ſtatim rubentes, folia *Ranunculo* ſimilia, flores ferè cæruleos, capitella præcedenti Geranio ſimilia, radicem craſſam & longam, multis exiguis radiculis ueluti capillamentis quibuſdam fibratā. **Sexti.** Sextum ramos habet tenues, lanuginofos, folia laciniata, tenuia, flores in ſummo purpureos, ex quibus, ut in quarto, capitella gruini capitis formam referentia proueniunt. Radicem extrā & intus ruſam.

## LOCVS.

Omnia Geraniꝝ genera in incultis proueniūt. Primum paſſim in campeſtribus, & nōnunquam inter ſegetes naſcitur. Alterum in colliculis. Tertium in umbroſis locis & dumetis. Quartum in agrorum limitibus, & iuxta ſepes. Quintū in pratis. Sextum in locis montolis & ſaxoſis.

## TEMPVS.

Primū ſtatim inter initia ueris Aprilī menſe flores ſuos oſtendit, & ſubinde per integram æſtatem. Alterum, tertium, & quartum, Maio menſe florent. Quintum Iunio & Iulio menſibus, quemadmodum etiam ſextum.

## TEMPERAMENTVM.

Omniū folia & radices, primo excepto, cuius radix dulcis eſt, quodammodo, atquea.



**A** atque adeò discutiendi ui prædita, adstringunt ac siccant.

VIREs.

EX DIOSCORIDE.

Radix Geranij primi in uino drachmæ pondere pota, uteri inflationes discutit. Secundum nullum habet in medicina usum.

EX PAVLO.

Geranium quod folijs respondet Anemones, radicem habet esculentâ, quæ cum uino drachmæ unius pondere sumpta, uteri inflationes dissoluit. Altera Gerani species in re medica inutilis est.

EX PLINIO.


Primæ Gerani species radix, reficientibus se ab imbecillitate utilissima. Bibitur contra phthisin drachma in uini cyathis tribus bis die. Item contra inflationes, quæ & cruda idem præstat. Succus radice auribus medetur. Opisthotonicis semen drachmis quatuor cum pipere & myrrha potum.

APPENDIX.

**B** Et si secundum Gerani genus à Dioscoride alijsq; nonnullis, tanquam nullius in medicina usus damnatū sit, tamen posterior ætas quotidiana experientia in sanandis uulneribus & fistulis, eius ac reliquorum etiam mirum esse effectum comperit: proinde eas herbas his ipsis in potu mirificè cōferre tradunt. Et certè nō mirum est earundem uires olim fuisse ignoratas, cum & aliarum multarum plantarum facultates, quas constat esse hodie notissimas, ueteribus fuisse incognitas, notius sit quàm ut demonstrari debeat. Antiquus quoq; herbarius, prædictorum Geraniorū folia magnam uim obtinere in glutinandis uulneribus, & articularum doloribus leniendis tradit. Primi autem radicem mouendi urinam facultatem habere ait, ideoq; calculosis, stranguriæ & difficultati urinæ prodesse. Tertium genus ad oris, mammillarum, pudendorumq; ulcera sananda unicè cōducit. Reliqua similiter ad glutinanda ulcera mirificè profunt. Nullum uerò ad sanguinem undecunq; emanantē compescendū præstantius sexto est: unde etiam Germani, ut comprehensum est, *Blutwurz*; hoc est, sanguinariam radicem appellare uoluerunt.

## DE GONGYLE CAP. LXXVII

NOMINA.



**ΓΟΓΥΛΗ**, ῥογγυλὶς Græcis, Rapum Latinis & Officinis, Germanis *Rüben* appellatur. Græci autem à figura eius, quæ plerunq; rotunda esse solet, uocabulum detorserunt. Namq; quod in rotunditatem coactum est, uel in orbem circumagitur, *ρογγύλιον* dixerunt. Rapa uerò, quod ex terræ rure, quasi ruapa, Varrone teste, nominata est.

Gongyle quare dicta.

ρογγύλιον.  
Rapa unde.

GENERA.

Rapi duo sunt genera. Vnum satiuū, quod simpliciter Germani *Rüben* uocāt. Estq; id iterum duūm generum. Vnum candidum, quod Germani etiam *weißrüben* uocant: & alterum rubrum, *rot rüben* idem appellant. Alterum syluestre, quod uulgus Rapunculum, quasi paruū rapum, Germani *Rapungeln* nomināt.

Rapunculus.

FORMA.

Rapum satiuū caule & folijs raphano simile est: floribus uerò & siliquis, in quibus semen profert, Napis aut Brasicis. Syluestre frutex est cubitali altitudine, ramosum, in summo leue, folia nimirum leuia habens, digitali latitudine, aut maiora. Semen in calyculatis fert siliquis: dehiscenrib. uerò seminū inuolucris, alia intus capitū specie est siliqua, in qua semina parua nigra sunt, sed quæ fracta intus albicent. Flos eius in purpureū uergit colorem. Radix digitalis ferè est. Quæ deliniatio prorsus alludit ad hanc herbam quam uulgus Rapunculum nominat: siquidem cubitalis est, fruticosa, ramosa, folio digitali, nigro in siliquis semine, quod cum frangitur album intus apparet. Flos etiam purpurei coloris est, radixq; digiti magna ex parte magnitudine constat.

Syluestre rapū.





RAPVM  
SATIVVM.

Weißrüben.





RAPVUM  
RVBRVM.

Rotrüben.





RAPVM  
SYLVESTRE.

Rapunzeln.



## LOCVS.

A Satiuum solum putre & solum desiderat. Syluestre in aruis nascitur passim.

## TEMPVS.

Satiuum rapum floret æstate, ac siliquatur subinde. Syluestre autem uerno quidem tempore priusquam in caulem attollitur, acetarijs frequenter inferi solet, erutum radicitus cum folijs suis iam recens enatis, quo sanè tempore à pueris etiam agnoscitur. Deinceps uerò exit in caulem & adolescit, ac Iunio mense flores, ac subinde semina profert.

## TEMPERAMENTVM.

Rapa calida sunt in secundo ordine, & humida in primo.

## VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Satiui rapi elixa radix nutrit, inflat, carnem flaccidam generat, uenerem stimulat. Decocto eius podagræ ac perniones fouentur. Ipsa etiam radix trita illita prodest. Si uerò quispiam in excauata radice rosaceum ceratum feruenti cinere liquefecerit, exulceratis pernionibus proficiet. Asparagi eius decocti eduntur ciendæ urinæ accõmodi. Semen in antidota & theriaca, præsertim quæ dolores mitigare possunt, aptè additur. Potum uenenis aduersatur. Venerem concitat. Muria conditum, comestum minus nutrit, sed appetentiam excitat. Syluestre rapum miscetur medicamentis quæ ad detergendam faciem reliquumq; corpus, ex lupinorum, aut tritici, aut lolij, aut erui farina conficiuntur.

## EX GALENO.

B Rapi semen uenerem excitat, utpote spiritum flatuosum procreans. Sic & radix concoctu difficilis est, inflatq; & semen generat. Succus ex ea in corpus digestus, temperato crassior est: ideoq; si quis ultra modum esitauerit, & maximè si perfectè conficere eam nequeat, crudum succum in uenis congeret. Ad alui deiectionem nec conferre quicquam, nec officere dixeris, potissimum quando bene fuerit percocta, ut quæ longam elixationem requirat, optimaq; sit bis decoctionem perpessa. Sin crudior ingeratur, concoctioni pertinacius resistet, pariet inflationes, & stomachum infestabit, nõnunquam etiam mordere illum non uerebitur.

## EX PLINIO.

Rapo uis medica inest. Perniones feruens impositum sanat. Item frigus pellit e pedibus aqua decoctum. Et ius feruens podagris etiam frigidis medetur. Et crudum tusum cum sale cuiuscunq; uitio pedum. Semen illitum & potum in uino, cõtra serpentes & toxica salutare esse proditur. A multis uero antidoti uim habere in uino & oleo. Democritus in totum ipsum abdicauit in cibis propter inflationes. Dioscles magnis laudibus extulit, etiam uenerem stimulari ab eo professus. Item Dionysius: magisq; si eruca condiretur. Tosta quoque articulorum dolori cum adipe prodest. Syluestri ad leuigandã albicandãue cutem in facie totoq; corpore, utuntur, mixta urina pari mensura. Eius succus circa messem exceptus, oculos purgat, medetur caligini admixto lacte mulierum.

## EX SYMEONE SETHI.

Admodum nutriunt rapa, urinam ciunt, inflant, genitale semen gignũt, fauces leniunt atque thoracem. Crebrior illorum usus crassum humorem generat, & obstructions iecoris parit. Ventrẽ nec sistunt, nec mouent. Si cum aceto & sale edantur, appetentiam excitant. Horum semen tritum & haustum magna copia, uenerem suscitatur. Fertur quod si quis hoc ipsum semẽ cum Calamintha & Lemnia terra cõmixtum sumat, eo die neque ueneno, neque morfu uenenati animalis lædi. Appensum inguinum morbis peculiari quapiam proprietate medetur.






GINGIDIVM

Kerbelkraut.



## NOMINA.



**I**RRIGATION græcè, Gingidium latinè, officinis Chærefoliū, Germanicè *Chærefolium*. Kerbelkraut dicitur. Chærefolium autem, græca uoce & latina coalescentibus in unum nomen, ob id dictum est, quod folijs luxuriet. Ne ta-  
Chærefoliū uia de diffum.  
 men uocabulorum uicinitas aliquam pariat cōfusionem, imperitoq; le-  
 ctori nomenclationū similitudo imponat, sciendum est officinarum Chærefolium  
 diuersum esse à Chærefolio Plinij.

## FORMA.

Herba est syluestri Pastinacæ similis, tenuior tantum & amarior. Radicula sub-  
 candida, amaricante. Vnde satis liquet herbam quam hodie Chærefolium nomi-  
 nant, esse Gingidiū. Nam erraticæ Pastinacæ folium æmulatur, aliquanto tenuius,  
 radicula subalba, amaricante, floribus candidis, semine in siliquis exiguis oblongo,  
 angusto & acuminato.

## LOCVS.

Pasim hodie in hortis colitur.

## TEMPVS.

Maior mense floret, & subinde semen profert.

## TEMPERAMENTVM.

Sicut gustu amaritudinem & adstrictionem præfert, sic temperamento quoque  
 ipso caliditatem & frigiditatem. Secundum uerò utranq; qualitatem desiccatoriū  
 in secundo ordine est: unde iterum colligi potest, Chærefolium esse Gingidium,  
 quod ipsum gustui amarorem & adstrictionem euidentissimè repræsentet.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

**B** Crudum & coctum olerum modo esui idoneum est. Editur etiam sale cōditum  
 seruatumue. Stomacho utile. Vrinam ciēt. Decoctum eius cum uino potum, uesi-  
 cæ accommodum est.

## EX GALENO.

Estur Scandicis modo. Stomacho mirè utile siue crudum, siue elixum libeat su-  
 mere. Longioris decoctionis impatiens est. Nōnulli ipsum ex garo oleoq; esitant.  
 Alij uinum aut acetū adijciunt, ac multo sic magis stomacho conducit. Cum aceto  
 assumptum, fastidiosos ad cibum inuitat. Perspicuum uerò est hanc herbam medi-  
 camentum magis esse quàm cibum, quippe quæ & adstrictionis & amaritudinis  
 non obscuræ nec exiguæ particeps est.

## EX PLINIO.

Coctum crudumq; stomachi magna utilitate estur. Siccat enim ex alto omnes  
 humores eius.

## APPENDIX.

Facultates iam cōmemoratas etiam Chærefolio suo tribuunt recentiores: scri-  
 bunt enim mirificè conferre uentriculo, ciendisq; mensibus, & uring in uino deco-  
 ctum, ut iterum hinc constet à Gingidio non esse diuersum.

T

DE GENI-





GENISTA

Sinfr.



## NOMINA.



GENISTA Latinis rei rusticæ scriptoribus & Plinio nominatur. Offici-  
nis & barbaram sectantibus medicinam, Genesta & Genestra. Germa-  
nis Ginst uel Genist appellat. Genistam autem uocāt haud dubiè quod  
genu modo flexilis ad nexus sit: uel, ut alijs placet, quia genibus medea-  
tur dolentibus. Alia autem est à Sparto, quod hoc uirgas habeat longas sine folijs,  
ut suo dicemus loco, illa autem minutis folijs scatet.

Genesta.

Genista unde  
dicitur.Genista non est  
eadē cū Sparto.

## FORMA.

Genista fruticat ramis herbaceis, scabris, folijs minutis scatentibus, flore luteo,  
apibusq; gratissimo, semine lenticulis haud ab simili, quod siliquis innascitur, radi-  
ce sublutea.

## LOCVS.

Perarida loca amat, ideoq; in syluis, & iuxta syluas nascitur.

## TEMPVS.

Florat Maio & Iunio mense, ac subinde in siliquis hirsutis semen profert.

## TEMPERAMENTVM.

Calefacit & siccāt in altero ordine, id quod amaritudo quā gustata refert, & eius  
facultates abundè docent.

## VIRE.

## EX PLINIO.

Semen Genestæ purgat Ellebori uice, drachma & dimidia pota in aquæ mulsæ  
cyathis quatuor ieiunis. Ramis similiter cum fronde in aceto maceratis plurib. die-  
bus & tuis, succum dant ischiadicis utilem, cyathi unius potu. Quidā marina aqua  
macerare malunt, & infundere clystere. Perunguntur eodem succo ischiadici, addi-  
to oleo. Quidam ad stranguriā utuntur semine. Genista tusa cum axungia, genua  
dolentia sanat.

## APPENDIX.

Ex iam cōmemoratis uerbis perspicuum omnibus fit, Sparto & Genistæ, nō ob-  
stante quod forma non nihil distent, eandem inesse facultatem: ut enim Spartum pi-  
tuitam per superna & inferna purgare potest, sic etiā Genista. Hinc adeo fit ut eius  
feminis hodierno tempore contra podagram magnus sit usus. Vrinam etiam ama-  
ritudinis ratione mouet, & quia incidendi & extenuandi facultatem habet, lapidem  
tum in renibus, tum in uesica cōfringere, ut etiam recentiores tradunt, potest. Stru-  
mas denique atq; alios tumores discutere posse n̄dem scribunt.

## DE GENISTELLA CAP LXXX

## NOMINA.



RIORI non admodum dissimilem herbam nonnulli Genistellam uo-  
cant, quod scilicet Genista exilior & humilior sit. Germanicè appellari  
potest, die stehende Ginst. Alij uocāt Erdpstyimen/oder Klein streich-  
blimen. Sunt qui non sine magno errore pro Genista utantur, quum fa-  
cultatibus diuersis prædita sit. Sunt qui Rosmarinum aculeatum nominent, quod  
eius folia Rosmarino ferè similia sint.

Genistella.

Rosmarinus acu-  
leatus.

## FORMA.

Frutex est Libanotidis coronariæ, quam Rosmarinum uocāt, penè folio, sed ri-  
gido ac pungente, flore luteo, piso non dissimili, semine in exiguis siliquis rufo, ra-  
dice sublutea.

## LOCVS.

Nascitur in arenosis locis, secus uias.

T 1

TEMPVS.





GENISTELLA  
Stechende Ginster.



A

## TEMPVS.

Maior mense flores luteos producit, quibus pastæ apes improbū mel conficiunt.

## TEMPERAMENTVM.

Adstringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde ualenter, simulq̃ citra mordacitatem exiccantem.

## VIREs.

Semen eius serpentibus aduersari tradunt. Decoctum foliorum, profluuiū menstruorum sistit. Idem etiam potum uentris fluori succurrit. Et ut rem in pauca contraham, idem Genistella quod Hippuris seu Cauda equina potest.

## DE GNAPHALIO CAP. LXXXI.

## NOMINA.



ΓΝΑΦΑΛΙΟΝ Græcis, Centunculum aut Centuncularis herba Latinis nominat̃. Officinis ignota. Germanis *Ährtraut* appellat̃. Gnaphaliū uerò uocata est hæc herba, Galeno autore, à candidis mollibusq̃ eius folijs, quibus *ἀντὶ γναφάλοι*, hoc est, pro tomentis utuntur. Gnaphalion itaque dicitur, quasi tomentitia. Centunculum autem dixerūt, quod centonibus cum tomento maxima sit cognatio. Germanicam nomenclaturam ab eius facultate aduersus dysenteriam illi inditam esse nemini non notum est.

Centunculum.

Centuncularis herba.

Gnaphaliū quare dictum.

Centunculus caruocatus.

## GENERA.

Duū esse uidetur generum: unum enim paulò latioribus ac candidioribus folijs constat: alterum uerò tenuioribus & minus candidis, quodq̃ flores in summitate ac cacumine tantum profert. Verum cum forma parum admodum, facultatibus uerò nihil distent, nos una pictura genus utrunq̃ complexi sumus.

## FORMA.

Candida & mollia Gnaphalium obtinet folia, atque adeò tomentitia, floresq̃ luteos, radicem uero capillatam ac tenuem, ut pictura ipsa monstrat.

## LOCVS.

Vulgaris herba ubiq̃ scatens Gnaphalium, in locis siccis potissimum, interdum etiam pinguibus proueniens.

## TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret.

## TEMPERAMENTVM.

Adstringit atque adeò exiccatur Gnaphalium.

## VIREs.

## EX DIOSCORIDE.

Gnaphalii folijs aliqui pro tomento utuntur. Tamen faciunt hæc ipsa in austero uino pota ad dysenteriam.

## EX GALENO.

Folia Gnaphalii mediocriter adstringunt, ac proinde quidam id exhibent ex austerorum uinorum quopiam dysentericis.

## EX PLINIO.

Datur in uino austero ad dysenteriam, uentris solutiones, mensesq̃ mulierum sistit. Infunditur autem tenasmo, Illinitur & putrescentibus ulcerum.

T 3

DE DIPSA-





GNAPHALIVM

Rhürkraut.



A

## NOMINA.



ΙΡΣΑΚΟΣ Græcis, Labrū ueneris, Carduus ueneris Latinis, Virga pastoris. Virga pastoris officinis, & Cardo fullonum dicitur. Germanis Kartendistel / Bübenstrel / Weberkatten. Dipsaci autē nomen à contrario inuenit, quoniam concavo alarum sinu rorem uel imbrem recipiat, quo uelut ad abigendas sitis iniurias abutitur. Labri ueneris nomenclationē à carinato foliorum habitu contraxit, quæ se anfractuosa sinuantia ambage, peluis uel lauacri speciem cōstituunt, & intra se humore nunquam nō retinent. Virga pastoris haud dubiè dicta est, ob longas uirgas, quibus cardui ad poliendos pannos utiles insident, quas pastores fortè sumunt, & ea parte qua possit manu capi aculeis nudant, reliqua autem aculeata parte gregem ducunt. Carduus uerò fullonius cœpit appellari, quod ea rudes pannos uelut echino quodam expoliunt, detractisq; floccis concinnant. Errat mirum in modum Serapionis interpres, qui sub Virgæ pastoris nomine, Polygonon Dioscoridis deliniat.

Virga pastoris.

Dipsacus unde dicta.

Labrum ueneris

Virga pastoris.

Carduus fullonius.

Serapionis interpres perstringitur.

## GENERA.

Duū est generum. Vnum quod à fullonibus in hortis plantatur, alterū quod sua sponte pascim prouenit. Differunt inter se hac quidem ratione, quod primum folia latiora & profundius in ambitu incisa, flores candidos, echinataq; capitula magis aculeata habeat: alterum contrā angustiora & minus laciniata folia, flores purpureos, capitulaq; minus aculeata obtinet. Nos discriminis illius rationem habentes, primi generis appellauimus Dipsacum album, alterius uerò Dipsacum purpureum, ad florum nimirum respicientes diuersitatem.

## FORMA.

B Aculeatarum generis est hæc herba. Caulem habet altū, spinis horrentē, folia caulem amplectentia, lactuæ similia, in singulis geniculis bina, oblonga, aculeis armata, quæ in dorsi medio ueluti bullas intus & extrā spinosas habent, cōcavo quo se in geniculis cōiungunt sinu, quo aquæ, rores, & imbres asseruantur, unde Dipsaci quasi sitientis nomen traxit. In cacumine caulis, singulis surculis capitulū unum echino simile inest, oblongum, aculeatum, quod postquam exaruerit candidū apparet. Dissectū per mediam medullam caput, uermiculos habet. Quod si itaq; contempleris eam quam herbarij hodie Virgā pastoris & Carduum fullonū nomināt herbam, offendes omnes huic notas respondere. Siquidem hæc pastoria uirga profert caulem binū cubitorū, imò qui sæpiusculè supra hominis altitudinē increseat, spinis horridum, geniculatū, folia lactuæ, in singulis geniculis bina, prælonga, aculeata, quorum toruli bullantibus turgent spinis, dorsoq; nocentibus aculeis rigent, carinato alarū sinu, qui peluis uel labri modo roris & imbris pluuij capax sit. Gnarræ laticis huius auiculæ, cum solis ardentissimus opprimit æstus, huc appelluntur ad satianda sitis desideria, illis facta bibendi potestate anfractu liberalem potum ministrante. Scaporum fastigia echinato minantur uertice, resupina hamulorū flexura, mucronibusq; leuiter uncinatis, quibus rude lanificiū aspero ductu læuigatur. Singuli echini è rotundo in oblongum quod antenus turbinantur, inter quorum spicula candicans aut purpureus emicat flos. His dissectis in medullo uermiculos identidem nobis in autumnno quum exicari incipit licet inuenire. Vermiculus autem albus est, qui per cavitatem echini dimouetur, & in caudicem transit. Hyeme etiam eundem uidere licebit antequam præ frigore moriatur. Imò etiam ueris initio in quibusdam uermiculi à nobis reperti sunt, partim uiui, partim mortui.

Vermiculi in echinis Dipsaci inuenti.





DIPSACVS  
ALBUS.

Weiß Kartendistel.



DIPSACVS  
PURPUREVS.

Braun Kartendistel.





## LOCVS.

**C** Nascitur humectis locis, iuxta riuos aquarum & fontes: quapropter nonnulli Dipfacon à Græcis nominatum esse arbitrantur.

## TEMPVS.

Carpitur in æstate, Iunio & Iulio potissimum mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Dipfaci spinæ radix ex secundo ordine exiccantium est, habetq; nonnihil absterforium.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius radix cum uino decocta & tusa usq; dum cerati crassitudinē accipiat, imposita rimas fistulasq; sedis sanat. Oportet autem medicamentum hoc ærea pixide recondere. Ferunt præterea formicis & uerrucis pensilibus remedio esse. Vermiculi capitis eius in folliculo clausi & collo aut brachio appensi, quartanas sanare produntur.

## EX PLINIO.


Sanat rimas sedis, item fistulas decocta in uino radice usq; dum sit crassitudo ceræ, ut possit in fistulam mitti. Item uerrucas omnium generū. Quidam & alarum, quas modo diximus, succum ipsi illinunt.

## APPENDIX.

Aliæ facultates quæ à Serapionis interprete & alijs recentioribus illi conceduntur non sunt genuinæ, sed spurix, & Polygono adscribendæ.

## DE DAPHNOIDE CAP. LXXXIII.

## NOMINA.

**D** **Laureola.** **Daphnoides un-**  
**de dicta.**  **APHNOIDÆZ** græcè, Daphnoides latinè nominatur. Officinis & nostræ ætatis herbarijs, græcam imitantibus uocem, Laureola. Germanis *zeilant* & *zeidelpast* nuncupatur. Daphnoides autem & Laureola, à Lauri forma & specie, quam in folijs & fructu refert, dicta est.

## FORMA.

**Objectionis dis-**  
**solutio.** Frutex est cubitalis, ramos complures habēs lori instar flexiles, à medio sursum uersus foliosos. Cortex ramos uestiens admodum glutinosus lentusue est. Folia Lauro similia, molliora tamen, tenuiora, nec facile fragilia, os & fauces erodentia, incendientiaq;. Flores candidi. Fructus ubi ematuruerit subniger. Radix inutilis. Quæ in uniuersum omnes notæ Laureolæ hodie dictæ cōueniunt. Nec obstat quod Dioscorides suæ Daphnoidi candidos tribuat flores, cum Laureola purpurascens potius habeat: solet enim color secundū diuersas regiones in eadem sæpè herba mutari, ut fufius in Symphyto maiore dicemus. Et certè nihil incōmodi erit si etiā Laureolæ flores quispiam candidos dixerit, cum albi coloris non minor quàm purpurei in ipsi portio reluceat. Verisimile quoq; est Dioscoridem ab extremo potius colore, quàm medio flores appellare uoluisse.

## LOCVS.

Nascitur in montanis & syluestribus locis.

## TEMPVS.

Floret primo statim uere anteq; folia erumpunt. Fructū autē autumnoprofert.

## TEMPERAMENTVM.

Calida est admodum & sicca.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Ducit per inferna pituitosa siccum aut recens Daphnoidis folium. Vomitus & menses cit. Cōmanducatum capitis pituitas elicit. Sternutamenta itidem mouet. Purgant etiam seminis eius pota grana quindecim.

## EX PLI-





DAPHNOIDES

Zeilant.



## EX PLINIO.

Daphnoides siue syluestris laurus aluum soluit, recenti folio uel arido drachmis tribus cum sale & hydromelite manducata. Pituitas extrahit foliū & uomitus. Stomacho inutile. Sic & baccæ quinae denaëue purgationis causa sumuntur.

## APPENDIX.

Officinarii  
error.

Thymelas non  
est laureola.

Animaduertendū hoc loco mirum in modum errare officinas, propterea quod folijs Daphnoidis pro Mezereon, quæ tamen græcorum est Chamelæa diuersa ad modum à Daphnoide, utantur: & eius fructu pro cocco cnidio, quod fructum Thymelæe esse notius est quàm ut demonstrari debeat. Sic in manifestissimis cæcutire solent officinæ, pulchrè interim ad eos errores conuiuentibus medicis, non minus quàm illi rei herbariæ imperitis. Thymelæan uerò non esse laureolam hodie appellatam herbam, ex eo colligi potest, quod hæc ipsa, Dioscoride autore, linum nōnullis nominata sit, non alia quidem ratione, quàm quod satiui lini similitudinem referat, cui quàm dissimilis laureola sit, nemo non nouit. Sunt etiam qui ad hanc similitudinem respicientes, in hodiernum usque diem linum syluestre appellant.

## DE DRYI CAP. LXXXIII.

## NOMINA.



ΠΥΞ Græcis, Quercus Latinis & Officinis, Germanis Eychenbaum appellatur.

## FORMA.

Notissima est arbor Quercus, procera, crassiore & asperiore caudice, ramosa, folijs profundè laciniatis. Glandes producit optimas, & grandissimas, gal-  
D las item & uiscum. Radix eius latissimè circumiacentem terram amplectitur.

## LOCVS.

Pæssim in syluis alijsq; locis nascitur.

## TEMPVS.

Vere quidem germinat, sed tardius multis alijs arboribus.

## TEMPERAMENTVM.

Desiccatur, adstringit & excalfacit paulò infra media, in genere scilicet eorum quæ tepida sunt.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Quercus omnis adstrictoriam facultatē habet, præsertim id quod inter corticem & caudicem membranæ simile clauditur: quinetiam membrana putamini glandis subiecta. Decoctū ex ijs datur dysentericis & sanguinē excreantibus, & in pessis tritum contra fluxiones mulierum apponitur. Glandes idem possunt. Vrinam ciunt, capitis dolorem, & flatu comestæ pariunt. Resistant esitatae uenenatorum ictibus. Decoctum corticis cum lacte bubulo potum, contra toxica prodest. Crudæ autem tritæ & illitæ inflammationes leniunt. Ad malignas duritias, & malefica ulcera cum adipe suillo salso cōueniunt. Galla fructus est quercus. Aliqua omphacitis appellatur, parua quidem, præ se ferens formam in digitis articularum, solida, nullo foramine peruia. Altera leuis, plana, perforata. Eligi debet omphacitis quæ efficacior est. Vtraq; uehementer adstringit. Carniū excrescentias tritæ, fluxiones gingiuarū & columellæ, atq; in ore aphthas reprimunt. Nucleus earum cauernis dentium inditus, dolores sedat. Crematæ carbonibus donec igne flagrent, & uino aut aceto, aut oxalme extinctæ, sanguinem reprimunt. Decoctum earum ad infusus utile, contra uulua procidentias, fluxionesq;. Capillos denigrat aceto aut aqua macerata. Coeliacis, dysentericis, cum uino aut aqua trita conuenienter illinuntur aut bibuntur. Vtiles & obsonijs mixtæ, aut integræ in aqua præcoctæ, in qua ali-  
quid co-





QVERCVS

Eichbaum.

V



c quid coquendum sit quod ipsis cōferat. In summa, galla utendum quoties opus est adstrictione & exiccatione.

## EX GALENO.

Quercus omnes partes adstrictoriae facultatis participes sunt. Sed plus tamē quę in trunci cortice membrana subest, tum quę sub glandis putamine, ea uidelicet quę fructus carnem conuestit. Quamobrē ad fluxum muliebrem, sanguinis expuitiones, uentrisq; diurnos fluxus, cōmodam esse credunt. Maximē uerō ea utunt de-cocta. Siquidem ego quandoq; glutinasse me uulnus memini securi inflētū, quum nullum ad manum esset medicamentū prāter ipsius Quercus folia. Terēbam uerō in leui saxo, & uulnus cum circumiacentibus locis illinebam. Eandem folijs uim habet & fructus Quercus, eoq; medici nōnulli ad incipientes, & crescentes phlegmonas utuntur. Nam quę iam uehementes sunt, adstringentibus haud indigent. Gallā quę omphacitis nuncupatur, admodum acerbum est medicamentū, plurimum terrenae & frigide substantię particeps, per quam desiccatur & reprimuntur fluxiones: adhęc constringit contrahitq; partes laxas ac languidas, omnibusq; fluxionū affectib; strenuē resistit. Esto uerō tertij in desiccando, secundi autem in refrigerādo ordinis. Altera autem galla, flaua, laxa, & magna, exiccatur quidem etiam ipsa, sed tanto, quanto acerbę qualitatis minus est particeps. Cocta itaq; ipsa per se, ac deinde trita cataplasma non instrenuum est sedis phlegmonarū, ac procidentiarum. Porro coquenda est in aqua, si modica opus sit adstrictione: sin uehementiore in uino. Et si augere insuper adstrictionem sit opus, uino etiam utare austeriore. Deniq; gallę combustę sanguinis reprimendi facultatem acquirunt, ac nimirum etiam calorem & acrimoniam ex uisione assumunt, suntq; ijs quę ignem non expertę fuerint, tum subtiliorum partiū, tum maiore desiccandi potestate. Ceterum quum ad sanguinis suppressionem pręparare eas uoles, carbonibus impositas dum undequaq; candeant, aceto aut uino extinguere oportebit.

## EX SYMEONE SETHI.

Glandes difficilis sunt coctionis, & ualde nutriūt, tardius descendunt, crudosq; humores generant, proptereaq; illarum usum deuitari pręcipimus.

## DE DAUCO CAP. LXXXV.

## NOMINA.



ΔΑΥΚΟΣ gręcē, Daucus latinē nominatur. Officinę alijs & adulterinis herbis sub hoc nomine utuntur. Germanicas appellationes in generū explicatione indicabimus.

## GENERA.

Diolcorides tria Dauci cōmemorat genera. Primum Creticum daucum uocat. Berwurz Germanis Berwurz / propter capillatam radicem, aut quia uteri dolorem, qui hñdem Bermüter appellatur, sanat. Alterum nomine peculiari caret, folijs Laserpitio simile, Germanis weiß Hirtzwurz dicitur. Tertium genus itidem nomine destituitur proprio, Germanis autem nonnullis schwarzgel Hirtzwurz nominatur.

## FORMA.

Creticus daucus

Creticus daucus folia Foeniculo similia habet, minora tamē & tenuiora. Caulem dodrantalem, umbellam Coriandro similem. Flores candidos, & post hos semen acre, candidum, hirsutum, & in cōmanducando odoratum. Radicem crassitudine digitali, & longitudine dodrantali. Omnes huius descriptionis notę, herbę quam Berwurz Germani uocant conuenire ad unguem uidentur, una duntaxat excepta: siquidem semen non est hirsutum. Sed quum omnia alia, atque adeo facultates etiam ipsę respondeāt, nō est cur una hęc nota nos impediatur, cur minus Creticū daucum credamus, aut saltem Germanicū qui Cretico per omnia respondeat. Vel si prorsus alicui non satisfaciunt, quę diximus, dicat planē hanc herbam esse Seseli

Creticum,



DAUCVS  
CRETICVS.

Wurzel.







DAVCI  
ALTERVM GENVS.

Weißhirtzwurz.





DAVCI  
TERTIVM GENVS.

Schwartz hiezwurtz.



- c Creticum, cuius etiam herbae notae omnes huic nostrae conveniunt, neque etiam facultates quas similes Dauco cretico habet, discrepant. Alterum Apio sylvestri, uel, ut antea diximus, Laserpitio simile est: aromatū modo odoratum, acre, gustanti odoratum & feruens. Tertiū folijs Coriandro assimilatur, flore candido, capite & semine Anethi, in quo umbella erraticae Pastinacae similis est, semine oblongo plenum, sapore ut Cuminum acris.

## LOCVS.

Primum in petrosis & apricis locis nascitur, nusquam uerò in Germania copiosius quàm in Martianae syluae quibusdam pratis prouenit. Reliqua duo genera in altis montibus gignuntur.

## TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus florent.

## TEMPERAMENTVM.

Semen Dauci admodum calefacit & exiccat. Idem etiam, sed minori efficacia, facit herba.

## VIREs. EX DIOSCORIDE.

Omniū Daucorum semen calefaciendi uim obtinet. Potum menses, foetus, & urinas mouet. Torminibus liberat. Tusses diutinas lenit. Succurrit phalangiorum moribus cum uino potum. Oedemata illitum discutit. Ex alijs seminis tantū usus est, ex Cretico radicis etiam, quae cum uino praesertim ad uenenata bibitur.

## EX GALENO.

- Dauci semen efficax admodum tum mouendae urinae medicamentū, tum prouocandis mensibus. Multum etiam discutere foris impositum ualet. Ipsa etiam herba eandem uim obtinet, semine tamen inferiorem, nimirum ob aquae humiditatis misturam.

## EX PLINIO.

Vehementer urinam impellit. Creticum magis contra serpentes pollet. Bibitur ē uino drachma una, datur & quadrupedibus percussis, aduersatur phalangio, capitis dolori medetur, tussi subuenit, stranguriae medetur drachma seminis. Eius radix in uino pota, dysenteriam sistit. Contusis & euerfis potū duobus obolis in mulsi cyathis tribus subuenit, aut si febris adsit in aqua multa. Menses & secundas potum facillimè pellit. Calculos eijcit. Folia omnia tela infixā corpori extrahunt.

## DE DRACONTIO MAGNO CAP. LXXXVI.

## NOMINA.

Serpentaria  
maior.  
Dracunculus ut  
de dicta.



Colubrina.

PAKONTIA *μυαλιν, ἡ δρακόντιος ρίζα* Graecis, Dracunculus maior Latinis, nonnullis Serpentaria maior dicitur. Officinis ignota herba, Germani Schlangentraut uocant. Nomen autem à figura sumpsit: caulis enim glaber, purpureisq; respersus litoris, uersicolori facie, corpus anguinum representat & aequat longitudine. Vertex quoque sinuoso oris hiatu linguam exerens cruentam, caput exprimit. Atque hinc est quod ueteribus etiam Romanis Colubrina ac Serpentaria nuncupata sit: uel sic dicta, Plinio autore, quod ē terra ad primas serpentium uernationes exeat, rursusq; cum ipsdem se in terram recondat, nec omnino occultata ea appareat serpens.

## FORMA.

Caulē habet glabrū laeuumq; rectū, bicubitalē, baculi crassitudine, uersicolorē, ut angui similis uideat, purpureis etiā maculis abundat. Folia fert Rumicis inflexa, & plicata. Fructū in summo caule racemosum, coloris inter initia cineracei, postea q̄ maturuit crocei & punicei. Radicē grandē, rotundā, candidā, tenui cortice uestitā. Ex qua deliniatione omnib. perspicuū fit, plantā eam cuius picturā exhibemus, esse Dracunculū maiorē. Simplici enim caule attollit, binū cubitū alto, leui glabrōue, recto, baculi crassitudine, uersicolorib. anguiū maculis uariiegato, purpureis etiā intercur.





DRACUNCVLVS

Schlangenfraut.



c intercūrantib. lituris, ita ut planè serpentis habitum coloremq̃ mentiri uideatur. In uertice comoso folia prodeunt sena septenāue, crassiore pediculo digitorū modo propendentia, puniceis resperſa notis, Rumicis primi generis figura. E foliato ſcapi faſtigio, uagina quēdam foris herbacea proſilit, in mucronem ſenſim turbinata, uelut erupturi partus inuolucrum, quæ cum dehifcens ſeſe pandit, purpureum cornu in acumen faſtigiatum demonſtrat. Ea ſeminis incremento diſtenta diſſilite in rimam, & tandem elanguēſcens flacceſcit, ſubareſcensq̃ perit relicto cornu. Cuius imam partem racemofus fructus ambit, acinis primo uirentibus, dein croceo & puniceo colore rutilantibus. Radix dēnique magna, rotunda, alba, tenuiq̃ cortice ueſtita. Et in ſumma, nulla eſt prorſus nota, quæ reclamare uideatur.

## LOCVS.

Nāſcitur in opacis ſepibus.

## TEMPVS.

Carpitur ſemen cum maturitate nigreſcit. Radix per meſſem effoditur, hoc eſt, Iulio meſe, aut initio Auguſti.

## TEMPERAMENTVM.

Dracunculus acris & amarus eſt, leuiculamq̃ quandam adſtrictionem habet, ut calidam & ſiccā eſſe nullus dubitare poſſit.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Radix calefaciendi uim obtinet. Toſta & elixa cum melle delinſta orthopnoicis, ruptis, conuulſis, tuſſibus, & deſtillationibus prodeſt. Pota cum uino uenerem ſtimulat. Concifa & ex melle illita, ulcera maligna atq̃ phagedænica expurgat, præſertim cum uite alba. Ex ea & melle collyria ad fiſtulas, & foetus euocandos componuntur. Ad uirilignes cum melle efficaciter illinitur. Polypus & carcinomata abſumit. Succus eius ad oculorum medicamenta, item contra nubeculas, albugines, caliginemq̃ utilis eſt. Odor herbæ radicisq̃, recens cōceptos abortu uitiat. Idem præſtant triginta grana eius in poſca pota. Sunt qui eius ſuccum cum oleo aurium doloribus infudere. Quinetiā folia eius, utpote adſtringentia, uulneribus recentibus impoſuere, in uino autem cocta pernionibus. Ferunt non feriri à uipera eos qui folia manibus affricuerint, aut radicem geſtauerint.

## EX GALENO.

Dracuntium quiddam Ari perſimile habet, tum folijs, tum radice. Acre etiam eſt & amarum, tenuiumq̃ partium. Obtinet quoque leuē quandam adſtrictionem, quæ quandoquidem cum prædictis duabus qualitatibus, acri ſcilicet & amara, coniuncta eſt, medicamentum factum eſt, ut quæ maximè efficax. Nam radix uiſcera omnia expurgat, craſſos potiſſimū & lentos humores extenuās. Optimumq̃ remedium eſt contumaciū ulcerum. Expurgat extergetq̃ ſtrenuè tum alia quæ exteſionem deſiderant, tum alphas cum aceto. Folia quoque, utpote ſimilem facultatem habentia, ulceribus, uulneribusq̃ recens inſiſtis accōmoda ſunt, & quanto minus fuerint ſicca, tanto magis conglutinant: nam quæ ſicciora ſunt, uiribus ſunt acrioribus quàm ut uulneribus cōueniant. Creditum eſt caſeum humidū ſi illis foris teſtus reponatur, ob temperaturæ illorum ſiccitatē, à putredine cōſeruari. Fructus ualentior eſt, nō folijs tantum, ſed & radice: proinde & caneros, & polypodas eliquare creditus eſt. Succus quoq̃ eius uitia oculorum expurgat. Dracontij radicem bis teruē elixam, quo omnem exuat medicamentofam uim, in cibo interdum Ari modo exhibemus, quum craſſi ac glutinoſi thoracem pulmonemq̃ infeſtantes humores fortiore ui expellendi ueniunt.

## EX PLINIO.

Omnino habentē Dracunculū ſerpentes fugiunt. Ideo percufſis prodeſſe in potu maiore aiunt: ut & menſes, ſi ferro non attingatur, ſiſtat. Succus eius & aurium dolori prodeſt. Reliquas facultates in Ari deſcriptione offendes. Vident enim ueteres Arum cum Dracunculo minori miſcuiffe.

APPEN-



## APPENDIX.

**A** Hæc est uera Serpentaria quæ officinis utendum erit, & minimè ea quam alio nomine Bistortam uocant. Nam uiribus planè ab ea quæ genuina est dissidet, ut suo etiam loco monuimus. Quare non est cur deinceps eandem medicamentis quæ thoraci expurgando adhibentur admisceant medici, sed hanc potius, cuius picturam oculis subieciimus.

## DE DAPHNE ALEXANDRINA

CAP. LXXXVII.

## NOMINA.



**A**ΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑ, Ἰδαία Græcis: Laurus Alexandrina, aut Idæa Latini, officinis Vuularia, nonnullis Bonifacia, multis etiam Pagana lingua, Germanis *zäpfleintraut* / *hauchblatt* / & *auffenblatt* dicitur. Theophrastus appellat *ἐπιφυλλοκάρπον*, quod fructum super folijs ferat. Alexandri nam autem laurum dictam putamus, quod Alexander uictor ea usus fuerit. Hinc est quod Apuleius hanc Victorialam nominet, quod nimirū uictores ea pro Lauro in triumphis & uictoriæ signum uterentur: quanquam in eo capite Daphnoida cum Victoriala confundat. Idæa uerò ab Ida monte, quo in loco speciosior & copiosior nascatur.

Vuularia.

Epiphyllocarpos.

Alexandrina  
laurum cur dicta:  
Victoriala.  
Idæa.

## FORMA.

**B** Folia Rusco seu Myrto syluestri similia habet, maiora tamen, molliora & candidiora. Fructum in medijs folijs fert rubentem, Ciceris magnitudine. Ramos spargit à terra dodrantes, & aliquando ampliores. Radicem Rusco similem, maiorem tamen, odoratam, & molliorem. Ex qua sanè deliniatione satis perspicuum fit, eam herbam cuius picturam damus, esse Laurum Alexandrinā. Folio siquidem Myrti syluestris, sed ut Plinius lib. xv. cap. xxx. ait, acutiore, molliore, & candidiore, fructu inter folia rubro, magnitudine Ciceris, ramulis à terra sparsis dodrantalibus, radice syluestri, Myrto proxima, odorata & molli.

## LOCVS.

Nascitur in locis montanis, & in Ida monte, ut cōprehensum est, speciosissima. Nunc adfertur ex inferiore Pannonia, atq; in nonnullis hortis plantata prouenit.

## TEMPVS.

Fructum in æstate in medio folij, in geniculo alterius folij quod maiori supernascitur, profert.

## TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est, id quod gustus euidenter monstrat. Siquidem gustantibus acris simul & subamara est.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Radix eius pota pondere senum drachmarū cum dulci uino, difficulter parientibus, & stillicidio urinæ laborantibus succurrit. Sanguinem quoq; menstruum elicit.

## EX GALENO.

Pota tum urinas, tum menses prolicit.

## EX PLINIO.

Celeres partus facit, radice pota trium denariorū pondere, in uini dulci cyathis tribus. Secundas etiam pellit mensesq; eodem modo pota.

## APPENDIX.

Recentiores in faucium ulceribus, & humecta supra modum columella utuntur. Hinc est quod nonnulli appendant hanc herbam pueris, ut nimia illorum humiditas exiccetur.

DE EPHE-






LAVRVS  
ALEXANDRINA.

Zapfflintraut.



A

## NOMINA.



ΕΠΗΜΕΡΟΝ, *ἡ ἑὴς ἀργία* Græcis, Ephemerum, Iris sylvestris Latinis dicitur. Cum autem Galeno, Paulo, & Dioscoride testibus, duo *Ephemerum duo genera.* sint Ephemerum genera, alterum, quod Colchicum à natali solo dicitur, interficiens, de quo suo loco plura: alterum quod non letale est, & præcipuo nomine Ephemerum dicitur, hic de secundo, nempe non interficiente, nobis sermo duntaxat erit. Ephemerum autem *Ephemerum eius dictum.* nominatum est, non quod eadem die iugulet (nulla enim ei uis mortifera inest) sed quod flos illius confestim marcescat, nec longius uno & altero die cōmoretur. Vulgus & officinæ Liliū cōuallium, quod in opacis & lucis nascatur, appellant. Germani *Liliū conuallium.* *Mayenblümle.*

## FORMA.

Caulē & folia Lilio similia habet, tenuiora tamē. Flores candidos amaroſq̃. Fructum mollē. Radicē unam digitali craſſitudine, longam, adstringentē, odoratam. Quæ ſiquidē delinatio ita herbę illi quam uulgus Liliū cōuallium nominat conuenit, ut nulla prorsus in ea ſit nota, quæ ei nō respondeat. Caulem enim & folia Liliū habet, ſed tenuiora. Flores candidos & ſuauiſſime olentes, guſtu amaroſ. Fructum mollem, colore puniceum, aſparagi fructui non diſſimilem. Radicem ſingularem digiti minimi craſſitudine, longam, adstringentem & odoratam. Nec obſtat quod *Obiectio diluatur.* nunquam aut rariffimē apud nos reperiatur radix quę minimi digiti craſſitudinem æquet. Dioſcorides enim cum alicui herbę aut radici menſuram tribuit, id facit ut maiori parti indiuiduorū illius ſpeciei quadret, nec adeo ſtatam menſurā aſſignat, quin quandoq̃ infra aut ſupra hanc eſſe poſſit. Cui hoc etiā accedit, quod magnitudo ſecundū diuerſas regiones in una eademq̃ herba ſæpe uariatur, ita ut nihil mirū ſit radices noſtri Ephemerum, paulo quā illius quas Dioſcorides uidit minores eſſe.

## LOCVS.

Nāſcitur in ſyluis & umbroſis locis.

## TEMPVS.

In Maio menſe flores illius magna copia erumpunt, ac mox iterum euaneſcunt atq̃ decidunt. Deinde Iulio menſe fructus profertur Aſparago haud diſſimilis, ut dictum eſt.

## TEMPERAMENTVM.

Miſtæ eſt temperaturæ, Galeno teſte, nempe repellentis & diſcutientis, quia ſcilicet radix adstringit, floresq̃ amari ſunt.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Huius radix in dentium doloribus remedio eſt, ſi decocto eius colluuntur. Folia in uino decocta & illita oedemata & tubercula, quæ nihil adhuc puris cōtraxerunt, diſcutiunt; *ἡ ἑὴς ἀργία* enim & non *ἡ ἑὴς ἀργία* legendum, ut ex Galeno liquet.

## EX GALENO.

Ephemerum non illud letale, quod etiam Colchicum nominant, ſed alterum, quod & Irin agreſtem uocant, folia & caulem Lilio ſimilem obtinet, radicem oblongam, non rotundam ceu Colchicum: digiti autem potiſſimū craſſitudine eſt, adstringens & boni odoris. Ex quibus palam ſit quod miſtæ ſit facultatis, nempe repellentis, & halitu digerentis. Teſtificantur uerò id quæ particulatim ædit opera. Siquidē non inefficiter radix eius in dentium doloribus colluitur. Folia tuberculorum tum augmento, tum uigori congruunt. Oportet autē in uino decocta prius quā pus moueas illinere.

## EX PLINIO.

Radiceſ unam digiti craſſitudine obtinet, dentibus præcipuam cōciſam in aceto, de-





EPHEMERVM  
NON LETALE.

Nebenblümle.



to, decoctamq; ut tepido colluantur. Et ipsa etiam radix mobiles sistit, cauis & excis imprimitur.

## APPENDIX.

Recentiores roborare cor, iecur, cerebrumq; tradūt. Hinc est quod eius succum aut decoctum syncopa, uertigine, morboq; comitiali correptis, attonitis, & phreneticis exhibeant. Cæterum incipienti elephantia, ne latius serpat, & altius radices agat, uiam præcludere scribūt. Ocularij medici ad oculorum caligines discutiendas eo etiam utuntur.

## DE ELENIO CAP. LXXXIX

## NOMINA.



ENION Græcis, Elenium & Inula Latinis, officinis Enula, rusticis Campana, uulgo iunctis utrisq; uocabulis Enula campana dicitur. Germanis Alant. Elenium autem ab Helenæ lachrymis, e quibus natum fabulantur, quidam dictum esse uolunt. Alij quoniam cōtra serpentes ex eo primum ab Helena remedium inuentum sit.

*Enula campana*  
*Elenium unde dictum.*

## FORMA.

Caulem ex se mittit Elenium crassum, hirsutum, cubitalem, & aliquando maiorem (interdum enim iustam hominis staturam altitudine æquat) angulosumq;. Huic supernè lutei flores insident, & in his semen Verbasco simile, tactu pruritus excitans. Folia angustifolia Verbasco similia obtinet, lanuginosiora tantum & oblonga. Radicem subruffam, odoratam, magnam, subacrem, ex qua ad consitionem Liliorum aut Ari instar, pingues propagines appendicis sue auferunt. Hæ siquidē notæ Enulæ campanæ uulgo dictæ pulchrè quadrant, neq; obstat quod nō in cunctis græcis exemplaribus omnes illæ habeantur, cum in nonnullis, nōq; probatissimis saltem, legant. Sic Marcellus Virgilius Florentinus in suis quos edidit in Dioscoridem cōmentarijs testatur, sibi uisum esse antiquissimū ac probatissimū codicem, in quo adhuc omnes seruentur. Et certè nihil absurdi cōmittemus, si nonnullas Dioscoridē notas subticuisse dicamus, cum euidentissimū sit Inulam nō passim una forma præditam nasci, quando, eodem Dioscoride teste, in quibusdā locis caulem haud emittat: in irriguis deniq; procerior & elegantior, quàm in sicciorib. proueniat. Huc accedit quod aliàs sæpe notas etiam admodū necessarias prætermittat.

*Obiectio diluitur*

*Marcellus Florentinus.*

## LOCVS.

Nascitur montanis, umbrosis, & siccis locis. In hortis etiam passim hodie plantatur.

## TEMPVS.

Radix æstate effoditur, & concisa siccatur. Floret Iulio mense.

## TEMPERAMENTVM.

Elenij radix non primo statim occurso excalescit, ac proinde non dicenda est calida & sicca exactè, ceu mel & piper album, sed cum recrementis humoris.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Radice Elenij decoctū potum, urinam & menses ducit. Ipsa deniq; in eclegmate cum melle sumpta, tussi, orthopnceæ, rupturis, cōuulsionibus, inflationibus, uenenatorum moribus prodest, calefaciendi ui quam in uniuersum habet. Folia eius in uino cocta ischiadicis utiliter illinuntur. Radix etiam Elenij in passo condita, sto macho utilis est. Siquidem salgamarij paululum siccata eam, mox decoctam, frigida aqua demergunt, postremo in defrutum coniectam, ad usum recondunt. Ea trita & pota sanguinem excreantibus auxiliatur.

## EX GALENO.

Elenij radix maximè utilis est. Eclegmatis quæ faciunt ad educendos lentos & X crassos





ELENIVM  
Allant.




A crassos qui sunt in thorace & pulmone humores commodè miscetur. Rubrificant quoque ea partes frigidis & diuturnis vexatas affectibus, cuiusmodi sunt nonnullæ coxarum palsiones, ischiadas uocant, & exiguae assiduæque quorundam articulorum præ humiditate luxationes.

## EX PLINIO.

Inula à ieiunis cōmanducata dentes confirmat, si ut eruta est, terram non attingat. *Superstitiosum.* Condita tulsim emendat. Radicis uerò decoctæ succus tineas pellit. Siccata autem in umbra farina tusa, & conuulsis, & inflationibus, & arterijs medetur. Venenatorum morsus abigit. Folia ex uino lumborum dolori illinuntur.

## DE EUPATORIO CAP. XC.

## NOMINA.



ΕΥΠΑΤΩΡΙΟΝ, ἡ εὐπατώριον græcè, Eupatorium & Hepatoriū latinè, officinis Agrimonia dicitur. Germanis Odermenig / Bruchwurz. Eupatorium ab Eupatore rege, qui illam primus inuenit, nominatam esse uolunt. Hepatorium uerò quoniam iecori præcipuè medeatur.

*Agrimonia.*  
*Eupatorium eundem.*  
*Hepatorium.*

## FORMA.

Fruticosa est herba, unum, interdum alterum etiam scapum efferens, tenuem, lignosum, rectum, nigrum, hirsutum, cubitalem, aut etiam maiorem. Folia per interualla partibus potissimū incisa quinque, & aliquando pluribus, Quinquefolij uel Cannabis potius folijs similia, nigricantia, & serræ modo in extremitatibus incisa. Semen à medio caule enascitur, deorsum inclinatum, hirsutum, adeo ut siccatum uestibus hæreat. Hæ deliniationes adamussim, nulla reclamante nota, herbæ quam uulgi & officinæ uocant Agrimonia conueniunt. Quapropter hanc uerum & genuinum esse Eupatorium facile deprehendet, qui singulas descriptionis partes diligenter expendet. Siquidem Agrimonia fruticosa est herba, scapum unum aut alterum obtinens, lignosum, tenuem, rectum, nigricantem, hirsutum, cubitalem uel maiusculū. Folia ex interuallis Cannabina, aut Quinquefolio similia, quinquepartita uel plurifaria incisa, per ambitum serrata. E medio caule semen erumpit deorsum spectans, subhirsutum, ut resiccatum uestibus adhærescat. Proinde præfracta quadam ac immedicabili cæcitate captos esse eos iudico, qui hoc ipsum hodie non animaduertunt.

*Agrimonia est uerum Eupatorium.*

## LOCVS.

Nascitur passim locis montosis, campestribus etiam, pratis nempe, & circa sepes.

## TEMPVS.

Carpitur in æstate, dum floribus abundat.

## TEMPERAMENTVM.

Eupatoriū herba tenuium partium, incidendi extergendi que facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. Inest ei & adstrictio modica.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Contrita huius folia & cum ueteri suillo adipe imposita, ulceribus difficilè cicatricem contrahentibus medentur. Semen aut herba in uino pota, dysentericis, iecinorosis, & serpentium moribus auxiliatur.

## EX GALENO.

Obstructiones iecoris expurgat, & robur huic uisceri addit.

## EX PLINIO.

Semen dysentericis in uino potum auxiliatur unice.





EVPATORIVM

Gdemenig.



A

## NOMINA.



AVDDVBIE Euphrasie herbæ nomen à græcæ linguæ imperitis phar-  
 macopolis deprauatum est, cum olim *ὕψιστον* dicta sit, quod nimirum  
 oculos, quorum caliginem discutit, delectet. Ad quod nomen Germa-  
 ni nostri pulchrè alludentes Augentrost / hoc est, oculorū solacium ap-  
 pellant. Nonnulli hac quoque ratione moti ophthalmicam & oculariam nomi-  
 nant. Officing, ut ferè in omnibus alijs herbis, corruptā uocem retinentes, Euphra-  
 siam uocant. Et si autem herba hæc græco & eleganti nomine donata sit, nihil ta-  
 men de ea, quod sciam, apud ueteres Græcos & Latinos, nempe Dioscoridem, Pli-  
 nium, Galenū, adde etiam recentiores, Aëtium, Paulum, & Actuarium scriptum  
 reperitur. Cum uerò appellatio ipsa græcam testetur originem, uidetur sanè à Bu-  
 glosso ueterum mutuata & desumpta esse. Vt enim hoc in uinum coniectum ani-  
 mi laticiam parit, atque adeò *ὕψιστον* dictum est, ita etiam illa quia oculos iuuat  
 & delectat, *ὕψιστον* appellari cœpit. Quam subinde uocem imperiti linguæ, ut di-  
 ximus, deprauantes, in Euphrasiam uerterunt.

*ὕψιστον  
curdita.**ophthalmica.*

## FORMA.

Herba est parua, palmæ unius longitudine, Hyssopo similis, cauliculis purpureis,  
 folijs exiguis, per ambitum serratis, flosculis albicantibus, radice exigua & inutuli.  
 Nec obstat quod Hermolaus, immensæ eruditionis uir, libro tertio, capite decimo  
 octauo sui Corollarij, luteolos esse dicit: is enim ad partem duntaxat florum respe-  
 xit, quæ lutea esse euidenter apparet. Certè si flores Euphrasie exquisitè conside-  
 res, neque prorsus luteos, neque in uniuersum etiam candidos esse deprehendes:  
 tribus enim coloribus, nempe purpureo, candido & luteo, ut pictura ipsa ostendit,  
 maculati sunt. Quum uerò potior florum pars candido colore constet, factum est  
 ut fermè omnes herbā hanc depingentes, albos illi assignarint flores, nobis autem  
 hos candicantes dicere placuit.

*Hermolaus Bar-  
barus.*

## LOCVS.

Nascitur in apricis collibus, & pratis ferè omnibus.

## TEMPVS.

Inter autumnii initia magna copia erumpit.

## TEMPERAMENTVM.

Quas particulatim facultates obtinet, abundè docent calidam & siccam esse  
 herbam.

## VIRE S.

Vtuntur ea ad oculorum caligines & suffusiones, uel per se imposita, uel ex ui-  
 no decocta. Memoriam etiam oculorumq; aciem redacta in puluerem, & in uino  
 albo pota, mirificè roborat, amissamq; reparat.





EUPHRASIA

Augentrost.



## NOMINA.



ΕΛΕΙΣΦΑΚΟΝ Græcis, Salvia Romanis & officinis, Germanis Salbey appellatur. Porro cum ipsa herba semper retorrída & exucca uideatur, factum est, ut Græcis Elelisphecon, quasi in tabem redacta, uel in sy-

Elelisphecon un  
de dicta.

derationem flaccescens dicta sit, ἐλεῖζαν & σφακός uocibus in unam coalescentibus appellationē. Est autem σφακός, seu potius σφακίον, malum in plantis quum per æstatem & ardentissimū canis æstum ui solis altius penetrante, humore quo nutriuntur deficiente, languent & arescunt. Latini syderationē nominant. Salvia autem dicta Latinis, quod ad multa, præsertim ad fecunditatē, salutaris sit.

σφακίον

Salvia cur uocata.

## GENERA.

Duo sunt Salviæ genera, quemadmodū etiam plebei abundē nouerūt. Vnum quod priuatim Elelisphecon dicitur, squalidius folio & scabrius, lacunosa facie præ asperum, multo latius, quasi cultum senserit, adeo ut domestica aut hortensis Salvia dici possit. Nos euidentiori distinctione usi, Saluiam maiorem nominauimus. Germanis etiam groß oder breyt Salbey uocatur. Alterum folio leuius & cōtractius, quasi syluestrem ob id referat figurā, syluestris Salvia appellari potest, minus etiam squalore oblitū est. Nos Saluiam minorē diximus. Germani creiū Salbey / oder klein Salbey / oder spiz Salbey / edel Salbey nominant. Dioscorides utrunq; genus sub uno Elelispheci nomine complexus est, quod scilicet facultate nihil distent, sed idem prorsus efficiant.

Salvia maior.

Salvia minor.

## FORMA.

Frutex est oblongus, ramosus, quadrangulas & candidas uirgas habens. Folia mali Cotonei effigie, oblongiora tamen, asperiora, & crassiora, quæ sensim attritarum uestium modo hirsuta, subalbida, uehementer odorata, sed uirosa sunt. Semē in summis caulibus syluestri Ormino simile gerit. Hæc descriptio, nulla prorsus reclamante nota, cum herba quam Saluiam uulgo uocant quadrat: nanque ea fruticosa est, rugosis folijs, extritarum latenter uestium asperitatem scabritiamue referentibus, incanis, uehementer odoratis, purpureo in spica flore, in aquilini rostri speciem falcato, semine syluestris Ormini, ut pictura graphicē monstrat.

## LOCVS.

Nascitur in locis asperis, & utrunq; genus hodie passim in hortis inuenitur.

## TEMPVS.

Carpitur in Iunio & Iulio mensibus, quando nimirum floribus & semine prægnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Elelisphecos euidenter excalfacit, ac leuiter adstringit.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Foliorum ramorumq; decoctū potum urinam cit, menses fetusq; extrahit. Pastinacæ marinæ ictibus auxiliatur. Capillos denigrat. Vulneribus herba utilis est, sanguinemq; compescit. Ferina tetræue ulcera purgat. Pudendorum pruritus foliorum & ramorum decoctum cum uino, si eo abluantur, sedat.

## EX AETIO.

Tradunt quidam suffitam Saluiam menses immoderatē fluentes, & omnino muliebri profluuium compescere. Agrippa sacram herbam uocauit, quam prægnantes mulieres si fluidæ laxæq; fuerint, utilissimē comedunt: cōtinet enim conceptū uitalemq; reddit: ac si succi huius heminam cum modico sale quarto à secubitu die mulier potauerit, deinde uiro misceatur, proculdubio concipiet. Aiunt in quodam Aegypti loco post sæuas pestilentias ab his qui supersunt, ad eum succum bibendū mulieres cogi, plurimosq; inde produci fetus. Dato, inquit Orpheus, sanguinem





**SALVIA**  
MAIOR.

Grosß Salbey.





**SALVIA**  
MINOR.

Creutz salbey.



**C** expuentibus succi Saluiae cyathos duos, ieiunis cum melle bibendos, & sanguis illico cohibet. Tabidis pilulae in hunc modum parantur. Spicae nardi, Zingiberis singul. drach. ij. seminis Saluiae assati triti & cribrati drach. viij. Piperis longi drach. xij. cum succo Saluiae pilulas conficito, & mane ieiunis drachmam unam exhibeto, eodemque modo in uespere, ac postea aquae purae quippiam propinato.

EX PLINIO.

Menses Saluia cit & urinas. Pastinacae marinae ictus sanat. Torporem autem inducit percusso loco. Bibitur cum Absinthio ad dysenteriam. Cum uino eadem commorantes menses trahit. Abundantes sistit decocto eius poto. Per se imposita uulnerum sanguinem cohibet. Sanat & serpentium morsus. Et si in uino decoquatur, pruritus testium sedat. Partus emortuos apposita extrahit, item uermes auriu. Ad tussim laterisque dolores bibitur. Contra scorpiones eadem & dracones marinos efficacax. Contra serpentes quoque ex oleo perungi ea prodest.

## DE ERPYLLO CAP. XCIII.

NOMINA.

*Serpyllum unde dictum.*



**S**ERPYLLON graece, Serpyllum latine. Officinae latinum nomen retinuerunt. Germanice Quendel / Kintlin / Hünertöl appellatur. Serpyllum autem, ut autor est Varro, ab eo quod serpat tam Graecis quam Latinis dictum est, quoniam si qua eius particula terram attingit, inibi radices demittit. Est enim ut Theophrastus libro sexto de plantarum historia, capite septimo ait, proprium quoddam eius ramulorum incrementum, quippe cum possit in quantum uoluerit quispiam longitudinem trahi, adiecto illi pedamento aliquo, aut si prope sepes plantetur, aut ex altiore loco aliquo deorsum demittatur: sic enim in longum protrahuntur: & ab hac plantae in ramulis eius natura, quod in longum serpit, Graeci & Latini peculiariter Serpyllum nominauerunt.

GENERA.

*Serpyllum hortense.*

*Syluestre. Zuyey.*

Duo eius genera. Hortense, quod germanice heymischer Quendel dicitur. Syluestre, quod priuatim Zygis uocatur, quod forte eo iugarentur uites. Zuyey enim Graecis interdum idem quod Latinis ligare & uincire significat. Germanice simpliciter Quendel dicitur. Nos syluestris tantum Serpylli picturam damus.

FORMA.

*Hortense.*

*Syluestre.*

*Plinij erratum.*

Hortense non dissimile est Origano, potissimum quod ad folia & ramulos ipsos attinet, quos candidiores tantum habet, odore tamen prorsus Sampsyllum praesentat. Repit humi, & in rectum non attollitur. Syluestre contra humi non serpit, sed rectum exilibus ramulis & lignosis attollitur, Rutae folijs plenis, angustioribus tamen. Flosculos habet subpurpureos, gustu acres, odore iucundo, radicem multifidam. Plinius secus quam Dioscorides hortense serpyllum nequaquam, syluestre uero humi serpere asserit, adeo ut subesse in hoc mendam uerisimile sit: res enim ipsa & uiuae herbarum imagines satis testantur, Dioscoridis sententiam esse ueriores. Dioscoridi subscribit Aetius. Neque mirum est magis humi reptare cultum, quod infirmius humoris copia est, atque adeo ramis inualidioribus stare nequit, quam syluestre, quod illo rigidius ac lignosius existit.

LOCVS.

Hortense non nisi satum prouenit, & Columella teste, neque pinguem, neque stercoreatum, sed apicum locum desiderat, ut quod macerrimo solo nascatur. Syluestre autem in petris, collibus, & montibus plerisque copiosissime nascitur, ita ut eo quasi uestriri uideantur.

TEMPVS.

Syluestre tota aestate floret, hortense autem Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERA-



**SERPYPILLVM****Quendel.**



C

## TEMPERAMENTVM.

Serpyllum gustu acre est, ob id calidum ualde, ita ut menses & urinam moueat.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Syluestre efficacius & maiori calefaciendi ui quàm hortense, atque ad usum medicinae aptius. Menses trahit, & urinam cit potum. Torminibus, ruptis, conuulsis, iecinoris inflammationibus auxiliatur. Aduersus reptilia potum & illitum. Capitis dolores sedat coctum adiecto rosaceo, & aceto madefactum. Maxime uero lethargo & phrenitidi cōuenit. Sanguinis uomitum sedat succus eius quatuor drachmis cum aceto potus.

## EX AETIO.

Serpyllum ita calefacit ut menses & urinam ducat. Huius genus duplex. Syluestre efficacius calidiusq̃ hortensi, atq̃ omnino usus eius in medicina p̃fertur. Prodest torminibus, cōuulsionibus, rupturis, inflammationib. iecinoris, reptilibusq̃. Potum ac illitum capitis dolores sedat. Madefactum autem aceto ac decoctum admixto rosaceo lethargicis, & diutinam phrenitim patientibus summopere cōgruit. Præterea drachmæ unius pondere ex aceto bibitum, sanguinis eiectiones cōpescit.

## EX PLINIO.

Aduersus serpentes efficax, maxime Cenchrin & Scolopendras terrestres ac marinas & scorpiones, decoctis in uino ramis folijsq̃. Fugat & odore, cominus si uratur, & contra marinorū uenena præcipue ualeat. Capitis doloribus decoctum in aceto illinitur temporibus, ac fronti cum rosaceo. Item phreneticis, lethargicis, contra tormina & iecinorum dolores. Folia obolis quatuor dantur ad lienem ex aceto. Ad cruentas excreationes teritur in cyathis duobus aceti & mellis.

## EX PLINIO VALERIANO.

Serpyllum calidum, simul nobis utile medicinae usus ostendit. Capitis dolores decoctum ex aceto & rosaceo temporis ac fronti illitum mitigat. Serpentes & omnia animalia uenenata adustum nidore repellit, ideo & messoribus in cibo miscetur, ut si fatigatos fortè somnus oppresserit, tutè quiescant contra animalia quæ hoc tempore uenenatis hausibus sequere consueuerunt. Contusi puluis ex scrupulis xij. in aqua datus tormina emendat, urinæ difficultates resoluit, lienis quoq̃ iniuriæ idem puluis ex aceto mixtus occurrit. Nec minus cruentis excreationibus subuenit, ex duobus cyathis mellis & aceto temperatus.

## DE ELYMO CAP. XCIIII

## NOMINA.

Panicum quare  
dictum.



ΕΛΥΜΟΖ Græcis, Panicum Latinis, Germanis Heydelpsenich/oder Senich dicitur. Panicum autem à paniculis in quibus semen est, Latini appellauerunt.

## FORMA.

Milij similitudine profilit, denis ut plurimum folijs luxurians, culmo penè in surculum extenuato, nutante, rubido panicularū fastigio, prædensis acruato granis, aliàs purpureis, aliàs rufis, nigris aliàs, item & candidis.

## LOCVS.

Satum facile quouis ferè loco prouenit, leuem autem & solutam terram potissimum desiderat. Nec in sabuloso duntaxat solo, sed in arena quoq̃ nascit̃, modo humidum cœlum, uel riguum solum fortiatur.

## TEMPVS.

Quadragesimo die postquā satum est absolui, ut omnia æstiuā, inter omnes conuenit.





253

PANICVM

Pfenich.

Y



c uenit. Quocunq; igitur tempore satum fuerit, ubi semine pragnans erit, tum carpendum uenit.

## TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & exiccat, praesertim si foris illinatur.

## VIREs. EX DIOSCORIDE.

Miliij similitudinem refert, eodemq; modo in panes defingitur, & ad idem accommodatum est, minus tamen quam Milium nutrit & adstringit.

## EX GALENO.

Panicum facultate pauci nutrimenti, & exiccatoria. Sistit quoq; nonnihil uentris fluxus, ceu ipsum etiam Milium. Panis itaq; eius exigui est alimenti & refrigerans. Constat insuper praeridū & instar arenae aut cineris friabilem esse: caret enim penitus pinguedine & lentore. Iure igitur aluum humentem desiccatur. Agricola farina huius cocta admisto adipe suillo & oleo uescuntur. Panicum in omnibus Milio cedit, insuauius esu, concoctu difficilius, uentremq; magis coërcet, minusq; nutrit. Huius farinā interdum cum lacte coctam, rustici ueluti triticeam esitant. Clarumq; est id edulij tanto quā illud per se solum assumptū melius esse, quanto lac huius seminis natura ad boni succi procreationē, aliaq; omnia eminentius habetur. Dico autem alia omnia, cōcoctionem, uentris subductionem, in totum corpus distributionem, adeoq; ipsam in edendo suauitatem & uoluptatem. Hoc nanq; semen nulla gratia aut iucunditate commendatur.

## EX PLINIO.

Panicum Diocles medicus mel frugum appellauit. Effectus habet quos Milium. In uino potum prodest dysentericis. Similiter ijs quae uaporanda sunt ex calfactum imponitur. Sistit aluum in lacte caprino decoctum, & bis die haustum. Sic prodest & ad tormina.

## DE ERICA CAP. XCV.

## NOMINA.

**E** PEIKH Graecis, Erica Latinis, Heyd Germanis dicit. Officinis inusitata.

## FORMA.

Erica fruticosa arbor est Tamarici similis, multo tamen breuior. Eius flore utentes apes, reprobū mel conficiunt. Plinius lib. xxiiij. cap. ix. fruticem esse scribit non multum à Tamarice differentem, colore Rosmarini, & penè folio. Id quod uerè de ea Erica, cuius nos picturam damus, dicitur. Theophrastus etiam Rosmarino similem Ericam facit. Habet flores in candido purpureos.

## LOCVS.

In montibus & syluis locisq; arenosis nascitur.

## TEMPVS.

Autumno floret sola ferè in syluis.

## TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est Erica, id quod in gustu amaritudo satis docet.

## VIREs. EX DIOSCORIDE.

Ericae coma & flores illita serpentium moribus medentur.

## EX GALENO.

Discutiendi facultate praedita est Erica: flore eius potissimū & folijs utendum.

## EX PLINIO.

Ericen aduersari serpentibus tradunt.

## APPENDIX.

Recentiores herbarij praeter iam commemoratas, alias facultates addunt, nimirū florum decoctum lumborū ac uentris dolores lenire posse. Succum ex folijs floribusq; elicium, oculis imbecilibus guttatim instillatum, aut foris inunctū cōferre.





ERICE

Heyden.





IRION

Hederich.

Y 3





HELXINE  
CISSAMPELOS.

Mittelwind.



## NOMINA.



HELXINE CISSAMPELO Græcis, Helxine cissampelos & Conuoluulus Latinis nominatur. Vulgus herbariorum & officinæ, Volubilem mediam & Vitalem appellat, Germani Mittelwinden/oder Weingartenwinden. Rectè autem Cissampelos dicitur: in uineis enim potissimum nascitur, & folio hederaceo. Conuoluulus uerò, quod crebra reuolutione uicinos fructus & herbas implicet.

Vitalis.

Cissampelos quare dicitur.

Conuoluulus.

## FORMA.

Folia habet Hedere similia, minora tamen. Ramulos exiguos circumplectentes quodcumque contigerint. Folia denique eius scissili ordine alterna subeunt. Flores primum candidos Liliæ effigie, dein in puniceum uergentes, profert. Semen angulosum in folliculis acinorum specie.

## LOCVS.

In uineis nascitur, unde etiam ei appellatio Cissampeli, ut diximus, indita est.

## TEMPVS.

Aestate, potissimum autem Iulio & Augusto mensibus, floret.

## TEMPERAMENTVM.

Calidam esse ex uiribus quas illi ueteres tribuunt, facile conijcere licebit.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.


Succus foliorum eius potus, aluum subducendi facultatem obtinet.

## EX GALENO.

Helxine, quæ & Cissampelos nuncupatur, digerendi facultatem habet.

## DE HEPTAPHYLLO CAP. XCVIII.

## NOMINA.



HEPTAPHYLLO Græcè, Septifolium latine, uulgò Tormentilla nominatur. Sunt ex recentioribus qui perperam Bistortam uocent. Germanicè Tormentill/ Rot heil wurz appellatur. Heptaphyllon autem à septenario foliorum numero dicta est.

Tormentilla.

Heptaphyllon unde dictum.

## FORMA.

Quinquefolio simillima est, nisi quod septem non quinque habet folia, utrinque lanuginosa, exigua, parua, serrata, caulem certis ferè interstitijs ambientia, flores luteos, radicem puniceam ac modicè intortam. Ex hac descriptione omnibus constare puto, herbam nostris Tormentillam dictam, non esse Dioscoridis Quinquefolium. Hoc enim, ut reliqua omittam, radicem non intortam, sed rectam & oblongam habet. Plinius etiam libro xxv. capite ix. herbam Quinquefolium incipere & desinere cum uite scribit. Tormentilla autem non maturè prouenit, sed cum uites iam florent. Accedit quod hæc in montosis & syluestribus incultisq; hoc uerò pratis, cultis & aquosis in locis potius prouenit. Apuleius etiam utranque herbam seorsim describit.

Tormentilla non est Quinquefolium.

## LOCVS.

Nascitur montosis, ut diximus, locis ac syluis.

## TEMPVS.

Serò ac cum iam uites florent herba hæc apparere incipit.

## TEMPERAMENTVM.

Recentiores iudicant hanc herbam in tertio ordine frigidam & siccam esse. Ceterum non esse frigidam, potissimum in tertio ordine, facultates eius abundè declarant. Gustus etiam adstrictionem illam tanta frigiditate prorsus carere palam ostendit. Quare cum eisdem quas Quinquefolium facultates habeat, idem etiam temperamentum ob-

Y 4 tineat





HEPTAPHYLLVM

Tormental.



A tineat necesse est. Erit itaq; radix desiccatoria ex tertio ordine, nullatenus tamē manifesta caliditate participans.

## VIRES EX APVLEIO.

Heptaphyllo herba trita & cū oleo mixta pedes perunges, & tertio die dolorē tollit.  
EX RECENTIORIBVS.

Facultatem obtinet glutinandi uulnera. Farina herbae uel radicis ex succo Plantaginis propinatur in difficultate urinæ. Eadem respersu uulnera ad cicatricem perducit. Cum albo oui subacta & figlino decocta, datur cholericis. Foliorū uis deplo-  
ratis fistulis instillatur, neq; non oculis ad discutiendas nubeculas. Ad putrescentia oris ulcera herba & radix cōmanducata, & in ore retenta ualēt. Herpetas, strumas, duritias, tumores, aneurismataq; sanat. Et ut antea diximus, facultates ferē easdem quas Quinquefolium obtinet. Quapropter uenenis resistit, dysenterias, & omnes sanguinis eruptiones compescit.

## DE ERUCA CAP. XCIX.

## NOMINA.

**E**RYSIMON Græcis, Eruca Latinis, officinae latinum nomen retinuerūt, Germanis Weiß senff appellatur. Euzomos autem Græcis, quoniam *Euzomos unde dicta.* iura cōmendet, habeatq; in eisdem peculiare gratiam dicta est. Erucam *Erucæ.* uerò ideo nominatam uolunt quod erodat: hæc enim ubi degustaueris, os & linguam satis acriter uellicat.

## GENERA.

Duplex est Eruca. Vna hortensis seu satiuæ, quæ Germanis sam weiß senff dicitur. Altera syluestris, h̄isdem wilder weiß senff appellatur.

## FORMA.

B Sesquipedali thyrsos confurgit satiuæ, folio longo, angustioq; in profundas sed rariores crenas laciniato, gustu præter modum acri, floribus pallidioribus, semine in siliquis rapi, uel sinapi, firmo, radice candida. Syluestris folio satiuæ simili, strictiore tamen & minore, flore luteo.

## LOCVS.

Satiua in hortis nascitur. Syluestris Hispaniæ familiaris: propē tamen aquas pro-  
uenit magna copia. Quæ autem apud nos creditur esse syluestris Eruca, ea non est sed Erysimon, de qua quidem herba suo in loco abundē scripsimus.

## TEMPVS.

Satiua tota æstate floret: syluestris autem circa Calendas Iuni potissimum erum-  
pit: alio enim tempore uix reperitur.

## TEMPERAMENTVM.

Temperamentum Erucæ idem cum temperamento Erysimi.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Cruda Eruca satiuæ largius comesta uenerem stimulat. Idem potest semen eius, quod urinam cit, coctionē adiuuat, aluumq; bonum efficit. Vtuntur semine ad con-  
dimenta. Quod ut plurimo tempore seruetur, aceto uel lacte maceratum, & in pa-  
stillos digestū recondunt. Syluestris semine homines in Hispania sinapis uice utun-  
tur. Est autem ad ducendam urinam efficacior, & multo quā satiuæ acrior.

## EX GALENO.

Olus hoc perquā manifestē calefacit, adeo ut nō facile solum absq; iunctis Lactu-  
cæ folijs edatur. Quinetiam genitale semen augere creditur, & in uenerem stimu-  
los addere. Caput magis dolore afficiet si solum edatur.

## EX PAULO.

Eruca temperamento Erysimi similis, flatulenta est, ob quod ad uenerem insti-  
gat. Semen eius urinam quoq; mouet. Cæterū syluestris, domestica ualentior est.

## EX PLL





ERVCA  
SATIVA.

Zam weiß senff.





ERVCA  
SYLVESTRE.

Wild weiß senff.



## EX PLINIO.

Eruca diuersæ est quàm Lactuca naturæ: concitatrix ueneris: idcirco iungitur illi ferè in cibis, ut nimio frigori par feruor immixtus temperamentū æquet. Eius semen scorpionum uenenis & muris aranei medetur. Bestiolas omnes innascentes corpori arcet. Vitia cutis in facie cum melle illitum. Lentigines ex aceto. Cicatrices nigras traducit ad candorem cum felle bubulo. Aiunt uerbera subituris potum ex uino, duritiam quandam contra sensum induere. In condiendis obsonijs tanta est suauitas, ut Græci euzomon appellauerint. Putant subtrita Eruca si foueant oculi, claritatē restitui. Tussim infantium sedari. Radix eius in aqua decocta, fracta ossa extrahit. Tria folia syluestris Erucæ sinistra manu decerpta, & trita in aqua mulsa, si bibantur, uenerem stimulant.

## DE EVPATORIO ADVLTERINO CAP. C.

## NOMINA.



Officinatum  
error.

Eupatoriū adul-  
terinum.

VM herba hæc ueteribus Græcis & Latinis cognita fuerit, & quo nomine ab iisdem appellata sit, mihi nondum constare ingenuè fateor. Officinæ tamen ferè omnes pro Eupatorio uero, cum tamen non sit, haud sine magno errore utuntur. Hinc cum nomen aliud non esset quo illam appellaremus, Eupatorium adulterinū nominare placuit. Germanicè Kunigund heraut, hoc est, herba S. Kunigundi uocatur, & Wasserdoß/ ab Origani similitudine, & quod iuxta aquas proueniat. Alijs Hirsgentlee/ quod uulnerati cerui sibi hac medeantur herba.

## FORMA.

Caulem edit rotundum, purpureū, geniculatū, solidum & hirsutum, circa quem alæ panduntur, folia longa, Canabinis ferè similia, amaraq̃. Flores in summo paruos coaceruatos, in candido purpurascens, tandē in pappos tenues abeuntes. Radicem multis fibris capillatā & inutilem. Errant haud dubiè qui herbam hanc Dioscoridis Hydropiper esse putant. Nam etsi ferè tota eius herbæ facies, floribus demptis, Hydropiperis deliniationi respondeat, tamen quia nulla prorsus piperis in folijs aut floribus acrimonia apparet, non est cur Hydropiper dici possit aut mereat.

Eupatoriū adul-  
terinum non est  
Hydropiper.

## LOCVS.

In fluminum ripis, alijsq̃ locis humidis nascitur: potissimum uerò iuxta residues aquas, aut tardo fluxu prorepentes.

## TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

## TEMPERAMENTVM.

Gustu uehementer amara est, ut calidam & siccam esse in secundo ordine, aut in medio tertij non sit dubium.

## VIRES.

Haud dubiè herba hæc abstergit, expurgatq̃, & quæ in uenis est crassitiem incidit: quamobrem menses & urinas mouet, educendoq̃ ex thorace pulmoneq̃ puri auxiliatur, aliasq̃ facultates amari saporis, quas recenset Galenus lib. iij. de Simp. med. facul. cap. xvij. obtinet. Potest itaq̃ obstructions iecoris & lienis aliarumq̃ partium corporis soluere. Ex recentioribus sunt qui hanc Vulnerariā esse tradunt, neq̃ temerè: id ipsum enim posse, siccitas eius testatur. Suffitum præterea eius herbe, uenenatas fugare feras iisdem scribunt. Euidētissimū uerò est hanc etiam contra uenena esse admodum efficacem.

DE ERE-



EVPA TORI VM  
ADVLTERINVM.


Rumigunt franc.

Z





## NOMINA.



EREBINTHOS græcè, Cicer latinè, officinæ latinum nomen retinuerunt, germanicè zyßern nominatur.

## GENERA.

Tria præcipua sunt Cicerum genera, album, rufum & nigrum. Nos ex his tribus nigri tantum picturam damus. Differunt potissimum in floribus; hoc enim ut cernis purpureos, album uerò candidos flores producit.

## FORMA.

Cicer satiuum caule est lignoso, obliquo, folijs exiguis, multis, circinatis, flore albo uel purpureo, siliquis rotundis, radice tenui & non admodum longa.

## LOCVS.

Pullo crassoq; solo gaudet.

## TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, atq; subinde in siliquis semen producit.

## TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum est primo in ordine.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Cicer satiuū bonam facit aluum, urinam cit, inflationes parit, cutis colorem commendat, menses & foetus educit, lac auget. Cum Eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium & myrmecias. Ad scabiem, achoras, impetigines, ulcera concretia & maligna, cum hordeo & melle. Alterum genus arietinum nominatur. Vtruncq; cit urinas, dato cum Rosmarino contra regium morbum & cutem subeuntes aquas eorum decocto. Legunt autem uesicam exulceratā & renes. Contra myrmecias & acrochordonas iubent aliqui noua luna singula earum capita eminentiasue singulis Ciceribus tangere, deligataq; in lintheolo semina illa post se abijcere, ut acrochordones decendant.

## EX GALENO.

Cicer legumen est flatuosum quod nutrire potest, aluo mouendæ habile, ciendæ urinae idoneū, & semini generando aptum. Prolicit uerò & menses. Porro quod uocatur arietinum, cæteris efficacius urinam prouocat. Decoctum eius calculos renum confringit. Reliquum autem Cicerum genus quod Orobiaeū uocant, eadem ui pollet, puta attrahendi, digerendi, incidendi, extergendi. Lienem & iecur, & renes expurgant, scabiesq; & impetigines extergunt. Parotidas & testes induratos discutunt. Maligna etiam ulcera cum melle sanant.

## EX SYMEONE ANTIOCHENO.

Cicera difficulter concoquunt & excrementa gignunt. Venerem stimulant, magisq; quàm fabæ nutriunt, obstructions tollunt, & menses educunt. Habent salis simul & dulcem qualitatem, & ob falsuginem uentrem mouent, propter dulcedinem autem urinam. Inflationes quoq; faciunt, & lac gignunt, extergendiq; facultatem obtinent. Nigra medicamentosam uim habent: urinam enim uehementissimè mouent, & calculos renū & uesicæ frangunt. Nullum uero legumen sic ut Cicera, præcipuè autē nigra & parua, lapides frangere potest. Id uerò magis eius ius, quod tamen uesicæ morbis supra cætera legumina officit. Cicera uerò rubra calidiora & crassiorū sunt partium quàm alba. Omnia autem urinam ducunt. Madefacta nocte una in aqua & sumpta, lumbricos eiiciunt, sed qui utitur sex ieiunet horas oportet. Imposita ut cataplasma parotidibus, molliunt & discutunt tumorem. Farina horum aceto subacta, & scabiosis inuncta prodest. Ius eorundem ictericos iuuat, & urinam albam reddit. Oportet uerò his neque antebum, neque post uti, sed in medio.





CICER  
NIGRUM.


Schwarz Kicher.



## NOMINA.

Buglossum syl-  
uestre.

Echion quare  
dictum.



**E**XION, ἡ ἀλκιβιάδος Græcis, Echion & Alcibiacū Latinis dicitur. Offici-  
nis ignotum. Vulgares herbarij sylvestre Buglossum nominant, quos  
sequentes Germani wild Schsenzungen appellant. Echion autem di-  
ctum uolunt, quod contra ferarum ictus sit utile. Alij quod florescit ca-  
pitulis uiperæ similibus. Rectius Dioscorides, quod semina uiperino capiti similia  
habeat.

## FORMA.

Folia obtinet oblonga, aspera, tenuia, Anchusæ proxima, minora tamen & pin-  
guia. Habet & aculeos exiles folijs adiacentes. Cauliculos tenues multos, & utrin-  
que foliola tenuia, pennata, nigra, minora proportionem ad cacumen caulis. Iuxta fo-  
lia flores purpureos, in quibus semē est uiperino capiti simile. Radix digito exilior,  
subnigra. Ex qua sanē deliniatione sole clarius fit, herbam cuius picturam hic exhi-  
bemus esse Echion. Folia enim habet prælonga, hirsuta, tenuia, ad Anchusam acce-  
dentia, minora tamē pinguiāq, tenuibus spinis horridula, cauliculos tenues, nume-  
rosos, minutaq folia utroq latere dependentia, nigra, in summo caule minuscule,  
inter quæ purpurei flores emicant, in quibus semina uiperarum capitulis similia in-  
sident, à ceruice paulatim in rostellum extenuata, tumidiore superna parte, in qua  
quædam prominulæ quasi sedes oculorū apparent, id quod ego hisce oculis non  
semel, sed iterum atq iterum conspexi. Radix digito tenuior nigricat.

## LOCVS.

Vbiq ferè ad itinera, & in asperis locis nascitur.

## TEMPVS.

Iunio mense floret.

D

## TEMPERAMENTVM.

Calidum esse citra tamen insignem siccitatē inde conijcitur, quod lactis procrea-  
tricem facultatem obtinet. Medicamenta enim, Galeno libro quinto capite uigesi-  
mo de Simpl. med. facul. teste, quia pituitosos humores calefacientia in sanguinem  
uertunt, lac procreare solent.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Radix non solum ijs qui à serpentibus morfi sunt succurrit pota cum uino, ue-  
rū etiam præsumentes eam ne feriantur facit. Idem præstant folia & semen. Se-  
dat etiam dolores lumborum, & cum uino aut sorbitione sumpta lac proritat.

## EX PAVLO.

Echion spinosa herba est, quæ non modo à serpente commorsis cum uino pota  
auxiliatur, sed præsumentes quoq percuti non patitur.





ECHION

Wild oxszungen.

Z 3





APIUM  
PALUSTRE.

Wasser cress.




## DE ELEOSELINO CAP. CIII.

271

A

### NOMINA.



ΕΛΕΟΣΕΛΙΝΟΝ, ἢ ὑδρόσελον Græcis, Apium palustre & rusticum Latinis, Germanis Wasser epff/oder Eppich/oder bauren eppich nominatur. Sic dictum Græcis, quod in paludibus & aquosis locis proueniat.

Apium palustre  
Eleoselinon uis  
de dictum.

### FORMA.

Apio satiuo maius est, caule tenero, concauo, folio molli, raro nec hirsuto, simile Apio sapore, odore, floribus, semine & radice.

### LOCVS.

Nascitur in paludibus & aquosis locis.

### TEMPVS.

Iulio mense floribus & semine prægnans est.

### TEMPERAMENTVM.

Idem quod Apium satiuum temperamentum obtinet.

### VIRES. EX DIOSCORIDE.

Eadem omnia quæ satiuum potest.

### EX PLINIO.

Eleoselino uis priuata contra araneas.

## DE ELLEBORO ALBO CAP. CIIII.

### NOMINA.



ΑΛΕΒΟΡΟΣ λευκός Græcis, Elleborus candidus, & Veratrum album Latinis, officinis pariter Latinis Elleborus albus, Germanis weißer meßwurß appellat. Elleboron autem Græci dictum uolunt, quod cibū corporis eripiat. Album à radice uocarunt, quæ nigri respectu candida est.

Elleborus albus  
dictus.  
Album quare cognominatus.

### FORMA.

Plantagini similia folia obtinet, aut Betæ syluestris, breuiora tamen, nigriora, & colore rubentia. Caulem palmi altitudine, cauum, quum sicari inceptis corticibus seu tunicis inuolutum. Radices illi subsunt numerosæ, tenues, ab exiguo & oblongo capite ceparū modo prodeuntes. Quod autem Dioscorides dicit colore rubere folia, id de costis eorum intelligendum erit.

### LOCVS.

Nascitur in montanis locis frigidis & asperis.

### TEMPVS.

Radices eius per messem legendæ sunt.

### TEMPERAMENTVM.

In tertio ordine est excalescentium & exiccantium.

### VIRES. EX DIOSCORIDE.

Optimus habetur qui mediocriter extensus est & albus, fragilis, carnosus, non acuminatus, iunceusq, aut quum frangitur puluerulentus, exilem interiorem medullam habens, gustu non admodum feruens, neq, saluā confertim ciens. Huiusmodi autem strangulat. Purgat uomitionib. uaria educens. Miscetur collyrijs, quæ claritati oculorum officientia purgare possunt. Menses ducit, & fetus in utero appositus enecat. Sternutamenta cit, & mures interficit, cum melle & polenta subactum. Carnes simul coctum minuit. Datur ieiunis per se & cum Sesamo, aut Pti-fang succo, aut Alicæ, aut mulsæ, aut pulte, aut lenticula, aut alia sorbitione. Pani cōpinfitur & torref. Apparatus & uictus ratio ab ijs tradita est, qui de ratione & modo dandi eius, dicato priuatim opere, scripserunt. Potissimum autem Philonidi Siculo ab Enna subscribimus. Longum enim esset ei qui de medica materia agit, curandi quoq, rationem docere. Dant autem aliqui cum copiosa sorbitione, aut suc-

Z 4 co mul-





ELLEBORVS  
ALBUS.

Weiß nießwurtz.



**A** co multo, aut modicum cibum dari præcipientes, statim Elleborum offerunt, præsertim ijs in quibus suspecta timendaue erit strangulatio, aut corporis imbecillitas imminet: tuto enim ea sic peragitur purgatio, quod non intempestiue medicamentum corporibus cibo munitis accedat. Sedi etiam balani ex Elleboro subditæ cum aceto, uomitiones eliciunt.

## EX GALENO.

Elleborus extergentis simul & excafacientis facultatis est. Quamobrem ad alphas, impetigines, scabies, leprasque accommodus est. Quinetiam si in fistulam callo induratum infundatur duobus tribusue diebus, callum detrahit. Dentibus si cum aceto colluantur prodest.

## EX PLINIO.

Candidum ueratrum uomitione, causasque morborum extrahit: quondam terribile, postea tam promiscuum, ut plerique studiorum gratia ad prouidenda acrius quæ commentabantur, sæpius sumptitauerint. Carneadem responsurum Zenonis libris: Drusum quoque apud nos, tribunorum popularium clarissimum, cui ante omnis plebs adstans plauit, optimates uero bellum Maricum imputauere, constat hoc medicamento liberatum comitiali morbo in Anticyra insula. Ibi enim tutissimè sumitur, quoniam, ut diximus, Sesamoides admiscunt. Italia ueratrum uocat. Farina eius per se & mixta radicle qua lanas diximus lauari, sternutamentum facit, somnumque. Leguntur autem tenuissimæ radices breuesque ac ueluti decurtatæ etiam hæ. Nam summa quæ est crassissima, cepis similis, canibus tantum datur purgationis causa. Antiqui radicem corticemque carnosissimum eligeant, quò tenuior eximeretur medulla. Hanc humidis spongijs opertam turgescerentemque, in longitudinem sindebant. Deinde fila in umbra siccabant, ijs utentes. Nunc ramulos ipsos à radice sua grauissimi corticis, ita dantes. Optimum quod acre gustu, feruensque in frangendo puluerem emittit. Optimum præterea quod celerrimè mouet sternutamenta, sed multo terribilius nigro, præcipue si quis apparatus poturorum apud antiquos legat, contra horrores, strangulatus, intempestiuas somni uires, singultus infinitos, aut sternutamenta, stomachi dissolutiones, tardiores uomitus aut longinquiores, exiguos aut nimios. Sed antiquorum uitium erat, quod propter hos metus parcius dabant, cum celerius erumpat, quo largius sumitur. Themison binas non amplius drachmas donauit. Sequentes & quaternas dedere, claro Herophili præconio, qui Elleborum fortissimi ducis similitudini æquabat. Concitatis enim intus omnibus, ipsum in primis exire. Præterea mirum inuentum est, quod incisum forficulis, cortex remanet. Hoc inanito, medulla cadit. Hæc in nimia purgatione data, uomitiones sistit. Cauendum est felici quoque cura, ne nubilo detur die, quippe impatibiles cruciatus existunt. Nam æstate potius quam hyeme dandum, non est in dubio. Corpus septem diebus præparandum cibis acerbis, abstinentia uini, quarto & tertio die uomitionibus, pridie cœnæ abstinentia. Album è dulci datur, aptissimè uero in lacte aut pulte. Nuper inuenere dissectis raphanis inferere Elleborum, rursusque comprimere raphanos, ut transeat uis, atque eo lenimento dare. Reddi post quatuor ferè horas incipit. Totum opus septenis peragitur horis. Medetur in morbis comitialibus, uertigini, melancholicis, insanientibus, lymphaticis, elephantique albæ, lepris, tetano, tremulis, podagricis, hydropicis, incipientibusque tympanicis, stomachicis, spasticis, clinicis, ischiadicis, quartanis quæ aliter non desinant, tussi ueteri, inflammationibus, torminibus redeuntibus. Vetant dari senibus & pueris. Item mollibus & foeminei corporis animeque exilibus, aut teneris, & foeminis minus quam uiris. Item timidis, aut si exulcerata sint præcordia, uel tumeant, minimeque sanguinem excreantibus, uel latere uel faucibus. Medetur extra corpus eruptionibus, pituitæ cum axungia illitum. Item suppurationi ueteri. Mures polenta admixtum necat. Muscæ quoque necantur albo trito, & cum lacte sparso. Eodem & phthiriasis emendatur.





ELLEBORVS NIGER ADVL  
TERINVS HORTENSIS.

Christwurz.





ELLEBORVS NIGER  
ADVLTERINVS SYLVESTRIS

Schwarzrauc.



## NOMINA.

Elleborus niger  
adulterinus cur  
dictus.



**H**ERBAM hanc cuius picturam damus non esse uerum Elleborum facile constabit, si eam ad descriptionē referas. Verum quum magna pars hodie medicorum pro Elleboro nigro, neq; tamen citra summam efficacitatem, utatur, adulterinum nigrum Elleborum appellare placuit. Germanis *Christwurz* dicitur, non alio sanè nomine quàm quod circa seruatoris nostri *CHRISTI* natalem diem flores, modo calido in loco sita sit herba, producat. Cæterum etsi genuinus Elleborus non sit, tamen non admodum ab illo abludie descriptio, nec uiribus multo inferior est, ut in alterius inopia huius usus citra errorem esse possit.

## GENERA.

Duo eius esse genera deprehendimus. Vnum quod officinæ hodie Elleborum nigrum, Germani uerò *Christwurz* / ut diximus, nominant. Nos certioris discriminis causa, Elleborum nigrum adulterinum hortensem appellauimus, quod scilicet sua sponte, & nisi plantatum sit, in hortis non proueniat. Alterum quod syluestre sit, & sponte sua nascitur, Elleborum nigrum adulterinum syluestrem nuncupauimus. Germanis *Leüßtraut* dicitur.

## FORMA.

Hortensis caulem, uel potius pediculum, habet oblongum & folijs nudum, nisi in summo, ubi folia oblonga, angusta, pluribusq; diuisuris incisa, atque adeò in ambitu serrata producit. Florem habet herbacei coloris. Radices tenues, nigras, ueluti à capitulo ceparum pendentes. Syluestris priori non admodum dissimilis est, nisi quia caulem obtinet crassiores, foliaq; minora. Florem etiam etsi herbaceum habeat, tamen è medio eius, folliculi, aut siliquæ duæ aut tres, in quibus semen est, exeunt.

## LOCVS.

**D** Hortensis, ut dictum est, passim in hortis nunc prouenit: syluestris in montibus asperis, lapidosis ac sublimibus.

## TEMPVS.

Hortensis hyeme, circa *CHRISTI* nimirum natalem, ut comprehensum est, floret. Syluestris autem uere & initio æstatis.

## TEMPERAMENTVM.

Quum experientia testetur Elleborum nigrum adulterinum, potissimū hortensem, eandem quam genuinus habere facultatē, idem etiam obtineat temperamentum necesse est. Calidus itaq; & siccus in tertio ordine erit.

## VIRE S.

Purgat perinde atq; genuinus inferiorem uentrem, pituitam & flauam bilem ducens. Prodest comitiali morbo laborantibus, melancholicis, insanientibus, articulorum doloribus correptis, & resolutis. Menses in pello subditus trahit. Foetus necat. Porro cum illis etiam insit extergendi uis, alphos, impetigines, scabiem, leprasq; curant. Erodentibus medicamentis cōmiscantur. Ideoq; syluestris non temere, quod pediculos interficiat, *Leüßtraut* à Germanis meis dicitur. Non uero pediculos tantum, uerum etiam oues & alia animantia comestus necat.





HELXINE

Tag vnd nacht.



C

## NOMINA.

Helxine unde  
dicta.

Perdicion.

Vrceolaris.

Muralis.

Parietaria.



ΑΞΙΝΗ, ἡ ἀποδύου græcè, Helxine & Vrceolaris latinè nominatur. Officinæ uocant Parietariam, & dempta una litera Paritariâ. Vulgus Muralium & Muralem. Germani Tag vnd nacht/S. Peterskraut/oder Glasstraüt. Helxine autem ab aspero semine quod tenaci nexu uestibus adhæret, dicta est. Perdicion uerò, quod ea perdices præcipuè uescantur. Vrceolaris autem, quod detergendis uitreis, urceolis uasisq̃ efficax sit. Muralis & Parietaria, quod muros ac parietes natales locos sibi fecerit.

## FORMA.

Cauliculos habet tenues, subrubentes, folia Mercuriali similia, hirsuta, circa caules ueluti exigua semina, aspera, uestibus adhærentia. Hæc sanè pictura sic plantæ illi respondet, ut nulla prorsus sit nota quæ illi non adamussim conueniat. Est enim fruticosa, cubitalis, cauliculis tenuibus, leniter rubescentibus, folijs Mercurialis herbæ, hirsutis, floribus purpureis minutissimis, exili per ambitum eius semine, aspero, uestibus adhærente, radice subrubra, fibris capillata.

## LOCVS.

Nascitur in sepibus, muris, macerijs, parietibus & uinetis. Nunc in hortis etiam plantata prouenit.

## TEMPVS.

Iulio mense floret.

## TEMPERAMENTVM.

Facultas Perdicio inest abstergendi & cōstringendi cum humiditate subfrigida.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Folia refrigerandi cōstringendiq̃ uim obtinent. Quare illita sacros ignes sanant, d condylomata, adusta, incipientes panos, inflammationes omnes, & cedemata. Succus eius cerussæ mixtus, ignibus sacris & ijs quæ serpunt malis utiliter illinitur. Inungitur podagris cum cerato Cyprino, uel seuo hircino. Diuturnas tusses adiuuat, cyathi mensura absorptus. Contra inflammatas tonsillas gargarissatus & illitus prodest. Aurium quoq̃ dolores cum rosaceo infusus iuuat.

## EX GALENO.

Vim habet abstergendi & paulatim constringendi ac refrigerandi. Quare phlegmonas omnes inter initia, & in augmento usq̃ ad statum sanat, maximè calidas. Quinetiam incipientib. phygethliis cataplasmatibus ritu illinitur. Succus quoq̃ eius ad dolores phlegmonosos mediocriter profuerit. Gargarizandū item nonnulli exhibent ad paristhmia. Aliqui etiam medicorum ijs qui diutina tussi uexantur, illam exhibuerunt. Certè euidens extergendi experimentum præbet & in uasis uitreis.

## EX AETIO.

Exterit alopecias & impetigines priuatim assiduè illita. Sedis hæmorrhoidas aperit, fistulis medetur, & sinus cohibet trita & cum modico sale apposita.

## EX PLINIO.

Hæc inficit lanas, sanat ignes sacros, tumores, collectionesq̃ omnes & adusta. Panos succus eius cum plimmythio, & guttura incipientia turgescere. Item ueterem tulsim cyatho hausto. Et omnia in humido. Sicut tonsillas & uarices cum rosaceo. Imponitur & podagris cum caprino seuo ceraq̃ Cypria.

## APPENDIX.


Monendi sunt hoc loco medici ut rectum Helxines usum discant. Nam hætenus non rectè eam in frigidis uitijs pro fomento usurparunt, cum refrigerandi constringendiq̃ uim habeat. Cæterum cum abstergendi quoque illi facultas insit, potest etiam calculosis, & ijs qui difficultate urinæ laborant exhiberi, potissimum si aliquid



Aliquid consimilem facultatem obtinens ei admisceatur. Sic Aëtius sedis hæmorrhoidas aperire tradit, si trita cum sale, cui etiam abstergerendi uis inest, apponatur. Quare qui calculosis hanc herbam propinant, curent ut aliquid quod abstergerendi facultatem habeat, commisceant.

## DE ERYTHRODANO CAP. CVII.

## NOMINA.



ΡΥΘΡΟΔΑΝΟΝ græcè, Rubia latinè uocatur. Officinæ Rubeam tinctorum appellant. Germanicè Rôte nominat. A rubore radice, quo lanæ & coria tinguntur, factum illi utrunq; nomen est.

Rubia citr non  
cata.

## GENERA.

Dioscoridi & alijs duo Rubiæ sunt genera. Altera enim sativa est, altera uero sponte prouenit, & syluestris existit; nec esse uidetur alia quàm quæ a nostris Stel-  
laria uocatur.

Sativa.  
Syluestris.

## FORMA.

Caules sativæ quadranguli, longi, asperi, similes Aparinæ, multo tamē maiores robustioresq; folia per interualla in singulis geniculis habentes, stellarū modo in orbem circūiacentia. Fructus rotundus, per initia uiridis, mox ruber, postea cum maturuit niger. Radix tenuis, longa, rubra. Syluestris itidem caules quadrangulos, ut diximus, emitit, folia per interualla in singulis geniculis stellarum instar in orbem circumiacentia, flores candidos, radicem tenuem, longam & rubram, adeo ut suo colore tingere etiam uideatur.

## LOCVS.

B Nascitur in plerisq; nunc Germaniæ locis, agro potissimum Argentoracensi & Spirensi. Seritur autem propter emolumentū quod ex ea questuosissimū sentitur.

## TEMPVS.

Æstate colligitur fructus, & subinde etiam effoditur radix.

## TEMPERAMENTVM.

Calida est in secundo ordine, & sicca in tertio.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix urinam ciet, qua de causa regio morbo laborantibus cum aqua mulsa auxiliatur: item ischiadicis & resolutis. Urinam multam & crassam ducit, nonnunquam etiam sanguinem. Bibentes quidem quotidie lauari oportet, & excrementorum quæ redduntur differentiam spectare. Aduersus uenenatorū morsus succum cum folijs bibere prodest. Semen ex oxymelite potum, lienem absomit. Apposita radix, fetus, menses, & secundas trahit. Albas uirilignes ex aceto illita sanat.

## EX GALENO.

Rubia tinctorum radix acerbæ & gustu amara est. Itaque quæcunq; agere diximus ubi eiusmodi coiuerint qualitates, ea omnia in hac radice luculenter conspiciuntur: quippe quum & lienem & iecur expurget, & urinam crassam copiosamq; ac nonnunquam etiam sanguinolentam moueat. Quin & menses ciet, ac mediocriter quæ extersionem postulant, extergit: proinde uirilignes albas cum aceto illita iuuat. Sunt qui eam ischiadicis & resolutis in potu cum melicrato exhibeant.

## EX PLINIO.

Erythrodanum, quam nos Rubiam uocamus, qua tinguntur lanæ, pellesq; perficiuntur, in medicina urinam ciet, morbum regium sanat ex aqua mulsa, & lichenas ex aceto illita: & ischiadicos & paralyticos, ita ut bibentes lauentur quotidie. Radix semenq; trahunt menses, aluū sistunt, & collectiones discutiunt. Contra serpentes rami cum folijs imponunt. Folia & capillum tingunt. Inuenio apud quosdam morbum regium sanari hoc frutice, etiam si adalligatus spectetur tantum.





RUBIA  
SATIVA

Röte die sam.





**RUBIA**  
**SYLVESTRIS.**  
Röte die wild.



C

## NOMINA.

Semen cur di-  
cta Zea.  
Ζείδωρος  
ἀγροα.



ΕΙΑ Græcis, Zea & Semen Latinis, uulgo & Italis Spelta dicitur. Semen autem Latini à præstantia frugis appellarunt. Hinc est quod Homerus etiā hanc celebrauerit dicens, Ζείδωρος ἀγροα. Quib. sanè uerbis innuit aruum Zeam largiens, non ut nonnulli arbitrantur quod uitam donet, Plinio autore.

## GENVS.

Duo Zeæ Dioscorides facit genera. Vnum cuius grana in singulis tunicis seu glumis gemina, quod Græcis eā ob causam αἰκάννος cognominatur. Germanis hoc genus Speltz/oder Dinkelkorn uocatur. Alterum simplicis est grani, & germanice nominatur Einkorn/oder S. Peters Korn.

## FORMA.

Primum genus. Primum genus culmo, geniculis & spica tritico simile est, duobusque utriculis iunctis duo grana simul fert. Alterum. Alterum culmo & spica est breuioribus, grana singula in singulis tunicis duplici ordine seu uersu dispositis proferens; ac in summitate aristis suis planè hordeum refert.

## LOCVS.

Lætum pingueq; solum desiderat.

## TEMPVS.

Iunio mense floret, Iulio autem maturitatem consequitur.

## TEMPERAMENTVM.

Zea media quodammodo est inter triticum & hordeū, quatenus ad calefaciendi & refrigerandi facultatem attinet, placide uero exiccat.

## VIREs.

## EX DIOSCORIDE.

D Zea magis nutrit quàm hordeum. Ori suauis est. Digesta in panificia minus quàm triticum alit.

## EX GALENO.

Zea uniuerſa ſua facultate quodammodo in medio eſt tritici & hordei; itaq; ex illis cognoscatur.

## EX PLINIO.

Zea farina efficacior hordeacea uidetur, trimestris mollior. Ex uino rubro ad scorpionum ictus tepida, & sanguinem excreantibus. Item arteriæ. Tussi cum caprino seuo aut butyro. Ex Fcenogræco mollissima omnium. Vlcera manantia sanat, & furfures corporis, stomachi dolores, pedes & mammas cum uino & nitro cocta.

## EX SYMEONE SETHI.

Zea facultatem habet proximam tritico, Est uero facilis concoctionis, boniq; succi: ad hæc etiam emplastica existit.

DE ERI-



ZEAE PRL  
MVM GENVS.

Speltz.


a 4





ZEAE ALTE-  
RVM GENVS.

Einkorn.





A

## NOMINA.



**H**ERIGERON Græcis, Senetio Latinis, officinis inusitata, Germanis Grindkraut dicitur. Græcis autem Erigeron quasi uernus senex nominatur, seu citò uel uere senescens, quod celeriter in pappum & lanuginem abeat. Itaque compositione nominis, tempus simul quo floret, & floris mox deflorescentis euentum, indicare uoluerunt Græci, ut quo tempore quærenda, & quibus notis inuenienda esset omnes scirent. Non igitur senectutis ratio aliqua in ea est, sed canescentes humani capilli modo post florem eius pappi, ut à senectute denominaretur, effecerunt. Eam etiam ob causam Romani Senetionem illam uocauerunt.

Erigeron cuius dicta.

Senetio.

## FORMA.

Herba est cauliculo cubitali, subrubro, folijs continuis, in extremitatibus Erucae modo incisuris diuisis, sed minoribus multo: floribus luteis, celeriter scissis dehiscenribus, & in pappos deflorescentibus: unde & Erigeron dicta est, quod uere scilicet capilli modo flores canescant. Radice inutili. Omnes hæ Dioscoridis notæ, herbæ quam Germani Creuzwurz & Grindkraut nominant, respondereprehenduntur. Siquidem cauliculus est illi cubitalis, subruber, folia continua habens, per extremitates Erucae instar laciniola, minora tamen. Flores lutei, qui scissi statim in lanuginem abeunt. Errant toto cœlo qui Senetionem Nasturtium esse garriunt.

Senetio non est Nasturtium.

## LOCVS.

Nascitur passim in sepibus, & circum oppida.

## TEMPVS.

Vere erumpit, quo etiam tempore, ut dictum est, canescit, & durat ferè tota æstate eius herbæ prouentus.

## TEMPERAMENTVM.

Erigeron, Paulo Aegineta autore, mixtam temperaturam obtinet: refrigerat enim & modicè discutit.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Folia cum floribus refrigerandi uim obtinent, quapropter cum exiguo uino, aut per se illita folia, testium sedisq; inflammationes sanant. Cum manna, tum reliquis uulneribus, tum neruorum quoque medentur. Idem præstant pappi per se ex aceto illiti, uerum recentes epoti strangulant. Totus autem caulis in aqua decoctus, & cum passo potus, stomachi dolores à bili contractos persanat.

## EX PLINIO.

Lanugo eius cum croco & exiguo aquæ frigida trita illinitur epiphoris. Tosta cum mica salis strumis. Erigeron quoque cum farina thuris & uino dulci, testium inflammationes sanat.

DE HE-





SENETIO

Creutzwurz.



A

## NOMINA.



**H**ΑΥΟΣΜΟΣ, ἡ μῦντς græcè, Menta latinè dicit̃. Officinæ nomen latinum retinuerunt. Germanicè Mûntz uocatur. Hedyosmon Græci, quod suauiem spiret odorem, nominauerunt. Menta autem dicta est, quod odore suo mentem excitet, aut quod grato, ut ait Plinius, odore mentis percurrat.

Hedyosmon uno  
de dictum.  
Menta.

## GENERA.

Mentæ in uniuersum duo sunt genera. Vna enim satiuæ & hortensis est: altera syluestris & fera. Satiuæ iterum quatuor præcipua sunt genera. Vna est quam Germani Deyment simpliciter, uel Krauß Deyment uocant. Altera, quam ijdem Krauß Balsam. Tertia, quæ ijdem Balsammûntz appellatur, & vnser Strau-wen mûntz / oder spitiz mûntz: à nostræ ætatis herbarijs Romana uel Saracenica. Quartam Germani quidam Herzkrant / nonnulli Balsamkrant uocant. Per me tamen licebit has species, quandoquidem facultatibus similes sint, ut cuius placuerit nominare. Nobis autem ut certius discernerentur prædictis nominibus appellare placuit. Syluestris, quæ Latinis Mentastrum uocatur, & uulgo equina Menta, germanicè Rosmûntz / wilder Balsam / oder wild mûntz dicitur. Non ignoramus plures esse Mentæ species, nos tamen eas duntaxat quas uidimus, pictas exhibemus.

Satiuæ genera:

## FORMA.

Satiuæ prima caulem habet quadrangulum, à radice lentè punicantem, & lanugine pubescentem, folium ferè rotundum, serratum, molle & odoratum, flosculos purpureos internodia geniculatim coronantes, uerticillato semper ambitu. Altera priori per omnia similis est, nisi quod illi subpurpureus flos circa cauliculorum fastigia spicatur. Tertia folio longiore & acutiore constat, flosculis purpureis coliculorum cacuminib. spicatim insidentibus. Quarta itidem longioribus folijs est, floribusq; purpureis internodia geniculatim, haud secus quàm in prima, caules coronantibus. Mentastrum uerò folijs lanugine canescentibus, atque hirsutioribus, Sisymbrio procerius, odore magis uiroso, flosculis spicatim coliculorum fastigia coronantibus.

Prima.

Secunda.

## LOCVS.

Satiuæ passim in hortis proueniunt. Amant apricum locum, nō pinguem, non stercoreatum, humidis facilius adulescunt. Syluestris autem, quæ Mentastrum alio nomine appellat̃, uliginosis gaudet locis, passimq; irrigua hoc Mentastro pubent.

## TEMPVS.

Florent omnes mense Augusto.

## TEMPERAMENTVM.

Vtracq; tam hortensis scilicet quàm syluestris, gustu acris, & facultate calida est, ex tertio ordine excalefacientium. Infirmior tamen est hortensis, minusq; calefacit. Exicat autem in secundo ordine: illi enim ex cultura aliquid humiditatis accedit.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Calefaciendi, adstringendi atque exiccandi uim habet Menta hortensis. Proinde sanguinem sistit succus eius cum aceto potus. Lumbricos rotundos enecat. Venerè concitat. Singultus, uomitiones, choleramq; sedant duo aut terni surculi cum acidi granati succo poti. Cum polenta illita abscessus discutit. Imposita fronti, capitis dolores mitigat. Mammæ quæ tendunt, aut lacte turgent, compescit. Cum sale canum morsibus illinitur. Aurium doloribus eius succus cum aqua mulsa subuenit. Mulieribus ante coitum admota, conceptioni resistit. Linguae scabritiem confricata leuigat. Lac coire densariq; in caseum non sinit, immersis in eo folijs. In summa, stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem usum habet, Syluestris in sanitate deterioris usus est quàm satiuæ.

EX GA-





MENTA

Krauß deymenc.





MENTA HORTENSIS  
SECVNDA.

Krauß balsam.

b






MENTA  
HORTENSIS TERTIA

Unser frauen müntz.





MENTA  
HORTENSIS QVARTA

Gertz fraut.





MENTASTRUM

Rosmüntz.



A

## EX GALENO.

Menta fatiua ad uenerem mediocriter excitat, id quod omnibus inest quæ humiditate semicocta & flatuosa participant. Deniq; in abscessibus aliqui eam cum polenta imponunt. Habet etiam quiddam amarum in se & acerbum: illo quidem lumbricos interficit, acerbitate uero si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis excretaiones reprimit. Substantia est, ut si qua alia herba, tenuium partium. Aëtius addit, potum eius decoctum tribus seriatim diebus, colicos omnino sanare.

## EX PLINIO.

Mentæ hortensis odor animū excitat, & sapor auiditatem in cibis: ideo in mammarum mixtura familiares ipsæ accessere, ut coire densariq; lac nō patiantur. Quare lactis portionibus additur, ne huius coagulati potu strangulentur. Data in aqua & mulso, eadem ui resistere & generationi creditur, cohibendo genitalia densari. Aequè maribus & fœminis sanguinem sistit, & purgationes fœminarum inhibet. Cum amylo ex aqua pota, coeliacorum impetus. Syriation & uomicas nuluæ curauit. Ille & iecinorum uitia ternis obolis ex mulso datis. Item sanguinem exereantibus in sorbitionem. Ulcera in capite infantū mirè sanat. Arterias humidas siccant, siccas adstringit, pituitas corruptas purgat in mulso & aqua. Voci succus sub certamine utilis duntaxat, qui & gargarisatur uua tumente, adiecta ruta & coriandro ex lacte. Vtilis & contra tonsillas cum alumine, linguæ asperæ cum melle. Ad cōuulsam intus per se, uitijsq; pulmonis. Singultus & uomitas sistit cum succo granati, ut Democritus monstrat. Recentis succus narium uitia spiritu subducto emendat. *\* Aliis spiritus subductos.* Ipsa trita choleras in aceto quidem pota. Sanguinis fluxiones intus. Ileum etiam imposita cum polenta, & si mammae tendantur. Illinitur & temporibus in capitis dolore. Sumitur & contra scolopendras, & scorpiones marinos, & ad serpentes.

B Epiphoris illinitur, & omnibus in capite eruptionibus, item sedis uitijis. Impetiginos quoq; uel si teneat tantum, prohibet. Auribus cum mulso instillatur. Aiunt & lieni mederi eam in horto gustatam, ita ne uellatur. Arida quoq; farinam tribus digitis apprehensam, & stomachi dolorem sedare in aqua, & similiter aspersa in potionem, uentris animalia pellere.

## APPENDIX

Animaduertendum, ea quæ Plinius Mentastro tribuit, Calaminthæ deberi, ut satis liquet Dioscoridem legenti. Neq; sanè mirum, quandoquidem autores societate quæ est inter Mentam, Mentastrum & Nepetam decepti, tum species, tum nomina confundunt.

## APPENDIX ALTERA.

Cæterum appendicis etiam uice hic annotandum erit, Aristotelem sectione xx. proble. secundo, cum asserit Mentam refrigerare posse corpora, non pugnare cum Galeno alijsq; medicis qui illam esse calidā affirmant. Per se nanq; calida est Mentastra: at quia esca libidinem proritat, & hæc cum immodica fuerit corporis uires deijcit, atq; adeò animum & corpus refrigerat, ideo eam ex accidente, quia uidelicet ut in uenerem immodice ruamus efficit, refrigerare dixit Aristoteles.

## EX SYMEONE SETHI.

Iuuat iecur frigidum, & uentrem corroborat ac stomachum, coctionem facit, uomitum sedat & singultum. Prodest etiam ad cordis morsus, & appetitionem suscitatur. Flatus discutit, & lumbricos interimit, potissimum syluestris Mentæ ius. Venerem stimulat, & iecinoris obstructions tollit. Verum hoc uesci ad satietatem non oportet, quoniam sanguinem extenuat, & serosum facit, & ipsum in flauam bilem mutat: dein efficit ut sanguis qui maxime est tenuium partiū discutiatur, & crassus ac melancholicus relinquatur, atq; idcirco oportet biliosos ab ea abstinere. Cōtrita cum sale, & morsui rabiosi canis imposita, medicamentum fit salubre. Arida uero





HERMIONITIS

Hirsungen.



A trita, & post cibum sumpta, ad cōcoctionem facit, & lienosos iuuat. Cum uino pota difficulter parienti succurrit. Ferunt etiam quod mansa lippienti imposita, fiat remedium: quodq̃ eius decoctum absorptum, confestim sanguinem ē faucib. eijciētes sanet. Huius semen uentrem purgat, & pulmonem lādit.

## DE HEMIONITIDE CAP. CXI.

## NOMINA.



MIΩNITIS, *ἡμιώνις* Grecis, Hemionitis Latinis, Plinio Teucrion, officinis & herbarijs Scolopendria & lingua ceruina, Germanis Hirszung *Scolopendria est officinarum.* nominatur. Alia tamen est à Dioscoridis Scolopendrio, quę Asplenon alio nomine dicitur.

## FORMA.

Folium Dracunculo simile profert, lunatum. Radices uero illi multę subsunt, *Scolopendria est Hemionitis.* tenues. Neq̃ caulem, neq̃ semen, neq̃ florē fert. Ex qua descriptione satis liquet, eam herbam quā uulgus Scolopendriā uocat, esse Hemionitin, quod tota illi Dioscoridis pictura, nulla reclamante nota, conueniat. Sunt enim illi folia Dracunculi seu Ari, instar lunę corniculantis falcata. Et si enim interdum in altū surgant, tamen inter initia potissimum incurua, & lunę crescentis modo falcata sunt. Radicibus etiam cohæret multis exilibus, nunquam florens, nec caulem, nec semen proferens. Non esse autem Phyllitim in primis folia docent, quę in ea sunt recta, & minime sicut in Lingua ceruina lunata. *Scolopendria nō est Phyllitis.* Dein in tergo ueluti uermiculi, qui in Phyllitide pensiles, in Lingua ceruina autem sessiles & nequaquā propendentes, sed liratim digesti sunt. Tertio natales ipsi: Phyllitis enim in umbrosis opacisue, & hortis nascitur, Scolopendria uero seu Hemionitis in petrosis. Quarto, quod me omniū maxime mouet, Phyllitidi nulla prorsus lienem liquandi facultas inest, quam tamen Scolopendrię uulgarī adesse præter cōmunem consensum, quotidiana etiam experimenta demonstrant. His itaq̃ de causis Phyllitis, Scolopendria uulgaris esse aut dici non debet. Dato enim quod descriptio per omnia conueniret, facultates tamen ipsę, quę diuersę sunt, aliam à Scolopendria esse manifeste docerent.

## LOCVS.

Nascitur locis umbrosis, montosis ac petrosis, copiosissime autē iuxta montem haud procul à Tubinga situm, quem Germanico uocabulo *Jarnberg* nominant, prouenire solet. Nunc passim in hortis habetur.

## TEMPVS.

Æstate usq̃ ad autumnum abunde nascitur.

## TEMPERAMENTVM.

Adstringens simul & parum amara est, unde credibile est in primo ordine esse calidam, & in secundo siccam.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Herba gustu adstringit. Hęc autem cum aceto pota lienem liquat.

## EX GALENO.

Hemionitis simul & adstrictionē & amaritudinem possidet: quamobrem cum aceto pota, lienosis auxilio est.

## EX PLINIO.

Medetur lienibus. Constatq̃ sic inuentum: cum exta super eam proiecta essent, fertur adhæsisse lienī, eumq̃ exinanisse. Ob id à quibusdam Splenion uocat. *Splenion unde dictum.* Narrant sues qui radicem eius edunt, sine splene inueniri.






ERYNGIVM.

Sansevier.



## NOMINA.



**I**RYNGION Græcis, Eryngiū Latinis, officinis corrupto uocabulo Irin- *Iringus.*  
gus uocatur. Pleriq; etiā Centumcapita nominant, à numero nimirum *Centumcapita.*  
capitum quæ in summo obtinet. Plinij tamen Centumcapita, ab Eryn-  
gio est diuersa, ut etiā Serapionis. Si quis enim diligenter eius descriptio- *Serapionis Cen-*  
nem excutiat, eam planè esse deprehendet, quæ Dioscoridi Alter Atticus & Ingui- *tumcapita est*  
nalis appellatur. Vtriusq; enim picturæ sic sibi respondent, ut planè una esse herba *Aster.*  
uideat. Germanis Eryngiū nominatur *Wansstrew / Brachendistel / & Xaddistel.*

## FORMA.

In genere aculeatarum stirpium est Eryngium, cuius folia initio sale condita ole-  
rum modo comeduntur. Sunt aut lata, & in ambitu aspera, gustu odorata. Quum  
uero adolescunt, in multis caulium eminentijs spinis aculeant: in quorum summi-  
tatibus globosa capita, durarū acutissimarumq; spinarum ambitu stellæ instar cir-  
cumuallantur, quorum color modo uiridis aut candidus, interdum cæruleus inue-  
nitur. Radix illi oblonga, lata, foris nigra, intus alba, pollicis crassitudine, & odora-  
ta. E qua nimirum deliniatione omnibus perspicuū sit, spinam cuius picturā nunc  
exhibemus, esse Eryngium: aculeatis enim folijs & per extrema spinosis conspici-  
tur, odoratis, caule cubitali, in cuius uertice coacta in globum capitula, durorum  
& acutissimorum spiculorum uallo, stellæ instar radiantur, quorum color in puber-  
tate uiridis, adultæ cæruleus, flaccescenti candidus conspicitur: radice pollicari, in-  
tus candida, foris nigra, sed odorata.

## LOCVS.

Nascitur in campestribus & asperis locis. Prope Argentoratum eius magna est  
copia.

## TEMPVS.

Colligi hanc quidam, ut Plinius tradit, cum sol Cancris hospitium tenet, hoc est,  
sub solstitio, iussere.

## TEMPERAMENTVM.

Eryngium caliditate aut parum aut nihil ea quæ moderata & temperata sunt su-  
perat. Siccitatem uero in tenui essentia consistentem non exiguam obtinet.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habet calefactoriam radix. Pota menses & urinas pellit. Tormina & infla-  
tiones discutit. Cum uino iecinorosis, uenenatorum moribus, & ijs qui letiferum  
hauserunt succurrit. Bibitur aduersus plurima cum Staphylini semine pondere  
drachmæ unius. Appensa & illita tubercula discutere proditur. Radix cum hydro-  
melite pota, opisthotonicis & comitialibus medetur.

## EX AETIO.

Potum radice decoctum colicis medetur. Mulso addito calculos, stillicidia, diffi-  
cultates urinæ, & renum uitia sanat: quod per quindecim iugiter dies, & ieiunos,  
& in lectum ituros bibere oportet. Quod si cum eo Sium quoq; decoxeris, magis  
proficies. Affirmabat quidam assiduo Eryngij usu, nunq; postea minxisse calculos,  
cum prius eo morbo frequentissime uexaretur.


## EX PLINIO.

Clara in primis aculeatarum Eryngion est, contra serpentes & uenenata omnia  
nascens. Aduersus ictus morsusq; radix eius bibitur drachmæ pondere in uino: aut  
si plerunq; tales iniurias comitatur febris, ex aqua. Illinitur plagis, peculiariter effi-  
cax contra cherfydros acranas. Omnibus uero contra toxica & aconita efficacio-  
rem Heraclides medicus, in iure anseris decoctam, arbitratur. Apollodorus ad-  
uersus toxica cum rana decoquit, cæteri in aqua.



C

## NOMINA.

Lactuca unde  
dicta.

PIAAE Græcè, Lactuca Latine officinæ latinum nomē retinuerunt: Germanicè Lattich/oder Lactuct nominat. Dicta autem Lactuca est, quod copia lactis, quod credebatur leniter mouere uentrem, exuberet: unde apud ueteres in primis epulis ueniebat, quod Martialis etiam ijs testatur uerbis:

Prima tibi dabitur uentri Lactuca mouendo Vtilis.

## GENERA.

Lactuca primum in satiuam & syluestrem deducitur. Satiuæ tria sunt genera, crispa nimirum, rotunda, & capitata. Nos una icone duo complexi sumus genera. *Crispa Lactuca.* Folium enim quod statim à radice erumpit, eam Lactucam refert quæ Latinis crispa, à folijs crispissimis, Germanis Krauser Lattich/appellatur. Columella lib. xi. cap. iij. Cecilianam & Beticam à regionibus in quibus crescit, nominat. Reliqua folia eam quæ Rotunda à folijs rotundis uocatur, præ se ferunt. Germanicè breiter *Capitata.* Lattich nominatur. Tertij generis Lactuca, quæ Capitata dicitur, à folijs suis, quæ ubi parum à terra attolluntur, mæli cuiusdam speciem rotundam obtinent, & instar Brassicæ capitatae, in capitis ferè formam extuberant. Germanis grosser Lattich/ uel weisser Lattich à semine candido nominat. Syluestris Lactuca satiuę opponitur, sponte enim sua in aruis nascitur. Germanis wilder Lattich nuncupatur.

## FORMA.

Satiua prima, cuius imaginem hic damus, folia Intybo satiuo haud dissimilia habet, in rectumq; surgit, caulibus in summo brachiatum, in quorum cacumine flores sunt lutei. Altera folijs, quæ crispa admodum sunt, duntaxat à priori uariat, aliàs per omnia similis. Sic etiam capitata non nisi folijs suis, idq; dum paululum creuerunt, à priorib. differt. Ideoq; duab. picturis, quæ omnes referunt, contenti fuimus. *Lactuca syluestris.* Syluestris similis est satiuæ Lactucæ, radice tamen breuior, proceriore caule, candidioribus folijs, gracilioribusq; asperioribus, & gustu amaris, quæ, ut addidit Theophrastus, ubi cōsummata sunt aculeantur. Ex qua deliniatione abunde constat, Lactucam syluestrem esse eam herbam, quæ passim nunc ab officinis & herbarijs, nō sine magno errore, Endiuia dicitur. Ea enim in aruis & uinearum limitibus sponte nascitur, folio Lactucæ, & cum adoleuit per oras aculeato, & laciniatim serrato, caulib. bicubitali proceritate consurgentibus, spinulis inhorrescentibus, quibus succus inest lacteus, amarusq; flore ut Lactuca satiuua luteo. Desinant itaq; deinceps ea herba pro Endiuia uti medici, si modo recte consultum ægris cupiunt.

## LOCVS.

Satiua in hortis prouenit. Syluestris in aruis & uinearum hortorumq; macerijs sua sponte nascitur.

## TEMPVS.

Florent Iulio mense, atq; subinde semen proferunt.

## TEMPERAMENTVM.

Lactuca satiuua humidum est frigidumq; olus, non tamen extremè: siquidē edendo non foret: uerum maxime secundum aquæ, ut sic dicam, fontanæ frigiditatem. Symeon Sethi frigidam & humidam in tertio ordine statuit. Syluestris autem minus refrigerat & humectat.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Satiua Lactuca stomacho accommodata est, refrigerat, somnū conciliat, aluum mollit, lactis abundantiam facit. Elixia magis alit. Illota autem comesta stomachicis prodest. Semen eius potum uenerem assidue somniantibus opitulatur, & concubitum arcet. Ipsæ tamen frequentiores in cibo, claritati oculorum officiant. Condiuntur muria. Quum in caulem prodierunt, uim quandam nanciscuntur succo  
aut





LACTUCA SATIVA CRI-  
SPA ET ROTUNDA

Krauser vnd breiter lattich





LACTUCA  
CAPITATA.

Grosser lattich.





LACTUCA  
SYLVESTRIS

Wild lattich.

c



c aut lacti sylvestris Lactuce similem. Sylvestris uirib. in totum Papaueri similis est, unde aliqui eius succum Meconio permiscuerunt. Aquosa per aluum purgat potus in posca liquor obolorum duorum pondere. Exterit argema & caliginē. Cum lacte muliebri inuncta ad ambusta prodest. In uniuersum soporifera est, & dolorem leuat. Menfes trahit. Contra scorpionum ictus, & phalangiorum morsus bibitur. Semen haud secus quam satiuę libidinum imaginationes in somno, ac uenere arcet. Succus ad eadem ualet, sed uiribus infirmior. Reponitur succus eius in fictili uase, antea, ut in alijs liquaminibus moris est, insolatus.

## EX GALENO.

Lactuca ad calidas phlegmonas accommodata est, & ad parua & leuia erysipelata, maioribus tamen satisfacere minime idonea est. Est etiam edulium sitim arcens. Semen potum geniturę profluuium cohibet: quamobrem etiam ijs qui libidinosis somnijs uexantur, datur. Sic & sylvestris Lactucę semen. Cuius quoque succus colligitur, argema & caliginem expurgans. Ad adustiones cum lacte mulierum inungitur. Omnibus alijs oleribus paucissimum sanguinem & uitiosum generantibus, ex sola Lactuca non multus quidem, nec uitiosus, haud tamen omni ex parte laudabilis gignitur. Vt plurimum cruda ipsa uescuntur. Æstate autem cum in semen iam proruptura est, in aqua dulci præcoquentes, cū oleo, garo & aceto assumunt, aut cum aliquo ex condimentis, obsonijsue, præsertim ijs quę caeco constant. Plerique etiam antequam excaulescat, in aqua elixa utunt: uti ego iam facio, ex quo dentes mihi deteriores esse cœperunt. Nam amicus quidam meus, quum olere hoc à longo tempore me ut familiari cibo usum fuisse sciret, uideretque post mandia me citra magnam molestiam non posse, cocturę rationem indicauit. In iuuentute enim, quoniam assiduo os uentriculi bile efferuescebat, æstus moderandi gratia Lactucis utebar. Quum autem ad prouectā ætatem peruenissem, olus hoc contra quam in iuuentute, somnum iam studio & industria accersenti mihi, auxilio fuit: quippe qui etiamnum iuuenis uigilijs dedita opera me assuefeceram, declinante iam ætate, ipsa ex se insomni, grauius hoc incommodo molestabar. Aduersus quod unicuique mihi præsentissimum remedium Lactuca uespere cōmanducata semper fuit. Frigidum ergo humidumque succum profert, haudquaquam tamen uitiosum. Itaque sicut alia olera à iusta concoctione non excidit, neque aluum cohibet, uti neque impellit. Atque hæc illi non immerito accidunt, quum nec austera, nec acerba sit, quibus facultatibus in uniuersum aluus sistitur, quemadmodum à salis, acris, & omnino abstergendi uim habentibus ad excretionem concitat, quorum nihil Lactucę inest.

## EX PLINIO.

Est quidem natura omnibus refrigeratrix, & ideo æstate gratæ à stomacho fastidium auferunt, cibi que appetentiam faciunt. Diuus certe Augustus Lactuca conseruatus in ægritudine fertur, prudentia Musæ medici, cum priores eam ob religionē minimè commanducarent, in tantum recepta commendatione, ut seruari etiam in alienos menses eas oxymelite repertum sit. Venerem inhihent, æstum refrigerant, somnumque faciunt. Cruditatem ipsæ nequaquam faciunt, nec ulla res maiorem in cibis auiditatem incitat inhihentque. Ambustis profunt recentibus, priusquam pustulæ fiant, cum sale illitæ. Ulcera etiam quę serpunt, coercēt initio cum aphronitro, mox in uino tritæ. Igni sacro illinuntur. Conuulsa & luxata caulib. tritis cum polenta ex aqua frigida leniunt. Eruptiones papularum ex uino & polenta. In cholera quoque coctas patellis dederunt, ad quod utilissimæ quammaximi caulis & amaræ. Quidam lacte infundunt. Deferuefacti iij caules & stomacho utilissimi traduntur, sicut somno, & satiuæ maxime Lactuca, & amara lactensque, quam Miconidem uocauimus. Hoc lac & oculorum claritati cum muliebri lacte utilissimum esse præcipitur, dum tempestiuè capiti inunguntur. Semen satiuarū contra scorpiones dari, Se-



ari. Semine trito ex uino potu & libidinum imaginationes in somno compesci. Tentantes aquas non nocere Lactucam edentibus. Quidam tamen frequentiores in cibo officere claritati oculorum tradiderunt.

## DE THYMBRA

## CAP. CXIII

## NOMINA.



YMBRA Græcis, Thymbra, Cunilaq; Latinis, Kunel Germanis appellat.

## GENERA.

Thymbræ seu Cunilæ duæ sunt species. Vna hortensis seu satiua, *Hortensis.* quæ quia minori est acrimonia, in cōdimentario genere edulij cōcoquitur: hinc à saturando Satureia dici cœpit. Alij tamen à Satyris nomē traxisse putāt, *Satureia unde dicta.* quod scilicet marcescentes coitus stimulet. Germanicè Saturon/Hüner siil/ Jose plen/ Swibel oder Gartenhyssop/ oder Sergentrauc nominatur. Altera agrestis *Sylvestris.* siue rustica Cunila est, quæ peculiariter Thymbra nuncupatur.

## FORMA.

Thymbra similis est Thymo, sed minor atq; tenerior, ferens spicam floribus plenam, coloris uiridis. Satureia pedali altitudine surgit, fruticosa, surculosis utrinq; *Satureia.* cauliculis, folio Hyssopi, flosculis per interualla ex purpura candicantibus, odore saporeq; gratissimo.

## LOCVS.

Thymbra in tenui solo, & asperis locis nascitur. Satureia in hortis seritur passim.

## TEMPVS.

Æstate utraq; Cunila floret.

## TEMPERAMENTVM.

**B** Thymbra calida & sicca in tertio ordine.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Thymbra eadem quæ Thymus præstat si consimiliter sumatur. Vtilis etiam in sanitate eius usus. Est etiam satiua Thymbra, in cunctis syluestri minor: ad cibum uero utilior, propterea quod non adeo efficax illi sit acrimonia.

## EX PAULO.

Thymbra sylvestris eadem quæ Thymus præstat. Hortensis autem omnibus quidem imbecillior, sed ad cibum laudatior.

## EX PLINIO.

Nusquam utrunq; Thymbræ genus additur, quippe similis effectus.

## EX HERBARIO ANTIQVO.

Farina eius ex uino pota, medetur pulmonis, thoracis, & uesicæ uitijs. Ciet urinas, menses pellit. Herba ipsa cum floribus Lethargicos excitat calfactu, aut corone modo capiti imposita. Succus cum rosaceo auribus infunditur. Cum triticea farina coxendicibus illinitur. Satureiæ usus marcescentes coitus stimulat, quare à Satyris traxisse nomen putant. Stomachi concoctiones adiuuat, fastidia discutit, hebetes oculos exacuit.







## NOMINA.



ΛΑΣΠΙ, ἡ θλασπίδιον, ἡ σίνικπι ἄγριον Græcis dicitur: Thlaspi, Capsella, & Scandulaceum Latinis. Sunt huius temporis herbarij qui Nasturtium tectorum, & Sinapi rusticum, quod digitis friatum sinapim suboleat, appellent. Alij Bursam pastoris uocant, non sanè quod sit reuera eius herbae species, sed quod ad formam illius quamproximè accedat. Sic antiquo herbario Bursam pastoris appellare Thlaspin placuit. Thlaspi autem Græcis à fructus forma dictum est, qui Nasturtio similis est, sed latior, & uelut infractus & contusus. θλασπίδιον enim iisdem contundi est & infringi, infringendoque quod globosum tumidumue erat malleo, lapide, pedèue cum dilatazione exequare.

Nasturtium tectorum.

Sinapi rusticum. Bursa pastoris.

Thlaspi unde dictum.

## GENERA.

Duo Thlaspis genera damus. Vnum latioribus folijs, quod ad Dioscoridis descriptione proximè accedit. Hoc germanicè Baurnsensf/ oder Kress nominatur. Alterum folijs angustioribus constat, & germanicè Besemtraut/ quod scoparum uices suppleat uocatur. Quare si quispiam hæc duo genera ab inuicem distinguere certis appellationibus uoluerit, primum Thlaspi maius aut latifolium, alterum uero minus aut angustifolium appellet. Dioscorides etiam duo Thlaspios genera facit, unum latifolium, alterum angustifolium.

## FORMA.

Herbula est angustis folijs ad digiti longitudinem, in terram uersis, in extremitatibus incisis, subpinguibus. Caulem tenuem, duorum dromedantum emittit, adnascens sibi paucos ramulos habentē, & per totum eius ambitū fructus est in summo modicè latus, in quo semen exiguum Nasturtio simile, disci figura, uelut conquassatum, unde & nomen inuenit. Florem obinet album, semenque acre. Ex ea sanè descriptione satis constat, herbam hanc quam pictam damus esse Thlaspin, angusta enim folia habet, potissimū suprema eius parte, digitali longitudine, in terram se conuertentia, per extrema leniter incisa, caulem duūm dodrantum, agnatis in eo paucis calycibus, breui pediculo nitentibus, quadam ligularum uel cochleariorum effigie, in quibus semen continetur Nasturtio simile, sed latius & uelut conquassatum, quod acerrimi esse gustus deprehenditur, ita ut mansum Sinapis modo os & linguam uellicet.

## LOCVS.

In fossis, semitis, & sepibus prouenit.

## TEMPVS.

Maior & Iunior mensibus floribus & semine prægnans inuenitur.

## TEMPERAMENTVM.

Semen calfacit & exiccat in quarto ordine.

## VIRES EX DIOSCORIDE.

Calefacit, bilem per superna & inferna purgat acetabuli mensura potum. Ischiadicis in clystere infunditur. Potum sanguinem ducit, & interiores abscessus rumpit, menses cit, & foetus necat.

## EX PAVLO.

Semen Thlaspi facultatē habet acrem, adeo ut internos abscessus potum disrumpat. Menses cit, & foetus enecat. Per sedem infusum sanguinolenta euacuans ischiadibus prodest. Potest enim alioqui tum superne, tum inferne biliosos uacuare humores acetabuli mensura epotum. Infunditur & contra coxendicū dolores. Quintiam potum sanguinem trahit, & internos abscessus rumpit.





THLASPI  
LATIFOLIUM.

Baurnsenff.





THLASPI  
ANGUSTIFOLIUM

Beseckkraut.



C

EX GALENO.

Thlaspi semen facultate acre est, adeò ut internos abscessus potù rumpat. Menses mouet, & foetus necat. Per sedem infusum sanguinolenta euacuans ischiadibus prodest. Est enim alioqui tum inferne, tum superne biliosorum humorum euacuatorium, acetabuli mensura potum.

EX PLINIO.

Semen asperi gustus, bilem & pituitam utrinq; extrahit. Modus sumendi acetabuli mensura. Prodest & ischiadicis infusum, donec sanguinem extrahat. Menses quoq; cit, sed partus necat.

## DE THERMIS CAP. CXV.

NOMINA.



ΕΡΜΟΣ *ἑρμπος* Græcis, Lupinus satiuus Latinis: officinae latinum nomen retinuerunt: Germanis *ſeigbon* appellatur.

FORMA.

Vnicum caulem obtinet Lupinus, folium quinquefarium aut septifarum dissectum, florem candidum, siliquas in quibus quina senaue intus grana, dura, lata, rufa q; continentur. Radicem luteam capillamentis fibratam.

LOCVS.

Exilem amat terram, arenosam & rubricam præcipue. Limoso agro non exit, culturamq; reformidat.

TEMPVS.

Ter floret, primum Maio, deinde Iunio, & tertio Iulio mense. Post unumquemque florem siliquas producit.

TEMPERAMENTVM.

Immensa amaritudo euidenter calidum & siccum esse monstrat.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Farina eius cum melle linctâ lumbricos pellit. Ipsi quoq; macerati, & amari adhuc comesti idem efficiunt. Decoctum eorundem cum Ruta & Pipere potù idem facit: unde & lienosis prodest. Eodem gangranas, ulcera tetra, incipientē scabiem, alphos, maculas, exanthemata, & achoras perfundere utile. Menses & foetus idem decoctum cum myrrha & melle subditum trahit. Farina eorum cutem liuoremq; expurgat. Inflammationes cum polenta & aqua mitigat. Ischiades & tubercula cum aceto lenit. In aceto cocta & illita strumas dissipat, & carbunculos rumpit. Decocti pluuiâ aqua donec in succū liquefiant faciem abstergunt. Cum radice nigri Chamaeleonis ouium scabiei medentur, si tepido decocto abluantur. Radix cum aqua cocta & pota cit urinam. Vbi autem edulcati fuerint, triti cum aceto & poti stomachi fastidium leniunt, & cibi auiditatem excitant.

EX GALENO.

Lupinus editur coctus, multis antè diebus maceratione in aqua amaritudinem deponens, fitq; tunc nutrimentum crassi succi. Carterum ut medicamen ita præparatus ex genere est emplasticorum. Qui uero natiuam amaritudinem habet, uic extergendi & digerendi uis inest. Lumbricos occidit illitus, & cum melle linctus, aut cum posca potus. Quin & decoctum eius lumbricos ejicere potest. Foris identidem perfusum, alphos, achoras, exanthemata, scabies, gangranas, ulceraq; maligna iuuat, partim extergendo, partim digerendo, citraq; mordacitatem siccando. Expurgat iecur & lienem cum Ruta & Pipere suauitatis gratia assumptum. Elicit menses ac foetum cum myrrha & melle adpositum. Porro Lupinorum etiam farina sine mordacitate digerit: nec enim liuida tantum, sed & strumas & tubercula curat: atqui tunc in aceto, aut oxymelite, aut posca hanc decoquere oportet, pro



LUPINVS

Feigbon.





**C** pro laborantis nimirum temperamento, & affectus diuersitate, quod ex usu est inueniendo. Digerit item quæ liuida sunt, & quæcunq; modo dictum est præstare decoctum, eadem omnia efficit & farina. Sunt uero etiam qui Ischiadicis cataplasmatibus modo illinunt.

## EX PLINIO.

Ex omnibus quæ eduntur sicco nulli minus ponderis est, nec plus utilitatis. Mitescunt cinere aut aqua calidis. Colorem hominis frequentiores in cibo exhilarant. Amari cōtra aspidas ualent. Ulcera atra, aridi decorticatiq; triti, supposito linteolo, ad uiuum corpus redigunt. Strumas, parotidas in aceto cocti discutunt. Succus decoctorum cum ruta & pipere, uel in febris datur ad uentris animalia pellenda, minoribus triginta annorum. Pueris uero impositi in uentrem ieiunis profunt. Et alio genere tosti, & in defruto poti, uel ex melle sumpti. Iidem auiditatem cibi faciunt, fastidium detrahunt. Farina eorum aceto subacta, papulas pruritusq; in balneis illita cohibet, & per se siccatur ulcera. Liuores emendat. Inflammationes cum polenta sedat. Si ad mellis crassitudinem decoquant, uirilignes nigras & lepras emendant. Rumpunt carbunculos impositi, panos & strumas minuunt, aut maturant. Cocti ex aceto cicatricibus candidum colorem reddunt. Si uero cœlesti aqua decoquantur, succus ille smegma fit, quo solent fouere gangrænas, eruptiones pituitæ, ulcera manantia, utilissimum. Expedit ad lienem bibere, & cum melle menstruis hærentibus. Lienem crudi cum fico sicca triti ex aceto imponuntur. Radix quoq; in aqua decocta, urinas pellit. Medentur pecori cum Chamæleonte herba decocta, aqua in potum collata. Sanant & scabiem quadrupedum omnium in amurca decocta, utroq; liquore postea mixto. Fumus crematorum culices necat.

D

DE IO

CAP. CXVI

## NOMINA.



Ion quare dicta.

viola unde  
uocata.

**I**ON *περσικου* Græcis, Viola muraria uel purpurea Latinis, blaw Veiel oder Mergen violen Germanis dicitur. Officinæ simpliciter Violam nominant. Nicander Ion Græcis dictam credit, quod Nymphæ quædam Ionæ, florē illum Ioui primum dedere muneris. Alij Græci Ion uocatum putant, quod cum Io in uaccam à Ioue conuersa esset, terra florem illum pabulo bouis eius fuderit. Latini quoq; detrita t littera, Violam quasi uitulam imitatione græca uideri possunt appellasse.

## FORMA.

Folium habet minus tenuiusq; quàm Hedera, nigrius tamen nec dissimile. Cauliculus statim à radice medius prosilit, in quo flosculus suauiter olens, purpureus. Humilis præterea est, statimq; à numerosa radice orbiculata folia sine ramis exeunt. Semen quoq; minutum in folliculis uasculisue rotundis, ut pictura indicat, extrema ferè æstate producit.

## LOCVS.

Nascitur in opacis & asperis locis, ad radices maxime murorum, hortorum marginibus, & sepibus.

## TEMPVS.

Viret hæc perpetuò, Theophrasto teste, si cultus adhibeat: tamen uere, & Martio mense floret, quo potissimum tempore colligi flores eiusdem debent. Semina uero in æstate, ut dictum est.

## TEMPERAMENTVM.

Violæ folia aqueam & subfrigidam substantiam superantem possident. Frigide autem sunt primo ordine, humidæ uero secundo.

## VIREs.





VIOLA  
PURPUREA

Hertzen veiel.



C

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Refrigerandi uim obtinet. Folia eius per se & cū polenta illita, stomacho æstuantibus, oculorum inflammationibus, sedisq̃ procidentibus auxiliantur. Præterea id quod in flore purpureum est cum aqua potum, angina correptis, & puerorum comitialibus mederi affirmant.

## EX GALENO.

Folia per se, aut cum polenta illita, calidas phlegmonas mitigant. Imponunt & ori uentriculi æstuantibus, & oculis.

## EX PLINIO.

Purpureæ uiolæ refrigerant. Contra inflammationes illinuntur stomacho ardenti. Imponuntur & capiti in fronte. Oculorū priuatim epiphoris, & sede procidente, uuluæ. Et contra suppurationes. Crapulam & grauedines capitis impotitis coronis olfactuæ discutiunt. Anginas ex aqua potæ. Id quod purpureum est ex his comitialibus medetur, maxime pueris, in aqua potum. Semen scorpionibus aduersatur.

## EX SYMEONE SETHI.

Profunt ad intestinorum dolores, cor uero offendunt. Dolores capitis qui fiunt à flaua bile sopunt potæ & odoratæ. Ventriculū irritant, & flauā in eo inuentam bilem. Caput siccum humectant, calidumq̃ refrigerant suo odoratu. Somnum inducunt. Humida capita destillationibus obnoxia reddunt.

## DE VIOLA MATRONALI CAP. CXVII

## NOMINA.

D



Eteribus Græcis & Latinis cognitæ fuerint nec ne Violæ quæ hodie, quod eas matronæ colere soleant, matronales uocantur, nondum compertum habemus. Quare uulgari & usitato nomine, donec rectius inuentū fuerit, utemur. Germanicè, quod raræ adhuc in Germania dum ista scriberemus fuerint, welsch Veiel appellare uoluimus, ut nimirum hac nomenclatura à Leucois, de quibus suo dicemus loco, segregaremus. Possent etiam haud inepte *Græwenueiel* ad imitationem latini nominis appellari.

## GENERA.

Tria Violarum matronalium damus genera. Primi enim generis candida est, alterius punicea, tertij purpurea; nec differre admodum nisi solis floribus uidentur.

## FORMA.

Fruticosa est herba, cubitali altitudine, ramosa, caule & folijs lanuginosis, oblongis, angustis, mollibus ac canescentibus, floribus aut albis, aut puniceis, aut purpureis quadrifolijs, semine in oblongis siliquis lato ac tenui, radice longa, lignosa, sub-rufa & acris.

## LOCVS.

In litoris & cultis locis proueniunt.

## TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus florent.

## TEMPERAMENTVM.

Admodum calidas esse sapor foliorum & radices, qui acris est, abunde docet. Humiditatem autem multā, Galeno lib. 4. cap. 18. de simpli. medi. facul. teste, eo quod amaræ non sint, admistam habent.

## VIRES.

Incidendi & digerendi per halitum uim obtinent. Ideoq̃ radix aut folia decocta in aqua, cōuulsis, difficultate spirandi laborantibus, & ueteri tussi auxiliantur. Vrinam & menses ducunt, sudoresq̃ ciendi facultatem habent.

## DE IRIDE.





VIOLA  
MATRONALIS ALBA

Weißwelsch Veiel.





VIOLA MA-  
TRONALIS PVNICEA

Rotwelsch Veiel.





VIOLA MA-  
TRONALIS PURPUREA.

Braunwelsch Veiel.

d 2



C

## NOMINA.



Iris unde dicta.

Causa vulgaris  
στροπυς.

PIΣ Græcis, Iris Latinis appellatur: officinis suam appellationem retinuit. Germanis blaw Gilgen/ blaw Schwertel/ Veielwurß dicitur. A cœlestis arcus similitudine, quam flores eius repræsentant, ut paulò post dicemus, nomen accepit Iris. Sunt qui non sine pudendo errore aliam assignent herbam recto, aliam casui paterno, ita ut Iris ab Ireos, tanquã purpureus color à niueo, distingui putetur imperitis herbarijs. Pro manasse autẽ hunc errorem ex græca uoce λείων, qua Lilium, quod candidos profert flores, genti illi significatur, parum per unius literæ abiectionem deprauata, uerisimile est. Primam nanque literam abijcientes, ultimam uerò in σ uertentes, αειδ dixerunt pro λείων. Sed hæc opinio indigna est quæ explodatur, cum Dioscoridem & alios ueteres omnes seorsim de Iride & Lirio siue Lilio agere constet.

## FORMA.

Folia Gladiolo similia fert, maiora tamen, latiora & pinguiora. Flores in caule æqualibus inuicem spacijs distantes, inflexi, uarij. Aut enim candidi, aut uirides, aut lutei, aut purpurei, aut cœrulei conspiciuntur. Vnde ob hanc uarietatem arcui cœlesti assimilata est. Radices subsunt geniculatæ, solidæ, odoratæ: quæ simulatq; fuerint dissectæ, siccantur in umbra, & filo traiectæ recondunt. Hæc Dioscoridis pictura tota huic herbe, quam Irim hodie herbarij & officinæ uocant, suffragat. Siquidem ea radicibus nititur solidis, geniculatis & odoratis, adeò ut uiolarum purpurearum odorem prorsus referre uideatur, & hoc nomine à Germanis nostris Veielwurß: hoc est, Violacea radix, sit appellata. Folia Gladioli faciem simulant, maiora duntaxat, latiora & pinguiora. Caule recto sesquipedali, è cuius fastigijs pari intervacante spatio flores erumpunt, inflexis mutuo foliorum labris, qui nitent uaria colorum mistura, instar cœlestis arcus. Quemadmodum enim aquarius ille arcus, qui est imago malè expressi solis, caua nube recepta, uarios mentitur colores, sic ut cœruleas, uirides, luteas, purpureasq; lineas ducat, ita cauo calyculi sinu uersicolores lituras flores ostendunt, qua diuersa specie cœlestem æmulantur arcum. Falluntur itaque qui in toto floris ambitu huiusmodi uarietatem perquirunt, cum inflexa foliorum labra uel purpureus, uel cœruleus semper color inficiat.

## LOCVS.

Pasim in hortis & macerijs uinearum prouenit. Laudatissima tamen est quæ in Illyrio & Macedonia nascitur, & melior inter has quæ densa & breui radice constat, quæque frangenti contumax est, colore subruffa, admodum odorata, gustuq; feruida.

## TEMPVS.

Floret uere, Maio potissimum mense, quo sanè tempore flores colligi debent. Radices autem suo tempore, hoc est, autumnno.

## TEMPERAMENTVM.

Iris in altero calefacit ordine, in tertio aut desiccatur. Abstergit quoq; & maturat.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Irides omnes calefaciendi extenuandiq; uim obtinent. Contra tussim efficaces, humoresq; non facile excreabiles extenuant. Biles ex hydromelite drachmarum septem pondere potæ purgant. Somnum conciliant. Lachrymas cient. Torminibus medentur. Cum aceto potæ uenenatorum morsibus, lienosis, conuulsis, refrigeratis, rigentibus, & quibus genitura effluit, auxiliatur. Menses cum uino potæ ducunt. Decoctum earum ad muliebria fomenta utile, molliens aperiensq; locos. Ischiadicis infunditur. Fistulas & sinus carne explent. Quinetiã glandis modo cum melle appositæ, foetus extrahunt, Strumas ueteresq; durities coctæ & illitæ emolliunt.

Aridæ





317

IRIS  
GERMANICA.

Blau Gilgen.

d 3



**C** Aridae ulcera explent, & cum melle purgant. Nudata ossa carne operiunt. Doloribus capitis cum aceto & rosaceo utiliter illinuntur. Lentigines, cutis in facie uitia cum Elleboro albo, & duabus mellis partibus illitae emendant. Pelsis, malagmatis & acopis miscentur. In uniuersum magni usus sunt.

EX PAVLO.

Iris tussi utilis. Humores in thorace non facile excreabiles extenuat. Torminibus medetur, ulceraque sordida expurgat. Cum mulla pota aluum ducit.

EX PLINIO.

Infantibus eam circunligari salutare est. Dentientibus praecipua est & tussientibus, tinearumque uitio laborantibus. instillari. Caeterum ulcera purgat, capitis praecipue, suppurationes ueteres. Aluum soluit duabus drachmis cum melle. Tussim, tormina, inflationes, pota. Lienes ex aceto. Contra serpentium & araneorum morsus, ex posca ualet. Contra scorpiones, duarum drachmarum pondere in pane uel aqua sumitur. Contra canum morsus ex oleo imponitur. Et contra perfrictiones. Sic & neruorum doloribus. Lumbis uero & coxendicibus cum resina illinitur. Vis ei concalfactoria. Naribus subdita, sternutamenta mouet, caputque purgat. Dolori capitis cum Cotoneis malis aut Strutheis illinitur. Crapulas quoque & orthopneas discutit. Vomitiones cit, duobus obolis sumpta. Ossa fracta extrahit, imposita cum melle. Ad paronychias farina eius utuntur. Halitus oris comanducata abolet, alarumque uitia. Succo duritias omnes emollit. Somnum conciliat, sed genituras consumit. Sedis rimas & condylomata, omniaque in corpore excrecentia sanat.

## DE HIERACEO CAP. CXIX.

D

NOMINA.



Hieraceum unde dictum.

Sonchites.

Lactuca syluatica.

**H**IERAKION, ἱεράκιον Graecis, Hieraceum Latinis dicitur: officinis inusitatum. Germanice, quum aliud nomen expiscari non potueramus, Habichtkraut appellauimus, ad graecam alludentes appellationem: neque enim alia ratione Graeci hanc herbam Hieraceum nominarunt, nisi quod accipitres, quos illi ἱεράκιον dicunt, scalpendo eam, succoque oculos tingendo, obscuritatem cum sensere discutiant. Sonchites autem dicta est, quod Soncho non admodum dissimilis sit, maxime quod ad eius circumferentiam & extremam partem, in qua caules & flores sunt, attinet. Haec enim & illa concouo, & lacteum succum emittente caule, luteisque floribus est. Apuleius Lactucam syluaticam appellat. Plinius quoque libro uigesimo, cap. septimo, ut alij omnes fere, in Lactucarum sponte nascentium numero, propter similitudinem, Hieraceon hoc habet. Quam autem inuicem similes sint Hieraceum & Lactuca syluestris, utriusque icones & effigies collatae monstrabunt.

GENERA.

Hieracii duo sunt genera, maius nimirum & minus. Maius germanice gross Habichtkraut, minus autem klein Habichtkraut nominatur.

FORMA.

Hieraceum maius.

Hieraceum minus.

Hieraceum maius caulem habet asperum, modice rubentem, spinosum, concauum. Folia per interualla rariusculè diuisa, Soncho per circumferentiam similia. Flores in oblongis capitulis luteos. Quae designatio prorsus hanc quam pictam damus herbam exprimit. Siquidem caulem emittit scabrum, subrubrum, spinulis horrentem, cauum, folia ex interuallis & raro laciniata, Sonchi folijs non dissimilia. Flores in longiusculis capitulis luteos. Minus Hieraceum folia ex interuallis per





HIERACEVM  
MAIVS.

Groß Habichtkraut.





HIERACEVM  
MINVS.

Klein Habichtkraut.



Alis per ambitum diuisuris scissa obtinet. Caules de se emittit cauos, teneros & uirides, in quibus flores lutei circulum circumscribentes. Quae itidem notae omnes herbae illi, cuius picturam exhibemus, conueniunt.

## LOCVS.

Utrunq; in quibusdam pratis prouenit.

## TEMPVS.

In fine Iulij mensis, & per uniuersum Augustum floret Hieraceum. Succus eius carpitur per menses inciso caule.

## TEMPERAMENTVM.

Maius Hieraceum plane Sonchi temperamento constare uidetur, refrigerat itaque & mediocris adstrictionis est particeps. Minus in gustu paulo maiorem amaritudinem refert.

## VIREs. EX DIOSCORIDE.

Vim habet Hieraceum maius refrigerandi, & modice adstringendi, ideoq; aestuanti stomacho, & inflammationib. illitum prodest. Succus erosionem eiusdem in sorbitione mitigat. Herba ipsa cum radice illita scorpionum ictibus auxiliatur. Minus facultates habet superiori easdem.

## EX PLINIO.

Succus sanat omnia oculorum uitia cum lacte mulierum. Arcet nubeculas, cicatrices, adustionesq; omnes, praecipue caligines. Imponitur etiam oculis in lana contra epiphoras. Idem succus aluum purgat, in posca potus ad duos obolos. Serpentiū ictibus medetur in uino potus. Et folia tosta, thyrsiq; triti ex aceto bibuntur. Vulneri illinuntur, maxime contra scorpionum ictus. Verum contra phalangia, B commixto uino ex aceto.

## APPENDIX.

Sunt qui tantam inesse huic herbae uim contra oculorum uitia credant, ut radicem etiam a collo suspensam caliginem oculorum sanare posse dicant.

## DE HIPPVRI. CAP. CXX.

## NOMINA.

**H**IPPURI Græcis, Equisetum, herba aut salix equinalis Latinis, recentioribus herbarijs uerbum uerbo reddentibus Cauda equina, Germanis Rosßchwanz / Pferdeschwanz / Rosßwadel / Rassenwedel / Rassenzagel / Rantenkraut / Schaffthorn nominatur. Nomen tam Græcum quam Latinum a caudæ equinae imagine, quam comæ illius præ se ferunt, accepit. Equisetum.  
Cauda equina.  
Hippuris comæ  
dicta.

## GENERA.

Eius duo sunt genera. Vnum longius, quod nonnulli ætatis nostræ herbarij ab asperitate quam obtinet Asprellam uocant. Hinc est quod materiarij fabri ligneæ pectinum & aliorum minorum operum ruditatem huius herbae scabritia in nitorem expoliant. Germanice groß Rosßschwanz dicitur. Alterum breuius est, ad abstergenda uasa aptum. Germani Klein Rosßschwanz appellant. Asprella.

## FORMA.

Primum Equiseti genus cauliculos habet inanes, leniter rubentes, subasperos, solidos, geniculis qui inuicem inferuntur dissectos, in quibus folia iuncea, crebra, & tenuia. In altitudinem adsurgit, scandendo proximas stipites comis circumfusa dependet multis, nigris ut equorum cauda. Radix illi est lignosa, dura. Alterum comas per interualla habet breuiiores, candidiores & molliores.

## LOCVS.





EQVISETVM  
LONGIVS.

Groß Kopfjagel.





EQUISETUM  
MINUS.

Klein Rosschwamm



C

## LOCVS.

Longius Equisetū in aquosis locis & scrobibus prouenit, nec eo in fossis prope  
*χαράδρων.* *ἐν υδροσφ.* aquas & umbrosis locis alia planta frequentior est, ut hoc nomine *χαράδρων* Græ-  
 cis dictum sit. Neq̃ enim *χαράδρων* aliud est illis nisi terrę rima & fissura. *ἐν υδροσφ.* etiam  
 non alia ratione, quàm quod in aquosis produceretur, nominauerunt. Alterum in  
 pratis inuenitur, nec fere frequentius occurrit, inuisa scenifecis.

## TEMPVS.

Vtrunq̃ æstate suis in locis copiose prouenit.

## TEMPERAMENTVM.

Adstringentem cum amaritudine facultatem, ac proinde ualenter simulq̃ citra  
 mordicationem exiccantem, obtinet.

## VIREs.

## EX DIOSCORIDE.

Herba ipsa adstringit, quapropter succus eius sanguinem ex naribus erumpen-  
 tem sistit. Dysentericis cum uino potus confert. Vrinam cit. Folia cruenta uulne-  
 ra glutinant trita & inspersa. Herba & radix tussientibus, orthopnoicis, ruptisq̃ suc-  
 currit. Quinetiam intestinorum diuisiones, uesicę dissectionem, & intestinorum  
 ramicem coalescere cogiq̃ folia in aqua pota feruntur.

## EX GALENO.

Vulnera maxima conglutinat, etiamsi præfectos esse neruos contingat: præte-  
 rea intestinorum ramices cogit. Cæterum ad sanguinis reiectionem, ad fluxū mu-  
 liebrem, potissimum rubrum, ad dysenterias, & ad alia uentris profluvia genero-  
 sum est medicamentum herba ipsa aut ex aqua, aut ex uino epota. Sunt qui de ea  
 scriptum reliquerunt, quod nonnunq̃ etiam uesicę, & tenuium intestinorum uul-  
 nera succus ipsius sanauerit. Prodest etiam profluuiio sanguinis ex naribus, tum  
 D fluxu obnoxijis in uentre affectibus ex austerorum quopiam uinorum potus, ac si  
 febre teneatur ex aqua.

## EX PLINIO.

Vis eius spissare corpora. Succus sanguinem ē naribus fluentem inclusus sistit,  
 item aluum. Medetur dysentericis in uino dulci potus cyathis tribus. Vrinam  
 cit. Tussim, orthopnoeam sanat: item rupta, & quę serpunt. Intestinis & uesicę fo-  
 lia bibuntur. Enterocelen cohibet.

## DE HIBERIDE CAP. CXXI.

## NOMINA.

*Nasturtium*  
*agreste.*

*Agriocardamon*  
*eius dicta.*



*ΒΕΡΙΣ, ἢ καρδαμαντικὴ, ἢ ἀγριοκάρδαμον* Græcis, Galeno & Paulo alio nomi-  
 ne Lepidion: Hiberis, Nasturtium agreste Latinis appellatur. Offici-  
 nis nostris incognita. Germanis *Gauchblum*/ non alia ratione quàm  
 quod plerosq̃ qui in illius notitiam nondum peruenerunt, infatuet.  
 Potest etiam cōmodè dici *wilder Kress*. Cardamantice, & Agriocardamū Græcis  
 appellata, quod radici odor insit Nasturtij: uel quod eius folia partim Nasturtio a-  
 quatico, quod à Dioscoride *Sisymbrium* cardamine dicitur, partim etiam hortensi,  
 quod Cardamon Græcis nominat, similia sint: uel quod gustu Nasturtiū referant.

## FORMA.

Folia Nasturtio similia habet, uerno tempore uirentia, cubitali longitudine, aut  
 minore, flore lacteo, radicibus duabus, sed una apud nos frequentius, nritur, odo-  
 re Nasturtij quamacerrimo. Ex qua nimirum descriptione omnibus perspicuum  
 fit, herbam cuius picturam exhibemus esse Hiberida: caulem enim cubitalem ob-  
 tinet, foliaq̃ Nasturtio similia. Quę enim à radice statim exeunt, aquatici, quę ue-  
 ro in supremo caule emicant hortensis Nasturtij folia referunt. Verno quoq̃ tem-  
 pore uirent, flos deniq̃ lacteus est, hoc est, in albo purpurascens: hunc enim Diosco-  
 ridem





NASTURTIVM  
AGRESTE.

Sauchblüm.



ridem uocare lacteum florem, satis testatur quarta Ranunculi species, cuius etiam florem, qui colore huic similis est, lacteum esse scribit. Semen quoque in siliquulis tam exiguum producit, ut, Plinio etiam teste, uix aspici possit: radicem autem exilem atque acrem, cui inest Nasturtij odor.

## LOCVS.

Nascitur incultis locis, circa itinera & prata.

## TEMPVS.

Verno tempore apparet, Aprili potissimum mense & Maio, duratq; ad æstatis initia, quo potissimum tempore lacteum florem fundit: initio enim purpureo colore maculatus uidetur: efficaciorēq; usum obtinet, quod tum semen etiam in siliquulis proferat.

## TEMPERAMENTVM.

Ex quarto est ordine calefacientium, ut Nasturtium, minus tamen eo desiccat.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Radix calefacit & adurit. Vtilis est ad coxendicis dolores cum suillo adipe salso, emplastri modo quaternis horis illita. Deinde in balneū descendatur, & oleo cum lana locus perungatur.

## EX GALENO.

Similis Nasturtio tum odore, tum gustu, tum uiribus.

## EX PLINIO.

Coxendicibus & articulis omnibus cum axungia modica utilissima, uiris plurimum quaternis horis, sceminis minus dimidio adalligata, ut dein in balneum descendatur in calidam, & postea oleo & uino corpus perungatur, diebusq; uicenis interpositis idem fiat, si qua admonitio doloris supersit. Hoc modo rheumatismos omnes sanat occultos. Imponitur in ipsa inflammatione, sed imminuta. Adalligata capiti cum Quinquefolio, epiphoras & si qua in oculis uitia sunt, emendat.

## APPENDIX.

Recentiores herbarij eius herbæ cuius picturam damus usum probant contra pediculos si lixiuio incoquatur. Vnde colligere licebit, eam exiccandi & ex alto euo candi trahendiq; facultatem, haud secus atq; Nasturtiū aut Sinapi, habere. Nam, Galeno lib. i. de composit. med. secundum locos, cap. vii. teste, medicamenta quæ phthiriali medentur necessariò exiccant atq; ex alto trahunt. Vt iterum euidentissimum sit hanc herbam, eo quod Nasturtij facultates obtineat, esse ueram Hiberida, non obstante quod rarò aut nunquā duabus, sed una potius & exili nitatur.

## DE HIPPOSELINO CAP. CXXII.

## NOMINA.

Officinarum  
error.

Hipposelinū in  
de dictum.

Olus atrū quare  
appellatum.



ΠΡΟΣΕΛΙΝΟΝ Græcis, Olus atrum Latinis dicitur: officinæ eius semine perperam pro Petroselino macedonico utuntur. Germanis groß Epffich/oder groß Eppich appellatur. Hipposelinon autem à magnitudine dictum est: siquidem Græci magnis & amplis rebus hippos præponere solent, adeò ut Hipposelinū Latinis nihil aliud nisi grande Apiū sit. Olus autem atrum uel pullum à folijs, quæ atro colore nitent, appellatum esse uidetur.

## FORMA.

Maius est hortensi Apio, caule cauo, alto, tenero, ueluti lineas habente, folijs latioribus, subpuniceis, Libanotidis coma, plena flore, in corymbos antequā defloreat cōgesta, semine nigro, oblongo, solido, acri, odorato, radice odorata, intus candida, ori grata, pro caulis magnitudine non admodū densa. Porrò ne mireris quod picturæ non ex omni parte respondeat descriptio: neq; enim Hipposelinum integrum, & quod ad perfectam peruenit ætatem, floresq; & semen produxit, damus, sed id





HIPPOSELINUM

Gros Epffich.



C sed id tantum quod primo erumpit. Radicem itaq; tantum & folia depingi curauimus, ut quæ Oleris attriti, cuius sæpè fit apud Dioscoridem mentio, forma, saltem in folijs & radice, esset, cerneret. Annitemur tamen ut aliquando integram eius herbæ picturam exhibeamus.

## LOCVS.

Nascitur in umbrosis, & iuxta paludes.

## TEMPVS.

Satum tardè prouenit, ideoq; factum ut integrè depictum dare nobis haud licuerit. Floret, Plinio teste, æstate.

## TEMPERAMENTVM.

Calidum est in secundo ordine, ut Apium, & siccum in medio tertij.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Estur olerum modo ceu Apium. Radix etiam cocta & cruda estur. Quinetiam folia & caules cocti manduntur, & per se aut cum piscibus præparantur. Crudaq; ad salgama condiuntur. Semen potum in mulso menses ducit. Rigore concussos calfacit potum & illitum. Vrinæ stillicidio auxiliatur. Radix eadem præstat,

## EX GALENO.

Hippofelini similis Apio uis est, ualidior tamen. Mensium autem & urinæ cindæ potissimum facultatem habet, ut liquet ex capite eiusdem de Smyrnio.


## EX PLINIO.

Olus atrum quod Hippofelinum uocant, aduersatur scorpionibus. Poto semine torminibus interaneis medetur. Itemq; difficultatibus urinæ semen eius decoctum ex mulso potum. Radix eius in uino decocta calculos pellit, & lumborum ac lateris dolores. Canis rabiosi moribus potum & illitum medetur.

D

## DE IXO CAP. CXXIII.

## NOMINA.

 **I**ox Græcis, Viscum Latinis & officinis, Germanis Mistel / oder Affolter nominatur.

## FORMA.

Planta est fruticosa, lenta, semper uiuens, intus porracei coloris, extrâ subflaua, folijs buxi, acinis exiguis, sine flore.

## LOCVS.

Nunq; in terra, sed semper in arbore, quercu præsertim, pyro, mâloq; prouenit.

## TEMPVS.

Autumni initio cum suis acinis decerpitur.

## TEMPERAMENTVM.

Calefacit cum acrimonia: ex plurima enim aëria & aquea, paucissima terrena constat. Igitur acrimonia in eo amaritudinem excellit.


## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Discutit, emollit, attrahit: tubercula, parotidas, ceterosq; abscessus cum resina & pari cæra mixtum, maturat. Epinyctidas in splenio curat. Cum thure antiqua ulcera, & malignos abscessus mollit. Lienes cum calce, aut gagate lapide, aut alio coctum & impositum minuit. Cum auripigmento aut sandaracho illitum, ungues extrahit. Mixtum cum calce & fæce, uim suam intendit.

## EX GALENO.

Valenter ex alto humores extrahit: nec tenues tantum, sed & crassiores, eosq; diffundit ac digerit. Est autem ex eorum genere quæ non protinus admota calfaciunt, sed quæ tempus requirunt, uelut Thapsia.





VISCUM

Wistel.



## NOMINA.

**I**SATIS Græcis, Isatis Latinis uocatur. Gallis, ut in cōmentarijs suis testatur Cæsar, Glastum olim dicebatur, nunc Guadam. Germanis autem ad hoc nomen alludentibus, Weydt nominat. Arabibus Nil, Nilech, & Indicum, ut lib. i. Paradox. cap. uigesimosexto monstrauius. Barbari deprauata uoce Osatim appellant.

## GENERA.

Duo Isatidis sunt genera. Vna enim satia, qua tingendis lanis infectores utuntur. Altera uerò syluestris, qua lanarum infectores haud utuntur. Priorem Germani simpliciter Weydt/alteram uerò cum adiectione wild Weydt nominant.

## FORMA.

**Satia.** Satia folia habet Plantagini similia, sed pinguiora, nigrioraq̃, caulē duobus cubitis altiorē. Hec Dioscorides, qui reliquas notas, quę syluestri similes per omnia sunt, cōmemorare noluit. Ex syluestris tamen effigie faciliē quales sint æstimare poteris: **Syluestris.** hec em̃ teste Dioscoride, satiaē similis est, folia tamē maiora obtinet, ad Lactucę folia accedentia: caules etiā tenuiores, multifidos, rubicantes, qui in cacumine folliculos linguarū figura multos dependentes habent, in quibus semen. Flos ei luteus & tenuis.

## LOCVS.

Isatis satia copiose in Germania prouenit, præsertim agro Erphordiano, cui magnum quæstum adfert. Viridem enim herbam trusculibus molis premunt, ut herbaceā saniem excludant: dein abactō liquore digerunt in magnos globos, quos tabulatis cōputrescere in æstate feruente sinunt. Hos cortinis infectoriae coquunt officinae, & laneos pannos, ac uellera demergunt, ut cœruleū imbibant colorem. Syluestris sua sponte in quibusdam Germaniæ locis nascitur, ut Tubingæ, ubi omnes uinearum maceries hac herba septæ uidentur.

## TEMPVS.

Maiō & Iunio mense florent, ac subinde semen proferunt.

## TEMPERAMENTVM.

Isatis satia ualenter admodum exiccantis, nondum tamen mordentis facultatis est: amara enim simulatque adstringens existit. Syluestris uerò acre quiddam, tum gustu, tum actione præfert: proinde ualentius quàm satia desiccatur.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Isatidis satiaē folia omnia cedemata & tubercula illita discutere possunt. Cruenta uulnera glutinant. Sanguinis profluvia sistunt. Ulcera phagedanica, herpetas, erysipelata, & putrescentia sanant. Syluestris eadem quæ satia potest. Lienosis etiam pota & illita auxiliatur.

## EX GALENO.

Satia magna ulcera durorum corporum glutinat, etiamsi in capitibus musculorum fuerint, & sanguinis profluuio laborantibus partibus utiliter illinitur. Tumores cedematodes mirifice discutit, simul & reprimat, omnibusq̃ ulceribus malignis mirabiliter resistit, etiamsi putrescant, etiamsi erodantur. Quod si quando laborantis natura ualidior appareat, folijs eius tritis aut panem, aut hordeaceā farinam, aut triticeam, aut polentam, pro uinciente in unoquoq̃ affectu, miscere oportebit. Syluestris uerò potentissime humidis putredinib. obstitit, ad cetera uerò iam comprehensa deterior: immoderatus enim & cum mordacitate desiccatur, talia namque irritantur hoc pacto, & phlegmone grauari incipiunt. Cæterum ob facultatis robur lienosis quoq̃ utilis est, quum altera prodesse nondum possit.

## EX PLINIO.

Isatidis folia trita cum polenta, uulneribus profunt. Sanguinem sistit. Phagedænas & putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanat. Item tumores ante suppurationē. Contra ignem sacrum, radice uel folijs prodest, uel ad lienes pota.



ISATIS  
SATIVA.

Weydt.







ISATIS  
SYLVESTRIS.

Wild Weyde.



## NOMINA.



ITEA Græcis, Salix Latinis, Weiden/ oder Selber Germanis appellatur. Salix uerò à saliendo dicta est, quod ea celeritate crescat, ut quasi salire uideatur. Sic etiam Iream quasi Salicem uocauerunt Græci.

Salix cur dicta.

Itea unde uocata.

## GENERA.

Tria Salicis genera Theophrastus lib. iij. cap. xij. de historia plantarū recenset. Primā nigram nominari dicit, quod nigro aut puniceo cortice obducta sit. Secundam candidam, quod candido obducatur cortice. Tertiam coactę breuitatis ac pumilam, Helicen Arcadibus appellari scribit. Plinius etiam lib. xvij. cap. xxxvij. tria Salicis nomina cōmemorat: Viminalem, eandemq̃ purpureā: Vitellinam à colore luteo, graciliore priore: Gallicam, quæ sit tenuissima. Lucius Columella lib. iij. cap. xxx. eiusdem quoque tria facit genera, Græcam, Gallicam, & Sabinam, quam etiam Amerinam uocari à plurimis scribit. Græcam flauī coloris, Gallicam obsoleti purpurei, tenuissimiq̃ uiminis, Sabinam gracilibus uirgis atq̃ rutilibus esse asserit. Quæ sanè singula pulchrè cum ijs quæ Theophrastus tradit, conuenire uidentur. Nam primam Salicis speciem, quam Theophrastus nigram aut puniceam uocat, Plinius Viminalem, Columella uerò Sabinam & Amerinam appellat, Germani rot Weiden nominant. Secundam speciem, quam Theophrastus candidam, Plinius Vitellinam, Columella autem Græcam uocat, Germani geel Weiden. Tertiam, quæ Theophrasto Helix dicitur, Plinius & Columella Gallicam appellant, Germani uerò à tenuitate Klein Weiden.

Salix nigra.

Candida.

Pumila.

Viminalis.

Vitellina.

Gallica.

Græca.

Sabina.

Prima Salicis species.

Secunda.

Tertia.

## FORMA.

Salix breui caudice confurgit, ramis longis, è trunco extremo ueluti à capite prodeuntibus, lentis, flexilibus: folijs longis, subtus incanis, supernè uirentibus: flore seu nucamento squamatim compactili, lanuginoso, propendente, fructu qui faciliè ante maturitatem euanescat.

## LOCVS.

Aquosis lætatur, ideoq̃ auctu perquam facilis.

## TEMPVS.

Floret primo statim uere. Ocyssimè amittit fructum, antè quàm omnino maturitatem sentiat, ob id dicta Homero ὠλίσκηρα, hoc est, frugiperda, Odyss. κ. ubi sic canit: μακρὰ τ' αἴγασσι καὶ ἰτέαι ὠλίσκηρα. Fructum siquidem fert, Plinio autore, abeuntem in araneam antequam percoquatur.

## TEMPERAMENTVM.

Salicis tum folia, tum flores, citra mordacitatem exiccantis sunt facultatis, ac modicè adstringunt. Cortex tamen eius siccior.

## VIRES.

## EX DIOSCORIDE.

Adstringunt Salicis folia, fructus, cortex & succus. Folia trita cum exiguo pipere & urino pota ileosis conueniunt. Per se etiam cum aqua sumpta, præstant mulieribus ne concipiant. Fructus potus sanguinè expuentibus prodest. Cortex eadem præstat. Vstus & cum aceto subactus, clauos & callos illitus tollit. Ex folijs & cortice succus in putamine mæli punici cum rosaceo calfactus, aurium doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras foveri optimū. Furfures exterit. Excipitur etiam è Salice succus exciso cum floret cortice: in interiore enim eius parte concretus inuenitur. Vim autem habet exterendi quæcunq̃ pupillæ claritati obstant.

## EX GALENO.

Salicis folijs ad cruenti uulneris glutinationē quis uti posset. Verū floribus eius maximè propè omnes utunt̃ medici ad exiccantis emplastri preparationē: est enim uis eorum desiccatoria: habent etiam quandam adstrictionē. Sunt qui succum ex ea expressum, medicamen seruent mordacitatis experts & exiccatorium, ad multas

res uti-





PRIMUM SA-  
LICIS GENVS.

Rot Weiden.





ALTERVM SALI-  
CIS GENVS.

Seel Weiden.





TERTIVM  
SALICIS GENVS.

Klein Weiden.



A res utile. Haud enim inuenias quid ad plures res uilius medicamento citra mordacitatem exiccante, quod paulum etiam adstringat. Porro arboris cortex similem facultatem obinet, tum floribus, tum folijs, nisi quod temperaturæ sit siccioris, uelut omnes cortices. Sed hunc quidam comburunt, eiusque cinere utuntur ad ea omnia quæ ualenter desiccare oportet. Nam clauos quos uocant, callos, myrmeciasque tollunt, aceto ipsum macerantes acri. Nonnulli autem dum floret Salix, corticem eius incidunt, & succum quendam colligunt, utunturque ad ea quæ pupillas obfuscant, extergente uidelicet simulque tenuium partium medicamine. Vti uero illo ad multa alia quis posset, siquidem talis sit.

## EX PLINIO.

Salicis fructus ante maturitatem in araneam abit. Sed si prius colligatur, sanguinem reiicientibus prodest. Corticis & ramis primis cinis, clauum & callum aqua mixta sanat. Vicia cutis in facie emendat, magis admixto succo suo. Est autem hic trium generum. Vnum arbor ipsa exudat gummi modo. Alterum manat in plaga cum floret, exciso cortice trium digitorum magnitudine. Hic ad purganda quæ obstant oculis, item ad spissanda quæ opus sunt, ciendamque urinam, & ad omnes collectiones intus extrahendas. Tertius succus est detruncatione ramorum à falce destillans. Ex ijs aliquis cum rosaceo in calyce mali punici calfactus, auribus infunditur: uel fossa cocta, & cum cera trita imponuntur. Item podagricis. Cortice & folijs in uino decoctis fouere neruos utilissimum. Flos tritus cum folijs furfures purgat in facie. Folia trita & pota intemperantiam libidinis coercet, atque in totum auferunt usum sapius sumpta.

## DE CAPNO CAP. CXXVI

## NOMINA.



CAPNOZ Grecis, Fumaria Latinis: officinis Fumus terre, Germanis Erdrauch / Daubentropff / Kagentörbel appellatur. Fumaria uero hæc herba dicta est, propterea quod succus eius oculis inditus, ueluti fumus lachrymas mouet, oculosque mordicat.

Fumus terre.  
Fumaria unde dicta.

## FORMA.

Fruticosa herbula est, Coriandro similis, tenera admodum: folijs candidioribus, cineracei coloris, undique numerosis: flore purpureo.

## LOCVS.

Nascitur in segetibus hordeaceis, hortis, uineis, sepibus, & macerijs, alijsque locis incultis atque pinguibus.

## TEMPVS.

Carpitur in fine Maij mensis & Septembris.

## TEMPERAMENTVM.

Capnos calida & sicca in secundo esse uidetur ordine, id quod ex gustu patet: acris enim & amara est.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius succus acris est, uisum acuit, lachrymas ducit, unde & nomen traxit. Illitus cum gummi duplices palpebrarum pilos renasci non sinit. Comanducata herba biliosam urinam trahit.

## EX GALENO.

Capnos acris simul & amaræ qualitatibus est particeps, nec tamen planè expers est acerbæ. Quamobrem biliosam urinam multam prouocat, sanatque iecinoris obstructions & debilitates. Succus eius oculorum aciem acuit, non parum lachrymarum trahens, uelut ipse fumus: nam hinc ei appellatio indita. Plebeius quidam ea uti solebat ad stomachum roborandum, unaque uentrem lubricandum. Siquidem herbam

f primum





FVMARIA

Erdrauch.



A primum desiccata condebat: dein cum uti uolebat subductionis quidem gratia melicrato inspergebat: roborandi uerò causa, uino nimirum diluto.

EX PLINIO.

Claritatē facit inunctis oculis, delachrymationemq̃ ceu fumus, unde nomen accepit. Eadem euulsas palpebras renasci prohibet. Bilem per urinam trahit.

## DE CICI CAP. CXXVII

NOMINA.



**K**IKI, *ῥικίνος* Græcis, Ricinus Latinis, Mauritanis Kerua, officinis nonnullis Cataputia maior, quibusdā etiam Pentadactylon & Palma Christi, quod scilicet eius folia in humanæ manus effigiem articulantur: Germanis Wunderbaum/oder Creunbaum dicitur. Croton autem & Ricinus à similitudine animalis, quod semen eius referre uidetur, nominata est. Sunt enim Græcis *ῥικίνος*, & Latinis Ricini, insecta animantia, quæ canibus præsertim adherent, quibus cibi nullus exitus est, colore liuido, nullis discreta membris, in globum continuè crescentia, donec plenius saginata, post aliquot dies sponte sua decidunt. Hinc est quod à Germanis nostris *Seckenbörner* nominentur.

FORMA.

Arbor est parue fici magnitudine, folia Platano similia habens, maiora tamen, læuiora & nigriora. Caudices uerò & ramos arundinis modo concavos. Semen in uuis racemisue asperis, quod cortice nudatum, Ricino animali simile est. Quæ descriptio ita picturæ quadrat, ut nihil magis.

LOCVS.

B Nascitur nusquam in Germania nostra, nisi satum fuerit. Satum autem semel copiose prouenit. Sine difficultate etiam palsim iam in hortis prouenit.

TEMPVS.

Carpitur Autumno dum semine abundat.

TEMPERAMENTVM.

Ricinus in secundo uel summum tertio ordine calefacientium & siccantium esse apparet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Ex semine Ricini oleum nomine Ricininum exprimitur, ad edendum minimè aptum: alioquin tamen lucernis & emplastris utile. Grana triginta numero putaminibus purgata, trita & pota, pituitam, bilem, & aquam per aluum deſciunt. Vomitiones etiam mouent. Est uerò iniucunda admodum & laboriosa huiusmodi purgatio: stomachū enim ualidè subuertit. Tusa & illita uaros, maculasq̃ sole cōtractas purgāt. Folia trita cum polenta, oculorū cedemata & inflammationes sedant, mammasq̃ turgentes cohibent. Per se aut cum aceto illita ignes sacros restinguūt.

EX GALENO.

Semen Ricini, quod etiam purgat, extergendi & digerendi facultatem obtinet. Sic uerò & folium, sed undequaq̃ debilius. Oleum quod ex semine cōficitur, tum calidius, tum tenuiorum partium, quàm est oleum commune, ac proinde quoque digerit.





RICINVS

Wunderbaum.



A

## NOMINA.



IPSION græcè, Spina mollis, Buglossum magnum latinè nominatur: *Buglossa.*  
 officinæ, necnon herbarij Buglossam uel Linguam bouis uocant. *Cir-* *Cirson eir dicta*  
 sion autem eò quod uarices, quos Græci *uigors* nomināt, sanet, dicta est.  
 Germanis *Schsenzung* appellatur.

## GENERA.

Nos duo damus genera, quorum unum Germanicum, alterum uerò Italicum est, in quo omnia sunt maiora.

## FORMA.

Caulis est tener, duūm cubitorum, triangularis. Ab inferiore parte foliolis rosaceorum figura, angulos spinosos per interualla, sed molles habentibus. Folia Buglossi similia, modicè hirsuta, longiora, albicantia, extremitatibus aculeata obtinet. Cacumen in caule orbiculatum, hirsutum, in quo capitula in summo purpurea, quæ in lanugines euanescent. Hæc sanè descriptio satis monstrat, Cirson esse Buglossam hodie uocatam, cum ei deliniationes omnes, nulla ferè reclamante nota, conueniant. Siquidem caulis ei tener, bicubitalis, triangularis, spinosis per interualla angulis, sed mollibus & innoxijs aculeis. Folia Buglossi similia, longiora tamen, aut lege, *μακρότερα*, hoc est, minora, cum Plinio: subcandida, leniter hirsuta, in extremis partibus aculeata. Cacumen quoque caulis circinatum, hirsutum, in quo capitula purpurea. Etsi uero reliqua omnia conueniant, tamen capitula purpurea non abeunt in pappos neq; in nostra, neq; in Italica. *Buglossa nostra.*

## LOCVS.

Producitur locis cultis & incultis, arenosis potissimum & petrosis. Italicū etiam hodie in multis hortis magna copia nascitur. *Locus Dioscoridis emendatur.*

## TEMPVS.

Carpitur Iunio & Iulio mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

In primo calefacere & humectare ordine apparet.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radice Cirsi laboranti loco adalligatam, dolores uaricum sedare Andreas scripsit.

## EX PLINIO.

Hanc herbam radicēmue eius adalligatam, dolores uaricum sanare tradunt.

## APPENDIX.

Non plures iam cōmemoratis facultates Cirsi, Dioscorides & ueteres alij tribuunt. Videant igitur nostrę ætatis medici, ne temerè Buglossæ suæ quas non ob-  
 tinet uires adscribant.





CIRSIVM  
GERMANICVM.

Teutsch Ghsenzung.





CIRSIVM  
ITALICVM.  
Welsch Ochsenzunge.



C

NOMINA.

Coriandrum.  
Corion quare no-  
catum.



OPION, ἡ κορίαννον Grecis: Corion seu Coriannon Latinis, uulgo & officinis Coriandrum, Germanis, qui latinam seu officinarum appellationem imitantur, Coriander nominatur. Corio nomen fecisse cimices uerisimile est, quos folia & caules eius olent: κόρυς enim Græcis insecti κόρυς. id genus est, quod Latinis cimex dicitur.

FORMA.

Caulis Corianno exilis, sesquicubitalis, ramosus. Folium dum primū erumpit Adianti, dein Fumariæ, odore graui. Flores candidos. Semen rotundū ac nudum, firmum & diutinum. Radicem breuiusculam, ligneam, neq̃ admodum fibratam.

LOCVS.

Amat terram pinguem, Palladio teste, sed & macro solo nascitur. Nunquam autem nisi satum prouenit.

TEMPVS.

Autumno dum semine prægnans est carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Coriandri temperamentū minimè frigidum ac simplex est, sed uariè coalitum & compositū. Est enim copiosæ quidem amaritudinis particeps, quæ in tenui simul ac terrestri substantia fundat: sed & aquosæ humiditatis tepidæ ei nō parum inest. Habet etiā adstrictionis nō nihil, sicut paulò post ex Galeni uerbis clarius innotescet.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Hec Dioscoridis  
uerba paulò post  
Galenu exhibet

Vim refrigeratoriā habet Coriandrum, unde illitum cum pane aut polenta erysipelatis, & herpetibus medetur. Epinyctidas, testium inflammationes, carbunculosq̃ cum melle & uua passa sanat. Cum lomento strumas & tubercula discutit. D Lumbricos semen cum passo potū pellit, genituramq̃ auget. Largius tamen sumptum, mentem non sine periculo mouet, quapropter copiosiorē & cōtinuum eius usum cauere oportet. Succus cum cerussa, aut argenti spuma, necnon aceto & rosaceo illitus, ardentes in summa cute inflammationes iuuat.

EX GALENO.

Dioscorides re-  
prehenditur.

Coriannon siue Corion, aut utcunq̃ uocare lubet. Vetusiores Græci Coriannon nominabāt, ac recentiores omnes medici Corion appellant, sicut & Dioscorides refrigeratoriā esse herbam dictitans, sed perperā. Siquidem ex contrariis constat facultatibus, plurimū habens amaræ essentiae, quam ostendimus esse tenuium partium, & terrenam, nec modicum etiam aqueæ humiditatis obtinentē, quæ est facultatis tepidæ. Habet autem & adstrictionis pauxillum. Ex quibus omnibus uariè quidem agit ea quæ scribit Dioscorides, & non tantum ex refrigeratione. Cæterum ego cuiusq̃ particulatim actionis causam enarrabo, tametsi propositum fuerat mei unius duntaxat hoc in libro sententiā expromere. Sed fortè nihil obstabit, imò si uerum fatendum est, proderit nō nihil superiores methodos, quæ in paucis medicamentis sunt dictæ, hunc in modum repetere. Primum ergo nō Dioscorides tantum, sed & alij complures medicorū indeterminatè & citra limitationē de morbis pronunciant, sicut sanè hac quoq̃ tempestate non paucos reperias medicos insignes, præter alia, hac in re maximè hallucinantes. Interdum enim atra, liuida, frigidaq̃ reddita parte quæ erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia poscente medicamenta, ceu antea, sed ea quæ infixum parti præter naturam humorem euacuent, in tamen refrigerare perseuerant. Aliquando autem ad digerentia quidē transeunt, cæterum erysipelas sanare dicunt. Et sanè scribunt incipientibus etiamnum & crescentibus erysipelatis alia cōuenire medicamenta, aliaq̃ declinantibus. Verum res ita non habet. Neq̃ enim erysipelas etiam uocari debet posteaquam inflammatio eius





CORIANDRUM

Coriander.



c eius & feruor, ac biliosum illud abierint: neque quæ facultate sunt frigida, neque quæ illa sanant, remedio esse putandum est, sed uelut si uel initio protinus aut percussis, aut alia de causa quauis tumor in parte quapiam aut liuidus, aut niger extiterit, eum frigidum esse affectum existimabis, & quæ digerant exalfaciantque poscere: ad eundem modum si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio nomine appellanda. Aut si displicet nominis mutatio, saltem sicut aliqui alia scribunt principij, alia declinationis remedia, haud frigida esse autumantes declinationis remedia, concedendum sanè est, si cui ita placet, ut talis affectio etiam erysipelas uocetur: sed eam etiam calidam dicere ubi iam refrigerata est, id uerò nequaquam concedendum. Itaque ne quod tunc ei auxilio est, refrigeratorium esse credamus, sicut Dioscorides Coriannon, quod, ut ipse ait, cum pane aut polenta illitum erysipelas sanat. Nam quod exquisitum est erysipelas, & iam utique inflammatum & flauum est, nequaquam cum pane sanabit Coriannon, sed illud quod iam refrigeratum est. Proinde nos superioribus uoluminibus, quum determinata ac definita experientia cuiusque medicamenti facultatem explorandam censuimus, quammaximè fieri posset simplicissimum eligi affectum consulimus. At plerique medici, neque quod uel plurimi morborum protinus ab initio compositi inuadant, norunt, neque quod alius affectus sit erysipelas exactum, alius uerò is qui uocatur ab omnibus nobis usitatè, ut à ueteribus quoque, phlegmone. Alij autem inter hos medij plurimi, partim ut sic dicam erysipelata phlegmonode, partim phlegmonæ erysipelatodes. Ac inuenias nonnunquam ubi neutrum uincat, sed ad unguem paria sint. Quinetiam nonnunquam cedematodes esse erysipelas conspicitur, sicut aliud

D scirrholes, ut compositorum morborum haud paruus aceruetur numerus. De quibus copiosius cum alibi disseruimus, tum in libris de curandi ratione. Dicetur autem & nunc, quoad saltem eorum meminisse necesse est, quod exactum erysipelas haud unquam ab antedicto cataplasmate curari possit. Voco autem exactum, quum à biliosa fluxione pars impleta fuerit. Porro quod longè à refrigeratione absit Coriandrū, uel ex his quæ ipse scripsit Dioscorides discere licet. Nam strumas, inquit, cum lomento discutit. Quod uerò nullum refrigerantium medicamentorum idoneum sit discutiendis strumis, uel ipsum Dioscoridē non dubitare arbitror, ut qui sexcenta scripserit medicamenta strumas sanare potentia, quæ omnia temperie calida, & actionibus digerentia esse confessus est. Hactenus Galenus: cuius quidē, etsi prolixa sint, uerba ideo recensere placuit, ut uulgi & nonnullorum etiam medicorum errorē detegeremus, qui præter ueritatē Coriandri temperamentū esse frigidum asserunt. Denique ut ex hoc loco discerent studiosi, quàm periculosum sit Dioscoridis ac aliorum ueterum scripta sine limitatione sequi. Admonitos quoque lectores esse uolumus, hoc caput ex eorum esse numero, in quo Galenus à Dioscoride dissentit.

Libro xliij.  
Exquisitum ery  
sipelas.

Periculosum Dio  
scoridis scripta si  
ne limitatione le  
gere.

#### EX PLINIO VALERIANO MEDICO.

Non dubitanter Coriandro refrigeratrix potestas datur, non tamen simplex, ut prudentissimè Galeno uidetur, sed cui quædam portio austeritatis immixta sit, inde quod quædam ex eo uicia curantur, quæ nunquam omnino curaret, si sola uirtute frigida niteret. Cum melle & uua passa tritū & impositū, omnes tumores collectionesque compescit. Præcipuè tamen isto genere medicaminis doloribus testium subuenit. Succo mali granati et oleo in potione permixtum, animalia interaneis innata persequit. Semen ex aqua potum solutionē uentris stringit. Scriptū à multis legitur tria Coriandri grana tertianas excludere ante accessione si fuerint deuorata. Iisdem quoque repellendis efficax est ipsum Coriandrū ante solis ortum ignorantia cervicali uiride subiectū. Mirum est quod Xenocrates tradit, si unum seminis granū focmina biberit uno die menstrua contineri, biduo si duo, & totidē diebus quot grana sumpserit.

Eadē ferè sunt quæ alter Plin. lib. naturalis histo. xx. cap. xx. scribit, ideoque omittere placuit. Tantū addit, Marcum Varronē putare Coriandro subtrito cum aceto, carnem incorruptā æstate seruari.



## APPENDIX.

**A** Non transeundum silentio erit quod Dioscorides hic diligenter monet, Coriandri copiosum & cōtinuum usum esse fugiendum. Ideoq̃ errare uehementer recentiores medicos, qui eo tam frequenter, potissimum ad caput roborandū, cui insensissimum est, utuntur, manifestius est quā ut probatione indigeat. A quo sanè errore uel id saltem reuocare eos deberet, quod idem Dioscorides, libro sexto, Coriandrum inter uenena connumeret.

*Coriandro nō copiose & cōtinuò utendum.*

## EX SYMEONE SETHI.

Stomacho bonum est, & eundem corroborat. Cibos in uentriculo donec probe cōcoquantur retinet. Tostum igne uentrem sistit. Prodest ad phlegmonas & calidas temperaturas. Sanguinis profluuiū potum, & si imponatur, compescit. Cum uino potum, lumbricos educit: immodicus tamen eius usus delirium facit. Huius etiam succus potus uenenum est & occidit. Qui enim hunc bibunt, muti fiunt, & desipiunt.

## DE CASSYTHA CAP. CXXX.

## NOMINA.



**K**ΑΣΣΥΘΑ recentioribus Græcis: Cassutha, y litera in u transeunte, ut sæpè fieri solet, Latinis appellatur: officinis & herbarijs nostræ ætatis hinc deflexa quadam pristini nominis umbra, Cuscuta dicitur, cum primum Cassutha, dein cōuersa Cascutha, postremo Cuscuta cœperit appellari. Sunt qui podagram lini uocant, quod quasi compedibus id cui insederit illi

*Podagralini.*

**B** oder Todtern dicitur. Errant qui Dioscoridis Androsacen esse putant, cum ueteres Græci, quod sciam, de Cuscuta hodie dicta, nihil memoriæ prodiderunt. Plinius tamen lib. xvi. cap. ultimo, eius uidetur meminisse ijs uerbis: Est & in Syria herba quæ uocatur Cassythas, non tantum arboribus, sed ipsis etiam spinis circumuoluens sese: Cassytas enim legendum non Cadytas: sic enim codices aliquot Pliniani, ut in suis annotationibus doctissimus Hermolaus admonet, ijsq̃ emendatiores, habent. Iam igitur memoria Plinij Cassytas herba suo nomine Syriaco uenerat in Latium, quod multis postea seculis usurpantes tam Pœni quā Arabes, suis scriptis protriuerunt. Quod autem Plinius sine spiritu protulit, id librariorum culpa factum esse suspicor, qui inuertentes mutarunt Cassythas in Cassytas.

*Androsace non est Cassutha.*

*Plinij locus emendatus.*

## FORMA.

Herbosis fruticibus adnascitur, earum adminiculo fulta: radice nulla, sed uelut ab alarum sinu prodeunte cirro capillamentōue miræ longitudinis, statim ab eius ortu sese ramulis conuolvente. Quæ iam ueluti clauiculis nixa, sensim proserpens herbarum fastigia scandens, & crebris uolutionibus opere topiario per uertices rotata, comas herbarum complectitur: tam uolubilis illi natura est. Folijs uidua cernitur. Florem fundit album, semine quoq̃ scatet tenui. Cirri dilutiore rutilant purpura, nōnunquam ex rubro rufescunt, fidibus lyrarum crassitie pares.

## LOCVS.


Non in terra, sed in herbis arboribusq̃ passim nascitur Cassythas, quas tam spisso sæpius irretit cōtextu, ut tentorij modo herbosum cespitem à sole uindicet. Non nunquam cacuminib. impendens stirpes humi deturbat, propriamq̃ parentē suis laqueis strangulat, aut continuò materni alimenti succu perducit ad tabem.

## TEMPVS.

Æstate, Iulio potissimum & Augusto mensibus, maximus illius in Germania prouentus esse solet: hoc enim tempore tanta eius est luxuria, ut mole sua stirpes onerata ferè procumbere uideantur.

## TEMPERA-





CASSVTHA

Flachs seiden.



A

## TEMPERAMENTVM.

In primo calefacientium abscessu seu ordine, & desiccantium secundo statuendum: quandam enim resipit amaritudinem.

## VIRE S.

Abstergendi naturam obtinet, & cum quadam adstrictione roborandi facultate prædita est. Iecinoris impedimenta laxat, infarcti & obstructi lienis expedit vitia, uenas pituitosis atq; biliosis exonerat humoribus, pellit urinam. Regio morbo subuenit qui iecinoris obstructionibus contrahitur. Febris huius auxiliatur quæ pueros male habent: sed usu nimio stomachum sua astrictione grauat: uerum noxa tollitur, si Anisi momentū adijciatur. Natura eius flauam bilem per aluum exigere, sed efficaciorē cum Absinthio præbet effectum. Hæ quidem ex Pœnorum ac Arabum sententiâ facultates Cassuthæ tribuunt, qui utiq; uires illius longè magis gliscere pollicentur, si parentis ingenium ei patrocinetur. Hinc est quod hanc forsitan ueteres Græci, quamuis triuiale, eo nomine subticuerunt, quod natiuas suæ merito parentis dotes adsciuiſſet, è sinu cuius uernaculum ebibens humorem aleretur. Nam ut testatum idem Arabicæ factionis medici reliquerunt, si calidæ insidet herbæ arboriue, calidam sortietur facultatem, & si decubuerit frigidæ, uim sibi frigidam uendicabit.

## DE CESTRO CAP. CXXXI.

## NOMINA.

**K**ESTRON græcè, Betonica seu Vetonica latinè: in officinis antiquū nomen retinuit, Braunbetonick germanicè appellat. A uarietate autem & copia remediorū, Cestron à Græcis dicta est: hac siquidem uoce opus Cestron unde dicta. interpunctū, ac uerè pictum nominauere. Libri etiam à uarietate subiecti, ab aliquot Græcis hoc titulo inscripti sunt. Plinius quoque aliquando Ebur cestrum, id est, picturatum dixit. Betonica uerò ab inuentoribus Vetonibus, Hispaniæ populis, nominata est. Betonica.

## FORMA.

Herba est caulem tenuem obtinens, cubiti altitudine, aut maiorem, quadrangulum. Folia longa, mollia, quernis similia, per ambitum incisuris diuisa, odorata, prope radicem maiora. In summo caulium semen ueluti Thymbræ spicatum inest. Radices subsunt tenues ut Ellebori.

## LOCVS.

Nascitur in pratis, syluis, montosis, frigidis & opacis locis, ideoq; Græcis *ψυχρότα ψυχρότοπος* ψυχρότα uocata est.

## TEMPVS.

In Maio & Iunio mensibus floribus abundat.

## TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca in primo ordine completo, aut in medio secundi.

## VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Folia Betonicæ carpunt & siccantur plurimos ad usus. Radices cum hydromelite potę, pituitosam uomitionē eliciunt. Folia dantur ruptis, cōuulsis, uulua affectibus, & eiusdē strangulationib. drachmę unius pondere cum hydromelite. Ternę in uini sextarijs duobus cōtra serpentū morsus ebibunt. Herba ipsa illita uenentorū morsib. prodest. Aduersus etiā uenena drachma ex uino pota cōuenit. Hanc si quis præsumperit, letale haustū uenenū nihil nocebit. Vrinā cit. Aluum subducit. Medet comitialibus & furiosis cum aqua pota. Iecinoris & lienis uitijs drachmę pondere cum aceto mulso pota succurrit. Concoctionē adiuuat, si quis à cœna eam

g fabæ





BETONICA

Betonick.



A fabæ magnitudine cum melle cocto deuorauerit. Eodem modo & acida ructantibus propinat. Stomachicis eam manducare, & succum deuorare proderit, si postea dilutum uino sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus trium obolorū pondere cum diluti uini cyatho uno. Ischiadicis, renum & uesicę dolorib. ex aqua. Hydropicis autem binis drachmis, febrientibus cum hydromelite, non febricitantibus cū mulso. Regio morbo laborantes recreat. Menses ducit drachmæ pondere cum uino pota. Aluum purgant drachmę quatuor cum hydromelitis cyathis decem pota. Cum melle tabidis, purulentis auxiliatur. Folia cum inaruerint trita ad hos effectus fictili uase reponuntur.

## EX GALENO.

Vim habet incidendi, ut gustus indicat; Amariuscula enim est, & subacris ipsa herba, id quod & particulatim edita ostendit actio. Nam consistentes in renibus lapides rumpit, & pulmonē & thoracem & iecur expurgat, abstergitq̃. Menses mouet, & comitialibus prodest. Rupta atq̃ conuulsa curat, & omnibus bestiarū moribus illita ulceri auxiliatur. Acidum ructantibus & ischiadicis bibita succurrit.

## EX PLINIO.

Morsibus serpentum imponitur Betonica præcipue, cui uis tanta perhibetur, ut inclusæ circulo eius serpentes, ipsæ sese interimant flagellando. Datur & ad ictus semina eius denarij pondere cum tribus cyathis uini, uel farina drachmis tribus sextario aquæ imponitur. Obolis tribus in aqua, contra purulentas, contraq̃ cruentas excreationes facit. Faciles præstat uomitiones radix eius Ellebori modo quatuor drachmis in passo aut mulso. Ischiadicos dolores & spinæ leuat eiusdem farina ex aqua mulsa. Aluum soluit drachmis quatuor, in hydromelitis cyathis nouem. Folia siccantur in farinam plurimos ad usus. Fit uinum ex ea & acetum, stomacho & claritati oculorū. Paralyin sanare dicitur. Eadem torpentibus membris prodest. Ad lateris & pectoris dolores farina eius bibitur.

## DE BETONICA ALTERA CAP. CXXXII.

## NOMINA.

**D**VAS esse Betonicæ species præter Paulum Aeginetam lib. vii. Plinius etiam lib. xxv. cap. viij. abunde docet: & in aliquibus Dioscoridis codicibus huius quoque secundæ Betonicæ mentio fit. Hanc itaque posteriorem, tam officinæ quàm herbarij medici Tunicam, detractis à Betonica duabus literis prioribus, nominant. Germanis Graßblumen & Negelblumen/ quod flores eius garyophyllorū odorem referant, appellare placuit. Herba Tunica.

## GENERA.

Duū est generum. Vna siquidem syluestris est, quam Germani wild Negelblumen/ hoc est, syluestrem Garyophylleam, & Dondernegele/ Seldtnegele/ & Blüströpfle. Altera altilis est, quę alio nomine Betonica seu Vetonica coronaria, quod illius in coronis nimius usus sit, dicitur. Germani heymisch Negelblumen/ quasi domi natam Garyophylleam appellant. Syluestris.

## FORMA.

Specie multum à priore Betonica differt. Radicem enim totam rubram, odoratamq̃ habet. Folia porracea, oblonga, stamine quo medium diuiditur puniceo ac rubente, cum recto calamo triangula, floribus in uertice purpureis. Hęc Dioscoridis deliniatio utriq̃ generi cōmunis est: priuatim tamen syluestris Betonica herba fruticosa est, folijs porri, oblongis, angustis, per extremū mucronatis, cæsijs, concoloribus calamis, teretibus, geniculatis, cubitalibus, floribus speciosis, simplicibus, qui quinis, senisue folijs constant, lentē fimbriatis, magna ex parte purpureis, quamuis & interdum niuei conspiciant. Altilis seu coronaria, folijs est porraceis, Syluestris Betonica.

g 2 oblon-





BETONICA  
SYLVESTRIS VNA.

Dondernegele.





BETONICA  
SYLVESTRIS ALTERA.

Wildnegele.



354



BETONICA  
ALTILIS.

Nigellblüm.



**A** oblongis, per extremum mucronatis, cōcoloratu cæsijs, teretibus cauliculis sesquicubitalibus, genicularis, coeuntibus pyxidatim internodijs, floribus omnium speciosissimis, Garyophyllorum odoratu, sed longè suauissimo, quandoquidem alius cocco rutilat, alius saturata nitet purpura, alius candido, alius emaculato blanditur colore, alius uersicolore uariatur cōmistu. Omnibus teres longiusculusq̃ calyx spectatur, orbiculo superiore denticulatus, à quo quina senaue folia prodeunt, lentè quidem fimbriata. Nonnulli tamen flores frequentiore coma stipantur, geminis utrinque emicantibus stamineis apicibus.

## LOCVS.

Syluestris in pratis, montibus, nitidisq̃ locis nascitur. Coronaria uerò passim in fictilibus uasis alitur, neq̃ facile ædes inuenies, ante quas non expositam intuearis.

## TEMPVS.

In æstate utriusq̃ magna est copia. Coronaria tamen longiori tempore durat, atq̃ æstiuas, autumnales, hyemalesq̃ struit coronas.

## TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse tum amaritudo, tum odor & alia multa declarant.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Animas hominum & corpora custodit. Contra nocturnas peregrinationes, loca insidiosa, & difficiles somnos cōmendatur. In totum, ad omnem medendi rationem celebrata. Recens trita uulneribus capitis indita dolorem finit. Vulnera glutinat. Fracta ossa extrahit, & hoc quotidie efficit, donec persanescat. Dolori capitis medetur, si decocta ea ex aqua caput perfundatur, aut temporibus cum bitumine illinatur, aut radix eiusdem suffiatur.

## EX INCERTO.

**B** Farina eius tam aduersus toxica quàm serpentū & scorpionū ictus ex albo uino bibitur. Quartanæ reliquarumq̃ febrium horrores discutit. Comitialibus opitulatur sub ipsam accessiōem propinata. Eadem per se carcinomatis inspergit, quæ tamen præstiterit herbæ succo prius abluisse. Estur contra uentris tineas. Succus pestis arcet contagia, atque etiam haustus, si iam morbus inuaserit, liberat. Fit ex flore oleum ad canis rabiosi morsus, ad fistulas & parotidas, quibus illitu medetur. Visus aciem exacuit. Ieiuno sumpta dolorem dentium sedat, iure decocti colluto ore. Discutit grauedines. Partum, qui sine febre sit, accelerat. Neruorū uulneribus imponitur. Præsumpta ebrietatem arcet. Intertriginem in itinere faciundo non sentient qui ex uino biberint. Fastidia cum aceto mulso discutit. Iis qui ex morbis sese recolligunt aluum ex aqua calida deijcit. Vomitiones cohibet. Dolores podagræ ac inflationes uentris sedat. Venena rabiosi canis morfu impressa elicit plagæ diutius illigata.

## APPENDIX.

Recentiores syluestris Betonicæ succum mirificè cōmendant in atterendo & educendo calculo, & medendis comitialibus. Altilis autem radicem contra pestis contagia utilem esse tradunt. Hanc ob causam ex floribus etiam eiusdem, medicamentum conficiunt, quod Conseruam hodie uocant, quod ad eundem usum adhibent.



COLCHICVM

Zeitlosen mit den blümen.







**COLCHICI**  
**FOLIA ET SEMEN**

Zeitlosen mit bleetern vnd samen.



C

## NOMINA.

Hermodactylus.

Colchicum cur  
dictum.

Ephemerum.



ΟΛΧΙΚΟΝ, ἡ ἐφ' ἡμέρας Græcis, Bulbus agrestis Latinis, officinis & herbarijs Hermodactylus dicitur. Germanis Zeitlosen. Colchicum à Colchide ueneni ferace, in qua nascitur, nomē desumpsit. Dictum uerò est Ephemerum, quoniam uno die sumptum interficiat, atque adeo ab altero Ephemero, quod minimè letale est, & de quo suo loco diximus, non solum figura, uerum etiam facultatibus differt. Etsi uerò Ephemerum Colchicum etiam significet, tamen præcipuè id Ephemerum quod ueneno caret, hoc nomine intelligitur.

## FORMA.

Autumni exitu florem subcandidum, crocino similem profert. Post florem folia Bulbo similia, pinguiora tamen. Caulem palmo altum, rufum ferentē semen. Radicem habentem corticem in nigro rufescentem, quæ cortice suo nudata, alba, tenera, succo plena, & dulcis inuenitur. Habet Bulbus eius in medio rimam fissuramue unde flos erumpit. Huius descriptionis in uniuersum notæ omnes ita Hermodactylo nostro conueniunt, ut nemo, nisi Tiresia cæcior sit, Dioscoridis esse Colchicū ambigere possit. Exitu enim autumnii in pratis florem ædit albicantem, croci floribus similem. Posterius, Februario nimirū mense & primo statim uere, folia Bulbi, sed pinguiora. Caulem palmeū ferentem semen rufum. Radicem cortice in nigro, colore rufescente, quæ decorticata candicat, teneraq; succo plena, & dulcis apparet. Bulbus etiam eiusdem diuisionē in medio obtinet, ex qua flos erumpit, ut pictura exquisitè tibi monstrat. His accedit, quod Serapio Arabs sub nomine Hermodactyli, Dioscoridis Colchicon prorsus depingat. Alium tamen esse à nostro Hermodactylo illum putamus, quem Aëtius, Paulus Aegineta lib. vii. & Actuarius peculiariter & priuatim articulorum doloribus conducere scribunt. Paulus enim separatim tanquam diuersorum mentionē fecit, & de Colchico & Ephemero diuersa ab Hermodactylo capita constituit.

Hermodactylus  
recentiorum gra  
corum.

## LOCVS.

Magnus Colchici in Messenia, & apud Colchos prouentus. Nascitur & passim in omnibus pratis Germaniæ nostræ.

## TEMPVS.

Flores in Autumni exitu, ut diximus, apparent. Folia autem post flores generantur, & primo statim uere è terra erumpunt. Semen in æstate Iunio potissimū mense producitur.

## TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum nonnulli Colchicum in secundo ordine seu à medio recessu statuunt.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Radix eius comesta fungorum modo strangulando enecat. Hanc autem depinximus ne pro Bulbo deuorata aliquem lateat. Mirum est enim quantum ignaros propter suauitatē inuitet. Hæc Dioscorides. Proinde satis liquet Hermodactyli huius nostri usum minimè tutum esse: uenenum enim est, & usq; ad sanguinis excretionem per inferna subducit. Eius tamen, radice potissimum & foliorum, ad enecandos ac abigendos pediculos usus esse potest.

## REMEDIA CONTRA COLCHICVM.

Remedio sunt edentibus quæcunq; contra fungos opem ferunt. Bubulum etiā lac potum, adeo ut quoties hoc affuerit, nullum præterea quærendum præfidiū sit.

## EX PAULO.

Ephemerum, quod nonnulli Colchicon, eò quod in Colchide nascatur, uocant, aut Bulbum agrestem, epotum protinus totum corpus prurire facit, uelut urtica & scilla



A scilla tactum irritatumque interiora erodit, stomachum urit cum ponderosa grauitate. Inualefcente autem malo, cruenta strigmentis mista per aluum egeruntur. Succurrendum, ut Salamandræ, uomitionibus & dysteribus. Sed antequam uires sibi adsciscat uenenum, dari debet foliorum quercus, aut glandiũ, aut malicoriũ, aut serpylli decoctum cum lacte bibendum: aut Polygoni succus, aut surculorum uitis, aut rubi, aut tenerarum ferularum medullæ, aut myrti cum uino. Benefacit etiam castanearum interior tunicula, si cum aliquo è succis, quos prædiximus, assumatur. Origanum quoque cum lixiua potum, in idem efficax est. Adeo uero exactum præsidium est lac uaccinum calidum potum, & simul in ore contentum, ut hoc præsentem nullum aliud desideretur.

## DE CLEMATIDE DAPHNOIDE CAP. CXXXIIII.

## NOMINA.



CLEMATIDIS *Daphnoides* Græcis, Clematis Daphnoides Latinis, Peruinca officinis, Vincaperuinca uulgo nominatur. Germanis, eò quod semper uireat, *Yngrün* / uel *Syngrün*. Clematida Græci, quoniam *κλῆμα* *κλῆμα*, hoc est, sarmenta seu uiticulas per terram spargat, dixerunt. Da-

*Clematis unde dicta.*

phnoida uero à foliorum Lauri, quam eius folia habent, figura. Plinius lib. xxiii. cap. xv. Clematida Ægyptiam nominat: libro autem xxi. cap. xi. Vincamperuin-  
cam, alioque nomine Chamædaphnen dici tradit, quod scilicet humilis uideat Lau-  
rus, ut nomen sonat. Non est autem cur eam Chamædaphnen putes quæ Roma-  
nis Laureola aut Laurago dicta est: hæc enim à Vincaperuinca genere & faculta-  
tibus diuersa est, & seorsim illam Chamædaphnen depingit Plinius lib. xxiii. cap.

*Daphnoides.*

*Chamædaphne.*

B xv. ut hinc manifestissimũ sit Plinio duplicem esse Chamædaphnen. Vnam quam  
sic appellant Dioscorides, Galenus & alij Græci. Alteram quam priuatim Vincam  
peruinca alio nomine uocat Plinius. Sic autem, quod humi serpat, & se in modum  
funiculi porrigat uicina quæque uinciens, appellat.

*Plinio duplex*

*Chamædaphne.*

## FORMA.

Sarmenta oblonga habet, iuncæ crassitudinis. Folium exiguum, Lauro figura  
& colore simile, multo tamen minus. Iam si quis imaginem & effigiem Clematidis  
daphnoidis exquisitius exploret, ea deprehendet esse quæ hodie uulgò Vincaper-  
uinca nominatur. Hæc enim humiles & graciles spargit iuncos, foliaque Lauri figu-  
ra & colore obtinet, multo tamen minora: flore hyacinthino seu in purpuram cœ-  
ruleo, inodoro, rotundo, folijs quinque sed continuis distincto. Ea etiam, ut Plinius ait, semper ui-  
ret, in modum lineæ folijs geniculatim circumdata. Hybernas sua  
perpetua fronde texit coronas.

*Vincaperuinca:*

## LOCVS.

Gignitur pingui, umbroso, lætoque solo, sed inculto, in agrorum uinearumque marginibus.

## TEMPVS.

Hæc etsi nunquam non uirescat, uere tamen duntaxat florescere uidetur, Martio potissimum mense & Aprili.

## TEMPERAMENTVM.

Siccitas in Clematide, Paulo Aegineta teste, cæteris qualitatibus præualet. Id quod gustus etiam ostendit: gustanti enim adstrictionem quandam & amarorem habere uidetur. Adstringit autem modicè, sed fortiter amara est. Siccat itaque, at citra mordicationem.

## VIREs.

## EX DIOSCORIDE.

Huius caules ac folia in uino pota, alui profluvia & dysenterias finiunt. Vteri dolores cum lacte & rosaceo, aut cyprino in pello apposita sanant. Commanducata dentium





CLEMATIS  
DAPHNOIDES.

Sprengel.



A dentium dolorem mitigant. Venenatorum moribus imposita profunt. Feruntur & aspidum moribus cum aceto pota auxiliari.

## EX GALENO.

Clematis daphnoides nequaquam est exulceratoria, neque acris, imò alui profluuijs & dysenterijs cum uino pota prodest, dentiūq; dolores mansa mitigat. Vteri doloribus irpello admotum usui est, tantum abest ut urat aut ulceret.

## EX PAVLO.


Clematis quibusdam Daphnoides, alijs Myrsinoides, nōnullis Polygonoides, farmenta habet praelonga, crassitudine iunci, folium uerò Lauri. Siccandi facultate pollet, qua alui fluores, difficultates intestinorum, & dentium dolores finit, Contra uenenatorum morsus prodest.

## APPENDIX.

Iam cōmemoratae facultates satis ostendūt Clematida daphnoida esse Vincamperuinca: nam codex antiquus manuscriptus, quem in rebus dubijs lubens cito & sequor, easdem prorsus uires Peruincae tribuit. Sanguinis enim ē naribus profluuium mirū in modum prodesse tradit. Item ijs qui sanguinē uomunt aut spuunt. In summa omnem sanguinis fluxum folia eius sistere asserit, ita ut euidentissimum sit Peruinca officinarum eandem esse cum Clematide hac nostra. Quibus etiam accedit pictura & descriptio eiusdem, quae utraque adamussim Peruincae nostrae respondent.

## DE CARDAMO CAP. CXXXV.

## NOMINA.

**B**  **ΑΡΔΑΜΟΝ** graecè, Nasturtiū satium latinè dicitur. Officinis latinum nomen retinuit. Barbari nostrae aetatis herbarij Cressionem hortensem *Cressio hortensis* uocant. Germanicè Gartentress dicitur. Cardamū uerò Graecis nonnulli dictum esse arbitrantur, ἀπὸ τῆς καρδίας, quod cor foueat, & in syncope illa, quam Cardiacam nominant, plurimum ualeat. Alij diuersa ratione usi, sic dictum quod caput edomet, quasi *καρπίδαμον*, putant. Nam arcem mentis obsidens suo ferit acremento, & ignea ui praeditum caput tentat. Sunt ē Graecis qui *καρὰ τὸ ὄψος μύων*, id est, quod pupillas oculorum coeuntibus unā palpebris abscondat, ita dici censeant. Nam luminibus admotum subinde cogit conniuere. A quo, ut uolunt, euentu *καρδάμνη* uerbum declinarunt, quod conniuere nostra lingua dicimus. Nasturtium autem appellatum est, Varrone & Plinio testibus, à naribus torquendis, quod odore & seminis acrimonia sternutamenta prouocet. *Nasturtiū quare appellatum.*

## FORMA.

Nasturtium caulibus assurgit sesquipedalibus, statim à radice minorū foliorum pediculo, floribus candidis, semine per ramorum latera copioso, firmo, calyculis orbicularibus contento, acris sapore.

## LOCVS.

Pasim in hortis satum prouenit.

## TEMPVS.

Floret aestate, Iunio potissimū mense. Sequenti tempore semine praegnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Nasturtij semen calefacit & desiccatur ordine quarto. Herba quoque sicca similem semini facultatem possidet. Humida autem adhuc & uiridis propter aquae humiditatis admisionem multo inferior est, adeoq; sic mordacitas eius moderata est, ut cum pane ea uti liceat ceu obsonio.

h VIRES.





NASTURTIVM  
HORTENSE.

Gartenkreß.



## A VIRES. EX DIOSCORIDE.

Omniū semen calefacit, acre est, & stomacho inimicum. Aluum turbat. Lumbricos pellit. Lienem imminuit. Fœtus in utero enecat. Menses cit. Venerem excitat. Sinapis & Erucae semini simile est. Lepras & impetigines abstergit. Lienem illitum cum inelle extenuat & reprimat, & fauos expurgat. Sorbitionibus incoctum ea quæ in pectore sunt educit. Potum serpentibus aduersatur. Suffitu eandem fugat. Capillos deciduos continet. Carbunculos rumpit ad suppurationem ducens. Ischiadicis cum polenta & aceto illitum confert. Oedemata & inflammationes discutit. Furunculos cum muria illitū ad suppurationes ducit. Herba omnia eadem, sed minore effectu, potest.

## EX GALENO.

Nasturtij semen adurentis est facultatis particeps sicut Sinapi. Proinde coxendicis & capitis dolores, atque adeo quodcunque rubrificationē postulat, eo perinde atque Sinapi excalefaciunt. Miscetur quoque remedijs quæ exhibentur asthmaticis, tanquam id quod crassos humores ualenter incidere ualet, uelut & Sinapi. Nam per omnia ei simile est.

## EX PLINIO.

Nasturtium Venerem stimulat, animum exacuit, aluum purgat. Detrahit bilem potum in aqua decem denariorū pondo. Cum lomento strumis illitum, operumque Brassica, præclare medetur. Capitis uitia purgat, uisum clarificat. Cōmotas mentes sedat ex aceto sumptū. Lienem ex uino potum, uel cum fico extenuat. Tusim ex melle, si quotidie ieiuni sumant. Semen ex uino omnia intestinorū animalia expellit, efficacius addito Mentaistro. Prodest & contra suspiria cum Origano & uino dulci. Pectoris doloribus decoctum in lacte caprino. Panos discutit cum pice, extrahitque corpori aculeos. Et maculas illitum ex aceto. Contra carcinomata adijcitur ouorum album. Et lienibus illinitur ex aceto. Infantibus uero ē melle utilissimē. Sestius adijcit hoc serpentes fugare, scorpionibus resistere. Capitis dolores contritum, & alopecias emendare addito Sinapi: grauitatē aurium trito imposito auribus cum fico. Dentium dolores infuso in aures succo. Porriginem & ulcera capitis cum adipe anserino. Furunculos concoquit cum fermento. Carbunculos ad suppurationē perducit & rumpit. Phagedænas ulcerum expurgat cum melle. Coxendicibus & lumbis cum polenta ex aceto illinitur. Item licheni & unguibus scabris: quippe natura eius caustica est.

## DE CRINO CAP. CXXXVI.

## NOMINA.



PINON καὶ λείων Græcis, Liliū siue Iunonis rosa Latinis, Liliū album officinis, weiß Lilgen / oder Gilgen Germanis, dicitur. Veteres Græcorū poetæ fingunt ē Iunonis lacte respersa terra natum Liliū. Nancq; cum Hercules puer, quem ex Alcmena sustulerat Iupiter, Iunonis dormientis uberibus admotus esset, & lacte se repleisset, post suctum digressus mamma lacte copiose profluxit. Quod in celo à puero uago & incerto suctu perfulsum est, lacteam effecit uiam: quod humi sparsum est, Liliū lacteo flore nitentē creauit, unde rosa Iunonis dictum.

Iunonis rosa quare dictum Liliū.

## FORMA.

Liliū caule simplici, raro duplici, tricubitali, comoso, folijs longis, Satyrii effigie, ex herbaceo nitentibus, flore eximij candoris, folijs foris striatis, & ab angustijs in latitudinem se paulatim laxantibus, forma calathi, resupinis per ambitum labris, luteis emicantibus ex fundo calycis apicibus, alterius quàm flos odoris, constat.

h 2 Flos





LILIUM

Weiß Lilgen.





LILIVM  
CROCEVM.

Soldtgilg.

h 3



C Flos ille languido semper collo est, nō sufficiente capitis oneri. Radix bulbosa. Hęc descriptio planē huic Lilio cōuenit, quod hodie candidum uocamus. Nos alterius etiam generis picturam adiecimus, quod Croceum appellauimus, à flore eius, qui non, ut in priore, candidus, sed croceus est. Folia quoq; eius angustiora sunt quàm prioris, aliās simile, ut pictura luculenter ostendit.

## LOCVS.

Pasim apud nos in hortis prouenit.

## TEMPVS.

Floret initio mensis Iunij.

## TEMPERAMENTVM.

Lilij flos temperaturā mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua utiq; in gustu amaritudinē habet, partim ex aquea, eaq; temperata. Radix autem & folia primi ordinis sunt exiccantiū & abstergentium. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice quàm in folijs.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

*Lirinum oleum.*

Ex Lilij flore unguentū fit quod ab alijs Lirinum, ab alijs Susinum appellatur, ad emolliendos neruos, priuatimq; uuluarum durities aptum. Folia herbę illita, serpentium morsibus subueniunt. Feruefacta ambustis profunt. Eadem in aceto condita uulneribus opitulantur. Succus foliorum cum aceto & melle in æreo uase coctus, cōtra uetusta ulcera, & recentia uulnera medicamentū fit. Radix assa, aut cum rosaceo trita ambustis medetur, uuluam emollit, menstrua ducit, & ulceribus cicatricem inducit. Cum melle subacta neruorum præcisionibus & luxatis auxiliatur. Alphos, lepras, furfuresq; emendat. Achores abstergit, faciemq; emendat & erugat. Testiculorū inflammationes trita cum aceto, aut Hyoscyami folijs, & farina triticea demulcet. Semen contra serpentū morsus potum ualet. Illinuntur sacris ignibus semen & folia cum uino trita.

## EX GALENO.

Quod ex flore Lilij conficitur oleum & unguentum, citra mordicationem digerendi simulq; emolliendi facultatem obtinet. Vnde fit ut uteri duritiēbus sit aptissimum. Porro radix foliaq; per se trita desiccant & abstergunt & digerunt moderatē: proinde quoque ambustis competunt: siquidem hæc quoq; moderatē desiccantem extergentemq; facultatem postulāt. Radicem ergo assam tostāmue, ac deinde cum rosaceo cōtritā, ambustis quoad obducatur cicatrix imponunt: quippe cum alioqui & aliorum ulcerum omniū bonum sit inducendæ cicatrici remediū. Quinetiam uteros emollit, mensesq; prouocat. Folia uerò præcoquentes, & ipsa ad obductam usq; cicatricem imponunt, non in ambustionibus duntaxat, sed alijs quoq; uulneribus. Sed sunt qui aceto ea cōdientes ad uulnera suo tempore utant. Quum alphos, aut pforam, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere uolumus, cōmiscemus illi aliquid aliorum medicamentorū ualidius extergentiū, cuiusmodi mel est. Cæterū si id moderatē illi ac cōuenienter admisceatur, & ad neruorū diuisiones competit, & ad alia uniuersa quæ ualenter exiccari postulant absq; morfu. Imposuimus uerò etiam quandoq; & foliorū succum cum aceto & melle coctū. Quinque partibus succi plus utroq; erat, atq; insigne medicamen ad omnia ea quæ exiccari postulant absq; morfu fuit, ceu uulnera omnia ingentia, & maximē quæ in capitibus musculorū cūeniunt, & quæcunq; humida flaccidæ, diuturna & agrē ad cicatricem perducuntur.

## EX PLINIO.

Lilij radices multis modis florem suum nobilitauerunt, contra serpentium ictus ex uino potæ, & contra fungorum uenena. Propter clauos pedum in uino decoquantur,



Aquuntur, triduoq̃ non soluuntur. Cum adipe aut oleo decoctæ pilos adustis reddunt. E mulso potæ inutilem sanguinem cum aluo trahunt. Lienis & ruptis & uulsis profunt. Et menstruis foeminarum in uino decoctæ. Impositæq̃ cum melle neruis præcis medentur. Lichenas, lepras & furfures in facie emendant. Erugant corpora. Folia in aceto cocta uulneribus imponuntur. Epiphoris testiu in melle cum Hyoscyamo & farina tritici. Semen illinitur igni sacro. Flos & folia ulcerum uetustati imponuntur. Succus qui flore expressus est ab alijs mel, ab alijs syrium uocatur, ad emolliendas uulvas utilis. Sudores mouet, suppurationes concoquit.

## EX SYMEONE SETHI.

Odoratum frigido capiti prodest. Oleum uerò quod ex ipso paratur, uim habet discutiendi & emolliendi. Huius autem radice quidam utuntur ad uulnerum sanationem.

## DE CUCURBITA SATIVA. CAP. CXXXVII.

## NOMINA.



ΚΑΟΥΝΘΑ ἰσώδης Græcis, Cucurbita Latinis uocatur: officinæ latinum nomen retinuerunt. Germanis Kürbß. Græci ex aduerso uocabulum imposuere, καλαμύθην nominantes, quod scilicet pumili breuesq̃ sint partus, quos ipsa passim enititur, cum tamen corporis mole omnes herbarum arborumq̃ fructus uideantur superare. Cucurbita uerò Latini à concuryatu haud dubie dixerunt, quod facile si quid obstitit aut fuerit impedimento quo minus extendatur, incurvescat.

καλαμύθα quare nominata.

Cucurbita concuryata dicta.

## GENERA.

B Plinius lib. xix. cap. v. duo satiuæ Cucurbitæ genera facit. Vnam camerariâ uocatam, quæ facili & admodum flexibili ramorum curuitate, tecta, pergulas & testudines operit. Alterâ plebeiam, quæ scilicet suis flagellis humi repit. Nos ad formam respicientes tria eiusdem genera fecimus. Vnam maiorem, altera uerò minorem. Maiorem uocauimus sic à floribus & fructu, quos maiores habet. Minorem contra, quæ prædicta minora obtinet. Tertiam longiorē, à fructu oblongiore diximus.

## FORMA.

Cucurbita amplexicaulis est, reptantibus flagellis in altum scandens, in ramosq̃ uitis modo se diffundit: tamen ob caulis infirmitatē, humi spargitur, nisi propius adsit cui caducus innitatur: folio rotundo, Personatiæ aut Alari folijs haud dissimili: flore candido, fructu coloris herbacei primum, flauo paulò post, pyri forma turbinato, qui aut in longum prorogatur, aut in orbem collectus intumescit, aut in breue crassamentum cogitur. Cortex recenti tener, inueterato durus, quo carne prius exinanito peregre proficiscentes urceorum uice frequenter utuntur in eo uina condentes, quo per iter se à suis iniuria uindicare possint.

## LOCVS.

Amat rigua & aquosa loca Cucurbita, nec nisi fata prouenit.

## TEMPVS.

Tardius in Germania ob soli frigiditatem fructus Cucurbitæ maturescit, ideoq̃ uix ante exactum autumnum maturum eius fructum inuenies. Cibus autem quotidianus, donec lignescat, esse potest.

## TEMPERAMENTVM.

Cucurbita frigida & humidaq̃ temperaturæ est, utraq̃ qualitate secundi ordinis.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Cucurbita cruda trita & illita, oedemata, abscessusq̃ mitigat. Ramenta eius

h 4 infan-





CUCURBITA  
MAIOR.  
Groß Kürbis.



369



CUCURBITA  
MINOR.  
Klein Kürbis.



370



CUCURBITA  
OBLONGA.  
Lang Kürbis.



**A** infantibus contra capitis ardorem, quam siriasin uocant, in sincipite utiliter illinuntur. Oculorū inflammationes, podagrasq; similiter iuuant. Succus è ramentis contusis per se, & cum rosaceo instillatus, aurium doloribus auxiliatur. Aduersiones cutis inunctus adiuuat. Totius Cucurbitæ elixæ & expressæ succus cum exiguo melle & nitro potus, aluum leniter soluit. Si quis in Cucurbitā crudam excavatā uinū infundat, & sub dio habeat, temperatumq; ieiunus bibat, aluum leniter molliet.

## EX GALENO.

Succus ramentorū Cucurbitæ ad aurium dolores cum phlegmone iunctos, cum rosaceo utentibus prodest. Sic tota quoq; illita calidas phlegmonas mediocriter refrigerat. Comesta humida est, & sitim arcet. Cruda cibo insuauis est, stomacho perniciofa, & concoctu planè inexpugnabilis, adeò ut si quis alterius cibi inopiaingere eam cōpellatur, ceu quidam iam ausus est, pondus cum algore uentriculo incumbere sit sensurus, stomachumq; euerteret, & ad uomitionē concitabit, quæ una eum ab urgentibus symptomatis liberare potest. Hanc igitur, aliāq; ex fugacibus cōplura, aut mōx quā elixata est, aut frictam in sartagine, aut assam omnes homines esse consueuerunt. Ipsa quantum in se est, humidū frigidumq; corpori alimentū præbet, ac id ipsum ea de causa exiguum, sed leuiter per aluum subit, cum ob suæ substantiæ lubricitatem, tum ob cōmunem omnium humidorū ciborū rationem, qui scilicet citra adstrictiones tales sunt. Nec sanè infeliciter cōcoquitur, modo non anteuertat corruptio. Plura lib. ij. de aliment. facult. Galenus.

## EX PLINIO VALERIANO.

Veteres medici de Cucurbita ita senserunt, ut eam aquam dicerent coagulatā. Galenus humidæ putat uirtutis & frigidæ, idq; ex eo probat, quod ipsa in cibo sumpta stomachū relaxat, bibendi desideria non excitat. Cætera etiam in Cucurbita talia ut apertè frigidæ potestatis exempla demonstret. Crudæ & tritæ leniunt omnē tumorem. In cibo sumptæ molliunt uentrem. Succus earum, ut Galenus ait, ad cōpescendum uelociter auriculæ dolorem tepesfactus infunditur. Idem succus & dolorem dentiū mitigat, si diutius in ore teneatur. Sed & rosaceo mixtus, & unctioni corporis admotus, febriū restinguit ardores. Cinis aridæ corticis efficaciter potest combusta sanare. Eundem cinerē didicimus ab expertis uulnera in ueretro iam in putredinem uersa purgare, & ad cicatricem usq; perducere. Semini sicco illa uis traditur, ut in puluerem tufum & inspersum impleat uulnera quæ cauata sunt. Quidam illud in uino bibendum dedere, ut solutiones alui fluentis inhiiberet. Viticulæ quoq; Cucurbitæ iam senescentes cum passo & aceto dysentericis datæ, miro modo saucia intestina componunt.

## EX SYMEONE SETHI.

Concoctu facilis, boniq; succi est, & admodū nutrit. Sitim sedat, urinā cit, & uentrem mouet. Calidis & siccis tēperaturis prodest, & inflāmationes uentris & iccoris sedat. Pituitosos autem lædit, colicosq; affectus. Si malos humores assequitur, ab ijs corrumpitur, & malum succum generat. Semen genitale minuit, & Veneris appetentiam extinguat. Sanguis ex ea procreatus, consistentia tenuis est. Thoraci, pulmonī & uesicæ prodest. Succus ramentorum eius, cum rosaceo impositus, ad aures inflammatione laborantes confert. Integra uerò illita, calidas inflammationes refrigerat.





COLOCYNTHIS  
Coloquint.



## NOMINA.



**K**ΟΛΟΚΥΝΘΙΣ Græcis, syluestris Cucurbita Latinis, Coloquintida *Coloquintida.*  
 barbaris & officinis, Germanis wilder Kürbß/ uel Coloquint appel-  
 latur. Sic autem nominata est, quasi parua Cucurbita. Nam si eius fru- *Colocynthis uno*  
 ctum cum fructu satiuæ contuleris, quantitate longe minor erit, ac pilæ *de dulcia.*  
 forma in orbem coactus.

## FORMA.

Vitulas foliaq; per terram strata emittit, satiuo Cucumeri, ei nimirum quem Citrulum hodie officinæ uocant, similia, diuisuris scissa, fructum rotundū, medio-cri pilæ similem, uehementer amarum, fungosa candidaq; intus medulla: flores, quod Dioscorides omisit, pallescentes ac luteos, Cucumeri iam nominato similes.

## LOCVS.

In Germania sua sponte non nascitur, fata tamen prouenit, sed rarissimè perfectiōnem attingit, quod frigidior sit eius terra quàm quod in ea fructum proferre possit. In orientalibus enim & calidioribus locis nata ad nos defertur.

## TEMPVS.

Eius flores in fine ferè estatis, fructus autem extremo autumno apparent, qui primum quidem herbacei, mox pallidi fiunt. Legendi uerò sunt cum cœperint in pallidiorem colorem demutari. Et durat integris natura & uiribus ad quinque annos.

## TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccat in tertio ordine.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Medulla fructus purgandi uim habet, quatuor obolorum pondere cum mulsâ aqua sumpta, & cum nitro, myrrha & melle coacta in catapotium. Arefactæ pilæ *B* tritæ, utiliter miscentur clysteribus ischiadicorum, resolutionis neruorum, & colico dolore affectorum, pituitam, bilem & strigmenta, interdum etiam cruenta educentes. Appositæ foetus enecant. Dentium dolores, si quis repurget hanc, & luto oblinat, & in aceto nitroq; inferuescat, & ad colluendos dentes det, tollit. Si uerò quis aquam mulsam aut passum in ea decoxerit, & sub dio refrigeratum bibendum dederit, crassos humores & strigmenta purgat. Stomacho supra modum aduerfatur. Sedi etiam ex ea balani subiiciuntur, ad excrementa eijcienda. Quinetiâ uirentis succo, ischiadici utiliter perfricantur.

## EX GALENO.

Colocynthis gustu amara est. Sed quæ amarissimo dum potatur adsunt opera medicamento, ea euidenter efficere nequit, ob purgatoriam facultatem quam ualidam in se continet, nimirum cum ijs quæ expurgat, per aluum & ipsa excerni præuertens. Viridis ipsius succus intritus ischiadicis prodest.

## EX PLINIO.

Herbacea arefacta per se inanit aluum. Infusa quoque clysteribus intestinorum omnium uitij medetur, & renum, & lumborum, & paralyti eiecto semine. Aqua mulsâ in ea decoquitur ad dimidias, sic tussienti infunditur obolis quatuor. Prodest & stomacho, farinæ aridæ pilulis cum decocto melle sumptis. In morbo uerò regio utiliter semina eius insumuntur, & protinus aqua mulsâ. Carnes eius cum ablinthio & sale dentium dolorem tollunt. Succus uerò cum aceto calefactus mobilis sistit. Item spinæ & lumborum ac coxarum dolores, cum oleo si infricetur. Præ-

terea, mirum dictu, semina eius si fuerint pari numero adalligata febribus, sanare dicuntur quas Græci periodicas uocant.



374



COTONEA  
MALVA.

Rüthenbaum.



A

## NOMINA.



ΚΥΔΩΝΙΑ *μάλια* Græcis, Mâlus Cotonea & Cydonia Latinis, officinis Citonia, Germanis *Rüthenbaum* nominatur. Cydoniam uerò Græci à Cydone Cretæ oppido, unde primum aduecta est, dixerunt. Cotonia uerò à Sidonte Corinthi uico nominata est. Sunt tamen qui sic uocatam uelint, quod mâla eius lana quadam regi uideantur, quæ cotton dicitur. At qui in re non admodum magni momenti, parum refert utram amplectaris sententiã.

*Cydonia unde dicta.*  
*Cotonea.*

## GENERA.

Cotoneæ arboris mâla Dioscoride & Galeno autoribus duum sunt generum. Alia enim minora, rotunda, odoratiores sunt, quæ uera Cotonea appellantur. Alia autem maiora, dulciora, ac minus acerba, Galeno in fine libri sexti de tuenda sanitate teste, Struthea nuncupantur.

*Struthea.*

## FORMA.

Arbor notior est quam ut debeat representari. Mâlo uulgari haud dissimilis est, nisi quod infra magnitudinem illius subsidet, fructu scilicet incuruatos deprimentes ramos, prohibentesque parentem crescere. Folium quoque eius angustius à terra albicat. Poma tenui lanugine pubescunt, & incisuris crispantur, ut pictura affabre ostendit.

## LOCVS.

In cultis & hortis prouenit. Locum tamē peculiariter & frigidum & humidum desiderat. Si in calido statuitur, assidua irrigatione illi succurri opus est: fert tamen mediocris situs, inter frigoris & caloris naturam, statum. Planis & decliuus gaudet.

## TEMPVS.

Autumno poma eius maturescunt.

B

## TEMPERAMENTVM.

Mâla Cotonea frigido & terrestri temperamento donata sunt, propterque uincen-tem adstrictionem minus cæteris mâlis humida existunt. Frigida itaque sunt primo ordine, & sicca secundo.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Cotonea stomacho accommodata sunt, urinam mouent. Tosta mitiora fiunt. Cœliacis, dysentericis, purulenta excreantibus, cholericis profunt, præsertim cruda. Maceratorum liquor potus stomachi atque alui fluxionibus opitulatur. Succus crudorum assumptus orthopnoicis auxilio est. Decocto eorum sedes & uulua procidentibus proluuntur. Quæ melle condiuntur, urinam cient, mel autem naturam eorum induit: quippe adstringens & conspissans obstruensue fit. Quæ autem cum melle coquunt, stomacho utilia sunt, & gustu iucunda, minus autem cōstringunt. Cruda cataplasmatibus miscentur ad cohibendam aluum, contraque stomachi subuersionem & ardorem, mammarum inflammationes, lienes induratos & cōdylomata. Fit uinum ex his tuis & expressis, sed quo perduret, sedecim sextariis succi, unus mellis adijcitur, alioqui acescit. Prodest autem ad omnia quæ dicta sunt. Unguentum etiam ex ipsis cōficitur, quod Melinum appellatur, quo utimur quando adstringenti oleo opus est. Eligi oportet uera, quæ parua, rotunda & odorata sunt. Struthea autem uocata & magna, minus utilia. Flos & uiridis & siccus cataplasmatibus utilis, his potissimum quæ adstrictionem desiderant conueniens. Inflammationibus oculorum, sanguinis reiectionibus, alui fluxionibus, mensiumque impetui cum uino potus prodest.

*Unguentum melinum.*

## EX GALENO.

Eximium quid Cotonea præ alijs mâlis possident: nam & plus adstringunt, & durabilem succum habent, si cocta cum melle asseruare quis cupiat. Aliorum succus



**C**repositus accescit, utpote frigida humiditate multa redundans. Strutheorum quoque succus perennare potest ubi recte fuerit praeparatus, quemadmodum & Cotoneorum: uerum hic minus suauis & iucundus est, maximeque adstringit, ita ut huius quoque aliquando usus sit idoneus ad uentris maiorem in modum dissoluti robur restituendum.

## EX PLINIO.

Cotonea cocta suauiora. Cruda tamen duntaxat matura, prosunt sanguine excreantibus, ac dysentericis, cholericis, coeliacis. Non idem possunt decocta, quoniam amittunt costringentem illam uim succi. Imponunt & pectori in febris ardoribus, & tum decoquuntur in aqua, ad eadem quae superscripta sunt. Ad stomachi autem dolores cruda decoctaue cerati modo imponuntur. Lanugo eorum carbunculos sanat, cocta in uino, & illita cum cera. Alopecij capillum reddunt. Quae ex his cruda in melle condiuntur, urinam mouent. Mellis autem suauitati multum adijciunt, stomachoque id utilius faciunt. Quae uero in melle condiuntur cocta, quidam ad stomachi uitia trita cum rosaceo folijs decoctis dant pro cibo. Succus crudorum lienibus, orthopnoicis, hydropicis prodest. Item mammis, condylomatis, uaricibus. Flos & uiridis & siccus, inflammationibus oculorum, excreationibus sanguinis, mensibus mulierum. Fit & succus ex his mitis, cum uino dulci tusus, utilis & coeliacis & iecinori. Decocto quoque eorum fouentur, si procidant uuluae & interanea. Fit & oleum ex his, quod Melinum uocauimus, quoties non fuerint in humidis nata. Minus utilia Struthea, quamuis cognata.

## EX SYMEONE SETHI.

Stomachum adstringunt & corroborant, & ante cibum sumpta uentrem cohibent, urinam prouocant. Si ad satietatem edantur, difficulter decoquuntur. Dulcia minus adstringunt, acida uero magis, uomitumque compescunt. Post cibum sumpta uentrem mouent: sed quibus est imbecilla facultas uentris retentrix, & excretrix ualida, plus cibi accipiant. Mansa a potu, uini uapore in caput distribui prohibent. Si qua praegrans, ut fertur, crebrius haec comedat, puerum industrium & uersutum pariet.

## DE CASTANEA CAP. CXL

## NOMINA.

**C**ASTANA, ἢ δὴς βάλαν, ἢ σαρδανία βάλαν, ἢ λέπινυρ Græcis: Castanea, Sardiana glans, Iouis glans, Nuxque castanea Latinis appellatur. Germanis nostris Castani/uel Kesten uocant. Castaneæ autem a Castano Magnesiæ oppido, unde primum aduectæ sunt, nominatas esse constat. Sardianæ uero glandes, quoniam in Sardinia optimæ nascuntur.

Castaneæ unde  
dicte.

Sardianæ glan-  
des.

## FORMA.

Arbor est uulgo cognita, Iuglandi haudquaquam dissimilis, folio tantum uenosiore & fimbriato. Nux quam producit intus solida, & plurimum plana, triplici tegminis ambitu septa, membrana primum amara, mox lento cortice, demum echinato calyce.

## LOCVS.

Puram & resolutam terram desiderat, opacoque & septentrionali cliuo læta. Montes & ualles diligit. In plerisque Germaniæ locis copiosissima prouenit.

## TEMPVS.

Ineunte uere germinat, seriusque Vergiliarum occasu fructificat.

## TEMPERAMENTVM.

Adstringit & exiccat Castanea haud secus quam aliæ glandes. Calida uero & sicca est primo ordine.

## VIRES.





CASTANEA

Resten.



## C VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Castaneæ adstringunt, eademq; quæ glandes possunt. Potissimū autem quæ inter carnem & corticem membrana est. Caro his qui Ephemeron, hoc est, Colchicon, biberunt, accommodata est.

## EX GALENO.

Castaneæ inter omnes glandes principatum tenent, solæq; syluestrium fructuū alimentum memorabile corporibus præbent.

## EX PLINIO.

Castaneæ uehementer sistunt stomachi & uentris fluxiones, sanguinē excreantibus profunt, carnes alunt.

## EX PLINIO VALERIANO.

Castaneæ ex omnibus fortissimū quidem cibum corpori præstant, sed qui difficile concoquatur. Coctæ autem in carbonibus, uel in fictili uase sicco assatæ, & cum melle ieiunis datæ, tussientibus profunt. Aqua in qua cum suo cortice decoquuntur, eccliacis, dysentericis, sanguinemq; excreantibus bibenda haud inutiliter propinat. Interior membrana quæ corticē fructumq; discernit, ad tertiam partem decocta in aqua & potui oblata, mirè aluum fluentē refrenat, adeò ut Dioscorides putet etiam cathartico dato, per hanc potionem iri obuiam posse, si plusquā necesse sit, purget.

## EX SYMEONE SETHI.

Copiosum corpori alimentum præbent, tardè transeunt, & difficulter coquuntur. Crassum humorē, capitis dolorem, & flatu efficiunt, uentremq; sistunt. Si torreantur, aut siccentur, multum nocuenti deponunt.

## APPENDIX.

Capitis dolores creant. Inflationes pariunt, cōcoctu difficiles. Tostæ tamen crudis innocentiores sunt. Arefactæ multum noxæ remittunt. Tritæ cum melle & sale rabiosorum canum morsibus imponuntur. Mammarū duritias discutiunt, cum hordeaceo polline & aceto impositæ, ijsq; uino maceratis, & cum farina subactis, pelsi uice utuntur ad suppressendos menses.

## DE CARYO BASILICO CAP. CXLI.

## NOMINA.

Caryon iande  
Græci appellat.  
larint.



Basilica & Persica  
dicitur.

Iuglans.

ΚΑΡΥΟΝ βασιλικόν Græcis, Regia nux & Persica, Iuglansq; Latinis: officinis Nux simpliciter, Germanis Welschnuß appellatur. Καρυον autem Græcis à capitis grauedine uocatam esse notissimum est. Nam folia arboris huius grauem expirant halitū, uiresq; eius in cerebrum penetrāt, atque adeo eos sopore tentans lædit qui sub arbore decubuerint. Basilicā uerò, Regiamue & Persicam, eò quod è Perside primum in Græciam à regibus delata sit, dictam esse constat. Iuglandem à iuuando & glande nominatam existimant.

## FORMA.

Vmbra Iuglandis  
diu arboris infusa  
lubris.

Arbor est prægrandis, multis prælongisq; nixa radicibus, procero caudice, multis summatim ramis ingentibus brachiato, ad binū ternūue cubitorū complexus sæpius crassescente, cortice hiulco, & in rimas altas dehiscente, folijs latis, oblongis, è iucundo grauius subolentibus, patulamq; iaculantibus umbram & infalubrem, per autumnum deciduis. Verni temporis initio ueluti quodam gestiente foliorum conceptu, panicula prælonga, callo squamatim compactili protracta, ordine nucis pineæ protuberat, dehiscitq;. Flauescens statim quàm frondem facere cœpit, nutans caducaq; prolabitur. Tum super ramenti huius pediculū flos erumpit, totidemq; calyculacea tegumenta quot flores petiolo contrahuntur, singulisq; ijs singulæ includuntur nuges, multis munitæ inuolucris, primum herbaceo cortice, mox ligneo putamine, dein tenui tunica. Crispi intus nuclei quadripartitò digerun-





IVGLANS

Welschnuß.

i 4



C geruntur, lignosa intercedente membrana.

LOCVS.

Montibus læta, aquasq̃ odit. Palsim in omnib. ferè Germaniq̃ hortis prouenit.

TEMPVS.

Germinat post afflatum Fauonij, non cacumine, ut maxima pars arborum, sed lateribus impulso priore pullulo. Fructificat autumno.

TEMPERAMENTVM.

Huius temperamentum ex uirium enarratione patebit. Virides uerò nuces primo ordine siccae, secundo uerò calidae censentur.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Nuces iuglandes difficiles cōcoctu, stomacho inutiles, bilem augent, capitis dolorem faciunt, tussientibus inimicæ. Ad uomitiones ieiunis in cibo utiles. Præsumptæ & à cibo comestæ cum caricis & ruta letalibus uenenis aduersantur. Largius esitata latos lumbricos pellunt. Illinuntur mammarū inflammationi, abscessibus, luxatisq̃ cum exiguo melle & ruta. Cum cepa uerò, sale & melle, canis hominisq̃ morfui conferunt. Tormina cum putamine suo crematæ & umbilico admotæ sedant. Cortex combustus, tritusq̃ in uino & oleo, infantibus inunctus capillos elegantes efficit, alopeciasq̃ replet. Sistit menses crematum tritumq̃, & cum uino admotum quod intra nūces clauditur. Vetustarū autem nucum nuclei illiti, gangrænas, carbunculos, ægilopas & alopecias cōmanducati & impositi celeriter sanant. Fit etiam ex ijs contulis & exprelsīs oleum. Recentes nuces stomacho minus nocent, dulciores enim sunt. Quam ob causam allijs miscentur, ut acrimoniam auferant. Illitu liuores quoque tollunt.

EX GALENO.

D Arbor tum in germinibus, tum in folijs adstrictionem quandam possidet. Cæterum euidentem & plurimam in nucis putamine recenti & sicco: proinde eo fullo-  
*† Aliis in xero-  
rou, in bilem  
acritur.* nes quoq̃ utuntur. At nos ea exprimentes, succo similiter ut mororum & ruborū decocto in melle, ut stomatico medicamento utimur, & ad omnia reliqua ad quæ modo dicti succi cōueniunt. Porro nucis ipsius quod edendo est, oleosum est & tenuium partium, ideoq̃ etiam facile † exprimitur: & quo diutius reconditum fuerit, magis tale efficitur. Quamobrè oleum ex eo inueterato exprimere licet: tunc sanè admodum discutiens fit, ut eo nōnulli gangrænas, & carbunculos, & ægilopas sanent: nōnulli uerò etiam ad neruos uulneratos utuntur. Cæterum si recens sit adstringentis nōnihil qualitatis quoq̃ obtinet. At quod imperfectū est etiamdum, & nondum siccum, ueluti reliqui fructus omnes qui uirides sunt, plenum est semico-  
 gæ humiditatis. Cortex tamen eius ubi inaruit, tenuium partium & exiccatoriū est medicamentum, morfus expers.

EX PLINIO.

Arborum ipsarum foliorumq̃ uires, in cerebrū penetrant, hocq̃ minore momento, sed in cibis, nuclei faciūt. Sunt autem recentes iucundiores, siccae unguinosiores, & stomacho inutiles, difficiles cōcoctu, dolorē capitis inferentes, tussientibus inimicæ, & uomituris ieiunis aptæ in tenasmo solo: trahunt enim pituitā. Eædem præsumptæ uenena hebetant. Item anginam cum ruta & oleo. Item aduersantur cepis, leniuntq̃ earum saporem. Auriū inflammationi imponuntur cum mellis exiguo. Item cum ruta mammis & luxatis. Cum cepa autē & sale & melle, canis hominisq̃ morfui. Putamine nucis iuglandis, dens cauus inuritur. Putamen combustum tritumq̃ in oleo aut uino, infantīū capite peruncto, nutrit capillum: & ad alopecias sic utuntur. Quo plures quis nuces ederit, hoc facilius tineas pellit. Et quæ perueteres sunt nuces gangrænis & carbunculis medentur. Item sugillatis. Cortex iuglandiū lichenum uitio & dysentericis prodest. Folia trita cum aceto, aurium dolori. In sanctuarijs Mithridatis maximi Regis deuicti, Cn. Pompeius inuenit in peculiari cō-  
 menta-



**A** mentario ipsius manu compositionē antidoti, duabus nucibus siccis, item ficis totidem, & rutæ folijs uiginti simul tritis, addito salis grano: & qui hoc ieiunus sumat, nullum uenenum nociturum illo die. Contra rabiosi quoque canis morsus, nuclei à ieiuno homine cōmanducati illitiq̃, præsenti remedio esse dicuntur.

EX PLINIO VALERIANO.

Nux uiridis, utpote adhuc aquatioris humoris, styptica & frigida uirtute censet̃. Potest deniq̃ & stomacho aliquid uigoris acquirere, & uentrē cum garo sumpta mollire. Noces autē siccae, durę, cum caricis duabus, & uiginti rutæ folijs addito salis grano simul cōteruntur, nullisq̃ uenenis opprimi poterit ea die quisquis ieiunus acceperit. Inter Calendas & Idus Iulij centum numero noces statim ut arbori demptæ sunt cortice adhærente quassantur: his admiscuntur aluminis scissi libræ tres, & in nouo fictili uase ponuntur: super hæc infunduntur olei boni libræ tres, & diligenter in loco neq̃ humido, neq̃ nimium sicco obruunt̃, post nonaginta dies dabunt oleum, quod fluentium capillorum damna restituit.

EX SYMBONE SETHI.

Virides uentrem mouent, quamobrē quidam ante cibum cum sapo comedunt. Facilius etiam quàm amygdalæ concoquuntur. Aridæ in ore inflammationes & plagas efficiunt. Stomacho meliores fiunt, si cum caricis edantur. Ferunt etiam eum qui noces cum caricis & ruta ante reliquos cibos esitauerit, non magnopere à uenenatis medicamentis lædi. Cōcoquuntur faciliē noces in frigidis uentriculis, in calidis uerò in bilem magis mutantur. Faucium & capitis dolorem afferunt, & tussēs augent. Ante alios cibos sumptæ, uomitum adiuuant. Ad satietatem comestas, lumbricos educere scimus. Ad dentium pruritum utiles sunt.

## **B** DE CALTHA CAP. CXLII

NOMINA.



VO nomine Græci plantam hanc appellauerint, fateor ingenue mihi nondum constare. Latinis autem dicta uidetur Caltha uel Calthula, quam uocē deinde corrumpentes officinę, in Calendulam immutarūt. Quamquam uerisimile etiam sit, sic nominatam esse, quod omnibus mensium Calendis fruticare comperiatur. Atque hinc fit quod nonnulli florem omnium mensium appellent. Germani Ringelblumen uocant, ab intorto, & in circulum acto semine.

*Calendula quare dicta.*

*Flos omnium mensium.*

FORMA.

Herba est fruticosa, caule dodrantali, lignoso, folijs longiusculis, in angustum desinentibus, floribus speciosis, croceis luteisque, non ingrati, quamuis grauis, odoris, qua dote in coronamenta uenit; semine, cuius uagina scorpionis caudam imitatur: radice simplici, multo capillitio fibrata. Cur autem hanc herbam Caltham esse credam, facit inprimis Plinius, qui lib. uigesimoprimo, capite sexto, Caltham odore grauem esse scribit. Dein Virgilius qui Ægloga secunda sic canit: Mollia luteola pingit uacinia Caltha. Luteolam, à luteo florū haud dubiē colore, nominans.

LOCVS.

Prouenit in cultis, atq̃ uix hortum inuenies in quo non copiose nascatur.

TEMPVS.

Singulis ferē mensium Calendis, ut diximus, florere deprehenditur, Maio incipiens mense. Magis autem autumnō eiusdem emicant flores.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse statuunt, neq̃ id immeritō, quandoquidē dulcedine modica cum amaritudine coniuncta participet.

VIREB





CALTHA

Ringelblüm.



## A VIRES EX RECENTIORIBVS.

Herba ipsa adhibetur condimentis & acetarijs. Flos ex uino potus ciet menses: item herbae succus, quo in dentium dolore os presentaneo remedio colluitur. Non parum etiam eius flos ad flauos reddendos capillos conducit. Idem, perinde atque ipsa herba, secundas educit mirificè, si aridus suffribus admotus fuerit.

## DE CARYOPHYLLATA CAP. CXLIII.

## NOMINA.



VALITER Græcis & antiquis Latinis scriptoribus hæc herba nominata sit, nondum compertum habeo. Cur enim Dioscoridis Lagopum *Caryophyllata* non esse credam, etsi paniculum pedi leporino prorsus similem habeat, *nō est Lagopus.* facit quod in manuscripto & peruetusto herbario seorsim descripta & depicta utranq; herbam uiderim. Pictura autem Lagopi longè aliam herbam, quæ in segetibus nascitur, quàm sit Caryophyllata, exprimit: de qua suo loco dicemus. Neq; defunt qui herbam hanc de qua agimus, Geum Plinio dictam uelint, quorū certè sententia periculo uacat, quod eadem facultas utrisq; radicibus sit. Sed ad institutum reuertamur. Herbam quam recentiores Latini Caryophyllatam, ab odoris suauitate quam radices de se præbent, nominant, uulgo herbam Benedictam, *Benedicta.* à diuina sua efficacia, & Sanamundam appellant. Germani *Sanamunda.* *Benedictenwurz.*

## GENERA.

Duo esse eius herbae genera animaduerti, non tamen multum à se dissidentia. Primum genus Caryophyllatam hortensem uocauimus, cui ex cultura aliqua *Caryophyllata* *hortensis.* neritas accedit in folijs, floribus & paniculis. Flos huic paulò minor & pallidior *quam syluestri.* Germanicè *garten / oder heymisch Benedictenwurz* appellari potest. Alterum huius herbae genus Caryophyllatam syluestrem diximus, quod *Caryophyllata* *syluestris.* scilicet citra culturam proueniat. Flores eius multo maiores, magisq; ad croci colorem accedunt. Germanicè *wild Benedictenwurz* nominari cōmodè potest. Differentiam tamen nemo rectius quàm ipsa pictura demonstrabit.

## FORMA.

Caulis illi sesquicubitalis, geniculatus, angustus, terna è pediculo longo folia articulatim exeuntia, per ambitum serrata, bina etiam prioribus minora, singula genicula cingunt. E medio alarum sinu ramuli funduntur tenues, quibus in summis flos luteus emicat, quo succusso caput extuberat circinatis acinulis cumulatè stipatum, quasi rudimentum eluceat naturæ fragum inchoantis. Radix multis luteis capillamentis fibrata, Caryophyllon olet.

## LOCVS.

Primum in hortis plantatum prouenit. Alterum in montanis, opacis, & iuxta sepes nascitur.

## TEMPVS.

Floret Maio & Iunio mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Recentiores, & peruetustus etiam herbarius, calidam & siccam esse in secundo ordine statuunt. Folia sanè in gustu non mediocrem adstrictionem ostendunt. Radix itidem haud paruum adstrictionem obtinet.

## VIRES EX RECENTIORIBVS.

Radix eius luto & sordibus eluta siccatur, & imbre aceti respersa arceas & uestes iucundo cōmendat odore. Decoctum huius sumitur ad perficiendas concoctiones, sedandosq; coli dolores. Radix eius pectoris laterisq; dolores & cruditates iucundo sapore discutit. Manuscriptus herbarius facultatem habere dissoluendi, digerendi, & obstructions tollendi scribit. Fomentū item ex uino decoctionis eius *menses*





CARYOPHYLLATA  
HORTENSIS

Garten Benediktenwurz.





CARYOPHYLLATA  
SYLVESTRIS.

Wild Benediktenwurz.

k



contra menses ciere. Contra uenena tritam cum uino sumptam ualere. Cōcoctionem præterea roborare, dolorem uentriculi & intestinorū à frigiditate aut flatibus ortum, decoctam in uino sanare ait. Mirificè etiam ad interna uulnera huius herbæ decoctum confert. Externa uerò ex ea collui debent.

## DE CENTAVRIO MINORE CAP. CXLIII

### NOMINA.

**C**ENTAYPION *μεκρόν, ἢ λιμνίστον, καὶ λιμναῖον* Græcis, Febrifuga & Fel terræ Latinis, officinis Centauria minor, Germanis Klein Taufendeguldenkraut / Sieberkraut / Erdgall / & Biberkraut appellatur. Centaurium, quod ea curatus dicit Chiron Centaurus, cum Herculis excepti holpitio pertractanti arma sagitta excidisset in pedem. Limnesion & Limnæum, quod secundū aquarum scatebras ac paludes, quas Græci *λίμνες* dicunt, nascatur. Febrifuga, eo quod febres fugat, & procul è corpore pellat. Fel terræ, ob summam quam habet amaritudinem.

### FORMA.

Herba est Hyperico Origanōue similis, caulem habens altitudine supra dodrantem, angulosum. Flores in puniceo colore subpurpurascens, ad Lychnidis flores accedentes. Folijs paruis & oblongis ueluti Rutæ. Semen tritico simile. Radicem exiguum, inutilem & leuem.

### LOCVS.

Propter lacus & rigua loca, Dioscoride autore, nascitur. Apuleio uerò teste in solidis & fortibus quoque locis prouenit, id quod non raro in Germania nostra accidere compertum habeo.

### TEMPVS.

Floret æstate & autumnno, quo maximè tempore, quia semine est prægnans, colligitur.

### TEMPERAMENTVM.

In folijs & floribus uincit qualitas amara paululum obtinens adstrictionis, atque propter eiusmodi temperamentum admodum exiccatorium est medicamentum, expers mordacitatis.

### VIRES. EX DIOSCORIDE.

Herba ipsa adhuc uiuens tusa & illita uulnera glutinat. Vlcera uetera purgat, & cicatrice obducit. Biliosa & crassa per aluum ducit. Decoctum eiusdem ischiadicis cōmodè infunditur, sanguinem educens, & à dolore leuans. Succus ad oculorum medicamenta perutilis, cum melle quæ pupillas obtenebrant expurgans. In pello admotus menses ac foetus educit. Priuatim potus neruorum affectibus succurrit.

### EX GALENO.

Centaurij minoris radix prorsus inefficax est. Rami uerò & potissimum folia quæ in ijs sunt atque flores, utiliora. Vlcera magna herba ipsa adhuc recens illita glutinat. Vetera quoque & quæ ægrè ad cicatricem perducunt eodem modo utentibus cicatrice obducuntur. Arefacta glutinatorijs & desiccatorijs miscetur facultatibus, ijs uidelicet quæ sinus & fistulas sanare sunt natæ, & ueteres durities emollire, tum ulcerum maligna sanare. Miscetur etiam ijs quæ rheumaticis affectibus medentur, in quibus ea medicamenta optima sunt quæ uehementer desiccantia cum quadam adstrictione nullam habent mordacitatem. Decoctum herbæ quidam ischiadicis infundunt, ceu biliosa ac crassa ducens: nam & talia purgat. Quamquam quum adeò uehementer operabitur ut cruenta euacuet, tunc magis proderit. Suc-



CENTAVRIVM  
MINVS.

Klein Taufendtgulden.





Crit. Succus porrò eius quum adsimilis sit facultatis, hoc est, exiccatoriae & absterforiae, & reliqua iam dicta pulchrè efficere potest. Cum melle etiam oculis illinitur, mensesq; & foetum appositus in pello euocat. Sunt qui ipsum præbeant & ijs quibus nerui affecti sunt, ut qui euacuet & desiccet innoxie quæ impleta sunt. Optimū etiam medicamentum est ad iecinoris obstructions soluendas. Bonum quoq; lie-  
ni indurato foris impositum, & nihilo secius si quis bibere sustinuerit,

EX PLINIO.

Purgat aluum succus Centaurij minoris drachma in hemina aquæ cum exiguo salis & aceti, bilemq; detrahit.

## DE CYAMO CAP. CXLV.

NOMINA.



YAMOZ Græcis, Faba Latinis dicitur. Officinæ Latinum nomen re-  
tinent. Germanis Bonen appellatur.

FORMA.

Sola Faba inter legumina sine adminiculo nititur, folio carnosio, Por-  
tulacæ simili, flore cristato, uersicolore, partim albo, partim purpureo, atris quibus-  
dam maculis notato, quas M. Varro lugubres uocat literas: siliqua plerunque se-  
mipedali, fructu intus lato humani unguis effigie, colore non simplici, sed aut ful-  
uo, aut nigro, iam uerò etiam herbaceo & coccineo: radice singulari, lignosa, & ca-  
pillata fibris. Quæ hic à quibusdam, quasi nostra non esset uera Faba, afferuntur  
argumenta, non tanti momenti sunt ut confutatione indigeant: constat enim no-  
stram, eas quas ueteres illi adscripserunt, habere notas & facultates. Non tamen ne  
D gamus in diuersis terris maiorem aut minorem produci posse.

LOCVS.

Passim in hortis sata prouenit. Latatur loco pinguisimo & stercoreato.

TEMPVS.

Floret æstate.

TEMPERAMENTVM.

Faba in refrigerando & exiccando ad mediam temperaturam propinquissimè  
accedit. Est itaque frigida & sicca in primo ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Spirituosa, inflans, concoctu pertinax, insomnia tumultuosa faciens. Tussi ta-  
men confert, carnesq; generat. Decocta in posca, & cum cortice comesta, dysente-  
rias & cœliacas fluxiones sistit. Vtilis contra uomitiones in cibo sumpta. Minus  
inflat priore aqua in decoctione effusa. Viridis magis stomacho nocet, plusq; in-  
flat. Farina eius per se & cum polenta illita, ex plaga inflammationes mitigat, & ci-  
catrices ad reliqui corporis colorē reducit. Mammis in quibus lac in grumos cogi-  
tur, & inflammatione laborantibus auxiliatur, lacq; extinguit. Cum melle & fœnigræ-  
ci farina furunculos, parotidas ac sugillata oculorum discutit. Cum rosa, thure, &  
oui albo, procidentes oculos, staphylomata & œdemata compescit. Macerata in ui-  
no suffusiones & ictus oculorum sanat. Ad sistendas fluxiones sine cortice com-  
manducata fronti imponitur. Testium inflammationes in uino decocta sanat. Pue-  
rorum pubi illita diu impuberes seruat. Alphos exterit. Euulsos pilos ut non nu-  
triantur & graciles fiant, cortices illiti efficiunt. Cum polenta, alumine & oleo ueteri  
illiti strumas discutunt. Decoctum illorum lanas tingit. Factas ab hirundinibus  
sanguinis eruptiones, cortice ablato, Faba qua parte cohæret diuisa, si dimidia ap-  
ponatur, compescit.

EX GALE-





FABA

Bonen.

k 3



C

## EX GALENO.

Caro Fabæ paulum quid abstergentis facultatis cōtinet, sicut cortex adstringentis: idcirco medicorum nonnulli totam Fabam cum polenta decoctam dysentericis, cœliacis & uomentibus exhibuerunt. Porro ut edulium flatulenta est, & coctū difficilis, ut si quid aliud. Excreationibus quidem ex thorace & pulmone idonea. Vt medicamentum uerò foris imposita sine molestia exiccat. In podagricis ea sæpenuero usi sumus ex aqua decocta, deinceps adipem suillum admiscentes. Ad neruorum tum contusiones, tum uulnerationes, farinam eius cum oxymelite imposuimus. Ad eos qui ex ictu iam phlegmone occupabantur, cum polenta. Sed & testium & mammarum bonum est cataplasma. Nam hæ partes cum phlegmone tenentur, moderatè refrigerari amant, maximè cum mammae ex lacte in ipsis concreto phlegmonen patiantur. Quin lac quoque ab eo cataplasmate extinguitur, sicut puerorum pubes farina fabacea illita plurimo tempore glabra permanet. Manifestè fabacea farina cutis sordes detergere conspicitur, quod intelligentes mango- nes, ac mulierculæ, in balneis quotidie hac utuntur. Illinunt præterea & hac faciem quemadmodū pitiana: nam quæ in summa cute eminent lentes exterit, & maculas uelut ex sole contractas.

## EX PLINIO.

Faba hebetare sensus existimata, insomnia quoque facere. Solida fricta, feruensque in acri aceto coniecta, torminibus medetur. In cibo fressa, & cum allio cocta, contra deploratas tussis suppurationesque pectorum, quotidiano cibo sumitur: & manducata ieiuno ore, etiam ad furunculos maturandos discutiendosque imponitur, & in uino decocta ad testium tumores & genitalium. Lomento quoque ex aceto decocto, tumores maturat atque aperit. Item liuoribus, combustis medetur. Voci eam prodesse, autor est M. Varro. Fabalium etiam siliquarum cinis, ad coxendices, & ad neruorum ueteres dolores, cum adipis suilli uetustate prodest. Et per se cortices decocti ad tertias sistunt aluum.

## DE CONSOLIDA MEDIA CAP. CXLVI

## NOMINA.

Consolida  
media.

INTER multas alias herbas quibus uulnera glutinandi facultas inest, & hæc cuius picturam damus cōnumeratur. Hinc est quod uulgius herbariorum illam Consolidam mediam nominet. Qua etiam appellatione nos uti uoluimus, quod nobis quo nomine ueteribus Græcis aut Latinis appellata sit nondum constaret. Rectius tamen Solidago diceretur. Germanis Gulde gungel nuncupatur.

## FORMA.

Caulem habet quadrangulum, lanuginosum, ex quo per interualla folia bina ex singulis geniculis in extremitatibus laciniata, Menthae similia emicant. A medio caulibus ad fastigium usque ex singulis foliorum alis, flores sex aut septem in purpureo cœrulei exeunt. Radix illi subest lignosa, quæ multas à se exiguas radices capillamentorum instar per terram late serpentes propagat.

## LOCVS.

Pæssim in pratis nascitur.

## TEMPVS.

Floret copiose Maio mense.

## TEMPERAMENTVM.

Gustu adstringit & amara est, ut calidam & siccam esse nemo dubitare possit.

## VIRE S.

Vulnera glutinat. Sanguinis grumos ex casu, uel cōtusionibus, coactos in corpore dissolvit





CONSOLIDA  
MEDIA

Guldeguntzel.

k 4



c disijcit & dissoluit. Præsens remedium est aphthis & ulceribus in ore serpentibus: Decoctum eius tumoribus illitum eos dissipat. Vfus etiam eius ad intertrigines, ulcera pudendorum, & intestinorum exulcerationes prodest.

## DE CANNABE CAP. CXLVII.

## NOMINA.



CANNABIS Græcis, Cannabis Latinis, Barbaris & uulgo Canapus dicitur, Germanis autem Hanff.

## GENERA.

ἡμετέριος.



Cannabis duo sunt genera. Vna enim satiuæ est, quam Græci ἡμετέριος, quod magni in uita usus sit ad robustissimos funes texendos. Germanis zamer Hanff dicitur. Altera syluestris, quam Latini Terminalem uocant, Germani wilden Hanff.

## FORMA.

Satiua Cannabis

Syluestris.

Satiua Cannabis folia fert fraxino similia, grauis odoris, caules longos, inanesq; semen rotundum. Syluestris uero uirgas fundit Altheæ similes, nigriores, asperiores & minores, cubitali altitudine. Folia satiuæ similia, asperiora & nigriora. Flores subrubeos, Lychnidi similes. Semen & radicem Altheæ similia. Eius effigiem uidere nobis nondum licuit.

## LOCVS.

Satiua, in locis cultis sata prouenit. Syluestris in syluis & asperis locis, Apuleioq; teste, iuxta semitas & sepes nascitur.

## TEMPVS.

Herba ad usus medicos carpitur dum maxime uiret. Semen autem eius, Plinio D autore, cum maturum est, id quod prope autumnæ æquinoctium accidit.

## TEMPERAMENTVM.

Admodum calefacit & exiccat.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Satiuæ maiori copia sumptum genituram extinguit. Ex uiridi autem succus expressus, contra aurium dolores utiliter instillatur. Syluestris radix decocta illitaq; inflammationes mitigat. Tumores discutit, & callos disijcit. Huius cortex texendis funibus utilis est.

## EX GALENO.

Cannabis semen flatus extinguit, adeoq; desiccatur, ut si plussculum edatur genituram exiccet. Sunt qui ex uiridi succum exprimentes, ad aurium dolores ab obstructione, ut mihi uidetur, natos utuntur. Semen etiam cannabinum difficulter concoquitur, stomacho & capiti aduersatur, prauosq; humores creat. Admodum excalefacit, ideoq; caput æstuoso ac medicamentofo halitu sursum misso tentat.

## EX PLINIO.

Semen Cannabis extinguere genituram uirorum dicitur. Succus ex eo uermiculos aurium, & quodcunq; animal intrauerit, eijcit, sed cum dolore capitis. Tantaq; uis ei est, ut aquæ infusa, coagulare dicatur, & ideo iumentorum alio succurrit pota in aqua. Radix cōtractos articulos emollit in aqua cocta. Item podagras & similes imperus. Ambustis cruda illinitur, sed sapius mutatur priusquam areseat.

## EX SYMEONE SETHI.

Semē Cannabis comestum idem nocumentum quod Coriandrū affert; immodicè enim si estur, ut illud, deliriū facit. Folia uero arida pota, ueluti farina, aut magis pro portione hæc farina exiccata, ebrietatem quandam hospitalem facit, & quæ ab hauriente non sentiat. Apud Arabas enim pinfitur, subigitur pro uino, & inebriat. Desiccatur uero semen genitale ut Caphura.

APPEN-





CANNABIS  
SATIVA.

Gamer Hanff.



C

## APPENDIX.

Quum ex iam dictis cōstet Cannabinum semen caput facile tentare, atque adeo lādere, imprudenter faciunt, qui uulgi errorē sequentes, in morbis, ijsq̃ maximis, capitis, ex hoc semine confecta iuscula ægrotantib. magno eorum malo exhibent.

## DE CARDIACA CAP. CXLVIII.

## NOMINA.

Cardiaca cur  
dicta.



VO nomine herba hæc ueteribus sit appellata, nondum nobis constat. Nostri tamen temporis herbarij Cardiacam uocant. Germani Hergspan/ oder Herggsperz. Cardiaca uerò haud dubiè à recentioribus nominata est, quod cordis palpitationi, quam illi perperam καρδιακὴν appellant, mirificè conferre uideat̃. Alia est hæc à Ballote, de qua suo loco diximus.

## FORMA.

Cardiaca caulem ex se mittit quadrangulum, geniculatum, nigrum: folia lacinata, nigra, per interualla in caule ex singulis geniculis prodeuntia: flores in candido purpureos orbiculato ambitu caules circumiacentes: radicem luteam, intortam, capillamentis fibratam.

## LOCVS.

Pasim in ruderibus & circa sepes nascitur.

## TEMPVS.

Iulio mense floribus abundat.

## TEMPERAMENTVM.

Amara admodum existit, ut hoc nomine calidam esse in secundo ordine, & siccam in tertio constet.

D

## VIRES.

Recentiores recte contra cordis palpitationem, conuulsionem & resolutionem cōducere tradunt: potest enim quum amara sit herba, sua caliditate & siccitate crassos humores qui in uenis & alijs partibus, neruosis potissimum, sunt, incidere, extenuare & discutere. Hac etiam ratione morbo comitiali confert, urinas mouet, & menstrua educit, aliasq̃ facultates quas Galenus libro quarto de simpl. med.

facult. cap. xvij. amaris tribuit, obtinet.

DE CARO.





CARDIACA

Hertzspan.





CAROS

Feldkümmel.



A

## NOMINA.



ΑΡΟΖ Græcis, Caron uel Careum Latinis, officinis Carui nominatur. *Cari.*  
 Germanis *Wattimich* / oder *Wysentimel* dicitur. A Caria fortè *Careum unde*  
 regione, in qua laudatissimum nascitur, appellationem accepit. *diffusa.*

## FORMA.

Caules emittit quadrangulos ab una radice multos, folia Staphylini, flores candidos, & in caulium summo semen angulosum ac copiosum, radicem oblongam & luteam.

## LOCVS.

Palsim in pratis Germaniæ nostræ prouenit. Optimum tamen est quod in Caria, ut diximus, nascitur.

## TEMPVS.

Iunio mense floribus & semine prægnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Cari semen calfacit & exiccat tertio quodammodo ordine, moderatè acrem qualitatem possidens.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Semen Cari calfacit, urinam cit, stomacho & ori gratum accommodumq̃. Concoctiones adiuuat. Antidotis & oxyporis utiliter miscetur, Aniso proportionem respondens. Radix elixa Pastinacæ syluestris modo edendo est.

## EX GALENO.

Flatus extinguit & urinas ciet, non semen tantum sed & planta.

## DE CARYO PONTICO CAP CL

B

## NOMINA.



ΑΡΥΑ *ποντικά*, ἢ *λεπτοκάρυα* Græcis: Auellanae nuces, & Prænestinae Latinis, Haselnus Germanis nominantur: Ponticae autem uocantur, *Auellane.*  
 quod in Asiam Græciamq̃ Ponto uenerunt. Parua, quod Iuglandibus minores sint. *Pontice quare uocata.*  
*Parue.*

## GENERA.

Duo eius sunt fastigia. Vna enim est syluestris, quam priuatim Germani nostri Haselnus nominant. Altera uerò urbana seu domestica, quam eundem *Kornus* / oder *Körnus* appellant.

## FORMA.

Corylus arbor in qua Auellana nux prouenit, caudice est multis infernè stolonibus fruticante, supernè ramis brachiato, uirgis breuibus, sine alarum sinu enodibus, crassiq̃ nonnullis, folijs ab una parte nigris, altera uerò subalbis, per ambitum ferratis, materia admodum lenta, cortice summo tenui, pingui, maculis albis uario, medulla tenui & flaua. Non floret, sed floris uice quidam in eo peculiare compati callo racematim coherentes, & ueluti prelongi uermes singulari pediculo peniles iuli erumpunt, qui ineunte uere dehiscunt ac defluunt cum folia profiliunt, ac *iuli.*  
 tum calyculacea tegumenta totidem summatim fimbriata, quot iuli supra pediculum exeunt, eorumq̃ singulis nuces singulae insunt. Domestica non differt à syluestri, nisi quod eius folium maius, & caudex procerior, melior fructus, rubra membrana inclusus. *Domestica.*

## LOCVS.

Gaudet argillosis & uliginosis locis: nascitur itaque in plano. Nemora etiam & montes Corylis uestiuntur.

## TEMPVS.

Autumno leguntur Auellanae nuces.



398



AVELLANA NVX  
SYLVESTRIS.

Haselnuß.



AVELLANA  
DOMESTICA

Rotnuß.





## TEMPERAMENTVM.

**C** Tum cortex, tum planta, tum fructus gustanti austerior quàm Iuglans apparet, plus itaque habet essentiae terrestri & frigidae. Symeon Sethi calidas & humiditas esse Auellanas asserit.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Stomacho aduersantur Auellanae. Tritae in aqua mulsa, & potè ueterem tussim sanant. Tostae uerò & cum exiguo pipere comestae destillationem maturant. Torae crematae, tritae cum axungia aut seuo ursino & inunctae alopecias explent. Ferunt aliqui usta earum putamina, & in puluerem redacta cum oleo caesiorum oculorū pupillas infantibus denigrare, perfuso syncipite.

## EX GALENO.

Valentiores sunt Auellanae quàm Iuglandes: nam densior strictiorq; his est substantia, ac minus oleosa. Caetera magnae nuci similia sunt.

## EX AETIO.

Auellana, quae & Nux pontica nuncupatur, quod in Euxino ponto frequens sit, praeter quod frigidior, austerior, terrestriorq; est, in reliquis Iuglandi asimilatur. Comesta dolorem capitis inuehit.

## EX SYMEONE SETHI.

**D** Magis nutriunt quàm Iuglandes nuces, difficiliusq; cōcoquuntur. Inflationes faciunt, & ut quidam aiunt, ieiunum intestinū laedunt. Facilius autem cōcoquuntur, minusq; uentrem sistunt, si interior earum cortex abijciat. Dicitur quod si quis ante reliquos cibos cum ruta sumpserit, huic neq; morsus, neq; uenena officere illo die posse, & scorpiones ab ipso fugere. Sumptae cum caricis, iam à scorpione ictos iuuant. Ad aciditatem à nigro humore excitatam omnino confert.

## DE CENTVM MORBIA CAP. CLI

## NOMINA.

Centummorbia  
unde dicta.



Nummularia.

**H**IC herbae, ut alijs multis, nomē aliud imponere non licuit, quàm, quo uulgò hodie appellari solet, Centummorbia. Sic autem haud dubiè à chirurgis, qui illa quotidie utunt, à mirifica sua quam in plurimis ulceribus medendis obtinet facultate, dicta est. Sunt qui à foliorū similitudine, quae nummi speciem referunt, Nummularia uocant. A nonnullis Hirudinaria, quod passim terrae hirudinis instar affixa sit, dicitur. Nec desunt qui Serpentariam appellent, quod compertum sit serpentes hac herba si uulnerentur sibi mederi. Germanicè *Egglekraut* / oder *klein Watterzung* / oder *Pfennigkraut* nominatur.

## FORMA.

Serpit per terram, exiguisq; radiculis è coliculis latis prodeuntibus nititur. Folia habet ex utroq; caulis latere rotunda, pinguiq; flores luteos.

## LOCVS.

Prouenit in locis humidis, potissimum uerò circa fluentia.

## TEMPVS.

Maiο mense apparet, Iulio autem floret.

## TEMPERAMENTVM.

Gustu admodum adstringit, ut hinc constet secundi aut tertij ordinis exiccantium esse herbam.

## VIRE.

Huius flores & folia trita adeò desiccant adstringuntq; ut quæuis ulcera glutinare ualeant. Ideoq; pota cum uino dysenterias, uentris imbecillitates, fluxusq; ac humiditates sanant. Cataplasmatibus illita ulcerū putredinosa iuuant. Profunt etiam ad san-





CENTAUREA

Egelkraut.



C ad sanguinis reiectiones, profluvia muliebria, & ad omnia interanea uulnera & ulcera, potissimū pulmonis. Externis etiam ulceribus summè confert, si uino in quo herba hæc decocta est, lauentur atque abstergantur.

## DE COCCIMELEA CAP. CLII

### NOMINA.



OKKIMHAEA Græcis, Prunus Latinis & officinis, Germanis eius arboris fructus Pflaumen/oder Prumen dicuntur.

### GENERA.

Satiua Pruna.

Pruneola.

Duo sanè Prunorū habentur genera. Vnum satiuorū, in quo genere sunt nigra, candicantia, uersicoloria, cerea, hoc est, ex candido in luteum pallescens, purpurea, Damascena, & si qua sunt alia. Alterum syluestriū, quæ Galeno lib. ij. de alimentorum facultatib. ἀχραιοκλυμιάδα, & in Asia πρῦμα, Pruneola siue Prunula uulgo nominant, Germanicè Schlehén. Caue eorum amplectaris sententiam, qui Poterium esse putant: neque enim facultates, neque notæ Prunulis respondent.

### FORMA.

Prunus arbor est radicibus summo cespite uagantibus paucis, caudice subrecto, scabro, multis brachiato ramis, folio ex oblongo ferè rotundo, per oras minutim serrato, flore candido, foliato, pomo carne cuteque uestito, osse intus duro in quo nucleus includitur.

### LOCVS.

Satiua Prunus in hortis nascitur. Damascena in Damasco Syriæ, à quo cognominata sunt, Syluestris autem passim in sepibus reperitur.

### TEMPVS.

D Satiua in æstate poma sua profert, syluestris autem autumnò.

### TEMPERAMENTVM.

Satiuæ Pruni fructus mediocriter humectant & refrigerant. Syluestris adstringunt, ut fusius ex eorundem facultatibus innotescet.

### VIRES. EX DIOSCORIDE.

Eius pomum estur, stomacho tamen aduersatur. Aluum mollit. Syriaca autem pruna, & præsertim in Damasco genita, exiccata stomacho utilia sunt, & aluum cohibent. Folia in uino decocta & gargarissata columellam, gingiuas & tonsillas fluxione laborantes reprimunt. Præstant idem & syluestrium Prunorū fructus cum maturuerunt siccati. Cum sapa decocti stomacho utiliores, & ad cohibendam aluum aptiores redduntur. Gummi Prunorū glutinat. Potum in uino calculos conterit. Ex aceto illitum, impetigines infantium sanat.

### EX GALENO.

Pruni fructus uentrem subducit, recens quidem plus, aridus uerò minus. Cæterum Dioscorides, haud scio cur, Pruna Damascena siccata uentrem sistere ait, quum tamen & ipsa palàm etiam subducant, minus tamen ijs quæ importantur ex Iberia. Damascena quidem magis adstringunt: at quæ Iberia fert, dulciora sunt. Quin & ipsæ arbores fructibus proportionè respondent: minus enim adstringunt quæ in Iberia nascuntur, magis uerò quæ Damasci. Porro ut in summa dicam, quarum in folijs aut germinibus adstrictio quædam inesse apparet manifesta, ijs decoctis phlegmonè in columella aut tonsillis existentes colluuntur. Syluestriū fructus euidenter adstrictorius est, uentremque sistit. Gummi autè arboris sunt qui dicant cum uino potum lapides confringere, cum aceto uerò puerorū sanare impetigines. Ac si id præstat, clarum est incidendi tenuandi que illi facultatem inesse. Raro fructum hunc austerum aut acidum, aut omnino iniucundum inuenias, ubi exactam maturi-





PRUNUS  
SATIVA.

Pflaumenbaum.





PRUNUS  
SYLVESTRIS.  
Schlehen.



**A** maturitatem fuerit assecutus. Priusquam enim eò perueniat, nullus est fermè qui non acorem, aut acerbicatem præ se ferat: est qui & amaritudinem. Proinde ex hoc fructu minimum alimenti corpus accipit. Verum quum humectare & refrigerare mediocriter uentrem statuemus, utilis erit: quem subducit humiditatis & lentoris sui gratia. Prunis porro æque ac ficibus concessum est, ut uel exiccata utilia permanent. Damascenis prima laus bonitatis magna hominum opinione defertur. Proxima ijs quæ in Iberia & Hispania proueniunt. Probatissima in Damascenis sunt, quæ cum mediocri adstrictione magna laxa quæ sunt. At parua, dura, acerbiora & in cibo permolesta, & uentri subducendo minus idonea, cui officio Iberica maximè cōueniunt. In melicrato plus mellis habente, abundè uentrem molliunt, etiamsi sola comedantur, & multo magis si melicratum ipsum subforbeatur.

## EX PLINIO.

Pruni folia decocta tonsillis, gingiuis, uuæ profunt in uino decocta, & subinde ore colluto. Ipsa Pruna aluum molliunt. Syluestriū quidem Prunorum bacca, uel è radice cortex, in uino austero si decoquat, ita ut triens ex hemina supersit, aluum & tormina sistunt. Satis est singulos cyathos decocti sumi. Et in ijs & satiuus Prunis est limus arborum, quem Græci Lichena appellant, rhagadijs & condylomatibus mirè utilis.

## DE CONIO CAP. CLIII.

## NOMINA.

**B** **K** **NEION** græcè, Cicuta Latinis & officinis, Germanis *Wügerling*/ *Wundschering*/ *Schirling*/ oder *Wüterich*/ quasi tyrannus dicitur, quod scilicet hominē interficiat, si intra corpus sumatur. Hinc est quod Athenienses eius succo in interimendo sapientissimo philosopho Socrate, quem falso Anytus & Melytus quasi parum recte de Dijs sentiret, accusarunt, usi sunt.

## FORMA.

Caulem profert geniculatum Fœniculi modo, magnum. Folia ferulæ, uel, ut Plinius ait, Coriandro similia, angustiora tamen & graueolentia. In cacuminibus adnascens ramulos & umbellâ. Florem subalbum, semen Aniso simile, albidius tamen. Radicem concuam nec profundam.

## LOCVS.

Pasim in pratis, locis incultis & umbrosis nascitur.

## TEMPVS.

Iulio mense flores & semina profert.

## TEMPERAMENTVM.

Summam habet refrigerandi uim Cicuta, atque adeo uenenum est.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Inter letalia connumeratur Cicuta, sua frigiditate enecans. Remedio est meraci uini potus. Succus exprimitur ex eius cacuminibus contusis, priusquam semen & coma areseat, expressusque in sole densatur. Multus aridi ad medendi rationem usus est. Miscetur utiliter collyrijs, quæ leuandi doloris gratia adhibentur. Herpetas & erysipelata illitus restinguit. Herba cum coma trita & testibus circumlita, libidinum in somno imaginationibus auxiliatur, sed genitalia illita resoluit, languidaque reddit. Lac extinguit, mammas in uirginitate increfcere prohibet. Puerorum testiculos tabescere facit.

## EX PLINIO.

Cicuta uenenum est, publica Atheniensium poena intusa, ad multa tamen usus non omittendi. Semini & folijs refrigeratoria uis, quæ si enecat, incipiunt algere





CICUTA

Wüterich.



**A**lgere ab extremitatibus corporis. Remedio est, priusquam perueniat ad uitalia, uini natura excafactoria. Sed in uino pota, irremediabilis existimatur. Succus exprimitur folijs floribusq̃: tunc enim maximè tempestiuus est & melior. Semine trito expressus, & sole densatus in pastillos, necat sanguinē spissando. Hæc altera uis. Et ideo sic necatorū maculæ in corporibus apparent. Ad dissoluenda medicamenta utuntur illo pro aqua. Fit ex eo ad refrigerandū malagma. Præcipuus tamen est ad cohibendas epiphoras æstiuas, oculorumq̃ dolores sedandos circumlitus. Miscetur collyrijs, & alios omnes rheumatismos cohibet. Folia quoq̃ tumorem omnem doloremq̃ & epiphoras sedant. Anaxilaus autor est, mammas à uirginitate illitas, semper staturas. Quod certum est, lac puerperarum mammis imposita extinguit, ueneremq̃ testibus circa pubertatem illita.

## DE CYNOGLOSSO OFFICINARVM

## CAP. CLIIII

## NOMINA.



**CYN**OTANSEON græcè, latinè Lingua canina: officinæ græcam appellationem retinuerunt, Germanicè Hundszung appellat. Animaduertendum tamen nos non temerè adiecisse officinarum: neque enim Dioscoridis damus Caninam linguam, quæ uidua caule est, & uiribus etiam ab hac nostra diuersa.

Lingua canina.

Dioscoridis Cynoglosson.

## FORMA.

Caulem obtinet cubitalem, & interdum longiorem, hispidum, furculosum: folia angusta, prælonga & lanuginosa, non uenosa, molliaq̃: florem primum purpureum, dein cœruleum, stamina habentē purpurea: radicem oblongam, & profundè de terram penetrantem.

## LOCVS.

Pæssim circa itinera prouenit.

## TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret.

## TEMPERAMENTVM.

Recentiores herbarij frigidam & siccam esse statuunt in ordine secundo.

## VIRE.

Oris & alijs maleficis ulceribus medetur. Dysenterix etiam prodest. Debet itaque illius herbe usus esse in omnibus ulceribus, uulneribus, scabie Hispanica, & similibus morbis. Auxiliatur etiam gonorrhœæ & destillationibus: atque hinc est quod catapotiorum compositioni, quorum nomenclatura est ad omnes morbos catarrhi, aut de Cynoglosso, admisceatur.

Catapotia de Cynoglosso.

## DE CNICO.





CYNOGLOSSVM  
OFFICINARVM.

Hundszung.





CARTAMVS


Wilder gartensafran.

m



C

Cartamus.  
Crocus horten-  
sis.



NOMINA.  
ΝΙΚΟΣ græcè, Cnicus & Cnecus latinè nominatur. Officinæ Cartamum & Crocum hortensem appellant. Germani Wilden gartensaffran / ad differentiam Attractylidis, de qua suprâ dictum est.

FORMA.

Folia habet oblonga, incisuris diuisa, aspera, aculeata. Caules cubitales, in quibus capita oliuæ magnitudine. Florem similem Croco, semen candidum & rufum, oblongum, angulosum.

LOCVS.

Nascitur in hortis & agris satus.

TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus, ac subinde semen etiam profert.

TEMPERAMENTVM.

Tertij est ordinis excalescentium eius semen, si quis foris eo uti uolet.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius flore utuntur in obsonijs. Semen tundi & ex eo exprimere succus qui cum hydromelite aut gallinaceo iure datus aluum purgat. Stomacho tamè aduersatur. Fiunt etiam placentæ quæ aluum emolliunt, si succus eius amygdalis, nitro, aniso, & melli cocto misceatur. Oportet autem ante coenam in partes quatuor diuisas Iuglandis nucis quantitate duas aut tres sumere. Eas hoc modo conficere oportet. Sumatur Cnici candidi sextarius, amygdalarum tostorum & decorticatarum cyathi tres, anisi sextarius unus, aphronitri drachma una, caricarum triginta carnes. Seminis succus lac cogit, & ad soluendum aluum efficacius efficit.

EX GALENO.

Cnici semine duntaxat ad purgationes utimur.

## DE CENCHRO CAP. CLVI

NOMINA.

Milium un-  
de dictum.



ΕΙΧΡΟΣ Græcis, Milium Latinis & officinis, Germanis Hirß appellatur. Nomen, Festo autore, à miliaria summa deriuatum.

FORMA.

Frumenti genus stipula cubito altiore, geniculata, folio arundinaceo, semine in iuba tereti & pendulo, folliculo concluso, radice numerosa, capillata, ac multiplici fruticante culmo.

LOCVS.

Satum in aruis prouenit. In frigido & aquoso solo prius serendum, postea in calido præcipiunt. Gaudet solo limoso uliginosoq.

TEMPVS.

Augusto mense demetendum.

TEMPERAMENTVM.

Milium primo ordine refrigerat, exicat autem tertio exoluto, aut certè secundo intenso. Paululum etiam tenuium est partium.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Minus cæteris frugibus alit. In panes autem coactum, aut tanquam puls confectum aluum sistit, urinam autem mouet. Tostum uero saccis inditum & fomenti loco appositum, torminibus & alijs doloribus auxilio est.

EX GALENO.

Milium ut ferculum comestum inter omnia frumentacea edulia minimū nutriti confert. Sed & uentrem desiccat. Porro foris impositum in sacculis idoneum est fo-





411

MILIVM

Grß.

m 2



**C** est fomentum ijs quæ citra morsum exiccare postulant. Cataplasmatibus etiam modo illitum exiccare potest, attamen admodum friabile est, proinde difficilis est eius in cataplasmatibus usus. **Panis ex milio.** Panis ex milio exigui est alimenti & refrigerantis. Constat insuper præaridum & instar arenulæ aut cineris friabilem esse: caret enim penitus glutinoso pingui: iure itaque aluum humentem desiccet. Milium tamen ad omnia panico præstantius, nam & suauius editur, facilius concoquitur, uentremque minus cohibet, ac magis nutrit. Huius farinam lacti incoctam esitant, ueluti triticeam agricolæ: clarumque est id edulij tanto quàm illa quæ per se sola sumuntur melius esse, quanto lac milij natura ad boni succi procreationem, aliaque omnia eminentius habetur. Dico autem alia omnia, concoctionem, uentris subductionem, in totum corpus distributionem, adeoque ipsam in edendo suauitatem ac uoluptatem.

## EX PLINIO.

Milio sistitur aluus, discutiuntur tormina, in quem usum torretur antè. Nervorum doloribus & alijs feruens in sacco ponitur, neque aliud utilius, quoniam leuissimum mollissimumque est, & caloris capacissimum. Itaque talis usus eius est ad omnia quibus calor profuturus est. Farina eius cum pice liquida, serpentium & mulipedum plagis imponitur.

## EX SYMEONE SETHI.

Difficiliter concoquitur, uentrem sistit, parumque nutrit. Iuuat eos qui refrigeratione & exiccatione uentriculi indigent. Sumptum cum lacte, uel amygdala thasia facilius concoquitur, & humidius fit.

## DE CRAMBE SATIVA CAP. CLVII.

## NOMINA.

D



**K**RAMBH ἡ ἄμυρα græcè, Brassica sativa latinè, officinis & uulgo Caulis; Germanicè Röl appellat. Crambe Græcis dicta censetur quasi κράμβη, quod pupillas oculorum, quas Græci κρας uocant, obtundat, hebetetque. In qua certè sententia fuisse Columellam hoc eius de cultu hortorum carmen testatur:

*Nunc ueniat quamuis oculis inimica Corambele.*

Attici integro nomine κράμβη protulerunt, alio sed potiore etymi sensu, quasi κρας ἄμβη, uel rectius ἀντίβη, id est, crapulæ satietati contraueniat. Nam uino aduersatur, ut inimica uitibus, Antecedens in cibis ebrietatem arcet, & postea sumpta crapulam discutit.

## GENERA.

Et si plurima sint Brassicæ genera, ut ex ueteribus rei rusticæ scriptoribus liquet, quatuor tamen duntaxat, quæ hodie usitatæ sunt, producemus: quarum una Græcis λάα, hoc est, leuis nominatur, grandibus & latis folijs, caule magno: Germanis breiter oder grosser Röl uocatur. Altera crispa, quæ à similitudine apij αλιναδής, id est, Apiana nuncupatur. Vulgo crispus caulis, Germanicè krauser Röl. Tertia propriè uocatur Crambe, minutionibus caulibus, & tenuioribus folijs, flore luteo, Germanicè kleiner Röl/ ut ab alijs discernatur, nominari potest, aut simpliciter & sine adiectione Röl. Quarta sessilis est, folio & capite patula. Vulgus caputos caules, quasi capitulatos appellat, quoniam in capitis formam extuberant. Folia enim horum in orbem glomerantur, exterius callosa & per ambitum rugata, multis intus carinarum uoluminibus, externis semper interiora complectentibus. Huc alludentes Germani Cappis kraut uocant. Nonnulli à candore foliorum Brassicam albam, & caules albos appellare maluerunt. Hoc genere Brassicæ in plerisque Germa-






BRASSICAE PRIMVM  
GENVS.

Breiter K6l.

m 3





BRASSICAE SE  
CVNDVM GENVS.

Krauser KÖL.





BRASSICAE TER  
TIVM GENVS.

Kleiner Kål.





BRASSICAE QVAR  
TVM GENVS.

Rappisbraut.



A Germaniæ partibus, Boioaria potissimum, per integrum anni curriculum quotidie uictitant, quod illic eius prouentus sit uberrimus.

## FORMA.

Caule est Bralsica leuiter rubente, crasso, folio prægrandi, carnosio, ex cæsis candidante, in latus utrinque diffuso, prominulis uenarum toris fruticante, cyma patula, flore tum luteo, tum albo, semine in siliquis.

## LOCVS.

In hortis hodie passim proueniunt Bralsicæ. Frigidis uero & pluuijs regionibus positio earundem optima.

## TEMPVS.

Augusto mense potissimum florent, ac subinde semen etiam proferunt.

## TEMPERAMENTVM.

Bralsica tum manducata, tum foris imposita exiccat. Sicca uero & calida primo ordine.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Bralsica satiuæ aluo est idonea, si leuiter feruefacta edatur. Percocta uero aluū sistit, & multo magis bis cocta, & in lixiuio decocta. Æstiuæ stomacho nocet & acrior est. In Aegypto propter amaritudinē nō estur. Obscuritate uisus laborantibus, & tremulis comesta auxiliatur. A cibo sumpta ex crapula & uino noxas restinguit. Cyma eius stomacho utilior, sed acrior, & ad ciendā urinā ualidior. Cōdita sale stomacho inimica est, aluumque cōturbat. Crudus eius succus cū iride & nitro deuoratus aluū mollit. Cū uino potus uiperarū morsibus succurrit. Cum Foenigræci farina, podagricis & articularū doloribus correptis, ulceribusque sordidis & uetustis illitus prodest. Caput purgat per se naribus infusus. Menfes ducit cum loliacea farina inditus. Folia per se aut cum polenta trita, omnibus inflammationibus & cedematis cōferunt. Erysipelatis, epinyctidis & lepris medent. Cum sale carbunculos rumpunt. Capillorum in capite defluxū retinent. Cocta autem & melli mixta gangrenarū pascen-  
B tibus malis opitulant. Cruda ex aceto comesta lienosis prosunt. Mansa uero deuorato succo uocem amissam restituunt. Decoctū eius potum, aluum & menfes mouet. Flos post conceptionē in pello subditus sterilitatē facit. Semen eius, præsertim quæ in Aegypto nascitur, potum lumbricos pellit. In antidota eccliacorū additur. Faciem lentiginesque expurgat. Cauliculi uirides cum radice cremati, & adipe porci uetusto excepti, diuturnos laterum dolores impositi mitigant.

## EX GALENO.

Bralsica esculenta desiccandi uim habet tum esca, tum foris imposita, non tamen etiam admodum acrem. Alioqui & ulcera glutinat, & maligna ulcera sanat. Præterea phlegmonas iam induratas, ac ægrè solubiles, & id genus quoque erysipelata. Eadem facultate epinyctidas & herpes sanat. Habet quiddam etiam in se abstersorium, quo lepras curat. Porro semen eius potum lumbricos interficit, maxime Bralsicæ Aegyptiæ, quanto ea scilicet temperatura siccior est. Sanè amaræ qualitatis particeps semen est, sicut uidelicet omnia alia medicamenta quæ ad lumbricos idonea sunt. Secundū eandem facultatem ephelidas, lentigines, & quæcunque alia modicā abstersionē postulant, adiuuat. Caules Bralsicæ combusti, cineres efficiunt admodum desiccantes, ut uidelicet iam & adurentē uim participant. Hac ratione ei ueterem adipem cōmiscens, ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis, adhibent. Nam ualenter digerens medicamentum efficitur. Bralsicæ quoque succus purgandi quandam uim obtinet: contra solidum eius corpus siccitatis ratione cohibere magis quàm incitare deiectionem potest. Proinde quum expellere alui excrementa propositum erit, aheni in quo elixa unā cum aqua fuit, propius admo-  
inijce-



C iniicere oportebit. At humentē aluum siccare uolentes, quum mediocriter buliſſe uidebitur, priore aqua effuſa repentē aliam calentem iniicimus, ac ita rurfus in ea diſcoquimus uſquedum tenera flaccidaq̃ euaserit.

## EX PLINIO.

Cato criſpam maximē probat, dein leuem grandibus folijs, caule magno. Prodeſſe tradit capitis doloribus, oculorū caligini, ſcintillationibusq̃, uel ſtomachi doloribus, crudam ex aceto & melle, coriandro, ruta, mentha, laſeris radícula, ſumptā acetabulis duobus matutino. Tantamq̃ eſſe uim, ut qui terant hæc, ualidiores fieri ſe ſentiant. Ergo uel cum uino tritam, ſorbendam, uel ex olei intinctu ſumendā. Podagræ autem, morbisq̃ articularijs illini cum rutæ, coriandri & ſalis mica, hordei farina. Aqua quoque eius decocta, neruos articulosq̃ mirè iuari. Si foueantur uulnera & recentia & uetera, etiam carcinomata, quæ nullis alijs medicamentis ſanari poſſunt. Fouerī prius aqua calida iubet, & bis die tritam, imponi. Sic etiam fiſtulas eluxatas, & tumores reuocari, quæque diſcuti opus ſit. Inſomnia etiam, uigilijsq̃ tollere decoctam, ſi ieiuni edant quamplurimam ex oleo & ſale. Tormina, ſi decocta iterum decoquat, addito oleo & ſale, cumino, polenta. Si ita ſumatur ſine pane, magis profuturā. Inter reliqua bilem detrahit per uinum nigrum pota. Quin & urinam eius qui Braſſicā eſitauerit, aſſeruari iubet, calefactamq̃ neruis remedio eſſe. Auribus quoq̃ ex uino ſuccum Braſſicæ tepidum inſtillari ſuadet. Idq̃ etiam tarditati audientium prodeſſe aſſeuerat. Et impetigines eadem ſanari ſine ulcere. Græci biles detrahare non percoctā putant. Item aluum ſoluere, eandemq̃ bis coctam ſiſtere. Vino aduerſari, ut inimicam uitibus. Antecedente in cibis cauere ebrietatem. Poſtea ſumpta crapulam diſcuti. Hunc cibum & oculorū claritati conferre multum, ſucco uerò crudæ angulis uel tantum tactis cum Attico melle, plurimū.

D Hippocrates coeliacis, dyſentericis bis coctā cum ſale dari iubet. Item ad tenaſmon, & renum cauſas. Lactis quoq̃ ubertatem puerperis hoc cibo fieri iudicans, & purgationem foeminis. Crudus quidem caulis ſi edatur, partus quoq̃ emortuos pelli. Inuenio & à podagra liberatos edendo eam, decoctaq̃ ius bibendo. Hoc & cardiacis datum & comitialibus morbis addito ſale. Item ſpleneticis in uino albo per dies quadraginta. Contra uerò ſingultus cum coriandro, & anetho, & melle, ac pipere, & aceto. Illitam quoque prodeſſe inflationibus ſtomachi. Item ſerpentiū ictibus, & ſordidis ulceribus & uetuftis, uel ipſam aquam cum hordeacea farina. Succū ex aceto, uel cum Fœnogræco. Sic aliqui & articulis, podagrisq̃ imponunt. Epinyctidas ac quicquid aliud ſerpit in corpore, impoſita leuat. Item repentinās caligines: has & ſi mandit ex aceto. Sugillata uerò & alios liuores pura illita. Lepras & pſoras cum alumine rotundo ex aceto. Sic & fluentes capillos retinet. Epicharmus teſtium & genitalium malis hanc utiliſſimē imponi aſſerit. Efficacius eandem cum faba trita. Item conuulſis cum ruta. Et muris aranei morſus, foliorum aridorum farina alterutra parte exinanit. Stirpium Braſſicæ aridorum cinis, inter cauſtica intelligitur. Ad coxendicū dolores cum adipe peructuſto. Plura de Braſſicæ uiribus uide apud Catonem de re ruſtica, cap. clvij.

## EX SYMEONE SETHI.

Malum & melancholicū ſuccum procreat. Viſum hebetat, & ſomnū per contraria inſomnia interturbat. Succus eius aliquatenus purgat: corpus uerò eius uentrē ſiſtit. Quapropter in quibus humectā aluum exiccare uolumus, ipſam modicē decoquentes, aquamq̃ primam abijcientes, conſeſtim alteri aquæ feruenti indimus: nihil enim neque aëris, neque frigidaæ aquæ quod bis coquitur tangere debet. Aſtiua Braſſica peioris ſucci eſt quàm hyberna. Cit uerò urinam, lumbricos interficit, & ijs qui ex uino crapula laborant auxiliatur. Fertur autem quod ab humiditate ortam hebetudinem ſanet. Cocta cum pingui carne, plurimum noxæ atque uitij amittit.



**A** amittit. Flos eius proprietate quadam semen genitale corrumpit, utero impositus, & mulieres concipere prohibet. Pulmonem lædit. Tradunt quoque si ante alios cibos assumpta fuerit, ebrietatem arcere. Et quod eius succus cum melle sumptus, magnificè defectiones uocis iuuet. Vulneribus imposita, ea conglutinat, & malefica ulcera, & induratas inflammationes sanat.

## DE CRUCIATA CAP. CLVIII.

## NOMINA.



**V**O nomine ueteres hanc herbam appellauerint nondum compertum habeo. Neque enim Isatis est, quam uulgius Saponariam uocat, ut suo loco docebimus, ideoq; nomen quo illam nominaremus fingendum fuit. Ad imitationem autem Germanicæ nomenclaturæ Cruciatam diximus, quod eius radix in modum crucis transfossa sit. Vt hoc etiam nomine græcè *σταυρότυπον* dici posset. Germanicè *Creuzwurcz* / *Sperensstich* / & *Wadelgeer* *σταυρότυπον* nuncupatur.

## FORMA.

Caulē rotundum obtinet, dodrantalem, in summo rubentem, alas multas habentem, è quibus singulis bina folia crassa, angusta & oblonga, floresq; orbiculatim purpurei è siliquis coloris herbacei prodeunt. Radicem albam, longam, crucis instar ab utroq; latere perforatam, à qua illi nomen inditum est.

## LOCVS.

Nascitur locis incultis.

## TEMPVS.

**B** Floret Iulio mense.

## TEMPERAMENTVM.

Admodum amara est, unde facile colligere licet calidam & siccam esse.

## VIRE S.

Recentiores eius esse magnum contra pestilentiae uenena usum tradunt. Item quod ea quæ in thorace sunt educere ualeat. Quæ sanè singula præstare posse amarus sapor qui illi inest abundè docet. Abstergunt enim expurgantq; amara, & quæ in uenis est crassitiem incidunt, Galeno libro quarto de simpl. medicamentorū facultatib. cap. decimo septimo, autore. Quamobrē menses etiam mouet, comitiali morbo competit, & alia quæ amaris ab eodem tribuuntur, præstare potest.

Vulneribus etiam glutinandis mirificè conducit.





CRVCIATA

Hadelger.



## NOMINA.



12202 græcè, Hedera latinè, Ephew Germanicè dicitur. Athenienses *Cissos* car nomina  
Bacchum appellarunt Cisson, quo nomine rigens Hedera quæ sine ad  
miniculo stat, sola omnium generum ob id uocata est Cissos: è diuerso  
nunquã nisi repens humi Chamæcissos. Sic Dionysia, hoc est, Bacchica *Dionysia.*  
nominata est à Baccho, qui primus ex Indis in Græciam Hederam asportauit: uel  
quod in tutela eius fuerit. Nam ut ille iuuenis semper, ita hæc uiuet. Nec secus o-  
mnia, sicut ille mentes hominum, illigat. Hedera uerò dicta est, quod uetustis pa- *Hedera unde*  
rietibus hæreat: uel potius quia edita petat, & altè diuagetur: uel quia id cui adhæ- *appellata.*  
serit, edat atque corrumpat.

## GENERA.

Plurimas, Dioscoride autore, sigillatim habet species, sed maximè generales tan-  
tum tres. Candida enim quedam dicitur, eo quod candidū fert fructū: hæc scemina *Candida.*  
à Plinio uocat. Germanis weisser Ephew nominari cōmodè potest. Altera nigra, *Nigra.*  
quæ nigrum producit fructum: hæc Plinio mas nominatur. Germanis schwar-  
zer Ephew. Hæc etiā parietibus obrepit, murisq; pertinacius hæret quàm ut pos-  
sit abire, hinc Maurephew Germanis uocatur, & Baumephew/ quod scilicet ar-  
bores suo complexu strangulet. Tertia priuatim Helix, id est, clauicula, & hederu- *Helix.*  
la nuncupatur. Germanis Klein Ephew/ oder Erdepheuw.

## FORMA.

Nigra, quæ in Germania nostra prouenit, arbores & parietes radicosis ample- *Nigra.*  
ctitur brachijs, in totum fruticosa, folia primū cum pubescit angulosa, compluri-  
mum in triangulam faciem exeuntia habens. Vetusiori rotundantur, pinguis, du-  
ra, immortali uiride: flore exili, uiridino, non inodoro: baccis primum herbaceis,  
B mox atris, & nonnunquã croceis, longiori pediculo in uuæ modum dependenti-  
bus, sparsioribus racemis non in globum candidæ modo coeuntibus, sed in acinos  
discretis. Radice numerosa, densa, flexuosa, cōtorta, ac surculosa, nec admodū pro-  
funda. Candida inter media folia emittit brachia, quibus arbores complectitur, ma- *Candida.*  
ximè ramosa & robusta, corymbis, hoc est, racemis in orbem circumactis, aut folio  
albicat. Helix quantum uis diu uiuat, Theophrasto autore, nunquã fert fructum, *Helix.*  
adeoq; sterilitate à cæteris distat. Parua tenuiaue huic folia, angulosa & rubra, uiti-  
culæq; tenues sine corymbis.

## LOCVS.

Hedera aquis gaudet. Nigra passim circa muros crescit. Helix uerò in syluis hu-  
mi serpit.

## TEMPVS.

Nusquam non uiuet Hedera.

## TEMPERAMENTVM.

Hedera ex contrarijs cōposita est facultatibus: habet enim quiddam adstringen-  
tis substantiæ, quæ terrena & frigida est. Habet etiam nō nihil acris, quæ calida est.  
Nec deest tertia, aqueam nanq; substantiam quandam tepidam obtinet, certè si ui-  
ridis sit. Siquidem dum arefcit, hæc prima exhalet necesse est, manetq; quæ terrea  
est & frigida adstringensq;, & ea quæ calida & acris.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Hedera omnis acris & adstringens est. Neros tentat. Flores trium digitorum  
carptu, in uino bis die poti, ad dysentericos faciunt. Ambustis cum cerato illiti pro-  
sunt. Tēnera folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorū  
& corymborum succus cum irino unguento, melle, aut nitro naribus infunditur.  
Et contra ueteres capitis dolores ualet, atque eo perfunditur caput cum aceto & ro-  
saceo. Dolentibus & purulentis auribus cum oleo medetur. Nigræ hederæ succus,

n aut





HEDERA  
NIGRA.

Maurepew.





HEDERA  
HELIX.

Klein & Phew.



**C** aut e poti corymbi imbecillitatē pariunt, mentemq̃ turbant largius sumpti. Pilulae quinque corymborū tritae calefactaeq̃ in malicorio cum rosaceo si instillantur in contrariā aurem, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in uino decocta, omniū ulcerum generi, etiam si cacoethe sint, illinuntur. Vicia cutis in facie & ambusta, uti iam diximus decocta, sanant. Mouent menses triti & subditi corymbi. Idem poti post purgationes foeminarū drachmę pondere sterilitatem faciunt. Pediculus foliorū melle irrigatus, ac uulua inditus, menstrua & foetus extrahit. Succus instillatus in naribus, graueolentiā & putredines expurgat. Lachryma eius depilat, pediculosq̃ illita necat. Radicum succus cum aceto potus, phalangiorum moribus succurrit.

## EX GALENO.

Viridis, folijs eius in uino decoctis, ulcera grandia conglutinat, quaeque maligna sunt, ad sanitatem reducit. Igne etiam factas exulcerationes cicatrice includit. Cum aceto decocta folia lienosis profunt. Flores autem quodammodo ualidiores sunt, ut ad leuorem redacta cum cerato ambustis conueniant. Praeterea succus medicamentū est, quod naribus infusum capiti purgando idoneum existit. Vetusitas aurium fluxiones sanat: ad haec ulcera uetera tum in auribus, tum in naribus. Porro si acrior appareat, aut rosaceo, aut dulci oleo misceatur. Lachryma eius pediculos interimit, pilis nudat, usque adeo calida potestatis ut obscure adurat.

## EX PLINIO.

Natura omnium Hederarū in medicina anceps. Mentem turbat & caput purgat largius pota. Neruis intus nocet. Iisdem neruis adhibita foris prodest. Eadem natura quae & aceto, ei est. Omnia genera eius refrigerant. Urinam ciunt potu, capitis dolorem sedant, praecipue cerebro: continentiq̃ cerebrū membranā utiliter

**D** mollibus folijs impositis, cum aceto & rosaceo tritis & decoctis, addito postea rosaceo oleo. Illinuntur autem fronti, & decocto eorū fouetur os, caputq̃ perungitur. Lienī & pota & illita profunt. Decoquantur & contra horrores febrium, eruptionesq̃ pituitae, aut in uino teruntur. Corymbi quoque poti uel illiti lienem sanant: iecinora autem illiti. Trahunt & menses appositi. Succus Hederæ tadia nariū graueolentiamq̃ emendat, praecipue albæ satiuæ. Idem infusus naribus caput purgat, efficacius addito nitro. Infunditur etiam purulentis auribus, aut dolentibus cum oleo. Cicatricibus quoque decorem facit. Ad lienes efficacior albæ est, ferro calefactus: satisq̃ est acinos sex in uini cyathis duobus sumi. Acini quoque ex eadem alba terni, in aceto mulso poti, tineas pellunt: in qua curatione uentri quoque imposuisse eos utile est. Hederæ quam chrysocarpon appellauimus, baccis aurei coloris uiginti, in uini sextario tritis, ita ut terni cyathi potentur, aquā quae cutem subierit, per urinam educit Erasistratus. Eiusdem acinos quinq̃ tritos in rosaceo oleo, calefactosq̃ in cortice punici, instillauit dentium dolori à contraria aure. Acini, qui croci succū habent, praesumpti potu, à crapula tutos praestant. Item sanguinē excreantes, aut torminibus laborantes. Hederæ nigrae candidiores corymbi poti steriles etiam uiros faciunt. Illinitur decocta in uino omniū ulcerum generi, etiam si cacoethe sint. Lachryma Hederæ psilothrum est, phthiriasimq̃ tollit. Flos cuiuscunq̃ generis trium digitorū carptu, dysentericos & aluum citam emendat, in uino austro bis die potus. Et ambustis illinitur utiliter cum cera. Denigrant capillum corymbi. Radicis succus in aceto potus, contra phalangia prodest. Huius quoq̃ ligni uase spleneticos bibentes sanari inuenio. Et acinos terunt, moxq̃ cōburunt, & ita illinunt ambusta, prius perfusa aqua calida. Sunt qui & incidāt succi gratia, eoq̃ utantur ad dentes erosos, frangi q̃ tradunt, proximis cera munitis ne ledantur.

Gummi etiam in Hederā quarunt, quod ex aceto utilissimum dentibus promittunt,





CERASVS

Kirschen.

n 3



C

## NOMINA.

Cerasus unde  
dicitur.

ΕΡΑΣΟΣ Græcis, Cerasus Latinis, Germanis Kirschenbaum dicitur. Cerasum autem arborem, ut Athenæus refert lib. ij. Dipnosoph. à Cerasunte Pontica ciuitate, primus in Italiam Lucullus intulit, debellato Mithridate. Ille idem est qui etiam fructum cognomine ciuitatis appellauit Cerasium.

## GENERA.

Multa Cerasiorum sunt genera, in Germania tamen tria, quod sciam, duntaxat proueniunt. *Primum.* Primi enim generis sunt rotunda, ac maxime rubent, suaq; uoce illis dicuntur *Amarellen*. *Secundum.* Alterius generis, quod ad figuram attinet, prioribus similia sunt, differunt autem colore, qui illis ad nigredinem accedit. Vocantur autem horum lingua *Weichsel*. *Tertium.* Tertij generis prædictis minora sunt ac longiora, partimq; rubent, partim nigricant: à nonnullis priuatim *Kirschen* uel *Kerschen* appellantur. Nos una icone omnia tria complexi sumus. Quæ in utroq; genere nigra sunt, ea uescentiũ manus & labra succo suo, qui sanguineus est, mororũ instar inficiunt.

## FORMA.

Cerasus folio ferè Mespili, duro, latiore, & in ambitu serrato cõstat, cortice lguo, in candido nigricante, flore albo racematim congesto, fructu rubro aut nigro, magnitudine fabæ.

## LOCVS.

Frequens est in omnibus hortis Cerasus. Quæ tamen posterioris generis Cerasia profert, in syluis nonnunquam & nemoribus etiam reperitur. Gaudet autem aquosis montibus.

## TEMPVS.

Junio ac Iulio potissimum mensibus fructus maturitatem consequitur. Flores primo statim uere apparent.

## TEMPERAMENTVM.

Cerasorum non unum idemq; est temperamentum, quod ex eorundem facultatibus perspicuum fit. Symeon tamen Sethi frigida & humida esse tradit.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Cerasia quidem ipsa si uiridia sumantur, uentri utilia sunt. Eadem siccata aluum sistunt. Gummi Cerasorum cum uino diluto sumptũ, uetustæ tussi medetur. Colorem commendat. Visum exacuit. Appetentiam inuitat. Idem ex uino potũ calculosis auxilio est.

## EX GALENO.

Cerasus arbor fructũ fert non paris adstrictionis in omnibus particulatim plantis participem. Nam & in horum, sicut etiam malorum granatorum, & malorum, quibusdam austera qualitas, in quibusdam uero dulcis, in nonnullis autem acida exuperat. Quinetiam ipsorum dulcium ea quæ nondum concocta sunt ac matura, quædam admodũ acerba sunt, quædam similiter moris acida. Sed in moris immaturis acida qualitas acerbã exuperat, in Cerasijs non semper. Ergo quæ dulcia sunt, magis quæ in intestinis sunt subducunt, sed minus apta stomacho sunt. Contrà austera. Quæcunq; uero acida sunt, ea pituitosis excrementosisq; stomachis conueniunt. Siquidem austeris magis exiccant, & nonnihil etiam incidunt. Porro ipsius arboris gummi cõmunem omnibus uiscosis & mordacitatem expertis medicamentis facultatem obtinet, quæ & ad arterias exasperatas accõmoda est. Propriè autem (si quidem uerum est quod quidam scribunt) calculis uexatos cum uino potum adiuuat. Nam sicilli tenuium partium quædam facultas inest.

## EX PLINIO.

Cerasa & aluum molliunt, stomacho utilia. Eadem siccata aluum sistunt, urinã ciunt,



**A** ciunt. Inuenio apud autores, si quis matutino roscida deuoret cum suis nucleis, in tantum leuari aluum, ut pedes morbo liberentur.

## EX SYMEONE SETHI

Cerasia mali succi sunt, uentrem subducunt, humidum uentriculū ledunt, praesertim cum non sunt matura. Profunt autem calidis & siccis uentriculis ac temperaturis. Gummi uerò arboris cum uino sumptum calculosis auxiliatur.

## APPENDIX.

Sunt qui tradunt gummi quod ex arbore destillat ueteri tussi mederi, ex quo sumptum gutturis lenire asperitates, fastidia discutere, & ciborum appetentiam moliri. Colorem cutis facere gratiorem, & oculis afferre claritatem. Lichenes infantium ex aceto sanare.

## DE CYANO CAP. CLXI.

## NOMINA.

**K**YANOS Græcis, Plinio & Latinis alijs Cyanus appellatur. Nonnullis Baptifecula, quod secantibus & metentibus officiat, retusa in eius cursu falce. Nam & seculam ueteres falcem dixerunt. Rectius tamen Blaptifecula uocaretur, quod *βλαπτικόν* Græcis nocere significet. Nostri florem frumentorum, Germani autem *blaw Kornblumen* nominant, quod scilicet in frumentario nascatur agro. Cyanos uerò dicta est hæc planta, ob florem quem profert cœruleum, aut quod honorem nomenque dederit cœruleo colori. Hinc est quod pueri in hodiernum usque diem barbulas calycibus erutas, ex candido oui liquore terant, quo in pingendis grandioribus literis cœrulei nitorem mentiantur.

Baptifecula.

Flos frumentorum

Cyanos cur dicta

**B**

## FORMA.

Caulis illi est angulosus, folia angusta & oblonga, calyces rosarum, sed squarosi atque tristes, quos plurimæ cœruleæ stipant barbulae. Radix oblonga, lignosa, fibris quibusdam capillata.

## LOCVS.

Triuialis flos est, passim in frumentis nascens.

## TEMPVS.

Iunio potissimum mense floret, nec parum gratiæ suo cœruleo colore frumentis adfert. Hinc est quod rusticorum etiam coronis inferatur, quanquam inodorus prorsus sit.

## TEMPERAMENTVM.

Frigidæ est temperaturæ atque adeo repellentis, id quod gustus etiam facile indicat, uiscositate manifestam, & nullum prorsus caloris indicium præ se ferens.

## VIRE S.

Recentiores rectè tradunt huic herbæ facultatem inesse, qua oculis alijsque partibus inflammatione laborantibus profit.







A

## NOMINA.



**K**ROMMYON Græcis, Cepa, & in neutro Cepe, Latinis dicitur. Officinæ genuinum nomen retinuerunt. Germanis Swibel appellatur: quod sennè uocabulum à Gallico detortum esse uidetur: quandoquidem Galli sua lingua Cepam uocant Siboulam. Crommyon autem, Aristotele in problematis autore, dictum est, quod oculi pupillam comprimi cogat. Nam oculos uellicando expressis subinde lachrymis contrahi pupillas certum est. Idem libro nono Dipnosoph. testatur Athenæus. Cepa uerò à capitis magnitudine.

Crommyon nomen  
de dictum.  
Cepa quare nota  
cata.

## FORMA.

Folia habet ferè porracea, intus concaua: caulem teretem rotundumq̃, per cuius fastigium flores primùm candidi, ac subinde semen, in orbem sparguntur: radicem capitatam pluribus compactâ tunicis, quæ summam prætenuibus rufisq̃ uestitur membranis, uertice nigricantē, à quo fibræ capillitij modo fruticant.

## LOCVS.

Terram Cephæ amant pinguem, uehementer subactam & irriguam, passimq̃ hodie in omnibus plantantur hortis.

## TEMPVS.

Floret Iulio potissimū mense, & deinceps semen profert, quod non antè legendum, quàm cum nigrum colorem præ se feret. Siquidem eo colore perfectionem fatetur, nigritiaq̃ maturitatis index est.

## TEMPERAMENTVM.

Ex quarto est ordine excalefacientiū, essentiaq̃ eius crassarum est partium. Si succum eius exprimas, quod reliquum est admodum terreæ substantiæ est, eiusq̃ calidæ: at succus aqueæ aëriæq̃ caliditatis.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.


Cepa longa acrior est quàm rotunda, item flaua quàm candida, sicca quàm uiridis, & cruda quàm cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordicant, flatu gignunt, appetentiam inuitant, extenuant, sitim excitant, fastidium pariunt & expurgant. Aluo utiles sunt. Detractis tunicis inq̃ oleum coniectæ, ac pro glandibus subditæ, hæmorrhoidas, reliquasq̃ excretiones aperiunt. Succus cum melle illitus, oculorum hebetudinibus, argemis, nubeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur, anginaq̃ laborantibus. Suppressos menses mouet. Caput purgat naribus infusus. Canis moribus cum sale, ruta & melle illinitur. Cum aceto autem in sole inunctus alphas sanat. Cum pari spodio, scabras lippitudines sedat. Varos cum sale reprimat. Contra calceamentorum attritus, cum gallinaceo adipe utilis est. Alui fluoribus prodest. Aurium grauitati, ac sonitui confert. Ad purulentas aures, & eliciendam aquam in ijs interceptam ualet. Alopecie earum succo utiliter perfricantur: celerius enim quàm Alcyonium pilos euocat. Largior Ceparum cibus capitis dolores ciet. Cocta uehementius urinam pellit. In morbis, cocta etiam, copiosius comesta, lethargū efficit. Cum pallsis uuis, & fico illita, tubercula cōcoquit & rumpit.

## EX GALENO.

Hæmorrhoidas aperit, tum apposita, tum cū aceto inuncta. In sole alphas abstergit, & alopecijs attrita pilos Alcyonio citius restituit. Porro succus eius ijs qui suffusione oculorū laborant, aut aciem oculorū obtusam præ crassitudine humorū obtinent, inunctus prodest. Tota Cepa manducata flatuosa est. Itaq̃ quæ temperatura sunt sicciore, minus flatuū generant. Crassos corporis humores extenuat, glutinososq̃ incidit. Bis tamen aut ter in aqua decocta, acrimonia spoliatur, quanquam ne sic quidem uim perdit extenuandi: uerum facultatē quandam obscurissimā alendi

corpo-





CEPA

Zwibel.



A corporis exinde acquirit, cuius antea quàm decoqueretur, nihil prorsus obtinebat.

## EX PLINIO.

Cepæ olfactu ipso & delachrymationi, & caligini medentur, magis uero succi inunctione. Somnum etiam facere traduntur, & ulcera oris sanare, commanducare cum pane. Et canis morsus uirides ex aceto illitæ, aut sicce cum melle & uino, ita ut post diem tertium soluantur. Sic & trita sanant. Tostam in cinere epiphoris multi imposuere cum farina hordeacea, & genitalium ulceribus. Succo & cicatrices oculorum, & albugines, & argemas inunxere, & serpentium morsus, & omnia ulcera cum melle. Item auricularum cum lacte mulierum, & in iisdem sonitū ac grauitatem emendantes, cum adipe anserino, aut cum melle stillauere. Et ex aqua bibendum dederunt repente obmutescensibus. In dolore quoque ad dentes colluendos instillauere, & plagis bestiarum omnium, priuatim scorpionum. Alopecias fricuere & psoras tulsis cepis. Coctas dysentericis uescendas dedere, & contra lumborum dolores. Purgamenta quoque earum cremata in cinerem, illinentes ex aceto serpentium moribus, inter ipsas quoque multipedes ex aceto. Reliqua inter medicos mira diuersitas. Proximi inutilia esse præcordijs & concoctioni, inflationemque & sitim facere dixerunt. Asclepiadis schola ad ualidum quoque colorē profici hoc cibo. Et si succum ieiuni quotidie edant, firmitatem ualeitudinis custodiri, stomacho utilia esse, ac spiritus agitationi, uentrem mollire, hæmorrhoidas pelli subditas pro balanis, succum cum succo sceniculi contra incipientes hydropises mirè proficere. Item contra anginas, ruta & melle. Excitari eisdem lethargicos.

## EX SYMEONE SETHI.

B Cepa lotium cit, & semen genitale gignit. Cibi appetentiam excitat. Capitis dolores facit, & stomacho officit. Rationem etiam, ut aliqui ferunt, lædit. Si uero coquatur, plurimum malignitatis deponit, & utilis fit ad thoracis asperitates, & tussis. Hæmorrhoidas imposita aperit, & cum aceto inunctum alphas extergit. Etsi autem crassarum partium substantiā habeat, humores tamen crassos & lentos extenuat. Ventriculum uero inflat. Si crebrius quis ea utatur, in lienis uitia incidit.

## DE CAMPANULA CAP. CLXIII.

## NOMINA.



VVM nobis non constet quo nomine ueteribus appellata sit hæc herba, placuit illam Campanulam, à florum similitudine, qui campanā planè referunt, nominare. Germanis Halskraut, hoc est Ceruicaria, dicitur, quod scilicet ad oris, & ceruicis, fauciumque mala mirifice conferat.

Campanula una  
de dicta.  
Ceruicaria.

## FORMA.

Caulem profert quadrangularem, hirsutum, rubescentē, folia oblonga, hirsuta, in extremitatibus incisa & serrata, ad Vrticam proxime accedentia, flores purpureos campanæ aut calathæ similes, in medio luteum quid prominens obtinentes, quibus emarcescentibus in rotundis capitulis semen prouenit. Radicem multifariam intortam, & candidam.

## LOCVS.

Gignitur in pratis siccis, in quibus dumeta plurima existunt. Propemodū enim nunquam nisi in dumetis reperiri potest.

## TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Gustu adstringit, ut hinc exiectioni illi uim esse quisque conijcere queat.

## VIRE S.

Adstringendi habet facultatem, ideo ꝑ decoctum illius unicè ad oris exulcerationes,





CAMPANULA


Salzkraut.



ationes, aliâque eiusdem mala quæ adstrictione indigent, confert. Vtilis etiam haud dubiè ad alia quæuis ulcera, ob insignem quam obtinet in exiccando facultatem.

## DE CALAMINTHA CAP. CLXIII.

## NOMINA.



**ΚΑΛΑΜΙΝΘΗ** Græcis, Calamintha Latinis, officinis Calamentum nominatur. Germanicas appellationes paulò post indicabimus. Calamintha uerò dicitur quasi uel bona, uel utilis mentha: namque nidore suo serpentes fugat. Quod testatur etiam Aristophanes his uerbis: *οὐ δὲ ἔστι καλαμίνθης, ὅπως ἐλεσται.* Nisi quis existimet à *κέλευ*, hoc est, ligno, quasi lignosam appellari mentham.

## GENERA.

Calaminthæ Dioscorides tria facit genera. Primum amat montes, ideo huius generis Calamintha montana uocatur. Germanis *Stein oder Ragenmünz* dicitur. Alterum Latini propriè Nepetam, uulgo eò quod Pulegio simile sit, sylvestre Pulegium nominat. Germani etiâ uulgi opinionem sequentes, *wilden Poley & Rornmünz* uocant. Officinæ pro Calamento hoc solo genere utuntur. Tertium Mentastro simile est, Germanicè *Geelmünz* commodè appellatur.

## FORMA.

Primum Calaminthæ genus folia Ocymo similia habet, subalba, ramulos angulosos, florem purpureum. Alterum Pulegio simile est, maius tamen, propter quod quidam, ut dictum est, sylvestre Pulegium nominant, quoniam & odorem illius æmuletur. Tertium Mentastri similitudine est, longioribus folijs, caule & ramis prædictis maius, sed minus efficax: flore luteo.

## LOCVS.

Primi generis Calamintha in montibus & asperis gignitur, unde & montana dicta est. Alterius in campestribus & agris. Tertij in aquosis locis.

## TEMPVS.

Florent Iunio, potissimum uerò Iulio, mense.

## TEMPERAMENTVM.

Calamintha essentia est tenui & calida, siccaque in tertio quodammodo ordine. Horum manifesta sunt indicia, partim gustu apparentia, partim experientia cognita. Gustu quidè acris & palam calida est, ac paulum omnino amaritudinis obtinet.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Omnium folia gustu feruentia admodum & acria, Radix inutilis. Pota aut illita demorsis à serpente opitulatur. Decoctum eius potum urinas & menses expellit. Ruptis, conuulsis, orthopnceæ, torminibus, cholera, rigoribusque auxiliatur. Præsumpta in uino uenenis resistit. Regium morbum expurgat. Lumbricos & ascaridas cum sale & melle pota, enecat. Nec secus cocta crudaque si terant. Elephanticos esitata adiuuat, si postea serum lactis bibatur. Folia trita & apposita, menses ducunt, & fetus interimunt. Accensa aut substrata serpentes fugant. Nigris cicatricibus candorem reddunt, in uino cocta & illita. Sugillata tollunt, Ischiadicis imponitur, ut humorem ex alto euocet, meatumque transmutet, summam cutem exurens. Vermes necat succus auribus instillatus.

## EX GALENO.

Periclitantibus & corpori admouentibus extrinsecus imposita, primū quidem ualde exalfacit & mordicat, cutemque laniat, postremo etiam ulcus efficit. In corpus autem intrò assumpta, tum ipsa per se sicca, tum etiâ cum melicrato, perspicuè calfacit, & sudorem ciert, omnemque corpus tum digerit, tum exiccat. Ea ratione ducti quidam ipsam contra rigores per circuitum repetentes adhibuerunt, foris quidem oleo

o inco-





CALAMINTHAE PRI  
MVM GENVS.

Ratzenmüntz.





CALAMINTHAE SE  
CVNDVM GENVS.

Wilder Polch.



436



CALAMINTHAE  
TERTIVM GENVS.

Gele Müntz.



**A** incoctam toti corpori inungentes cum frictione non segni, intrò uero assumentes, sicuti est dictum. Quinetià & coxendicibus eam quidam in argritudinibus ischia-  
dicis tanquã strenuum remediũ illinunt: trahit enim quæ in profundo hærent, to-  
tumq; adeo articulum excalfacit, cutemq; non obscure adurit, mensesq; tum pota,  
tum apposita admodũ efficaciter prouocat. Bonum etiam elephantiorũ remediũ,  
non eò tantum quod strenuè tenues humores digerat, uerumetiã quia extenuet &  
incidat ualenter crassos, quales sunt qui hunc morbũ procreant. Sic & cicatricibus  
attris candorem reddit, & sugillata digerit. Sed ad talia recentem magis quàm aren-  
tem adhibere præstat. Quippe arefacta uehementior redditur, & ad urendũ prom-  
ptior. Porro talis cum sit, ad uenenatarũ bestiarũ morsus assumitur, uelut etiã cau-  
teria, & quæcunq; medicamenta calida sunt & acria, tenuiumq; partiũ, quæq; faciliè  
ex alto ad sese circumiacentẽ omnem humiditatẽ possunt attrahere. Caterũ quæ il-  
li inest amaritudo, planè exigua est, uerum ad quædã ita efficaciter agit, ut quæ ua-  
lentissima est, nimirũ quum cõiuncta sit uehementi calori cum tenui essentia. Qua-  
re & ascaridas & lumbricos succus eius infusus aut potus enecat. Eadem ratione au-  
rium uermes, aut si alicubi in parte corporis sinuosa aut implicata quæ putredine  
tentetur, talis prouenerit affectus. Sic & conceptũ seu pota, seu admota interimit &  
eijcit. Igitur incidendi quidem ei uis adest propter calorẽ eius, tenuitatem, & amari-  
tudinẽ: abstergendi uero propter unicam amaritudinẽ. Itaq; asthmaticis ob omnia  
antedicta prodest. Ictericis uerò potissimum ob amaritudinẽ, sicut alia ferè omnia  
amara, utpote abstergentia & expurgantia in iecinore prouenientes obstructio-  
nes. Ad omnia iam dicta efficacior est montana.

## EX PLINIO.

**B** Decocta in aqua ad tertias discutit frigora. Mulierũ menstruis prodest. Acstate  
sedat calores. Vires quoq; contra serpentes habet. Fumũ ex ea nidoremq; fugiunt,  
quam & substernere in metu obdormituris utile est. Tusa ægilopis imponitur, &  
capitis doloribus recens, cum tertia parte panis temperata aceto illiniẽ. Succus eius  
instillatus naribus supinis, profluuiũ sanguinis sistit. Item radix cum myrti semine  
in passo tepido gargarizata, anginis medetur.

## DE CRITHE CAP. CLXV.

## NOMINA.



**P**ΙΘΗ Græcis, Hordeũ Latinis & officinis dicitur. Germanis *Gersten*.  
Ex eo polenta, quam Græci *ἀλυσσιν* nominant, & Pislana, medicamen- *Polenta.*  
ta ueteribus usitatissima, conficiuntur.

## GENERA.

Rustici duo esse Hordei genera tradunt. Vnum Polystichũ, quod sic dictum est *Hordeum polys-*  
quia in multos uersus spicatur. Sunt enim ex hoc genere quæ spicam tribus, interdũ *stichum.*  
quatuor, nunc sex, nunc octo uersibus distinctã proferunt. Germanis *groß Gerst*/  
hoc est, Hordeũ magnum uocatur. Alterum Distichũ nominatur, quod scilicet in *Distichum.*  
duos duntaxat uersus spicetur. Germani *klein Gersten*/id est, Hordeum exiguum  
appellant.

## FORMA.

Culmum habet tritici, fragiliore tamen minoremq; quinque, sex, & interdum  
pluribus geniculatũ articulis, simplici in stipula folio, & eo quidem scabro ac lato.  
Grana ferè nuda, longiore capillamento, mordaciq; arista. In uersus spicatur, radice  
frequenti, capillis fibrata.

## LOCVS.

Hordeum pinguisimum amat agrum.





A detailed botanical line drawing of a barley plant. The illustration shows the root system at the base, with several roots extending downwards. A single stem rises from the roots, featuring several long, narrow, lanceolate leaves that are slightly curved. At the top of the stem is a single, elongated spikelet, which is the fruiting part of the plant. The drawing is executed in a fine-line style typical of 19th-century botanical publications.

**HORDEVUM**  
POLYSTICHUM.

Grosse Gerst.





HORDEVN DI  
STICHVM.

Kleine Gerst.



C

## TEMPVS.

Erumpit à primo fatu die septimo, & caput alterum grani in radicem exit, alterũ in herbam. Metitur Augusto mense.

## TEMPERAMENTVM.

Hordea primi sunt ordinis in exiccando & refrigerando.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Hordeum optimũ est candidum, purumq̃. Minus quàm triticum nutrit. Pti-  
fana tamen ob cremorem in elixatione redditum, plus alimenti præbet quàm po-  
lenta ex hordeo facta. Contra acrimonias atq̃ faucium scabritias, exulcerationesq̃  
pollet, quibus etiam triticea ptifana præsidio est, sed plus alit, magisq̃ urinam mo-  
uet. Lac abundè suppeditat, si cum Fœniculi semine decocta sorbeatur. Abstergit,  
urinam ciet, inflat, stomacho aduersatur, & cedemata concoquit. Farina hordeacea  
cum fico in mulsa aqua decocta, cedemata & inflammationes discutit. Duritias cū  
pice, resina & fimo columbino concoquit. Cum meliloto autem & papaueris caly-  
ce dolores finit qui latus excruciant. Aduersus intestinorum inflationes, cum lini  
semine, fœnogræco & ruta illinitur. Strumas cum pice liquida, cera, oleo, & impu-  
bis pueri urina, ad concoctionem perducit. Cum Myrto autem, aut uino, aut syl-  
uestribus pyris, aut rubo, aut malicorio, alui profluuia sistit. Podagricis inflama-  
tionibus cum cotoneis, aut aceto prodest. Decocta in acri aceto, modo quo hordea  
cum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Liquata eadem cum aqua, atq̃  
cum pice & oleo decocta, pus excitat. Cum aceto autem liquata, & cum pice deco-  
cta, contra articulorum fluxiones prodest. Farina ex ijs aluum cohibet, inflam-  
mationesq̃ mitigat.

## EX GALENO.


D Hordea pauxillum etiam absterfionis habent. Paulò etiam plus desiccant quàm  
farina fabacea, cui non insint cortices. Cetera uerò similia sunt foris utentibus. In ci-  
bo autem hoc præstant fabis, quod flatuosam naturā exuant: fabis quantumcunq̃  
que coxeris, flatuosa natura remanet: sunt enim crassioris essentia quàm hordea,  
quamobrem ijs plus etiam nutriunt. Quoniam uerò ambo paulum à medio reces-  
serunt, multo sunt usui. Nam talia medicamenta multis alijs miscentur ceu mate-  
ria quædam: itaque etiam cera & oleum paucis medicamentis coniunguntur. Po-  
lenta uerò multo plus hordeo desiccatur. Plura de hordeo, ptifana & polenta apud  
Galenum libro primo de alimentorũ facultatibus offendes.

## EX PLINIO.

Farina ex hordeo & cruda & decocta, collectiones impetusq̃ discutit, lenit & con-  
coquit. Decoquitur aliàs in mulsa aqua, aut fico sicca. Ad iccinoris dolores eam in  
posca positam cōcoqui opus est, aut cum uino. Cum uero inter coquendum discu-  
tiendumq̃ cura est, tunc in aceto melius, aut in fece aceti, aut cotoneis pyrisue deco-  
ctis. Ad multipedũ morsus cum melle, ad serpentium in aceto & contra suppuran-  
tia, ad extrahendas suppurationes ex posca, addita resina & galla. Ad concoctiones  
uero & ulcera uetera cum resina. Ad duritias cum fimo columbino, aut fico sicca,  
aut cinere. Ad neruorũ inflammationes, aut intestinorũ uel laterum uel uirilium  
dolores, cum papauere aut meliloto, & quoties ab ossibus caro recedit. Ad stru-  
mas cum pice & impubis pueri urina. Cum oleo & fœnogræco contra tumores  
præcordiorum, uel in febribus cum melle, uel adipe uetusto. Suppuratis tri-  
ticea farina multo lenior. Neruis cum Hyoscyami succo illi-  
nitur. Ex aceto & melle lentigini.

DE CRO-





CROCI FLORES

Saffranblumen.

CROCI FOLIA.



Saffranblätter.



C

## NOMINA.

Crocus inde  
dictus.

POKOS Græcis, Crocus Latinis appellatur. Officinæ antiquū nomen retinuerunt. Germani Saffran uocant simpliciter, aut cum adiectione, zamer Saffran. Sic uerò uocatus à Croco iuuenē, qui propter amorem Smilacis uirginis, in florem sui nominis uersus est: quod Ouidius testatur, qui sic scriptum reliquit:

*Et Crocum in paruos uersum cum Smilace flores.*

## FORMA.

Crocus folio est angusto adusque capillamenti penē exilitatem: flore purpureo Colchici floribus non admodum dissimili, in quo flammea Croci stamina: radice bulbosa, copiosaq; ac uiuaci.

## LOCVS.

Nascitur in Coryco monte Ciliciæ optimus. Proxima nobilitas ei qui in Olym-po Lyciæ monte prouenit. Dein ei qui ex Aegis Ætoliciæ urbe affertur. Nunc in plerisque Germaniæ locis plantari cœpit haud infeliciter, quod uiribus ē locis iam cōmemoratis allatis haud cedat.

## TEMPVS.

Florem ante folium ædit: per autumnū nanq; Vergiliarum occasu floret, neque ultra mensis spacium flores durant. Postquā autem hi decidunt, statim folia angusta & oblonga prodeunt, uirentq; tota hyeme.

## TEMPERAMENTVM.

Crocus paulum quid adstringens obtinet, quod terreum frigidumq; est: sed superat in eo calefaciens & qualitas & facultas, ut tota essentia secundi sit ordinis excalescentium, & primi exiccantium.

D

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Crocus emollit, concoquit, leniter adstringit, urinam cit, & coloris bonitatē efficit. Arcet crapulam cum passo potus. Fluxiones oculorū cum lacte muliebri inunctus sistit. Potionibus quæ pro interaneis parantur, utiliter miscetur: item ijs quæ uulvæ sediq; subiiciuntur & illinuntur. Venerē stimulat. Inflammationes erysipelatosas inunctus lenit. Aurium remedijs utilissimus est. Letalem sanē dicunt hunc si trium drachmarū pondere cum aqua bibat. Radix eius cum passo pota, urinā cit.

## EX GALENO.

Crocus concoquendi uim quandam habet, adiutante scilicet in hoc & pauca adstrictione. Quippe quibus medicamentis, quum non admodū excalfaciāt, paucula adest adstrictio, ea parem facultatē habent essentis emplasticis nominatis, quas cum iunctas caliditati non uehementi contigerit, concoquentes esse constat.

## EX PLINIO.

Discutit inflammationes omnes quidem, sed oculorū maximē ex ouo illitū. Vuluarum quoq; strangulatus. Stomachi exulcerationes, pectoris & renum, iecinorū, pulmonū, uescicarumq; peculiariter inflammationi earum uehementer utile. Item tussi & pleuriticis. Tollit & pruritus. Urinam cit. Qui Crocum prius biberint, crapulam non sentient. Ebrietati eo resistunt. Corone quoq; ex eo mulcent ebrietatē. Somnum facit. Caput leniter mouet. Venerē stimulat. Flos eius igni sacro illinitur cum creta Cimolia. Ipsum plurimis medicaminibus miscetur.

## EX SYMEONE SETHI.

Stomacho bonus est, ciborumq; concoctionē efficit. Obstructiones tollit. Pituitosa & lethargica uitia iuuat. Discutiendi quoque uim obtinet, & uisceribus utilis est, ad spiritusq; difficultatē conducit. Si quis illo mediocriter utatur, bonum colorem habebit: sin uerò citra modum, pallorem contrahet, & capitis dolorem, cibiq; inappe-



A inappetentiam faciet. Cum opio & lacte & rosaceo pedum doloribus impositus ubi dolent, summopere prodest, superpositis Betæ folijs.

DE CYNOCRAMBE CAP. CLXVII.

NOMINA.



YNOKPAMBH, ἡ κυνία, ἡ λινόζωστis ἀγρία ἀγρίων Græcis, Canina Brassica, Cynia, & sylvestris mercurialis mas Latinis, wild Bingeltraut das memle/Hundstöl Germanis appellatur.

FORMA.

Caulem ex se mittit dodrantalem, tenerum & subalbidū. Folia Mercuriali similia, albescencia ex certis interuallis. Semen prope folia paruum, rotundum. Ex qua quidem deliniatione sole meridiano clarius est, herbam cuius picturam damus esse Cynocramben. Siquidem ea caulem binūm palmorum altitudine habet, mollem & subcandidum. Folia Mercuriali similia admodum, certis interstitijs, subalbida. Semen item iuxta folia exiguum, rotundum, geminorū instar testiculorum connexum: & in summa, nihil est quod non in ea descriptioni adamussim respondeat.

LOCVS.

In syluis copiose prouenit.

TEMPVS.

Semen ueris initio, nempe Aprili mense, profert, maturescit autem Maio.

TEMPERAMENTVM.

Quum gustu nihil à satiua Mercuriali distet Cynocrambe, colligitur hinc idem quod illa obtinere temperamentum.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

B Caulis & folia pota, & olerum modo comesta aluum ciunt. Ius uero decoctorū bilem & aquosa detrahit.

APPENDIX.

Alia est Cynocrambe ab hac nostra, ea cuius mentionem facit Galenus, Paulus & alij, adde etiam Dioscorides, uerum sub nomine Apocyni: quod lectorem, ne diuersas herbas unam esse putaret, monere uolui.



CYNOCRAMBE

Wild Bingelkraut.





A

## NOMINA.



COLYTEA Græcis, Colytea & Colutea Latinis dicitur: à nullo tamen, quod sciam, ueterum, quàm à Theophrasto lib. iij. de plant. hist. cap. xviij. celebrata.

## GENERA.

Duo eius sunt genera. Vnum quod priuatim Colytea uocatur, officinis incognitum. Germani welsch Linsen appellant. Alterum officinis cognitum & frequentius usu à medicis usurpatum, Mauritano sermone Sena nominatur. Germani ad eam alludentes appellationem, Senet nuncupant. Differunt autem inter se magnitudine: siquidem primum genus maius est altero, utpote quod quadriennio, Theophrasto loco paulò antè citato teste, se in arborem efferat. Siliquæ etiam illius magis turgido spiritu distenduntur, Sena uerò siliquas profert lunatas, nec ita prætumidas. Semen denique Colyteæ rotundum, lentis obtinens similitudinem: Senæ autem oblongum, cordisq; humani instar acuminatum.

## FORMA.

Frutex est ramis exilibus, folio scenigræci, flore genistæ aut pisi luteo, membra-  
neo folliculo, pellucente, prætumido, & ueluti quodam spiritu distendente turgi-  
do, ita ut digitis si prematur, crepitans disiliat, in quo semen atrum, durum, latum,  
lentis magnitudine, pisi gustu, in ordinemq; digestum clauditur.

## LOCVS.

Satum utrunque in hortis prouenit.

## TEMPVS.

Floret Colytea Maio & Iunio mensibus, ac subinde in siliquis oblongis semen  
B profert.

## TEMPERAMENTVM.

Arabes calidam in principio secundi, & siccam in primo ordine statuunt.

## VIRE. EX ACTVARIO.

Sene siliquosus quidam fructus à barbaris appellatur, qui citra noxam drachmæ pondusculo potus, pituitam & bilem deijcit: post hos reliquos humores modestissime purgat, retorridam atramq; bilem, eiusq; suffusiones ex gallinaceo iure depellit. Vetus capitis dolori, scabiei, comitialibus, impetigini succurrit. Sed feruēfacti ius potius quàm tritici farina propinatur. Interaneorum obstructions tollit.

## APPENDIX.

Quum non forma tantum, imò etiam sapore duo hæc Colyteæ genera sibi similia sint, facile etiam hinc colligitur facultate inter se minimè differre. Quare utrunque citra molestiam atram bilem retorridamq; educit, caputq; ac cerebrum, & instrumenta sensuum à noxijs purgat humoribus. Quid multa? aduersus omnia uicia ab atra bile nata ualet.

P

DE CORO





COLYTEA

Welsch Einsen.






SENA

Senec.



## NOMINA.

Pes Cornicis.  
Coronopus nō  
de dicta.  
Sanguinaria.  
Herba stelle.



Cornu ceruinum

ΟΡΩΝΟΡΟΥΣ, ἡέσπιος Græcis, Pes Cornicis & Sanguinaria Latinis dicitur. Officinis incognita herba. Germanis cōmodè Kræn oder Rappensiß appellari potest. Coronopus enim non alia ratione dici cœpit, quàm quod Cornicis pedem effigie repræsentet. Sanguinaria autem Sanguinalisue uocata est, quod sanguini sistendo apta sit herba. Sunt qui herbam Stellæ nominant, alludentes haud dubiè ad græcam appellationē astrion. Nonnulli quod folium eius multipartitò confectum in ceruini cornu imaginem effigietur, Ceruinum cornu uocant.

## FORMA.

Herbula est oblonga, per terram strata, folijs fissis, radice gracili & adstringente. Ex qua quidem descriptione, etsi concisa admodum, satis liquet, herbam hanc cuius picturam damus esse Coronopum. Herbula enim est folijs oblongis & scissis ac in multas partes laciniatis, atque adeo cornicis pedem effigie referentibus, humi quoque semper sparsa proserpit: radice denique tenui admodum & adstringente prædita. Quibus omnibus id quoque accedit, quod Dioscorides Psyllium folia Coronopo similia habere scribit: quod si uerum esse ex utriusque herbæ collatione experiri uolueris, senties Coronopi huius nostri folia planè Psyllij folijs simillima esse, potissimum ubi primum è terra erumpunt: imò quod ad folia, flores & semina attinet, omnia in utrisq; sibi similia deprehendes, in eoque solo distare comperies, quod Psyllium folia non fissa habeat, & in altum surgat, singulaq; iam dicta maiora producat: contrà Coronopus humi repat, minoraq; omnia proferat. Vtracq; igitur herba luteos obtinet flores, & semina in capitulis pulicibus similia. Capitula uerò in Coronopo sunt multo quàm in Psyllio tenuiora ac longiora, id quod pictura D graphice monstrabit. Ex ijs quoque manifestum fit errare illos toto cœlo, qui gramen aculeatum & Coronopum unam & eandem herbam esse contendunt, cum tamen forma non parum distare uideantur. Atque hinc est quod omnes ueteres tam Græci quàm Latini utranque herbam seorsim, & in diuersis locis descripserint. Plinius siquidem lib. xxiij. cap. xix. aculeatum gramen in cacumine aculeos plurimum quinos habere, atque adeo Dactylon uocatum esse hoc nomine, quod scilicet digitorum speciem referat, scribit. Coronopus uerò neque quinos, neque in cacumine aculeos obtinet, sed tantum folia fissa, uel si aculeos placet appellare has fissuras, non in cacumine, sed in ambitu passim foliorum eas reperiens: ut certum sit Coronopum non esse aculeatum gramen.

## LOCVS.

Dioscorides in incultis, semitis, & iuxta domicilia nasci tradit. In Germania tamen, quod sciam, nusquam nisi fata prouenit.

## TEMPVS.

Floret Iunio mense, ac subinde in oblongis capitulis semen profert.

## TEMPERAMENTVM.

Ex adstrictione ipsa satis constat radicem ipsam siccandi ui præditam esse.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Herba cocta estur olerum modo. Radicem habet in cibo adstringentem, quæ cœliaci conducant.

## EX GALENO.

Coronopodis radix comesta cœliaci prodesse creditur.

## EX PLINIO.

Seritur interim Coronopus, quoniã radix cœliaci præclarè facit in cinere tosta.





CORONOPVS

Kränsfuß.



Cyclaminus 1019  
de dicta.

Ichthyotheron.

Rapum terre.

Tuber terre.

Umbilicus terre.

Panis porcinus.

Panis terre.



YKAAMINOS, ἡχθυόθερον Græcis, Rapum & tuber umbilicusq; terræ Latinis, Cyclamen officinis mutata uoce, Panis porcinus & terræ, atq; Arthanita à nostræ ætatis herbarijs, Germanis Erdwurz oder Apffel/Schwein oder Sewbrot dicitur. Cyclamino Græci nomen fecerunt, circumactâ in orbem eius circinationē contemplati, ὡς τοῦ κύκλου, quasi ab orbe Cyclaminon, hoc est, orbicularē dixerunt. Fuitq; hæc prior & antiquior plantæ huius appellatio. Ichthyotheron uerò idem, quod pisces ea necantur nominauerunt. Romani Rapum terræ, quoniam eius radix in terra uelut Rapum extuberat. Quæ sanè ratione terræ tuber, quod in molem quandam intumeat: aut umbilicum terræ, quoniam ut umbilicus circinata forma emergit, sic & Cyclaminus sub terra conspicitur, etiam appellarunt. Panem porcinum haud dubiè primum uocarunt subulci, qui pecori suo radicem huius gratam pabulis cognouerunt. Cæteri antiquum Cyclamini nomen ignorantes, quod sapius radicem in orbem circumactâ intuerentur, quæ non in globum intumescens, sed ueluti pressa sese in latitudinem explicaret, qua forma quotidiano usu panes uisuntur, terræ panem cœperunt appellare.

## FORMA.

Folia Hederæ habet, purpurea, uaria, suprâ infraq; albicantibus maculis. Caulis longitudine quatuor digitorū, nudum, folijsq; carentem, in quo flores rosatur. figie purpurei. Radicem nigram, rapo similem, in latitudinem se pandentem.

## LOCVS.

Nascitur in umbrosis & uepribus, maximè sub arboribus.

## TEMPVS.

Cyclaminus ad finem Augusti folia sua quæ per integrū retinuit, amittit, & subinde noua emittit, atq; statim inter ea flores ostendit, qui integro durant autumno.

## TEMPERAMENTVM.

Clarum est ex particularibus operationibus, quas statim subiiciemus, Cyclaminum esse calidam & siccam in tertio ordine.


## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix Cyclamini cum hydromelite pota, pituitam, aquamq; per inferna trahit. Menfes pota & apposita cit. Tradunt si prægnans mulier radicem transgrediatur, abortum fieri. Partum appensa accelerat. Bibitur & in uino contra letalia, præsertim leporē marinum. Illita contra serpentium ictus remedio est. Immissa uino ebrietatem facit. Regium morbum sistit tribus drachmis pota cum passo, aut diluta mulsâ. Sed oportet eum qui bibit cubiculo calido reclinare, multis uestibus cōtectum, quò sudet. Eiectus uerò sudor felleus colore inuenitur. Succus eius ad purgandum caput, naribus instillatur. Sedi etiam deijcienda excrementa in lana subiicit. Umbilico, imo uentri & coxæ illitus succus aluū mollit, uerum abortū efficit. Suffusis & hebetibus oculis inunctus cum melle succus prodest. Medicamentis abortū inferentibus admisceat. Sedem procidentē cum aceto inunctus succus cōpescit. Exprimitur rusa radice succus, & ad mellis crassitudinē decoquit. Radix cutem extergit. Exanthemata reprimat. Vulneribus per se ex aceto aut melle medet. Illita lienē minuit. Vitia cutis in facie à sole & alopecias emendat. Decocto eius luxata, podagra, & capitis ulcuscula, pernionesq; utiliter fouent. Ipsaq; in uetere oleo seruata, ad cicatricem perducit quæ oleo illo inuncta fuerint. Cauata radix oleo explet, & cineri feruenti imponit, adiecto interdū thyrrenicæ ceræ modico, ut strigmenti crassitudinem contrahat unguentū, cum primis utile pernionibus. Radix Scillæ modo concisa reponitur. Narrant ad amatoriam assumi cōtusam, & in pastillos conformatâ.

## EX GALENO.

Cyclaminus uarias uires obtinet, nam & extergit, & incidit, & ora uenarum aperit, & attrahit, & discutit. Clarum uerò id est ex particularibus operibus. Nam succus eius





CYCLAMINVS  
Schweinbrot.




Caus eius hæmorrhoidas referat, uiolenterq; ad recessum prouocat in floccis appositus. Sic etiam medicamentis tubercula, strumas, aliasq; durities discutientibus commiscetur, ac suffusis cum melle illitus competit: ad hæc quoq; per nares expurgat. Adeo est uehemens eius facultas, ut abdomine illito uentrem subducatur, & scetum interimat. Nam & alioqui ualidum interimendo conceptui medicamen est, in pefso addita. Tota uero radix succo imbecillior est, quanquam & ipsa uehemens sit. Nam & menses siue epota, siue apposita euocat, & regio morbo prodest, non modo ipsum uiscus expurgans, sed etiam quæ in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem excernens. Proinde à potione omnibus modis sudoris adiuuanda prouocatio est. Modus eius bibendi est drachmarum trium, siue cum melicrato, siue cum passo. Cutem extergit cum in alijs, tum quod alopecias, ephelidas, omniaq; exanthemata curet. Lienem quoque induratum iuuat illita, tum recens, tum arida. Sunt qui radicem siccam asthmaticis exhibeant.

## EX PLINIO.

Cyclamini radix contra serpentes omnes bibitur. In omnibus ferenda domibus, si uerum est, ubi fata sit, nihil nocere mala medicamenta: amuletum uocant: narrantq; ea ebrietatem repræsentari, addita in uinum radice. Et siccata Scillæ modo concisa reponitur, decoquiturq; eadem ad crassitudinem mellis. Suum tamē uenenum inesci, traduntq; si prægnans radicem eam transgrediatur, abortum fieri. Radix denique tribus drachmis bibitur in loco calido, & perfriktionibus tuto: sudores enim felleos mouet.

## DE CYPERO CAP. CLXXI.

## NOMINA.

**D**  **Κ**ΥΠΕΡΟΣ *κῦπερος* Græcis, Cyperus & Cypirus Latinis dicitur. Quum enim Græci quandoq; diphthongo, ut Theophrastus, quandoq; uocali breui, quemadmodum Dioscorides, Galenus & alij quidam, penultimam scribant, sit ut aliqui e, alij uerò i retineant. Poëta qui e ex diphthongo retinuerunt, meritò penultimam in Cypero producunt. Officinæ latinum nomen retinuerunt. Germanis wilder Galgan uocatur.

## FORMA.

Cyperus porri folia habet, longiora tamen, graciliora & solidiora. Caulem cubitalem, & nonnunquam altiorē, angulosum, scæno similem, in cuius cacumine minorum foliorum ac seminis productio est. Radices illi subsunt, quarum usus est, oblongæ, oliuarum modo sibi inuicem commissæ, aut rotundæ, nigræ, suauiter olentes, & amaræ: uel, ut Theophrastus deliniauit, inæquales, partim crassæ, carnosæq; partim graciles atq; furculosæ. Ex qua descriptione omnibus esse perspicuum arbitramur, stirpem cuius nunc picturā damus esse Cyperum. Siquidem folia fert porracea, longiora exilioraq; caulem altitudine cubiti, aut altiorē, angulosum, in cuius cacumine minuta folia prodeunt, inter quæ semen residet. Radices huic sunt oblongæ, oliuarum modo inter se connexæ ac inuicem implexæ, aut rotundæ, nigræ, iucundè spirantes, gustu amaræ. Præterea magna inæqualitate notantur, quod pars quædam crassa carnosaq; quædam gracilis atque lignosa sit. Nemo enim non uidet radice tenuitatē furculosam protinus in oliuaria tubercula uerticillari. Nascentur quoque è latere huius radícula, quod Theophrastus etiam notauit, unde cauliculus erumpit alius, ut pictura affabre monstrat.

## LOCVS.

Nascitur in locis cultis & palustribus. In Germania certè non nisi cultus in hortis prouenit.

## TEMPVS.

Minuta folia in cacumine cum semine Iunio & Iulio mense producit.

TEMPE-



CYPERVS

Wilder Galgan.





C

Cyperi radices maximè usui sunt, excalfacientes pariter & exiccantes citra mordacitatem.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radici Cyperi calefaciendi uis inest, urinamq̃ mouendi. Calculosis & aqua inter cutem correptis pota succurrit. Aduersus scorpionū ictus remedio est. Refrigerationibus uuluae & præclusionibus fori auxiliatur. Pellit menses. Arida trita oris ulceribus, etiam si depalscant, prodest. Malagmatis calefacientibus miscetur, & unguentorum spissamentis accommodatur.

## EX GALENO.

Cyperi radices maximè usui sunt, excalfacientes pariter & exiccantes citra mordacitatem. Itaq̃ ulceribus quæ præ nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt, mirificè profunt: habent enim quiddam etiam adstringens, quapropter ulceribus item oris conueniunt. Quin & incidendi uim quampiam illis inesse testificandum, quæ & calculo uexatis congruunt, & urinam mensesq̃ mouent.

## EX PLINIO.


Cypero uis in medicina psilothri. Illinitur pterygijs, ulceribusq̃ genitalium, & quæ in humore sunt omnibus, sicut oris ulceribus. Radix aduersus serpentium ictus & scorpionum præsertim remedio est. Vuluas aperit pota. Largiori tanta uipellit eas. Urinam ciet & calculos: ob id utilissima hydropicis. Illinitur & ulceribus quæ serpunt, sed his præcipuè quæ in stomacho sunt, ex uino uel aceto illita. Radix in tribus heminis aquæ decocta ad tertias tussi medetur. Semen tostum & in aqua potum, sistit aluum & fecminarum menses, capitisq̃ dolores facit.

D

## DE LATHYRI CAP. CLXXII.

## NOMINA.

Cataputia minor  
quare dicta



ΑΓΥΡΙΣ Græcis, Lathyris Latinis, officinis Cataputia minor, quod in pilulis quibusdam, seu potius catapotijs, semen ferat: aut, quod uerisimilius est, quia granis eius ad aluum subducendam pro catapotijs utantur. Germani Springkraut / Springkörner oder Treibkörner appellant, quod semen scilicet nisi in tempore auferatur, sua sponte ex loculamentis saliendo excidat.

## FORMA.

Cataputia minor

Caulem profert cubitalem, uacuum, digiti crassitudine: in eius cacumine sunt alæ. Folia in caule oblonga, amygdalinis similia, latiora tamen & læuiora. Quæ uerò in summis sunt ramulis, minora, Aristolochiæ aut oblongæ Hederæ figura. Fructum fert in summis ramis tribus loculamentis distinctum, rotundum ceu Capparin, in quo terna sunt semina putaminib. inuicè discreta, rotunda, maiora eruis, quæ quàm corticibus exuunt, candida sunt, & gustu dulcia. Radix illi tenuis & inutilis. Totus autem frutex lacteo liquore, Tithymali modo, plenus est. Hanc certè descriptionem, si singula comparare uelis, ita Cataputiæ minori quadrare inuenies, ut nulla prorsus sit nota, quam non pictura referat. Nam hæc caulem cubitali emittit longitudine, & digitali crassitudine. Gignunt in fastigio alæ, & folia in caule oblonga, amygdalæ proxima, latiora & læuiora. Quæ autem in summis emicant ramulis, minora ijs quæ caulem ambiunt conspiciuntur, Aristolochiæ aut longioris Hederæ figura. In cacuminibus fructum gerit triplici cellula conceptaculoue distinctum, ceu Capparin rotundum, in cuius uentriculis grana tria intercurfantibus membranis diuisa continentur, eruis maiora, rotunda, quæ corticibus exuta alba spectantur, gustatu dulcia.

LOCVS.





LATHYRIS

Springkraut.



## LOCVS.

Nascitur locis cultis & sabulosis.

## TEMPVS.

Carpitur autumnno dum fructu pragnans est, semenq; eximitur dum tuniculae quibus includitur, inaruerunt.

## TEMPERAMENTVM.

Calidam in tertio, & in primo ordine humidam statuunt.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Purgant aluum grana eius sex uel septem sumpta in catapotio, aut comesta, aut cum caricis aut palmulis deuorata, frigida superpota aqua. Ducunt autem pituitam & bilem, & aquas. Succus Tithymali modo exceptus, eundem effectum praestat. Folia cum gallinaceo aut oleribus decoquuntur ad eodem effectus.

## EX GALENO.

Sunt qui Lathyrin dicant Tithymali esse speciem, tum quod similiter illis succum habeat, tum quod eodem modo purget, uniuersaq; illis facultate similis sit, nisi quod semen gustantibus uideatur dulce: quod sane etiam maxime purgatoriam uim obtinet.

## EX PLINIO.


Grana uicina in aqua pura aut mulsa pota, hydropicos sanant. Trahunt & hilem. Qui uehementius purgari uolunt, cum folliculis ipsis sumunt ea, nam stonchum laedunt: itaq; inuentum est, ut cum pisce, aut iure gallinacci sumerentur.

## DE LEVCOIO DIOSCORIDIS

## CAP. CLXXIII.

## NOMINA.

D  
Viola alba.  
Cheiri.



ΕΥΚΟΙΟΝ Græcis, Viola alba, uel Viola simpliciter Latinis, officinis Mauritana uoce Cheiri uel Keirim appellatur, Germanis Weiel. Non autem temerè adiectum est Dioscoridis: hac enim uoce à Leucoio Theophrasti, de quo suo loco dicemus, segregare uoluimus.

## GENERA.

Viola purpurea  
duplex.

Viola candida  
duplex.

Et si Leucoij nomine Viola significetur candida, tamen & pro lutea, & cœrulea, & purpurea solet usurpari. Quatuor itaque Viola huius sunt genera, quæ sola florum diuersitate inter se differunt. Alia enim candida, alia lutea, alia purpurea. Non est tamen quod per purpuream hic intelligas eam quæ Græcis ἰσπ, & Latinis propriè Viola dicitur: nam eius alia ab ea de qua hic agimus familia est, huicq; tum qualitate tum facultate, adde etiam forma, contraria. Ea enim quæ ἰσπ Græcis uocatur, humilis est, ob id à nonnullis Sessilis dicta, & latiore folio. Contrà nostra illa, ut mox dicemus, cubitali est altitudine, & minimè sessilis. Idem de candida dictum putes, nam ea quoq; duplex est: una de qua hic fit sermo, alia sessilis, de qua in præsentia nihil dicemus. Nos tria duntaxat genera picta damus: cœruleas enim uidere non licuit. Quare supposititium hoc uerbum in Dioscoride puto, maxime cum Plinius lib. xxi. ubi de satiuis Violis loquitur, purpurea scilicet, lutea & alba, nullam de cœrulea mentionem fecerit.

## FORMA.

Cubitali altitudine profiliunt, ramosæ, caule Brassicæ exiliore, folio longo, molli, canescente, flore quadrifolio, Viola syluestris odorem referente, non unius coloris, nam alij candidi, alij lutei, alij purpurei. Semen foliaceum tenuibus quidem, sed quincuncialibus siliquis continetur.

## LOCVS.

Vbiq; ferè in hortis & cultis reperiuntur. Non enim nascuntur magna ex parte nisi satæ fuerint.

## TEMPVS.





LEVCOION

Weiß Weich.





VIOLA  
LUTEA.

Geel Veich.





VIOLA  
PURPUREA.

Braun Vieh.



C

## TEMPVS.

Primo uere & Maio potissimū mense, inter flores emicat Leucoion. Hoc itaque tempore flores carpendi. Semen inter æstatis initia profert.

## TEMPERAMENTVM.

Leucoion abstergentē facultatem possidet, & tenuium est partium, Galeno auctore, proinde ut calidum sit necesse est.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Lutea in medicina præcipui usus est. Huius flores aridi efferefacti in defelsionibus, contra uulvæ inflammationes ualent, & menstrua educunt. Cerato excepti rimas sedis sanant: cum melle oris ulcera. Semen eius duūm drachmarum pondere ex uino potum, aut cum melle appositum, menses, secundas & foetus educit. Radices cum aceto illitæ, reprimunt lienem, & podagricos iuuant.

## EX GALENO.

Leucoij frutex uniuersus extergentē facultatem obtinet, ac tenuiū partium est, plus tamen flores, & inter hos qui sunt sicciores magis etiam quā uirides, adeo ut & oculorum crassas cicatrices extenuent. Tum menses quoq; decoctū eorum mouet, & secundas, foetumq; emortuum elicit, & si bibatur, abortum facit. Est ergo id medicamentū, ut si quod aliud, amarum. Quod si quis uirium eius uehementiam multa aqua admista mitiget, aut certē id genus aliquo, habebit & ad phlegmonas bonum medicamentū. Sic decoctum eius si non merum fuerit, uteri phlegmonas identidem perfusum sanat, potissimum quæ diutino tempore ad scirri modum induruerit. Sic cum cerato ulcera ægrè ad cicatricem peruenientia curat. Sunt uerò etiam qui cum melle ad oris ulcera adhibeant. Semen quum eiusdem sit facultatis, aptissimum est duarum drachmarū mensura potum, tum mensibus ciendis cum melle appositum conuenire creditur, foetumq; uiuentem interficere ac mortuum eicere. Radices similis quoque facultatis, nisi quatenus crassioris sunt essentia, & magis terrenæ, cum aceto lienes induratos sanant. Nonnulli uerò & phlegmonas induratas ijs curant.

## EX PLINIO.

Extenuant, menstrua & urinā ciunt. Minor uis est recentibus, ideoq; aridis post annum utendū. Lutea dimidio cyatho in aquæ tribus, menses trahit. Radices eius cum aceto illitæ sedant lienem. Item podagram, oculorū inflammationes, cum myrrha & croco. Folia cum melle purgant capitis ulcera, cum cera rimas sedis, & quæ in humidis sunt. Ex aceto uerò collectiones sanant.

## DE LAPATHO CAP. CLXXIII.

## NOMINA.

Lapathum unde dictum.

λαπάθω.



ΑΡΑΘΟΝ Græci, Rumicem Latini, barbari Lapathum uocant. Lapathum autem ab effectu nomen accepit, quod scilicet exinaniat: etenim λαπάθω uacuare uel exinanire Græcis est: omnium siquidem generum folijs decoctis aluus mollitur.

## GENERA.

Primum.  
Lapathum acutum.

Huius quatuor genera facit Dioscorides. Primum oxylapathon Græcis & Latinis dicitur. Officinæ Lapathum acutum, Germani *Wengelwurcz* / *Grindwurcz* / *Streyffwurcz* / *Zitterwurcz* / *Wildampffer* nominant. Oxylapathū, quamuis anceps in acidum saporē uel acutam figurā uideatur significatio, tamen nomen hoc à folijs quæ in mucronē desinunt accepisse uidetur. Secundū genus hortense priori dissimile, non quidē in uniuersum, sed duntaxat in folijs, quæ Serapione teste, multo sunt latiora. Hoc genus haud dubiè est Rhabarbarū monachorum, quod passim hodie in hortis plantatur: Oxylapatho enim per omnia ferè simile est, folia tamen latiora obtinet, & ob cultū paulò tenerius est. Cum autem primum erumpūt folia, purpurea ferè sunt, dein quotidie uiridiora fiunt, ut pictura ipsa monstrat. Tertium

sylue-



OXYLAPATHVM

Wengelwurtz.



RUMICIS SE  
CVNDVM GENVS.

Münch Rhabarbarum.







RVMICIS  
TERTIVM GENVS.

Güter Heinrich.





MERCVRIALIS  
FOEMINA

Bingelkraut weiblich.



A syluestre, paruum, plantagini simile, molle & humile est, quod uulgato nomine bonus Henrichus, germanicè gûter Heinrich dicitur, id quod ex forma primùm colligitur: folia enim eius oxalidi, nisi quod ampliora sunt, atque adeo ad plantaginis nonnihil accedunt folia, similia sunt. Flores autem eius & semen sic Oxylapathū referunt, ut uix ab inuicē discerni queant. Dein uires etiam cōueniunt: uulneraria enim herba est Bonus Henrichus, ac mirificè ad sordida purganda, ac glutinanda ulcera confert, sic ut appensa etiam, ac trita uulnerib. imposita, uermes qui in ijs nati sunt excidere faciat. Quartū genus Græci *ἰσαρίδα*, Latini Oxaliden, officinæ Acetosam, Germani Saur Ampffer nominant. Oxalis autem ideo dicta est, quod in gustu acorē planè respiciat, unde etiam uulgus Acetosam uocauit. Hanc propriè Romani *Quartan*  
*Acetosa.* *Rumex unde dicta.* *Hippo-*  
appellarunt Rumicē, forsitan quod ab ea succus non aliter atq; mamma, quam Rumex ueteres dixerunt, sitientibus exugi soleat. Galenus tria tantum genera Lapathi facit, Oxaliden, Oxylapathon & Hippolapathon, quod sic Græci quasi grande Lapathum dicunt, magnis amplisq; rebus hippo præponere soliti, ab equo excellentis amplitudinis animali magnitudinem mutuantes.

FORMA.

Oxylapathū folijs duris & in cacumine acutis, semine herbaceo acuminato ex minutissimis pediculis dependente, radice longa & lutea uel potius crocea. Secundū genus Oxylapatho perquā simile est, folijs tamē latioribus ac teneriorib. constat, le bicubitali interdum, striato, floribus exiguis, luteis, semine ut Oxylapathon triangulari, radice longa & lutea seu crocea. Tertiū genus, quod uulgus hodie Bonum Henrichū uocat, foliū Oxalidi, latius tamē, aut Aro, uel ut Dioscorides inquit, plantaginiue simile obtinet. Aliqua enim Ari, aliqua autē plantaginis folia referūt. Caulē prioribus duobus humiliore, in quo flores & semina racematim multa dependent. Radicē uerò longam & subflauā. Oxalis autē folia syluestri & paruo humiliue Rumici similia habet. Caulis eius nō adeò grandis est, sesquicubitū altus. Semen acuminatum, rubrum, quod foliaceo uestitur inuolucro, sapore acri, quod in caule & adnascantibus coliculis nascitur.

LOCVS.

Oxylapathon in palustrib. & circa fossas potissimū nascitur. Secundū genus hodie in multorū hortis consitum prouenit. Tertiū passim in aris, sepibus & circa itinera crescit. Oxalis in omnibus pratis copiosissimè prouenit.

TEMPVS.

Æstate antequam prata demetantur omnium copia haberi potest.

TEMPERAMENTVM.

Recentiores Acetosam statuūt esse frigidā & siccā in secundo. Atqui quale huius & reliquarū Rumicū sit temperamentū, ex facultatibus earundem, quas mox dicemus, facile deprehendent studiosi. Secundi generis Rumex in folijs manifestissimā aciditatem ostendit, ut hinc etiam conicere liceat esse Rumicem, utcunq; monachi & cum ijs multi quoq; medici, Rhabarbarum esse contendunt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Omnium Rumicū olus decoctū aluum mollit. Crudum illiū cum rosaceo aut croco melicerides discutit. Semē syluestris & Oxylapathi & Oxalidis cum aqua aut uino utiliter contra dysenterias, coeliacos affectus, stomachi fastidia, scorpionumq; ictus bibiē. Si quis etiā in potu præsumat, nihil ictus patiet. Radices ipsarū ex aceto & crudæ illitæ, lepras, impetigines, scabrososq; ungues sanāt. Sed antea locus aceto & nitro in sole perfricandus est. Pruritus decoctū earum sedat, si eo foueantur. Coctæ in uino si cum iure colluant, aurium dentiumq; dolorē mulcent. Strumas parotidasq; discutunt si cum uino decoctæ illinant. Lienes autē cum aceto. Aliqui utuntur radicibus contra strumas, uinculo collo eas appendentes. Tritæ & appositæ fecminarū fluxiones sistunt. Decoctæ cum uino & potē regio morbo correptos emendant. Calculos uesicæ cōminuunt. Menses cient. Scorpionum ictibus auxiliantur, Hippolapathon easdem antedictis Rumicum generibus uires obtinet.

EX GA-



## EX GALENO.

C

Lapathum moderatè digerentē facultatem habet, oxylapathum uerò mistam: nam simul cum eo quod digerit, nōnihil quoq; reprimendi facultate participat. Semen eorum manifestam quandam adstrictionē obtinet, adeò ut & dysenterias, & alui profluuia sanet, potissimum autem oxylapathi. Hippolapathon easdem dictis facultates obtinet, sed imbecilliores.

## EX PLINIO.

Syluestria Lapatha scorpionū ictibus medentur, & ferire prohibent habentes. Radix aceto decocta si coletur, succus dentibus auxiliatur: si uerò bibatur, morbo regio. Semen stomachi inextricabilia uitia sanat. Hippolapathi radices priuatim ungues scabrosos detrahunt. Dysentericos, semen duabus drachmis in uino potum, liberat. Oxylapathi semen lotum in aqua cœlesti, sanguinem reiicientibus, adiecta acacia lentis magnitudine, prodest. Præstantissimos pastillos faciunt ex folijs & radice, addito nitro & iure exiguo. In usu aceto diluunt. Sed satiuū in epiphoris oculorum illinunt frontibus. Radice melicerias & lepras curant. In uino uerò decocta, strumas & parotidas & calculos. Poto uino & lienes, cœliacos atque & dysentericos & tenasmos. Ad eademq; omnia efficacius ius Lapathi, & ructus facit, & urinā ciet, & oculorum caliginem discutit. Item pruritum corporis, in solia balnearū additum, aut prius ipsum illitum sine oleo. Firmat & cōmanducata dentes. Eadem decocta cum uino, sistit aluum. Folia soluunt adiecto sale.

## APPENDIX.

Rhabarbarimos  
nachorum facul  
tas.

Alterius generis Rumicis, qui Rhabarbarū monachorū uocatur, radix purgandi etiam uim obtinet, si in puluerem redacta drachmæ pondere sumatur. Neq; id mirum admodum, cum etiam Dioscorides ipse omnium Rumicum olus decoctū aluum mollire, atq; decoctas eorundem radices cum uino, regio morbo correptos emendare, ob bilis nimirum per inferna educationem, testetur.

## DE LIMONIO CAP. CLXXV

## NOMINA.



Beta sylvestris  
unde dicta.

Tintinabulum  
terrae.

Pyrola.

LIMONION Græcis, Limonion, Beta sylvestris & Tintinabulum terræ Latinis, uulgo Pyrola, Germanis Wintergrün / Holzmangolt / Waldmangolt / oder Waldtöl appellatur. Beta autem sylvestris hæc herba dicta est, quod in syluis & locis muscosis, hortensi Betæ primum erumpenti haud dissimilis, proueniat. Tintinabulum, à floribus eius tintinabulo similibus. Pyrola, quod eius folia arboris pyri folio similia sint.

## FORMA.

Folia Betæ similia habet, tenuiora tamen & minora, decem, aut plura. Caulem tenuem, rectum, lilio æqualem, semine rubro, gustuq; adstringente plenum. Ex qua siquidem descriptione abundè liquet, herbam quam uulgo Pyrolam uocat esse Limoniū. Foljs enim Betæ similis est, uerum tenuioribus & minoribus (legendum enim in Dioscoride μικρότερα, & non μακρότερα, Plinio libro uigesimo, capite octauo, teste) decem, interim pluribus. Caule tenui, recto, lilio simili, pleno seminis rubri, quod gustu adstringit. Quibus accedit quod germanicè Waldmangolt / id est, Beta sylvestris nominatur. Neque uires discrepant: adstringit enim, uulnerariaq; herba est Pyrola, haud secus atque Limonium. Flores denique tintinabulo similes sunt, ut citra ullum discrimen Pyrolam Dioscoridis esse Limonium asseuerare liceat.

## LOCVS.

In umbrosis & syluestribus prouenit locis.

## TEMPVS.





LIMONIUM

Wintergrün.



C

TEMPVS.

Iunio mense floret.

TEMPERAMENTVM.

Folia & semen gustu uehementer adstringunt, ita ut in tertio ordine siccitatis illud recte recentiores collocent.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen tritum in uino potum acetabuli mensura, dysentericis ac eccliacis auxilia tur. Rubrum fœminarum profluuium sistit.

EX GALENO.

Limonij semen utpote austerum, eccliacis, dysentericis & sanguinem spuenti- bus cum uino exhibent. Iuuat & profluuium muliebre. Satis autem est acetabuli mensura.

EX PLINIO.

Huius folia ambustis utilia, guttantia adstringunt. Semen acetabuli mensura dysentericis prodest. Aquæ è radice coctæ maculas uestium eluere dicuntur, itemq̃ membranarum.

EX RECENTIORIBVS.

Pyrolæ decoctum interna & externa uulnera potum sanat. Item fistulis ac alijs malignis ulceribus medetur.

## DE LAMIO. CAP. CLXXVI.

NOMINA.

Archangelica.

D

Vrtica mortua  
quare dista.

LAMIVM Plinio lib. xxi. cap. xv. & lib. xxij. cap. xiiij. uocatur. Vulgo Vrtica iners & mortua. Sunt qui albam Vrticam nominent, & Archangelicam. Officinis inusitatum, germanicè Todmessel/ oder Taubnessel dicitur. Iners & mortua cognominata, quod folijs non mordenti- bus sit, & mitissima.

GENERA.

Vrticæ mortuæ tria inueniuntur genera. Vnum albis, quod propriè Lamium dicitur: alterum luteis, & tertium purpureis floribus constat. Nos, quia solis floribus differunt, nec in eorum folijs aliquod discrimen apparet, una icone omnia tria complexi sumus genera.

FORMA.

Folijs constat Vrticæ pungentis, minoribus, fimbriatis, candidioribus, lanugine nequaquā mordaci, caule quadrangulo, flore albo, luteo, aut purpureo, radice ex interuallis cincinnis capillata. Graui odore tota fragrat. Innoxia est & morfu caret. Semen in caulibus per interualla copiosum & nigrum profert.

LOCVS.

Pasim circa semitas & sepēs nascuntur.

TEMPVS.

Vere primo, Maio potissimum mense, floribus abundant, & tota ferè æstate.

TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum est Lamium, ueluti etiam alia Vrticæ genera, id quod ex gustu, eiusq̃ facultatibus deprehenditur.

VIRES. EX PLINIO.

Medetur cum mica salis contusis inculsisq̃, inustis & strumis, tumoribus, podagris, uulneribus. Album habet in medio folio, quod ignibus sacris medetur. Quidam è nostris tempore discreuere genera. Autumnalis Vrticæ radice alligata in tertianis, ita ut ægri nuncupentur cum eruitur ea radix, & dicatur quæ, & cui, & quorum filio eximatur, liberari morbo tradiderunt. Hoc idem contra quartanas polle-  
re, lidem





LAMIUM

Taub Nessel.



**C**re. Idem radice urticae addito sale, infixæ corpori extrahi. Folijs cum axungia strumas discuti, uel si suppurauerint, erodi compleriq̃.

## EX RECENTIORIBVS.

Recentiores hac inerti Vrtica utuntur sistendo ruentis è naribus sanguinis impetu, imæ ceruici uel scapulis alligando, inde sperant in aduersum trahi cruoris manantis impetum. Vlcerebus denique, putredinibus & fistulis mirificè conferre, ac mederi tradunt.

## DE LINO CAP. CLXXVII.

## NOMINA.



INON Græcis, Linum Latinis & officinis, Germanis *Lein* / oder *Glachß* appellatur.

## FORMA.

Herba est tenui caule, folijs angustis, oblongis, & in summo acuminatis, floribus cœruleis, speciosis, quibus decidentibus folliculus enascitur in quo semina continentur fulua.

## LOCVS.

*Linum agris  
noxium.*

Gaudet pingui solo & modicè humido. Agris autem noxiū est, deteriores enim eos facit, id quod ijs carminibus in Georgicis significauit Virgilius:

*Vrit enim lini campum seges, urit auenæ,*

*Vrum letheo perfusa papauera somno.*

## TEMPVS.

**D**Vellitur æstate ubi maturitatē consecutum fuerit, quæ sanè duobus argumentis intelligitur, intumescente semine, uel flauescente colore.

## TEMPERAMENTVM.

Est in primo ordine calidū, ac humiditatis & siccitatis quodāmodo in medio sitū.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Semen Lini eandem Fœnogræco facultatem obtinet. Omnem intus forisq̃ inflammationem discutiit & emollit, cum melle, oleo, exiguaq̃ aqua decoctum, aut melle cocto exceptū. Vitia cutis in facie crudum, uarosq̃ cum nitro & ficu illitum. Cum lixiuia autem parotidas, duritiesq̃ discutiit. Herpetas in uino decoctū, & fauos purgat. Vngues scabros cum pari modo Nasturtij & mellis eximit. Cum melle uice eclegmatis sumptum, ea quæ in thorace sunt educit. Tussim lenit. Venerem stimulat si cum melle & pipere mixtū pro placenta largius sumatur. Huius decoctū intestinorum utriq̃ erosionibus iniectum medetur, adq̃ excrementorū educationem prodest. Ad uulvæ inflammationes in deflectionibus haud aliter quàm Fœni græci perquam utile est.

## EX GALENO.

Lini semen esum flatuosum est, etiamsi frigatur, adeò sanè excrementitia humiditate plenum est. Visceribus tamen quæ circa hypochondria sunt, ut si quid aliud, gratum existit. Quidam hoc tosto instar obsonij non secus ac factitio sale cum garo utuntur. In usu est & melle conspersum. Inferunt nonnulli panibus quoque. Stomacho & concoctioni repugnat. Tenuiter corpus alit. Quod spectat ad deiectionem, nec laudandum, nec uituperandum, perexiguam tamen uim mouendæ urinæ tenet, quæ in tosto efficacior est. Idem quoque aluum magis sistit. Rustici sæpe numero torrefacto adiecta portione mellis utuntur.

## EX PLINIO.

Lini semen cum alijs quidem in usu est. Et per se mulierum cutis uitia emendat in facie. Oculorum aciem succo adiuuat. Epiphoras cum thure & aqua, aut cum myrrha. Cum uino sedat parotidas. Cum melle, aut adipe, aut cera, stomachi solutiones



LINUM

Flachsp.







LICHEN

Stein Leberkraut.



C

NOMINA.

Mercurialis.

Mercurialis car  
dicta

INOZOSTIZ, ἢ ἑρμῆος βοτάνιον, ἢ πρία Græcis, Mercurialis Latinis & officinis dicit. Germanis Bingeltraut / Mercuriuskraut / oder Rûwurz. Mercurialis dicta est, quod à Mercurio inuenta sit.

GENERA.

Duo eius genera, mas & fœmina, quæ facili ex eorundē descriptionibus discerni poterunt. Folia uerò maribus nigriora, fœminis candidiora.

FORMA.

Mercurialis folia Ocimo similia habet, ad Helxines foliorum figuram accedentia, minora tamen. Ramulos geniculatos, alarū caua multa & densa habentes. Fœmina semen fert racemosum & multum. Mas uerò iuxta folia exiguum, rotundū, geminorum testiculorum modo connexum, Totus frutex dodrantalis, & nonnunquam maior.

LOCVS.

Nascitur in campestribus cultis, uinetisq̃, aliquibus locis tam copiosa & efficax, ut sapore suo uina etiam inficiat, & bibentibus ingrata reddat.

TEMPVS.

Augusto mense semine prægnans est.

TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam in primo ordine esse asserunt.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vtraq̃ aluum mouet olerū modo comesta. Cocta in aqua & epota aqua, bilem & aquosa ducit. Creduntur præterea fœminæ folia trita & pota, aut post purgationem pudendis apposita, ut fœminæ concipiantur efficere. Masculæ uerò similiter adhibita, mares progenerare.

EX GALENO.

Mercuriali omnes duntaxat ad uentris purgationes utuntur. Verumenimvero si quis eius facere periculum uolet in cataplasmate, sanè digerentis admodum facultatis esse experietur.

EX PLINIO.

Mirum est quod de utroq̃ eorum genere proditur: ut mares gignantur hunc facere, ut fœminæ illam. Hoc cōtingere si à conceptu succus protinus bibatur in passo, edanturue folia decocta ex oleo & sale, uel cruda ex aceto. Quidam decoquunt eam in nouo fictili cum heliotropio, & duabus aut tribus spicis, donec decoquantur. Decoctum dari iubent & herbam ipsam in cibo altero die purgationis mulieribus per triduū, quarto die à balneo coire eas. Hippocrates miris laudibus in mulierum usu prædicauit illas. Easq̃ ad hunc modum adhuc medicorū nemo nouit. Ille eas uulua cum melle, uel rosaceo, uel irino, uel lirino admouit. Item ad ciendos menses, secundasq̃. Hoc idem præstare potu fotuq̃ dixit. Instillauit auribus surdis succum, inunxitq̃ cum uino uetere. Aluo folia imposuit, epiphoris, stranguriæ & uesicæ. Decoctum eius dedit cum myrrha & thure. Aluo quidem soluendæ, uel in febris, decoquitur quantum manus capiat, in duobus sextarijs aquæ ad dimidias, bibitur sale & melle admixto: necnon cum ungula suis, aut gallinaceo decoctum salubrius. Purgationis causa putauere aliqui utranq̃ dandam, siue cum malua decoctum. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachum lædunt.

DE LIBA-





MERCVRIALIS  
M A S.

Bingelkrautmennle.



A

CAP. CLXXX.

## NOMINA.



LIBANOTIS Græcis, Rosmarinus Latinis & officinis, Germanis Rosmarin appellatur. Libanotis uerò dicta est, quod odorem thuris reddat. Libanotida autem nō eam quæ simpliciter sic nominatur à Græcis intellige, sed eam quæ cum adiectione, coronaria Libanotis appellatur.

Rosmarinus

Libanotis cuius dicta.

Libanotis coronaria.

## FORMA.

Rosmarinus quæ nectentes coronas utunt, uirgas habet tenues, circa quas sunt folia tenuia, crebra, oblonga & gracilia, intus candicantia, exteriore autem parte uiridia, grauiter odorata. Florem, quod Dioscorides omisit, in candido cœruleum, radicem nigram, multis fibris capillatam.

## LOCVS.

Hodie passim in hortis & scitilibus uasis plantatur. In Narbonensi autem Gallia sua sponte prouenit tam copiose, ut eius incolæ aliud lignum non urant.

## TEMPVS.

Carpitur Maio mense & deinde usque ad Septembris medium. Floretq; bis annuatim, uere & autumnō.

## TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est, id quod ex gustu & uiribus conijcere quisq; poterit.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Calfacit. Regium morbum sanat, si quis eam in aqua decoxerit, & ante exercitia bibendam dederit, dein post exercitia lauerit, & uino potauerit. Miscetur etiam acopis, & musteo oleo.

## EX GALENO.

Libanotidis, quæ ad coronas est utilis, quam Romani Rosmarinū nuncupant, decoctum regio morbo laborantes potum adiuuat. Omnes enim Libanotides abstergentis & incidentis facultatis sunt participes.

## APPENDIX.

B Recentiores Rosmarinum suffitu tussim & destillationem sedare tradunt. Et quod in primis nobile, tutam præstare in pestilentia domum crematam, nidore improbam aëris diluentem perniciem. Adijciunt & alias facultates, eas nempe: Rosmarinus corroborat cerebrum, sensus interiores, memoriam & cor. Succurrit tremori, resolutioniq; partium. Loquelam amissam reparat, & alia multa potest, quæ commemorare superuacaneum est.

DE LIGV-






ROSMARINVS

Rosmarin.



A

## NOMINA.



LIGVSTRVM Plinio alijsq̃ Latinis nominatur. Officinis inusitatum, Germanis Beinhölzlin / Gundholz / Kein oder Schälweiden dicitur. Quo autem nomine Græcis appellatum sit, nondum certo nobis constat: neque enim ut ferè omnes hodie putant Cypros est, quæ Plinio libro duodecimo teste, semen habet Coriandri, peregrinaq̃ existit arbor. At Ligustrum semen non Coriandro simile, quod rotundum ac subflauum est, sed potius atrum, & altera parte latum modicèq̃ cōcauum in racemis profert. Nec arbor est peregrina, sed sponte in sepibus & senticetis ubiq̃ prouenit. Mea tamen sententia Phillyrea potius apud Dioscoridem erit, quod hæc Cypro congener ac similis sit, easdemq̃ quas Ligustrum facultates habeat. Iudicium tamen penes prudentem lectorem esse uolumus.

Ligustrum non  
est Cypros.

Phillyrea uide-  
tur esse Ligustrum

## FORMA.

Ligustrum arbor est parua, folijs Oleæ similibus, floribus paruulis, candidis & odoratis, racematim florentibus, fructibus initio uirentibus, processu temporis nigris, uuarum more congestis.

## LOCVS.

Nihil frequentius Ligustro in uepribus occurrit, nihilq̃ crebrius in dumetis inuenitur, ita ut hoc nomine contemptui habeatur. Quapropter huc respiciens Virgilius in Bucolico carmine, eius flores negligi à pastoribus, ac inutiliter perire canit, dicens:

*Alba ligustra cadunt, uacinia nigra leguntur.*

## TEMPVS.

B Maio mense floret, autumnno autem cum maturis baccis nigrescit.

## TEMPERAMENTVM.

Et si forma nōnihil à Cypro distet Ligustrum, temperamento tamen eodem est præditū. Eius enim folia & surculi mixta qualitate constant: discutiens enim quiddam cum aquea substantia, modicè calida, & quiddam etiam adstrictorium ex terrena substantia frigida, & sine morfu siccante, obtinent.

## VIRES. EX PLINIO.

Succus eius neruis, articulis, algoribus, folia ubiq̃ ueteri ulceri cum salis mica, & oris exulcerationibus profunt. Acini contra phthiriasin, item contra intertrigines, foliæue. Sanant & gallinaceorum pituitas acini.

## APPENDIX.

Recentiores Ligustri succum ulcera oris, ueretriq̃ sanare tradunt. Idem etiam posse folia in uino decocta adiungi: ut hinc euidentissimū sit, folijs Ligustri, haud secus atque Cypri aut Phillyreæ, adstrictoriam inesse uim, propter quam cōmanducata & decocta, oris potissimum ulceribus opitulantur.





LIGVSTRUM

Beinhölzlin.



A

## NOMINA.



IV multumq; de huius herbæ nomenclatura fuimus solliciti, at utcun-  
que multos interrogauerimus, tamen aliud nomen quàm idipsum quo  
nunc appellamus expiscari haud potuimus. Vocetur itaque Lunaria *Lunaria minor.*  
minor, donec certiozem appellationem habere contigerit. Germanicè  
Hein Donneraut/ut sit ad Latinam nomenclaturam allusio quædam, nuncupetur.

## FORMA.

Rotundo est caule, cui folia utrinq; septem annexa, cordis ferè humani formam  
habentia: in summitate caulis semen Betæ simile profert.

## LOCVS.

Nascitur in montibus. Copiosissimè autem Tubingæ in pede montis Austria-  
ci prouenit. Prope hanc nunquam nō Ophris, de qua suo dicemus loco, inuenitur.

## TEMPVS.

In fine Maij & Iunio mense inuenitur, dein statim euanescit.

## TEMPERAMENTVM.

Terrestre quid præ se fert gustata, atque parum adstringit, ut hinc mediocriter  
frigida & sicca esse uerisimile sit.

## VIR ES.

Vis foliorum eius haud dubiè uulneribus efficax, glutinandi nanque facultate  
prædita est. Chymicorum nugæ, quibus eius herbæ usus frequentissimus est, lu-  
bens prætereo. Cōstat autem experientia, ad suppressendos menses, & album mu-  
liebre profluuium, mirificè conferre hanc herbam.





LVNARIA  
MINOR.

Klein Monkraut.



A

## NOMINA.



LEPIDION Græcis, Lepidium Latinis appellatur. Vulgus herbariorū Piperitū nomināt. Quam denominationē sequentes Germani nostri *Piperitis.* Pfefferkraut uocant. Nomen uerò hoc à pipere traxit, cuius acrimoniam herba hæc gustata refert. Diuersa est uerò, ut obiter parum attentos moneam, ab ea planta quam Plinius Piperitū nuncupat, de qua suo loco dicemus copiose. Sunt qui Lepidium alio nomine raphanum nomenclant, quod non alia *Raphanum cuius dicitur Lepidium.* fit ratione, quàm quod herba hæc quod ad folia attinet, raphano syluestri, quem Amoraciam alio nomine dicunt, admodum similis sit. Lepidium uerò appellatū, *Lepidium unde dictum.* quod *λεπίδας*, hoc est, squamas & maculas in facie deleat & repurget.

## FORMA.

Fruticosum est, in cubitalem altitudinem surgens, folijs laurinis, sed mollibus, & maioribus. Sic quidem Lepidion depingit Plinius & Paulus. Vnde sole clarius fit, herbam cuius picturam damus esse Lepidion: cubitalis enim & interdum bicubitalis est, caule solido & rotundo, folijs oblongis & laurinis, maioribus tamen & mollioribus, gustu piper referentibus & acris, magnopereq; linguam uellicantibus, floribus candidis exiguis admodum, semine paruo, radice oblonga. In summa, forma totius herbæ raphano, ut diximus, syluestri similis est.

## LOCVS.

In hortis potissimum prouenit, in quibus uiuacitatem suam usque ad multos annos prorogat.

## TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, deinde semen profert.

## TEMPERAMENTVM.

B In ordine quarto calefacit, ut Nasturtium, exiccat autem ipso minus.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Salgamorum more, sale cum lacte conditur. Foliorum uis acris & exulceratrix est. Quapropter ischiadicis præsentī remedio illinitur, tritum cum radice Inulæ, & quarta unius horæ parte impositum. Similiter & lienosis prodest. Lepras idem pelit. Radix collo adalligata, dentium dolorem leuare creditur.

## EX GALENO.

Facultate Nasturtio simile est.

## EX PLINIO.

In facie cutem emendat exulcerando, ut tamen cera & rosaceo faciliè sanetur. Sic lepras & psoras tollit semper faciliè, & cicatricū ulcera. Tradunt in dolore dentium adalligatum brachio quā doleat, compescere dolorem.

## APPENDIX.

Lepidion crassos & glutinosos cibos & humores extenuare, & incidere ualet: ideoq; culinaria est herba, & salsamentis idonea.





LEPIDIVM

Pfefferkraut.



A

## CAP. CLXXXIIII.

## NOMINA.



**ΛΕΥΚΟΙΟΝ** Theophrasti hoc loco describimus, quod planè diuersum est à Leucoio Dioscoridis, quod supra depinximus, id quod tamen plerique etiam docti uiri non animaduenterunt. Latinis Viola alba dicitur. Germanicè weiß Hornungsblumen / oder Mergenblumen. Non autem ab re Viola alba dici cœpit: flos enim huius herbæ colorem album, & Violarum odorem refert.

Viola alba.

Viola alba cur dicta.

## FORMA.

Folia habet Porro similia, tenuiora tamen & molliora, ex radice bulbosa prodeuntia. Pediculum etiam profert dodrantalem, tenuem ac ferè iuncum, in quo candidus flos est, in medio croceus, Violarum purpurearum odorem referens, quo decidente, capitula Nucis auellanae quantitate erumpunt, in quibus semen Sinapi haud dissimile continetur. Quod si ad hanc descriptionem adhibeas ea quæ de Viola alba Theophrastus libro sexto & septimo de stirpium historia tradit, certè sole manifestius erit herbam hanc cuius picturam damus esse eam, quam *λευκόιον* Theophrastus uocat. Nam hæc prima florum se ostendit. Emicat ubi cœlum dementius statim, etiam non hyeme exacta: ubi uerò immitius, postea. Celeriter quoque euanescit. Radicem denique bulbosam & florem odoratum obtinet. Quæ singula etiam de hac nostra herba uerè dici possunt. Prima siquidem florum, hyeme etiam nondum exacta, Februario nimirum mense, & die diuo Valentino sacro, ubi cœlum dementius fuerit, apparet. In Aprili, ubi appropinquare iam cœperit Maius, euanescit. Flos item eius, Violarum purpurearum prorsus odorem refert. Radix etiam ad Bulbi similitudinem orbiculata existit, ut hoc nomine nemini dubium esse debeat, quin sit Viola alba Theophrasti.

Theophrasti albaviole.

Flos Februarij uocatur.

B

## LOCVS.

Prouenit in umbrosis syluis & locis, qualis est non procul à Tubinga paulò supra & infra monasterium Bebenhufum uocatum, ubi copiosissimè nascitur. Plantatur nunc etiam passim in hortis.

## TEMPVS.

In Februario statim hæc erumpit, ut diximus, herba, & inter initia Martij ad perfectionem uenit. Semen in Aprili ostendit in capitulis, ut in altera pictura uides.

## TEMPERAMENTVM.

Folia ferè qualitatis omnis expertia, radix autè dulcis & glutinosa est, ut hoc nomine adstringat & exiccet, ut reliqui bulbi.

## VIRE.

Digerentem leuiter, & cum hoc adstringentē facultatem, sicut reliquos bulbos, habere ex his quæ commemorauimus satis constat. Tamen nunc nullus, quod sciam, eius stirpis usus est.





VIOLAE ALBAE FOLIA  
CVM SEMINE.

Weiß Hornungsblüm mit dem Samen.



## NOMINA.

Miliū solis.

Lithospermon  
unde dictum.

LITHOSPERMON Græcis, Lithospermum Latinis, officinis & medicis hodie omnibus Miliū solis appellatur. Germanis Weerhirs/oder Steinsomen. Nomen à lapidea seminis duritia accepit: neque enim Lithospermon aliud sonat Græcis, quàm lapideum semen. Quum itaque semina tanquam calculos ferat, candore & rotunditate margaritarum, duritia uerò lapidea, cōmodissima uoce Lithospermon dictum est. Miliū uerò solis recentioribus nominatum puto, quod semen eius candore solis & lucis splendore fulgeat.

## FORMA.

Folia habet Oleæ similia, longiora tamen & latiora, & quæ in ima parte sunt, humi iacent. Ramulos uerò rectos, tenues, crassitudine lunci acuti, solidos, lignosq̃. In quorum cacumine bifidi diuicatiq̃ exortus, cauliculorum speciem exhibent longa habentes folia, inter quæ semen lapideum, rotundum, paruum, eruo equale. Plinius graphicè candore & rotunditate margaritas referre dixit. Nostrium autem Lithospermon multo minus quàm Dioscorides & Plinius tradiderunt semen profert, quod soli diuersitati acceptum referendum erit. Radix etiam Lithospermi, quod adijciendum esse arbitror, exteriori sui parte rubore perfunditur.

## LOCVS.

Lithospermon asperis & sublimibus locis gaudet. Satum etiam in hortis prouenit.

## TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, eoq̃ tempore semen etiam profert.

D

## TEMPERAMENTVM.

Semen Lithospermi, cuius maximè usus est, calidum & siccum esse facillè ex eiusdem facultatibus conijcitur. Omnia siquidem urinam cientia, Galeno lib. v. de simpl. medicam. facult. cap. xij. teste, calida & sicca sunt.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen cum uino albo potum, calculos frangit, & urinam ducit.

## EX PAVLO.

Semen cum uino albo potum, calculos conterit, & urinas pellit.

## EX PLINIO.

Lapillis eius drachmæ pondere potis uino albo calculos frangi pelliq̃ constat, & stranguriam discuti.






LITHOSPERMUM

Steerhief.



C

## NOMINA.

Lysimachia unde  
de appellata.

LYSIMACHION græcè, Lysimachia latinè, uulgò Salicaria, germanicè Weiderich nominatur. Lysimachia uerò ab eius inuentore Lysimacho appellata, aut quia uis tanta herbe, ut iumentis discordantibus imposita iugo, asperitatem cohibeat. Quare à dissoluenda dissidentium pugna, non ineptè Lysimachia uidebit nominata. Salicaria uerò quod folia salicis, aut quod inter salices nascatur, dicta est.

## GENERA.

Lysimachię duo esse genera ex Dioscoride & Plinio satis liquet. Plinij enim purpureum florem habet, hinc nos illam purpureā appellauimus, Germanicè braun Weiderich. Dioscoridis uero rufos, hoc est, aureos, ut metipse interpretatur, flores obtinet, ideoq; luteam nominauimus, Germanicè geel Weiderich. Et hæc quidem altera magis adstringit, inq; usu medico hoc nomine eidem præferenda.

## FORMA.

Caules profert cubitales, aut etiam maiores, tenues, fruticosos, quorum à geniculis folia exeunt gracilia, salici similia, gustum adstringentia, flores rufos, aut ad auricolorem declinantes. Ex qua pictura nulli non notum fit, plantas quas pictas damus esse Lysimachias. Caules enim emittunt cubitales, & multo quoque longiores, tenues & fruticosos. Folia etiam habent salicis, cum lentore quodam adstringentia. Flores hæc rufos, illa autem purpureos habet, ut non contemnendus autor est Plinius. His accedit locus natalis, & alia quæ referre non attinet.

## LOCVS.

Nascuntur palustribus locis, & prope aquas, potissimū ubi salices proueniunt.

## TEMPVS.

D Iunio & Iulio mensibus florent, ac subinde purpurea in siliquis oblongis semen producit, lutea uerò decidentibus floribus, semen exiguum, Coriandro haud dissimile profert, quod gustum non secus atque folia adstringit.

## TEMPERAMENTVM.

Superantem adstrictoriam qualitatem, adeoq; exiccatoriam uim obtinent.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Succus foliorum eius, cui adstringendi facultas est, ad sanguinis excreationes & dysenterias potus & infusus confert. Sistit & mulierum fluxum appositus. Contra erumpentem è naribus sanguinem herba ipsa utiliter inseritur. Vulneraria etiam est, & sanguinem compescit. Incensa acerrimum habet fumum, ut serpentes quidem abigat, & muscas enecet.

## EX GALENO.

Vulnera glutinat, erumpentemq; ex naribus sanguinem emplastri modo illita sistit: quin & reliquas sanguinis eruptiones compescere tum ipsa, tum succus eius multò magis potest. Pota dysenterias, sanguinis reiectiones ac muliebrem fluxum sanat.

## EX PLINIO.

Vis eius tanta est, ut iumentis discordantibus iugo imposita, asperitatem cohibeat. Pota uel illita, uel naribus indita, sanguinis profluium sistit. Vulneribus ijs priuatim quæ calceamento facta sunt contrita & arida infricata efficax est.

DE LAGO-





LYSIMACHIA  
PURPUREA.

Kot Weiderich.






LYSIMACHIA  
LUTEA

Gelb-Weiderich.



A

## NOMINA.



ΑΓΑΡΟΥΞ Græcis, Leporinus pes Latinis, Trifolium humile & Tri-<sup>Trinitas.</sup> nitas à tribus folijs herbarijs dicitur. Officinis nostris ignota est herba. Germanis Nasenfuß/oder Kagentlee/oder Kagle nominatur. Sic uerò Græci atque Latini hanc herbam appellarunt, quod Lepo-<sup>Lagopus cur</sup> rino pedi similem paniculam habeat. <sup>dula.</sup>

## FORMA.

A nullo, quod sciam, Lagopus describitur. Herba autem quam pro eo exhibemus, caules habet rotundos, hirsutos, folia Loto trifoliæ quæ in pratis gignitur similia, semen in paniculis muscosis lanuginosisq̃, leporino pedi similibus admodū, adstringentis gustus.

## LOCVS.

In segetibus, Plinio etiam authore, & in hortorum areis, ut testatur Dioscorides, gignitur.

## TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus potissimum apparet.

## TEMPERAMENTVM.

Exiccandi facultatem obtinet, Galeno teste, Lagopus.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habet Lagopus herba sistendi aluum cum uino pota. Febrientibus autem cum aqua danda. Alligatur eadem contra inguinum inflammationes.

## EX GALENO.

Fluxus alui probè exiccat.

## EX PLINIO.

**B** Lagopus sistit aluum è uino pota, aut in febre ex aqua. Eadem inguini adalligatur in tumore.

## APPENDIX.

Ex ijs omnibus abundè constat, herbam eam quam depictam damus esse Lagopum, siquidem & nomen & forma illi aptissimè respondent. Locus etiam conuenit: nascitur enim copiosissimè in segetibus. Nec temperamentum abhorret, quod illi est adstrictorium & exiccans. His omnibus accedunt uires: uulgò enim omnes hac planta in dysenteria, & alui profluuiò utuntur.

DE LARI-



494



LAGOPUS

Ratzenflee.



A

## NOMINA.



APIE Græcis, Larix & Larex Latinis, officinis & uulgò Larga, Ger. *Larix seu Larex* manis Lärchbaum appellatur.

## FORMA.

Larix arbor est magna, Piceæ similis, crassior, læuioriꝑ cortice, folio uilloto pectinum modo, pingui & denso, molliꝑ flexu, materia præstanti, rubente, odore acri. Hinc erumpit nonnihil liquoris melleo, Dioscoride ac Plinio testibus, colore atque lento, nunquam durescentis. Est autem resina quam Larignam, *Resina laricina* aut certè Laricinam uel Lariceam uocant, qua hodie omnes ferè officinæ pro tere- *hodie pro tere-* binthina, non sine errore utuntur. Terebinthina enim candida est, pellucida, & in *binthina utuntur* modum coloris uitri cœrulea & odorata. Lignum eius propèmodum ignibus in- *officinis.* uictum, neꝑ flagrat, neꝑ in carbores recidit: nec alio modo ignis ui consumitur, quàm saxum in fornace ad calcem coquendam adhibitum, quod quidem nec flammam recipit, nec carbonē remittit, sed longo spacio tardè comburitur. E ramis eius panicularum modo nucamenta dependent, quod pictura affabre ostendit.

## LOCVS.

Larix, ut autor est Vitruuius, circa ripam fluminis Padi, & litora maris Adriatici nascitur. Copiosissimè autem in Silesia prouenit, unde Illustrissimus Princeps *GEORGIVS* Marchio Brandenburgensis dominus meus clementissimus, plures *Marchio Brans-* arbores Onoltzbachiū transferre curauit, à quo sanè hanc etiam cuius hic damus *denburgensis.* picturam ad me Tubingam transmisit. In Silesia ex eius arboris ligno hypocausta construuntur, tantus illius ibidem prouentus est.

## TEMPVS.

Larix nullo exhilaratur flore, sed turgens tantum ædit germina.

## TEMPERAMENTVM.

B

Minimum in eius temperamento ignis & aëris, humoris autem terreni plurimum. Hinc cum non habeat spacia foraminum quæ possit ignis penetrare, fit ut eius uim, quemadmodū paulò antè diximus, reiiciat, nec patiatur ab eo citò lædi. Adstrictoriam itaque facultatem, haud secus atque piceæ, eius folia & cortices, ut statim dicemus, obtinent.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Cortex eius adstringit, ac intertriginib. tritus & illitus prodest, & ulceribus summam cutem occupantibus, ambustisꝑ cum lithargyro & manna thuris. Ulcera in teneris corporibus cerato myrtino exceptus ad cicatricem perducit. Tritus cum atramento sutorio, serpentia cohibet. Foetus & secundas suffitu eiicit. Potus aluum sistit, & urinam mouet. Folia eius trita illitaꝑ inflammationes leniunt, & uulnera ab inflammatione uindictant. Trita uerò & in aceto cocta, calida collutione dentium dolorem mulcent. Resina eius, ut omnes aliæ, emollit, calefacit, discutit, expurgat. Tussientibus ac tabidis in ecligmate per se aut cum melle conuenit. Thoracis uitia expurgat. Vrinam etiam cit, maturat, & aluum mollit. Pilos in palpebris glutinat. Cōtra lepras cum ærugine, atramento sutorio, & nitro inungitur. Auribus saniem stillantibus cum melle & oleo, & in genitalium pruritu. Miscetur etiam emplastris, malagmatis & acopis. Lateris doloribus per se inuncta & imposita auxiliatur.

## EX GALENO.

Cortex eius uincentem habet adstrictoriā facultatem usque adeo, ut & intertrigines bellissimè sanet, & uentrem potus sistat. Sed & ambustis cicatricem inducit. In folijs arboris, ut quæ multo sunt cortice humidiora, uis inest uulnere glutinatoria. Resina eius desiccet & calefacit.

## EX PLINIO.

Laricis folia trita & decocta in aceto, dentium dolori profunt. Cinis corticum

t 2 inter-





LARIX

Lärchbaum.



A intertrigini & ambustis medetur. Potus aluum sistit. Vrinam mouet. Suffitu uul-  
uas corrigit. Resina larigna tussi efficax habetur, polletq̃ contra uiscerum ulcera.

## DE MELISSOPHYLLO CAP. CLXXXIX

## NOMINA.



ΕΛΙΣΣΟΦΥΛΛΟΝ, ἢ μελίφυλλον Græcis, Apiastrum siue Citra-  
go Latinis, officinis Melissa dicitur. Germanis Wengentrout / We-  
lissentraut / Honigblum. Melissophyllum non alio nomine ap-  
pellatum est, nisi quod apes eius folio magnopere delectentur:

Melissa.

Melissophyllum  
unde dictum.

neq; enim μελισσόφυλλον aliud quàm apum folium significat. Me-  
liphyllon uerò, qua uoce Nicander usus est, mellis folium indi-

cat. Sic itaque nominari cœpit, quod hinc apes mellis materiam colligant. Pari ra-  
tione Latini Apiastrum haud dubiè dixerunt, quod ea herba apes plurimum læ-  
tentur, adeò ut si ea aluearia confricentur perunganturue, detentum in eis examen  
non fugiat. Citraginem autem ab odore Citri;nares enim si consulantur Citrium  
mâlum olebit.

Apiastrum.

Citrago.

## GENERA.

Duo sunt ex uulgarium herbariorum sententia Melissophylli genera. Vnum  
uerum; alterum adulterinum, quod Germani Wengentrout nominant, ut paulò  
pòst dicemus.

## FORMA.

Folia & cauliculi ueri Melissophylli, Balloti seu Marrubio nigro similia sunt, ma-  
iora tamen & tenuiora, nec ita hirsuta, citri mâli odore. Perperam hodie officinæ  
B pro uera Melissa utuntur herba passim in hortis proueniente, quam Germani, ut  
diximus, quia cimices olere uidetur, Wengentrout nominant. Fœdus itaq; cum  
huius herbæ odor sit, non est cur apes ea delectentur, neq; ei florenti insident, sed  
eam potius fugiunt. Contrà illa quam pro uera pictam damus unice oblectantur,  
quod illius tam gratus odor sit, ut in ædibus strata, eas gratissimo odore compleat.

## LOCVS.

Nascitur in syluis uerum, adulterinum autem in hortis.

## TEMPVS.

Carpitur æstate, Iunio potissimum mense, quo floribus prægnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Melissophyllon ex secundo ordine calefacientiũ censetur, desiccatur uerò non æ-  
què, sed ipsum quispiam in hoc primi ordinis esse posuerit.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia cum uino pota aut illita, contra scorpionũ, phalangiorũ, canumq; morsus  
profunt. Decoctũ eorundem, si eo perfundantur, idem potest. In infursionibus ad-  
ducendos menses utile est. Dentes eodem in dolore colluuntur. Dysentericis inie-  
ctum prodest. Fungorũ strangulationibus, folia cum nitro pota succurrunt. Tor-  
minibus auxiliant. Dantur in eclegmate orthopnoicis. Illita cum sale strumas dis-  
cutiunt. Vlcera purgant. Articulares dolores illita mitigant.

## EX GALENO.

Melissophyllon Marrubio facultate simile est, sed plurimũ ab eo uinciẽ: quam-  
obrem nec utitur illo quispiam. Superuacaneum siquidem foret præsentẽ Marru-  
bio, cuius tantus est ubiq; terrarum prouentus, uelle uti Melissophyllo. Cæterum  
si cui fortè ad manum quandoq; Marrubium non fuerit, illo ad quæcunque uti li-  
cebit, modo quanto ab hoc exuperetur cognitum habuerit.

## EX PLINIO.

Melissophyllo siue Melittana si perungantur aluearia, non fugient apes: nullo

enim





MELISSOPHYLLUM  
VERUM.

Melissen.





MELISSOPHYLLUM  
ADLUTERINUM.

Wanzenkraut.



C enim magis gaudent flore. Copia istius examina facillimè continentur. Idem præsentissimum est contra ictus earum uesparumq̃, & araneorum, item scorpionum, remedium. Item contra uuluarum strangulationes addito nitro. Contra tormina è uino. Folia eius strumis illinuntur, & sedis uitij cum sale decocta. Succus fœminas purgat, & inflationes discutit, & ulcera sanat. Articularios morbos sedat, canisq̃ morsus. Prodest dysentericis ueteribus, & cœliacis, orthopnoicis, lienibus, ulceribus thoracis. Caligines oculorum succo cum melle inungi eximium habetur.

## EX SYMEONE SETHI.

Ad stomachi ex frigidityte morsus, & à nigra bile tristitias & timores qui sine ratione ex illa fiunt, confert. Hilaritatem efficit, & ad melancholicū ac pituitosum humorem prodest. Fertur quod industriam afferat, & quod ante somnum sumptum, bona somnia faciat, contraria ratione cum Bralsica, quæ mala insomnia affert. Bubbles lædit.

## DE MARATHRO CAP. CXC.

## NOMINA.

Marathrum cur  
appellatum.

Fœniculum.



ΑΡΑΘΡΟΝ græcè, Fœniculum latinè, officinæ antiquum & latinum nomen retinuerunt, Germanicè Fenchel dicitur. Marathrum Græcis dictum putant à marcescendo, quod ad cōdienda plurima cum inaruerit cōmendatissimum sit. Fœniculum autem dici existimant, quod satum magno cum fœnore semen reddat.

## FORMA.

D Fœniculum ferulacei generis est, hominisq̃ plerunq̃ proceritatem superat, caule geniculato, fungosa intus medulla, leui exterior cortice & herbaceo, folia Abrotini, sed longiore molliori, iucundo odore, umbella rotunda, ampla, lutea, in orbem radiatim circinato, in qua semen nudum dependet, radice candida, longa & odorata.

## LOCVS.

Pæssim in hortis satum prouenit. Sua etiam sponte interdum ceu Anethum nascitur.

## TEMPVS.

Colligitur caule turgescente. Floret Iunio & Iulio mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Fœniculum tam ualenter excalfacit, ut ex tertio ordine excalefacientium censeripot sit. Exiccat uerò non æquè, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit. Proinde lac procreat, quod, si admodum desiccaret, non sanè efficeret.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Fœniculi herba comesta mammas lacte replet. Idem potest semē potum, aut decoctum cum ptisana. Comæ decoctum subditum impositumue, renum & uesicæ uitij utile: quippe quod urinam ciere potest. Contra serpentium ictus in uino potum prodest. Menfes ducit. In febribus nauseam, & stomachi ardorem ex aqua frigida potum, sedat. Radices contritæ & cum melle illitæ, morsibus canum medentur. Succus caulibus & folijs expressis in sole siccatus, medicamentis quæ ad excitandam oculorum aciem cōficiuntur, utiliter adijcitur. Extrahitur etiam succus ex semine uiridi, folijs, ramulisq̃, ad eadem utilis. Radix in prima germinatione exprimitur. In occidentali Iberia liquorem gummi similem reddit. Caulem medium dum herba floret incolæ demetunt, igniq̃ admouent, quo facilius ui caloris exudans gummi remittat. Hoc efficacius succo est ad medicamenta oculorum.

EX GALE-





FOENICVLVM

Fenchel.





MELANTHIVM HOR  
TENSE PRIMVM.

Schwarz Kominich.





MELANTHINUM  
SYLVESTRE.

Wilder schwarzer Coriander.



C

## LOCVS.

Melanthion domesticum non nisi in hortis solum prouenit. Syluestre autem, ut dictum est, in agris sua sponte prouenit.

## TEMPVS.

Melanthion floret Iunio mense, Iulio autem & Augusto semine pragnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Melanthium excalefacit atque desiccatur tertio ordine.

## VIRE.

## EX DIOSCORIDE.

Capitis doloribus illitum fronti Melanthiū, & incipientibus suffusionibus cum irino tritum & naribus infusum prodest. Tollit lentigines, lepras, cedemata uetusta, duritiesq; cum aceto illitum. Circumscarificatos clauos excutit cum uetere uino impositum. Dentium doloribus cum aceto & teda decoctum, si eo colluantur, succurrit. Rotundos uentris lumbricos expellit, ex aqua umbilico illitum. Tritum autem & in linteo colligatum & olfactum, destillatione laborantes adiuuat. Pluribus diebus potum, urinam, menses & lac prouocat. Difficultatem spirandi cum uino potum finit. Phalangiorum morsibus drachmæ pondere cum aqua haustum auxiliatur. Suffitu serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

## EX GALENO.

Tenuium est partium Melanthium, unde destillationes sanat calidum in linteo admotum, atque assiduò olfactum. Quinetiam si intrò in corpus sumatur, uel maxime flatus extinguit. Hinc constat essentia ipsam esse tenuis, & ad unguem à caliditate elaborata. Propterea sanè etiam amarum est. Itaque mirum non est si lumbricos interimat non esum modo, sed etiam foris impositum. Neque sanè etiam mirandum si lepras, clauos, myrmecias ejiciat. Sic uerò etiam orthopnceam iuuat, & menses prouocat, qui ob crassitiem aut uiscedinem retenti fuerint. In summa, ubi incisione, extersione, desiccatione, excalefactione est opus, præstantissimum id remedium est.

## EX PLINIO.

Melanthion medetur serpentium plagis & scorpionum. Illini ex aceto & melle reperio, incensoq; serpentes fugari. Bibitur drachma contra araneos. Destillationem narium discutit tulum in linteolo olfactum. Capitis dolores illitum ex aceto, & infusum naribus mitigat. Cum irino oculorū epiphoras & tumores lenit. Dentium dolores coctum cum aceto. Ulcera oris tritum & cōmanducatum. Lepras & lentigines ex aceto tritum emendat. Difficultates spirandi addito uino potum. Duritias tumoresq; ueteres & suppurationes illitum. Lac mulierum auget continuis diebus sumptum. Colligitur succus ut Hyoscyami. Oculos purgat, urinam & menstrua cit. Similiter largius uenenum est, quod miremur, cum semen gratisimè panes etiam condit. Quinimo linteolo alligatis tantum granis triginta, secundas trahi reperio. Aiunt & clauis in pedibus mederi tritum in urina. Culices suffitu necare; item muscas.

## EX SYMEONE SETHI.

Est tenuium partium, lumbricos in uentre necat, flatus discutit, pituitamq; incidit. Ad orthopnceas & defluxus capitis facit odoratum, præsertim postquam calefactum fuerit. Dicitur uerò quod si teratur, & cum aceto uentri imponatur, etiam sic lumbricos necare. Et si cum melle fermentetur, & calida aqua hauriatur, calculos in renibus & uesica minuit, urinam cit, menses ducit, & ueluti remedium contra uenena est, si quis ipsum ieiunus assumat.

DE MALA-



MALVA  
HORTENSIS.

Ernrosen.







MALVA SYLVE  
STRIS PYMILA.

Genschappel.





MALVA SYLVESTRIS  
ELATIOR.

Hofpappel.



Malua quare  
dicta.  
μαλάχη.



ΑΛΛΗ græcè, Malua latinè, officinis latinum nomen retinuit, Germanicè Pappel dicitur. Malua autem Græcis ab emollienda aluo nomen traxit: μαλάχη enim mollire significat. Quinetiam Latinis Varro Maluam quasi moluam, quod aluum molliat, dictam esse contendit.

Antiqui enim ea utebantur in acetarijs cum Lactuca ad subducendam aluum. Vnde Martialis libro decimo ait:

*Exoneraturas uentrem mihi uillica maluas*

*Attulit, & uarias quas habet hortus opes.*

## G E N E R A.

Maluarū genera esse duo Dioscorides & Galenus tradunt. Vna enim hortensis, Hortensis altera syluestris Malua dicitur. Hortensis, quæ in hortis sata prouenit, Germanis *Römische Pappel* uel *Lenros*/quod scilicet melsis tempore floreant, uel *Herbstros* nominatur. Huius iterum uaria sunt genera: alia siquidem rosas purpureas, & has uel simplici uel multiplici foliorū textura constantes, ut pictura monstrat: alia candidas & iterum foliorū textura differentes producit. Nos una pictura quatuor syluestris. hæc hortensis Maluæ genera complexi sumus. Syluestris non quæ in syluis, aut asperis locis, sed quæ in incultis locis sua sponte nascitur, intelligi debet: id quod *χρσαία*. græca uox *χρσαία*, qua Dioscorides utitur, maximè docet. Hæc enim Græcis incultam & inelaboratā terram significat, qualis in semitis, pratis, alijsq; huiusmodi ruris & agri partibus est. Erratica hæc seu syluestris Malua itidem in duas distribuitur species: quædam enim pumila est, & humi serpens, hanc Germani *Genßpappel*/ *Ras* oder *Nasenpappel* uocant. Quædam altius attollitur, & ferè arborescit, hanc germanicè *Rospappel* nominant.

## D

## F O R M A.

Hortensis Malua grandescit in arborem, eiusq; scapulis tanta magnitudine proficit, ut baculi usum præbeat. Folia huic ampla, circinata rotunditatis, multis in ambitu segmentis. Caudex simplex, luxuriosæ proceritatis attollitur, à medio ferè ad uerticem pulcherrimis floribus decoratus, breui admodum pediculo dependentibus, qui uenustate rosas non cedunt, & si suppeteret odor, de principatu certarent. Colore constant purpureo, uermiculatoue & candido. Capitula quædam breuibus innixa petiolis, & leuiter in mucronem fastigiata primùm è caule profiliunt, hsc paulatim intumescuntibus, prægnantia florū inuolucra fatiscunt, in quibus dehiscen-  
tes rosæ sese pandunt, & explicant in folia quinq; interdum structili quadam serie, ut diximus, numerosa, calycibus apices paucos cōplexis, qui lutei medijs emicant, quibus decidentibus erumpunt purpurea stamina. His foetus succrescit multipliciter tunicatus, atq; in umbilici formam numero semine coagmentatus, in quibus cum decussa sunt folia, reliquarum Maluarū modo semina recluduntur. Syluestris pumila & humi repens, folio rotundo, pingui, & in ambitu serrato constat: caule magno, floribus ex candido purpurascens, radice candida. Syluestris pro-  
altior folio magis laciniato nascitur, floribus ex cœruleo purpureis, radice candida.

## L O C V S.

Hortensis in hortis sata prouenit. Syluestris autem locis incultis, pinguibus potissimum, & humidis.

## T E M P V S.

Hortensis floret Iulio & Augusto præsertim mensibus: neque enim flos is ut rosa fugax est, sed diu uigor uitæq; durat. Syluestris pumila per totam æstatem, & in maximam autumnii partem durat. Arborescens autem Iunio & Iulio mensibus, floribus quammaxime abundat.

## T E M P E R A-



## A TEMPERAMENTVM.

Malua sylvestris digerentis paululum, & emollientis leuiter est facultatis. Hortensis uerò quanto plus habet aqueæ humiditatis, tanto facultate imbecillior est. Fructus eius tanto ualidior est, quanto & siccior. Inter Lactucā, Betam & Maluam id est discriminis, nempe quod sicciora sint syluestria, satiuu humidiora. Permissū <sup>Syluestria satiuu</sup> est Maluæ succo aliquid glutinosum, quo Lactuca caret. A refrigerandi facultate ma- <sup>sicciora.</sup> nifestè abest, ut ante sumptionē cernere licet, si ex ambobus particulatim oleribus, quemadmodū facitare homines consueuerunt, cataplasma ad calidum quempiam affectum, qualis est erysipelas, componas, molliuscula folia diligenter tundens donec ad leuorem redacta sint exactissimum. Tum nanque cognosces Lactucam manifestè refrigerare, Maluam uerò modicum, & quasi tepidum quendam calorem obtinere. Facile hoc olus deorsum labitur, non tantum quia humidum est, sed etiam quia glutinosum. Si horum trium olerum succos inter se compares, tenuis & absterforius Betæ, crassior glutinosiorq; Maluæ, in utriusq; medio Lactucæ statuetur. Hæc Galenus lib. ij. de alimentorū facultatibus.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Esui aptior hortensis multò quàm sylvestris. Stomacho noxia, aluum bonam efficit, præsertim caules, intestinis & uesicæ utiles. Folia cruda illita, & cum modico sale addito melle cōmanducata, egilopas sanant. Verum in inducenda cicatrice, ea sine sale utendum est. Contra apum uespærumq; ictus illita prodest. Et si cruda tritaq; cum oleo antea se inunxerit aliquis, non feritur. Achoras, furfuresq; cum urina illita sanat. Sacris ignibus & ambustis decocta folia tritaq; utiliter cum oleo imponuntur. Eius decoctum uuluas in fessione mollit. Prodest erosionibus intestinorum, uulua sedisq; clystere infusum. Ius decoctæ cum radice sua omnibus letalibus uenenis auxiliatur, si continuo à bibentibus reuomatur. Contra phalangiorum morsus remedio est. Lac prurit. Semen eius admixto Loti sylvestris semine potum cum uino uesicæ dolores lenit.

## EX PLINIO.

Maluæ contra omnes aculeatos ictus efficacior uis, præcipuè scorpionū, uespærum similiūq; & muris aranei. Quin & trita cum oleo qualibet earum peruncti antè, uel habentes eas non feriuntur. Folium impositum scorpionibus torporem affert. Valent contra uenena. Aculeos omnes extrahunt illitæ crudæ, aut cum <sup>† dilu. aceto:</sup> anetho potæ. Decoctæ uerò cum radice sua, leporis marini uenena restringunt: & ut quidam dicunt, si uomatur. De eisdem mira & alia traduntur, sed maxime, si quotidie quis succi ex qualibet earum sorbeat cyathum dimidium, omnibus morbis cariturum. Ulcera manantia in capite sanant, in urina putrefactæ lichenas, & ulcera oris cum melle. Radix decocta furfures capitis & dentium mobilitates. Eius quæ unum caulem habet, radice circa dentem qui doleat punge, donec desinat dolor. Eadem strumas & parotidas panósque, addita hominis salua, purgat citra uulnus. Semen in uino nigro potum, à pituitis & nauseis liberat. Radix mammærum uitij occurrat, adalligata in lana nigra. Tussim in lacte cocta, & sorbitionis modo sumpta, quin diebus emendat. Stomacho inutiles Sextus Niger dicit. Olympias Thebana, abortiuas esse cum adipe anseris. Aliqui purgari fœminas, folijs earum manus plenæ mensura, in oleo & uino sumptis. Vtique constat parturientes substratis folijs celerius solui, protinus à partu reuocanda, ne uulua sequatur. Dant & succum bibendum parturientibus ieiunis, in uino decocta hemina. Quin & semen tritum adalligant brachio, genitale non continentium. Adeoque eæ Veneri nascuntur, ut semen unicaulis aspersum genitali, fœminarum auaritates augere ad infinitum Xenocrates tradat. Item tres radices iuxta



C adalligatas, tenasmo & dysentericis utilissimè infundi. Item sedis uitijis, uel si foueantur. Melancholicis quoque succus datur cyathis ternis tepidus, & insanientibus quaternis. Decoctæ comitialibus heminae succi. Hic & calculosis, & inflatione, & torminibus, aut opisthotonico laborantibus tepidus illinitur. Et sacris ignibus & ambustis decocta in oleum folia imponuntur, & ad uulnerum impetus cruda cum pane. Succus decoctæ neruis prodest, & uesicæ, & intestinorum rosionibus. Vuluas & cibo & infusione mollit in oleo. Succus decoctæ pori meatus suaues facit.

## EX SYMEONE SETHI.

Ventriculum facilè subit, non solum propter humiditatem, uerum etiã glutinositatem, atq; inprimis si cum oleo & garo offeratur, uino quo editur tempore irrorata. Vesicam, thoracè, pulmonemq; iuuat, & raucam uocem lenit. Syluestris malua, ut ferunt, comesta, dolores ex uesparũ morfu tollit. Si quis morsus à uespis aut apibus, succo Maluæ, præsertim syluestris, perungatur, confestim dolore leuatur. Dicitur etiam quod huius decoctum potum, lapides conterit, somnum conciliat, facilemq; partum præstat, si mulier ea crebrius utatur. Illita inflammationes lenit, eaq; quæ indurata sunt emollit. Illud Maluæ peculiare est, ut imposita ictibus uesparum & apum, dolores leuet.

## DE MYRICE CAP. CXCI.

## NOMINA.

Tamariscus.



ΥΡΙΚΗ Græcis, Myrice & Tamarix Latinis, officinis Tamariscus, Germanis Tamarisc & Pœst nominatur.

## GENERA.

D Dioscorides duo Tamaricis genera facit. Vna enim syluestris est, qualis est ea quæ in plerisq; Germaniæ locis prouenit, quamq; hic pictam damus. Altera satiaua, quæ priori in cæteris similis est, nisi quod fructifera est, & minimè, ut illa, sterilis.

## FORMA.

Syluestris arbustum frutæxue humilis est, ramis ex herbaceo fuluoq; colore uarie gatis, folijs Sabinæ aut Ericæ, flore muscoso, qui demum in pappos euolat. Satiua cætera similis est syluestri, fructum tamen gallæ non dissimilem profert, qui gustu inæqualiter adstringit.

## LOCVS.

Proxime paludes, residues stagnantesq; aquas nascit. Syluestrisq; copiosa in Germania ad Rhenum & Iſarum, insignes fluuios, prouenit. Satiua in Syria & Ægypto, ubi procerissimas æquat arbores, gignitur.

## TEMPVS.

Perpetua coma frondet.

## TEMPERAMENTVM.

Myrice abstergentis est ac incidentis facultatis, absq; perspicua desiccatione: habet uerò etiam adstrictionē nonnullam. Cæterum fructus & cortex non paucam sortita est adstrictionē, adeò ut gallæ omphacitidi seu immaturæ proxima sint, nisi quod acerbitas euidentis est in galla, sed Myricæ fructui temperatura inest inæqualis: immista est enim naturæ eius multa partium tenuitas, atque uis abstergendi, quod sanè gallæ haud inest. Porrò Myricæ combustæ cinis admodum desiccatoris facultatis est, plurimam abstergendi facultatem habens, pauxillam adstringendi.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Fructu uice gallæ in oris oculorumq; medicaminibus utuntur. Cruentis sputis in potu





TAMARIX

Tamarisck.



**C** potu, coeliacis, foeminarū fluxionibus, morbo regio, & phalangiorū moribus prodest. Oedemata illitus reprimat. Cortex eadem quæ fructus potest. Decoctum foliorum cum uino potum, lienem minuit. Ad dolorem dentium in collutionibus salutare est, & mulierum fluxionibus in defelsionibus. Aptè his in quibus pediculi & lendes abundant circumfunditur. Cinis lignorum eius appositus profluuiū ex utero supprimit. E trunco eius nonnulli potorios calices fabricant, quibus in lienosis pro poculo utuntur, quò datus in ijs potus proficiat.

Calices potiorij  
ex trunco latis  
marici.

## EX GALENO.

Myrice prodest admodū lieni indurato, decoctis cum aceto aut uino radicibus, siue folijs, siue extremis ramulis. Sanat uerò etiam dentium dolores.

## EX PLINIO.

Lenæus sanari ea carcinomata in uino decocta tritaq; cum melle dicit. Ad lienem præcipua est, si succus eius expressus in uino bibatur. Adeoq; mirabilem eius antipathiam cōtra solum hoc uiscerum faciunt, ut affirmant, si ex ea alueis factis bibant sues, sine liene inueniri. Et ideo homini quoque splenetico cibum potumq; dant in uasis ex ea factis. Lignum & flos & folia & cortex in eisdem usus adhibent, quam remissiora. Datur sanguinem reiicientibus cortex tritus, & contra profluvia foeminarum, coeliacis quoq;. Idem tusus impositusq; collectiones omnes inhibet. Folijs exprimitur succus. Ad hæc eadem & in uino decoquuntur: ipsa uerò adiecto melle gangrenis illinuntur. Decoctum eorum in uino potum, uel impositum cum rosaceo & cera sedat. Sic & epinyctidas sanant. Ad dentium dolorem auriumq;, decoctum eorum salutare est. Radix ad eadem, similiter & folia. Hæc amplius ad ea quæ serpunt imponuntur cum polenta. Semen drachmæ pondere aduersus phalangia & araneos bibitur. Cum altitium uerò pingui furunculis imponitur. Efficax & contra serpentium ictus, præterquam aspidum. Necnon morbo regio, phthiriasi, lendibusq; decoctum infusum prodest, abundantiamq; mulierum sistit. Cinis arboris ad omnia eadem prodest.

## DE MEONE RHOEADE CAP. CXCIII.

## NOMINA.

Papauer ruber.



Rhoea unde dicitur  
etiam.

ΜΗΚΩΝ ποίος Græcis, Papauer rhœas, hoc est, fluidum aut erraticum Latinis, Papauer rubeum officinis & herbarijs, Germanis à strepitu quem ludentes pueri harum folijs concauo pugno impositis, altera palma incussa ædunt, Klapperrosen/ quasi dicas crepitaculares rosas, & Glitschen/ & wild Maen/ ac Kornrosen appellant. Rhœas autem à flore, qui ei protinus decidit, dictum est.

## FORMA.

Folia Erucar, aut Cichorio similia, & incisa habet, longiora tamen & aspera. Caulis lanuginosus, rectus, asperus, cubitalis. Florem puniceum, & aliquando candidum, similem syluestris Anemones flori. Caput oblongum, minus tamen quàm Anemones. Semen rufum. Radicem oblongam, subalbam, minoris digiti crassitudine, amaram. Ex qua deliniatione omnibus perspicuū fit, herbam quam Papauer rubeum hodie uulgò nominant, esse Rhœada, quod sit folio Erucar, laciniato, scabro, & longiore: caule lanuginoso, recto, aspero, cubitali: flore syluestris Anemones puniceo, nonnunquā albo, oblongo capite: semine rufo, radice longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Errant itaque qui Anemonem esse arbitrantur, quod folia eius, quæ Coriandri sunt, euidentissimè reclamant. Nos Rhœadis utriusque picturas damus. Vnius, atque adeo primi, quod Erucar folia habet, alterius quod Cichorij.

Papauer ruber  
nō est Anemone.

LOCVS,





PAPAVER ER  
RATICVM PRIMVM.

Clapperosen.





PAPAVER ERRATI  
GVM ALTERVM.

Kornrosen.



A

## LOCVS.

Nascitur in aruis & segetibus passim.

## TEMPVS.

Vere & æstate dum frumenta messem appetunt, floret: quo etiam tempore decerpitur.

## TEMPERAMENTVM.

Refrigerat, ut alia genera Papaueris.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius Papaueris quinque sexue capita cum tribus uini cyathis decocta donec ad duas reducantur, potui dabis quibus somnum accersere uolueris. Semen acetabuli mensura cum aqua mulsa potum, aluum leniter emollit. Ad idem præstandū mellitis & dulciarijs immiscetur. Folia cum calycibus illita inflammationes sanant. Eorundem perfusione & fotu somnus allicitur.

## EX GALENO.

Papauer quoddā Rhœas nuncupat, quod scilicet celeriter flos eius defluat. Huius semen ualidius refrigerat, ita ut nequaquam eo quis innoxie solo uti possit, ueluti satiuo melli admiscens. Admodū uerò ita sumptum somnum conciliat. Sed & pusillum eius inspergunt ijs quæ ex melle conficiuntur bellarijs, placentis & panibus.

## EX PLINIO.

Aluum exinaniant capita quinq; decocta in uini tribus heminis: pota somnum faciunt.

## EX RECENTIORIBVS.

Sacro igni medetur. Mulierum menstrua profluua compescit. Sanguinem è naribus fluentem iecori impositum sistit. Lingua ex decocto eius lota, ardorem faucium sanat. Pudendorū tumores detumescere facit. Temporibus illitum, phreneticis somnum conciliat. Calidos oculorum dolores linteo impositum mitigat. Unde rursus omnibus liquet, Papauer hoc rubrum non esse Anemonem, quod scilicet hæc ipsa contrarias planè facultates obtineat.

## DE MECON SATIVO CAP. CXCV.

## NOMINA.



Η Κ Ω Ν ἡμῶς græcè, Papauer satiuum latinè dicitur. Officinæ antiquū nomen retinuerunt. Germanicè Magsomen oder Mân uocatur. Dictum autem Græcis μέλαινα ἀ μινιστῶν, hoc est, non ministrando, quod

Mecon quare ap-  
pellatur.

luis fungi munis uescentes non patiatur.

## GENERA.

Satiui Papaueris duplex genus, albū uidelicet, cuius flos & semen candidū: & nigrum, quod semine nigro cōstat. Nos utrunq; genus una pictura complexi sumus.

## FORMA.

Folijs constat longis, per ambitum serratis, nulloq; pediculo cauli adhaerentibus: floribus uel candidis, uel ex candido leniter purpureis: capitibus oblongis, in quibus semen atrum uel candidum.

## LOCVS.

Passim in hortis satum prouenit.

## TEMPVS.

Æstate floret, ac subinde semen profert.

## TEMPERAMENTVM.

Refrigerat, sicut omnia alia Papaueris genera, in quarto ordine.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Cōmunis ipsis refrigerandi uis est: proinde folia & capita in aqua decocta fotu  
x somnum





PAPAVÉR  
SATIVVM.

Opiumfamen.



A somnum accersunt. Bibitur & decoctum contra uigilias. Capita trita & cum polenta cataplasmatibus mixta, ignibus sacris & inflammationibus prosunt. Oportet autem uiridia ipsa tundere, & in pastillos conformare, siccatosque reponere ac uti. Capita per se etiam ad dimidias in aqua decocta, dein iterum cum melle dum humor densetur crassescatque decocta, elegma medicamentum efficiunt, dolorem mitigans in tussi, fluxionibus arteriarum & coeliacis affectionibus. Efficacius redditur adiecto Hypocistidis succo & Acacia. Papaueris nigri semen tritum cum uino bibitur contra fluxiones alui & foeminarum profluvia. In peruigilijs fronti temporibusque cum aqua illinitur. Eiusdem liquor plus refrigerat, inspissat, siccatur. Erui quantitate sumptus dolorem leuat, somnum conciliat & concoquit. Tussi atque coeliacis affectibus auxiliatur. Maiori autem copia haustus nocet, lethargicos efficiens, & interimit. Ad dolores capitis cum rosaceo perfusus facit. Aures dolentibus cum amygdalino, myrrha & croco instillatur. In oculorum inflammationibus cum tosto oui luteo & croco. Igni sacro & uulneribus cum aceto, podagris cum lacte mulieris & croco sedi pro balano subditus, somnum allicit.

## EX GALENO.

Satiui Papaueris semen panibus utiliter ceu dulciarium inspergitur, non secus ac Sesamum. Candidius nigriore praestat, uimque refrigerandi habet, ideoque somnificum est. Si uero liberalius sumatur, soporem etiam inducet, atque concoquetur. Tussim praeterea ex thorace & pulmone compescit. Confert aduersus tenues ex capite destillationes. Corpori nullum notatu dignum exhibet nutrimentum.

## EX PLINIO.

Candidi semen tostum in secunda mensa cum melle apud antiquos edebatur. Calyx ipse teritur & bibitur somni causa. Semen elephantis medetur. E nigro Papauere lacteus succus scapo inciso exprimitur, qui densatur, & in pastillos tritus in umbra siccatur, non ui soporifera modo, uerum si copiosior hauriatur, etiam mortifera per somnum: opion uocant. Semine eius trito in pastillos, e lacte utuntur ad somnum. Item ad capitis dolores cum rosaceo. Cum his aurium dolori instillant. Podagris illinitur cum lacte mulierum. Sic & folijs ipsis utuntur ad sacros ignes. Item uulnera cum aceto. Ego tamen damnauerim collyrijs addi, multoque magis quas uocant lexypyretas, quasque pepticas & coeliacas. Nigrum tamen coeliacis in uino datur.

## EX SYMEONE SETHI.

Melius est album quam nigrum. Somnificum uim habet, & difficilis est concoctionis, parumque nutrit. Si autem cum melle edatur, semini genitali adiicit. Prodest & thoraci, & asperae arteriae, ac tussi. Ventrem sistit, etsi quidam falso putauerunt ipsum mouere, cum contrariam habeat uim. Laedit caput, si copiosius sumatur, idemque aggrauat. Sunt qui ipsum conterunt, & uigilantiu fronti imponunt, in hoc ut somnum conciliet. Caeterum nigrum Papauer frigidius est, & magis somniferum, adeo ut si quis eo immodice utatur, somno profundo similiter lethargicis capiat.

Cum rosaceo impositum capiti, eiusdem dolores a calore ortos sanat. Dicitur etiam quod illitum cum lacte muliebri & croco, podagricos iuuat. Huius lachryma uenenum est. Nigri autem succus est uocatum opium.





PAP AVER  
CORNICVLATVM.

Gelb ölmagen.



A

## NOMINA.



ΜΗΚΩΝ καρατίνης Græcis, Papauer corniculatum Latinis, officinis Papa- Papauer cornu-  
natum.  
uer cornutum, Germanis Gelb ôlmagen appellatur. Corniculatum à  
fructu, quem producit, cornu modo inflexo nominatum est.

## FORMA.

Folia habet candida, hirsuta, Verbasco similia, per ambitū Papaueris syluestris modo serrata: caulem etiam similem, florem luteum pallidūmue, fructum paruum ut cornu inflexum, scenigræci corniculo similem, unde & nomen inuenit. Semen pusillum, nigrum quale Papaueris. Radicem in superficie terræ herentem, nigram, crassam.

## LOCVS.

Dioscorides in maritimis & asperis locis prouenire ait. In Germania tamen nostra non nisi satum fuerit nascitur.

## TEMPVS.

Iunio floret mense. Semen autem circa messes legitur.

## TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum esse, facultates eius, & in gustu nitrositas, satis ostendunt.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix ad dimidias cocta in aqua & pota, ischiadas, & iecinoris affectus sanare potest. His etiam qui crassas & araneosas faciunt urinas prodest. Semē acetabuli mensura cum aqua mulsa potum, aluum leniter purgat. Folia præterea floresq; cum oleo illita crustas emarginant. Eadem inuncta iumentorum argema ac nubeculas emendant.

## EX GALENO.

B Papauer corniculatū nominatum quidem est à fructu leuem inuersionē habente, ueluti & scenumgræcū, ut bouis cornu simile esse uideatur. Vim habet incidendi & abstergendi. Proinde radix herbæ in aqua decocta ad dimidium, iecinoris affectus adiuuat. Folia & flores, sordida admodum & maligna ulcera iuuant. Sed ab his abstinere oportet ulceribus iam purgatis: adeo enim abstergere ualent, ut & puræ quoque carnis nonnihil eliquent. Hoc facultatum robore non sordes duntaxat, sed & crustam ulceribus detrahunt.

## EX PLINIO.

Semen aluum purgat dimidio acetabulo in mulso. Folia trita cum oleo, argemas iumentorū sanant. Radix acetabuli mensura cocta in duobus sextarijs ad dimidias, datur ad lumborum uitia & iecinoris. Carbunculis medentur ex melle folia.

## DE MORO CAP CXC VII

## NOMINA.



ΜΟΡΕΑ, ἢ συκεραρία Græcis, Morus Latinis, officinis & uulgaribus herbarijs Morus celsi, Germanis Maulberbaum appellatur. Morus celsi.

## FORMA.

Morus arbor notior est quàm ut describi desideret. Folia autem rotunda ferè habet, nisi quod in summo sint acuminata, in extremitatib. serrata, & ad Menthæ hortensis primi & secundi generis folia accedentia. Flores lanugineos, fructum statim ab ortu candidum, cum pubescit rubrum, ubi maturuit atrum. Non est certè silentio transeundum, quod Mori folijs quadraginta ferè diebus à Vergiliarum exortu usq; ad solstitiū pasti uermiculi, qui σῆψα Græcis, Latinis bombyces ac Seres nominantur, sericeū uellus, quo turget uterus, pedibus explicantes conficiunt: nulla enim in re alia natura sagacior deprehendit, nec ars aliquid ab ijs accepisse uidebitur, in quo ingeniosius laborauerit, si tam multas dum id uellus perficitur na-





MORVS

Maulberbaum.



**A**ur naturæ mutationes, & artis dum ad uitæ usum disponitur labores æstimemus. Appetente siquidem uere oua, piscium ouis haud dissimilia, linteolo chartæ uē ad hærescentia, quæ proximo autumno produxerunt, radijs solis exponuntur, aut calido in loco, hypocausto nimirum, seruantur. Quo fit ut uermiculi excludantur exigui, qui mox Mori folijs nutriuntur, quoad grandiores facti fuerint: tum statim penulæ cuiq; chartaceæ, uel potius inuolucra conficiuntur, quibus inclusi mirabili naturæ opere lanitio sese inuoluunt, ac congesto glomeri se condentes, postquam suum nendi obierunt munus emoriuntur, adeò ut semestris tantum illis apud nos uita sit. Mortuis testacea subinde tunica inducitur, qua aliquot diebus obducti reuiuiscunt, ac ascitis sibi alis in uolucres papiliones degenerant, qui assidue inuicem insidentes coeuntesq; tandem relictis ouis milij forma & colore, quibus sua rediuitua proles sequente anno renascitur, iterum moriuntur, atque adeo cum nullius præterea sint usus abijciuntur. Oua autem ad ueris usq; initia seruantur. Hanc mirificam metamorphosin quam non raro summa cum admiratione ac delectatione sum contemplatus, non potui non commemorare, quò studiosis uermiculorum istorum qui Mori folijs pascuntur natura prorsus perspecta esset.

## LOCVS.

Nascitur in hortis quibusdam. Amat autem in primis loca calida sabulosaq;. Gaudet folsione & stercore.

## TEMPVS.

Nouissima urbanarū germinat, nec nisi exacto frigore, ob id dicta sapientissima *Morus sapientissima arborum.* Proinde cum hanc germinare uiderimus, trigus minimè timendum erit.

## TEMPERAMENTVM.

**B** Immaturs Mori fructus ubi exaruerit admodum adstringit. Maturus autem mediocriter adstringit. Cortex radicis arboris amaritudinis cuiusdam & purgantis facultatis particeps est. Folia & germina quodammodo media temperie inter adstrictionem & purgatoriam facultatem sunt prædita.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Mori fructus aluum soluit. Facile corrumpitur. Stomacho inimicus est. Præstat hoc idem eius succus. Decoctus autem æreo uase, aut insolatus, magis adstringit. Admixto mellis exiguo, ad fluxiones, nomas & tonsillarū inflammationes facit. Augetur uis eius adiecto scisili alumine, galla, croco & myrrha, item tamaricis semine, iride & thure. Mora uerò immatura sicca rusaq;, Rhois uice obsonijs miscent, & cœliacos iuuant. Radicis cortex decoctus in aqua & potus aluum soluit. Latos uentris lumbricos expellit: ijs quoq; auxiliat qui aconitū hauserunt. Folia trita & cum oleo illita, ambustis igne medentur. Decocta in aqua cœlesti cum uitis & nigrae fici folijs capillos tingunt. Succus foliorum cyathi mensura potus, phalangiorum moribus auxiliatur. Corticis & foliorum decocto colluuntur utiliter in dolore dentes. Colligitur per messem succus, circumfossa & secta radice arboris: inuenitur enim postridie concretus, qui in dolore dentiū utilis est. Tubercula discutit, & aluū purgat.

## EX GALENO.

Mori fructus maturus uentrē quidē subducit: immaturus atefactus medicamentum fit satis cōstringens, adeò ut ad dysenterias & cœliacos affectus, aliosq; omnes qui ex fluxionum sunt genere efficax sit. Contunditur autem & obsonijs miscetur, ueluti Rhois fructus: aut si cui ita uideatur, ex aqua aut uino bibitur. Porro quod maturorum succus ad stomatica medicamenta sit utilis, propter eam uidelicet quæ inest illi adstrictionem, neminem latet. Præterea ad alia complura particularia, quæ mediocrem poscunt adstrictionē, competit. At immatura præter acerbitatē aciditate etiam participant. Tota quoq; arbor in omnibus suis partibus mistam aliquam obtinere facultatem ex cōstringente & purgante compositam uidetur. Attamen in radicis cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeò ut & latum




C lumbricum interficiat. In alijs autem partibus constringens uincit. In folijs tamen & germinibus media quodammodo cōprimētis & subducentis facultas est. Cæterum Mora ubi in uentriculum purum, & prima fuerint ingesta, citissimè per intestina transeunt, & alijs cibis suo ueluti ductu uiam struunt. Verum secundo loco assumpta, aut prauum in uentre humorē inuenientia, celerrimè alijs unà cum cibis corrumpunt, extraneā quandam atq; inexplicabilem corruptelam inducentia similiter Cucurbitis. Tameñ enim fugacibus hæc omnia sint esculentis innocentiora, corruptione tamen nisi uelociter deorsum concedant, non secus ac Pepones, uitiantur. Porro quando uentriculi os squalidum calidumq; erit, tum sicut peponibus, ita & Moris utendum. Tale nanq; iecur etiam tunc esse necesse est. Immatura Mora ab arbore decerpta, siccataq; in hyemem reponunt, ut sibi medicamē ex ijs parent, utile ad dysenteriam, aluiq; diuturnum fluorem persanandū. Quod quidem facile descendant fortè eis usuuenit sola substantiæ humiditate & lubricitate, fortè etiam admistione actioris facultatis, quæ stimulanđe ad excretionem aluo sit satis. Nam adstringens qualitas adeò nihil ad deiectionem opitulatur, ut etiam reprimere stipareq; sit nata. Proinde Moris exiguum quandam eius facultatis portiunculam inesse cōiicio, cuius permagna in purgantibus medicamentis habetur: quæ facit non solum ut facile deñciantur, uerumetiā ut diutius morata in uentre corrumpantur. Quod si corruptionem effugiant, omnino quidem humectant, sed non planè refrigerant, nisi frigida accipiantur. Parcissimè corpus alunt, similiter ut Pepones, haud tamen uomitum cient, nec stomacho ut illi aduersantur.

## DE MYRRHIDE CAP. CXC VIII.

D

NOMINA.

Cicutaria.

Error de duplici  
Cicuta.

ΥΠΡΙΣ ἡ μύρρη Græcis, Myrrhis Latinis, uulgaribus herbarijs Cicutaria, quod scilicet caule & folijs Cicutæ simillima sit. Hac similitudine quidam decepti, ueram esse Cicutam putauerunt, cum tamen ab ea, uiribus potissimū, diuersissima sit. Germanis Wilderkoffel appellatur.

FORMA.

Cicutæ caule & folijs similis est, radicem obtinet longam, teneram, rotundam, odoratam, in cibo non insuauem. Hæc tota Dioscoridis deliniatio, nulla prorsus reclamante nota, herbæ cuius effigiem damus pictam suffragatur. Siquidem caule striato, folijs & flore Cicutæ simillima est, adeò ut eam nonnulli à Cicuta discernere nesciant. Radicem etiam habet longam, teneram, rotundam, cibo iucundam & odoratam.

LOCVS.

Pæssim in hortis & pratis nonnullis prouenit.

TEMPVS.

Maio mense loca in quibus nascitur huius floribus quasi candicant.

TEMPERAMENTVM.

Ex secundo est ordine excafacientium, adiuncta partium tenuitate.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Phalangiorū morsibus radix Myrrhidis succurrit cum uino pota. Menses purgat & secundas educit. Cocta in sorbitione tabidis utiliter datur. Ferunt præterea aliqui eam bis tēue die potam ex uino in pestilentialibus constitutionibus, à morbo seruare incolumes.

EX GALENO.

Radix eius menses mouet, quæq; in thorace & pulmone sunt expurgat.

EX PLINIO.

Cit menstrua & partus cum uino. Aiunt quoque eandem potam in pestilentia salutarem





*Fler Subalbus*

MYRRHIS

Wudlo:ffel.



- C salutarem esse. Subuenit & phthisicis in sorbitione. Auiditatem cibi facit. Phalangiorum morsus restringit. Vlcera quoque in facie aut capite succus eius in aqua triduo macerata sanat.

## DE MELIOTO CAP. CXCIIX

## NOMINA

Sertula cor  
dicta.

Corona regia.



ΕΛΙΑΝΤΟΣ Græcis, Melilotus, Sertula campana, & Corona regia Latinis dicitur. Meliloti nomen officinæ retinuerunt. Sertulam uerò dixerunt, quod flos eius coronamentis dicatus sit, & quia ex ea antiquitus coronæ & sertæ factitata sint. Coronam autem regiam, quoniam luteis floribus superne coronetur.

## GENERA.

- Vulgaris Melilotus. Tria Meliloti hodie faciunt genera. Primum uulgarè, statim à radice fruticosam, cubitalem, folio scenigræci minuto ac lentè simbriato, flosculo luteo, odoris suauis, tereti per ramos diffuso semine. Hoc quanquam tertio generi, quod nos uerum esse putamus, folijs & floribus simile sit, tamen cum nullam gustu præ se ferat adstrictionē, quam summè requirunt Dioscorides, Galenus & alij ueteres medici, & præter amaritudinē haud exiguam acrimoniā habeat, sit ut inter Melilotos, meo quidem iudicio, rectè cōnumerari non possit. Hinc est quod nos infra, hanc alio nomine dignati sumus, Saxifragamq; luteam appellauerimus. Alterum aspectu cano, Croci flore, folijs Trifolij, minutissimis, ut paulò post fusiùs dicemus. Hoc sanè genus nos Melilotum germanicā uocauimus, quod illa, & non prior, in Germania nostra pro uera Meliloto sit usurpanda, ob adstrictionem illam manifestam quam gustu præfert. Accedunt folia quæ pingua sunt, & flores Croci colorē referentes, quos Dioscorides requirit. Sententiā nostram confirmat antiquus manuscriptus herbarius, qui hanc pro Meliloto pingit. Neq; obstat quod hæc herba non admodum odorata sit: fatemur enim non esse laudatissimam Melilotum, sed eam quam Germania nostra profert. Nam quum Plinio lib. xxi. cap. xi. teste, Melilotus ubiq; nascatur, suam quæuis habeat ferè regio necesse est. Nihil igitur mirum si huic herbæ non adsint singulæ notæ, quas illi ueteres Græci & Latini attribuunt. Satis autem est ei mistam quandam, nempe adstringentē & digerentem inesse facultatem, haud secus quàm optimæ. Germani hanc herbā nominant Unser frauen schüchlin / uel wilden fleec. Tercium genus nos optimam & legitimam esse arbitramur Melilotū, quam nos maioris discriminis causa Italicam nuncupauimus, quod mos sit patrius Germaniæ nostræ, omnia ferè peregrina uocare Italica. Germanicè itaq; haud ineptè welscher Steinfleec nominabitur.
- Germanica Melilotus.
- Italica Melilotus.

## FORMA.

- Melilotus Germanica. Vulgaris Meliloti descriptionē inuenies suo loco. Germanica, herba est humilis, palmi altitudine, folio pratensis Trifolij, pingui & cano, flore pisi, minore tamē, luteo, semine in siliquis, radice rufa. Italica, quam è Campania allatam in Germaniam arbitror, caulem habet subrufum, rotundū, folium scenigræci, in ambitu serratum, flore luteo, odorato, semine in siliqua lunata, ut pictura luculenter ostendit. Tota etiam herba odorata est, ut hinc etiam conijcere liceat ueram esse Melilotum.
- Italica.

## LOCVS.

Germanica passim in pratis Germaniæ, montosis potissimum, nascitur. Italica in Germania, nisi sata fuerit, non prouenit. In Campania uerò circa Nolam, Dioscoride teste, copiose nascitur.

## TEMPVS.

Floret ferè per integram æstatem utrunque genus. Siliquas tamen in fine Iulij & Augusto mense proferunt.

TEMPE-





MELILOTVS  
GERMANICA.

Unser frauen schüchlin.





MELILOTUS  
ITALICA.

Welscher Steinklee.



## TEMPERAMENTVM.

**A** Mixta est facultatis: habet enim quiddam adstringens, sed & discutit & maturat: copiosior enim in ea est substantia calida quam frigida.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.


Melilotus adstringendi facultatē obtinet. Mollit omnes inflammationes, præcipuè autem oculorū, uteri, sedis & testium in passo decocta & illita. Aliquando autē addito oui luteo affato, aut fœcnigræci farina, aut lini semine, aut polline molario, aut capitulis Papaueris, aut Intybo. Recentes meliceridas per se cum aqua, & achoras cum creta Chia & uino aut galla illita sanat. Stomachi dolorē cum uino cocta, & cruda cum antedictis leuat. Aurium etiam dolores crudæ expressus succus, & cum passo instillatus sedat. Capitis dolorem lenit, cum aceto & rosaceo inspersa.

## EX PLINIO.

Melilotos oculis medetur cum lacte, cut cum lini semine. Maxillarū quoque dolores lenit, & capitis cum rosaceo: item aurium è passo, quæque in manibus intumescunt uel erumpunt. Stomachi dolores in uino decocta, uel cruda tritaque. Idem effectus est ad uulvas. Testes uerò & sedem prociduam, quæque ibi sunt uitia, recens ex aqua decocta, uel ex passo. Adiecto rosaceo illinuntur ad carcinomata. Deferuescit in uino dulci. Peculiariter & contra meliceridas efficax.

## DE MANDRAGORA CAP. CC.

## NOMINA.

**B**  **A**ΝΑΡΑΓΟΡΑΖ, ἡ κίρλαξ Græcis, ἀνθρωπομορφος Pythagoræ, Latinis canina aut terrestris mālus, officinis Mandragora, Germanis Alraun dicitur. Qui Circæam uocarunt, nomen illi à Circe fecerunt, quoniam creditur radix eius ad amatoria conducere. Pythagoras haud dubiè ab humana forma, quam radix eius referre uidetur, Anthropomorphon appellauit. Hinc sumpta occasione, agyrtæ & impostores illi circūforanci radices humana effigie insignitas circumferunt, quas Mandragoras esse testantur, cum tamen constet eas esse fictitias, & manu factas ex cannarum radicibus humana specie sculptis, postea plantatis. Nascuntur autem subinde radiculæ paruæ, quæ repræsentant capillos, barbam, pectinis pilos, & ex terra eum acquirunt colorem, ut radices esse appareant. Sunt & alia multa quæ nebulones illi fabulantur ut pecuniam ab imperitis extorqueant, quæ cōmemorare in præsentia nihil attinet. Terrestris mālum Romanæ manu dixerunt, quod mālā proferat, nec in altum ut reliquæ arbores surgat.

## GENERA.

Duo Dioscoridi & Plinio Mandragoræ sunt genera. Mas candida est, *μασ* Græci uocant. Huius hic effigiē, citra tamen poma, quæ habere non potuimus, damus. Fœmina nigra, Græcis *θεοφράστει* à similitudine foliorum appellata. Theophrastus tamen lib. vi. de historia plantarū, cap. ij. tertium quoddam genus Mandragoræ constituere uidetur, cuius fructus sit *μύλας, καὶ ῥαγάδης, καὶ ὀνείδης τῶ χυμῷ*, hoc est, niger, acinosus, & sapore uinosus. Et nisi hoc genus à priorib. diuersum esse statuas, discrepare inter se non leuiter Theophrastū & Dioscoridē necesse est fatearis. Nam Dioscorides palàm asserit poma priorum duorū generum uitellis ouorū esse similia, & pallida: contrā Theophrastus nigra, acinosa, ut diximus, & sapore uinosa esse tradit. Accedit quod idem Theophrastus eodē loco Mandragoræ caulem tribuat, perinde atque Plinius, quem Dioscorides penitus aufert: ut hoc nomine necesse sit hæc omnia ad tertium hoc genus Mandragoræ referre, quod nos tamen infra inter Solani genera recensebimus, ubi etiam eius picturam offendes.

## FORMA.

Fœmina angustiorib. & minoribus quam Lactuca folijs est, grauiter odoratis & uirosis,





MANDRAGORA  
MAS.

Alraun mennle.



**A** uirosis, per terram sparsis, iuxtaq; folia pomis uitellis oui similibus, pallidis, odoratis, in quibus semen quale pyri, radicibus magnis, binis ternisue, sibi inuicem implentis, in superficie nigris, intus candidis & crassi corticis. Caulem uero non fert. Maris folia sunt magna, candida, lata, laeua ut Betæ. Mâla duplo maiora quam fœminæ, croci colore, cum aliqua grauitate odorata, quæ comedentes pastores quædantenus soporantur. Radix supradictæ similis, maior tamen candidiorq;. Orbata & hæc est caule.

## LOCVS.

Prouenit in syluis & umbrosis locis. Nunc in hortis etiam plantatur.

## TEMPERAMENTVM.

Mandragora uincentem habet facultatem refrigeratorem, adeo ut tertij sit ordinis refrigerantium. Veruntamen nonnihil etiam caloris inest, & in pomis humiditatis. Radicis cortex non tantum refrigerat, sed & desiccatur.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Succus colligitur è cortice recentis radicis tuso & prælis subiecto, quem insolaturn cum iam cōcreuerit, in fictili uase reponere oportet. Colligitur itidem è pomis succus, ignauior tamen. Delibratur radicis cortex, & traiectus lino ad usum suspen ditur. Quidam Mandragoræ radices in uino ad tertias decoquunt, & traiectum per colum ius seruant, utentes cyathi unius mensura in peruigilijs, & doloribus, & in his quos sine doloris sensu secare aut urere uoluerint. Potus obolorum duorum pon dere cum mulla aqua Mandragoræ liquor, pituitam, nigramq; bilem ueratri modo purgat. Verum maiore copia potus uitam adimit. Miscet medicamentis ocula ribus, & ijs quæ dolores finiunt, pelsis quoq; emollientibus. Per se semioboli pon dere appositus, menses & fœtus trahit. Sedi pro balano subditus somnū facit. Ra dix ebur emollire fertur, si senis horis cum eo decocta sit, & in quam uoluerit aliquis formam fingi & formari facilem reddere. Folia recentia, oculorum & quas ulcera exci tarunt inflammationibus cum polenta illita profunt. Discutiunt eadem omnē duri tiem, abscessus, strumas, tuberculaq;, quinq; aut sex diebus leniter cōfricata. Stigma ta sine ulceratione delent. Folia condita sale seruantur in eodem usus. Radix autē trita ex aceto ignibus sacris, & serpentium iectibus ex melle aut oleo medetur. Stru mas atque tubercula ex aqua dissicit. Articulorum dolores cum polenta sedat. Con ficitur citra coctionē uinū è cortice radicis. Ternæ minæ in uini dulcis metretā cō ijiuntur. Dantur ex eo terni cyathi, ijs qui secari, aut uri debent, ut antè dictum est. Siquidē nullo tunc afficiuntur dolore, eò quod somno quodam pressi torpescant. Mâla olfactu, & comesta soporem afferunt. Potest idem & eorum succus. Nimiū ta men eorundem usus obmutescere facit. Semen mâlorum potum uterum purgat, appositumq; cum sulphure ignem non experto rubra fœminarum profluvia sistit. Colligitur ex radice liquor, ea scarificata multifariam, & eo quod erumpit, in ca uum uas recepto. Est autem liquor succo efficacior. Sed non ferunt omnibus locis liquorem radices, idq; experientia ostendit.

## EX GALENO.

Soporem conciliandi uim habent Mandragoræ poma. Radicis cortex ualentis simus est, reliquum quod intus est imbecillum existit.

## EX PLINIO.

Succus fit & è mâlis & è caule, deciso cacumine, & radice punctis aperta aut decocta. utilis hæc uel surculo. Concisa quoque in orbiculos seruatur in uino. Succus non ubiq; inuenitur, sed ubi potest, circa uindemias quæritur. Odor grauis eius, sed radicis & mâli grauior. Mâla matura in sole siccantur. Succus ex ijs sole densa tur: item radicis tulsæ, uel in uino nigro ad tertias decoctæ. Folia seruantur in murijs efficacius, aliàs recentium succus pestis est: sic quoque uires noxiæ. Grauedinem



**C** afferunt etiam olfactu, quanquā mala in alijs terris mandantur, nimio tamē odore obmutescunt ignari. Potu quidem largiore etiam moriuntur. Vis somnifica pro uiribus bibentium. Media potio cyathi unius. Bibitur & contra serpentes, & ante sectiones punctionesq̃, ne sentiantur. Ob hæc satis est aliquibus somnū odore quæsisse. Bibitur & pro Elleboro duobus obolis in mulso. Ad strumas radix Mandragoræ ex aqua bibiit. Articulis prosunt folia cum polenta, uel radix recens tusa cum cucumere syluestri, uel decocta in aqua. Cum cerato apostemata & ulcera tetra, folia Mandragoræ recentia sanant. Radix uulnera cum melle aut oleo.

## DE MALIS INSANIS CAP. CCI

### NOMINA.



**V**AE m̃la insana hodie appellantur, & à Neapolitanis Melanzana, ab alijs amoris poma, à Germanis uerò Melangan/num ueteribus cognita fuerint asseuerare non ausim. Non latet tamen Hermolaum in Corollario suo in ea esse sententia, ut putet esse tertiā Mandragoræ speciem, quam Morion uocant. Quam tamen sententiam cur non probem, facit in primis Theophrastus, qui lib. vi. de historia stirpium cap. ij. eius fructum esse nigrum, acinosumq̃ scribit, qualia mala insana non sunt. Dein quod Morij fructus letalis sit, mala uerò insana minimè, ut paulò post dicemus. Mala autem insana dicta sunt, nō quod letalia sint, sed quod difficulter concoquantur. Amoris autem poma, quod propter elegantiam & pulchritudinem digna sint quæ amentur.

*Mala insana non sunt tertia Mala dragoræ species.*  
*Mala insana cur dicta.*  
*Amoris poma quare uocata.*

### GENERA.

**D**uo sunt malorum insanorum genera. Aliqua enim purpurea ferè tota, aliqua uerò lutea, aut candorem aliquem præ se ferentia. Primi generis poma germanicè braun Melangan/alterius autem, geel Melangan uocantur.

### FORMA.

Mala insana in frutice nascuntur, qui Personatiam propemodum caule & folijs refert. Differunt autem huius folia à Personatiæ, quod longiora, magisq̃ laciniata sint. Flores habet purpureos, speciosos, sex folijs è calatho stellatim radiatis, fructus oblongi mali forma & magnitudine, in quibus semen siliquaestro non dissimile. Radicem multis capillatam fibris luteamq̃.

### LOCVS.

In hortis apud nos feruntur, sed frequenter in fictilibus & pensilibus fenestrarū hortis. Et eodem cultu quo cucumeres & melones gaudent.

### TEMPVS.

Floret Augusto & Septembre mensibus, ac subinde fructum profert.

### TEMPERAMENTVM.

In his malis haud dubiè ut in cucumere esculento, aut fungo, frigida & humida temperies superat.

### VIREs.

Nullum, quod sciam, in medicina usum habent. Eduntur autem à nonnullis ex oleo, sale & pipere fungorū modo cocta. Alij ubi paululum inferbuerunt igni, in orbiculos uel taleolas digerunt, & in acetarijs ex oleo, uel pipere & aceto comedunt. Salgamarij in muria acida seruant, cibo per hyemem & uerori grato, sed tamen qui agrius concoquatur. Quid multa: delicatiorum & omnia degustare uolentium cibus est malum insanum. Quare qui sanitatis studio aliquo tenentur, ij statim nomine ipso territi, usum illorum euitabunt.





MALA INSANA.

Melantzan.

Y 3



C

## NOMINA.

Nenuphar.

Nymphaeae  
candida.

ΝΥΜΦΑΙΑ Græcis, Nymphæa Latinis, officinis Nenuphar bar-  
bara uoce nominatur. Germanis Seeblüm / Wassermâhen.  
Nymphææ autem nomen sibi uendicasse uidetur, quod aquosa  
amet loca: uel, ut ex ueteribus aliqui fabulati sunt, a Nympha,  
quæ zelotypia Herculis intabuit & mortua est, inq̃ palustrem  
hanc plantam mutata.

## GENERA.

*Candida.* Duo eius genera. Vna enim à flore candido, Liliij simili, candida appellatur.  
*Lutea.* Germanicè weiß Seeblüm. Altera itidem à floribus, qui lutei sunt, lutea no-  
minatur. Germanicè geel Seeblüm. Possent etiam radicibus discerni, cum prior  
nigra, altera uerò candida cōstet, adeò ut hoc nomine prima candida, altera autem  
nigra diceretur. Multò uerò consultius est à floribus, quàm radice discrimen sume-  
re, quòd illi nunquam non oculis expōiti sint, radices autem non nisi effossæ in-  
tueri possint.

## FORMA.

Prima, folia Ciborio similia habet, minora tamen & longiora, quadantenus su-  
per aquam eminentia, aliqua tamen etiam sub aquis, plura ab una radice prodeun-  
tia. Flos candidus, Lilio similis, in medio quod croceum sit obtinens. Hic cum de-  
floruerit rotundus, & m̃lo circumferentia, aut Papaueris capiti similis, colore niger  
fit. In quo sanè semen clauditur nigrum, latum, densum, gustu glutinosum. Caulis  
illi læuis, minimè crassus, niger, Ægyptiæ fabæ similis. Radix nigra, aspera, clauæ  
per similitudinem. Hæ singulæ notæ alteri Nenuphari uocato quadrant. Folio enim con-  
spicitur orbiculato, læui, herbaceo, amplo, in stagnantibus aquis supernatante: flo-  
re candido, Lilio simili, in medio croceum habente, & cum defloruerit capite Papa-  
ueris, in quo semen latum, amarum, pingue. Caulis gracilis est & læuis. Radix ni-  
gra & ampla, dulcis, nodosa, clauæ formam repræsentans. Altera folia antedictæ  
similia habet, sed radicem albam & asperam: florem luteum, splendentem, rosæ si-  
milem. Quæ itidem notæ in uniuersum omnes alteri Nenuphari, quæ luteis est  
floribus, respondent.

## LOCVS.

Nascitur in paludibus & aquis stagnantibus.

## TEMPVS.

Flores in fine Maij & Iunio mense colliguntur. Radices autem in autumnò ef-  
fodiuntur.

## TEMPERAMENTVM.

Nymphææ tum radix, tum semen refrigerandi & citra morsum desiccandi uim  
obtinet.

## VIRES EX DIOSCORIDE.

Radix prioris sicca cum uino pota, cœliaci & dysenterici prodest. Lienem ab-  
sumit. Stomachi uesicæq̃ doloribus illinitur. Alphos ex aqua extert. Alopecias  
cum pice imposita sanat. Eadem contra Veneris infomnia bibitur, siquidē ea com-  
pescit. Paucis diebus, si quis continuò bibat, genitale infirmat. Idem semen potum  
efficit. Alterius quæ lutea dicitur, radix & semen contra muliebria profluvia ex ui-  
no nigro bibuntur.

## EX GALENO.

Nymphææ radix & semē, uentris profluvia cohibent, semenq̃ genitale siue per so-  
mnia, siue alio pacto immodicè profluens retinēt. Iuuāt dysentericos. Ceterū Nym-  
phæa quæ candidā radicē habet, potentioris est facultatis, ut & muliebri profluuio  
medea-





535


NYMPHAEA  
CANDIDA.

Weiß Seebäumen

y 4



536



NYMPHAEA  
LUTEA.

Gel Seblimen.



A medeatur. Verum & hæc, & ea quoque quæ atram habet radicem, ex uino nigro austero bibitur. Porro nonnullam etiam abstergendi uim obtinent, ita ut alphas & alopecias sanent. Ad alphas uerò macerantur aqua, ad alopecias pice liquida. Sed ad hæc aptior est ea cuius radix nigra est, sicut ad alia, cuius alba.

EX THEOPHRASTO.

Nymphæa trita plagæ imposita sanguinem sistere traditur. Vtilis & ad difficultates intestinorum pota.

EX PLINIO.

Venerem in totum adimit Nymphæa, semel in quadraginta dies pota. Insomnia quoque Veneris à ieiuno pota, & in cibo sumpta. Illita quoque radix genitalibus, inhibet nō solum Venerem, sed effluentiam genituræ: ob id corpus alere, uocemq̃ dicitur. Semen cum uino potum dysentericis auxilio est. Tenesmo radix eiusdem ex uino bibitur. In uino quoque pota lienem consumit. Dolores uesicæ sedat ex uino. Manantia sanat ulcera. Maculas omnes emendat. Trita plagis imponitur. Viceribus, priuatim ijs quæ calceamento facta sunt, prodest arida infricata.

## DE NAPHY CAP. CCIII.

NOMINA.



ΑΡΥ, *ἁρύν* græcè, Sinapis & Sinapi latinè uocatur. Officinæ nomen retinuerunt. Perperā tamen faciunt, quod altero genere pro Eruca, quam suo loco depinximus, utunt̃. Germanicè *zam oder Gartensenff* nominatur. Sinapis autem nomen è Græcia uenit in Latium, censetq̃ dictum

Officinariū error.

Sinapis unde dicta.

Napy cur uocatum.

Athenæus lib. ix. Dypnosoph. Sinapi, *ἡ σινάπις τὸς ἁρύνες ὅτι τὰ ὀδόντα*, hoc est, quod olfactum luminibus officiat. Pleraq̃ Græcia Napy nominat quasi Naphy, ut idem eodem in loco interpretatur, quoniam non sine natura sit, sed acri & proinde incommoda donetur. Alij Napy per priuationem uidelicet *νᾶπις*, quasi immitè dici uolunt, quoniam acrimoniæ uehementis particeps sit.

GENERA.

Sinapis duo inueniuntur genera, folijs, floribus & semine distantia. Primum siquidem genus rapitiā frondem exprimit, floremq̃ luteum obtinet, ac semen album profert. Nos à floribus luteis germanicè *geelen Gartensenff* nominauimus. Alterum in Erucae folium laciniatur, floremq̃ albicante, & semine uesco pulloq̃ constat. Nos genus hoc ab albicantibus floribus *weissen Gartensenff* appellauimus, ut esset huius aliqua ab Erucae nomenclatura diuersitas, quam Germani simpliciter *weissen Senff* uocant.

FORMA.

Primum caulem habet hirsutum, longum, ramosum, folia rapi, minora tamē & asperiora, flores luteos, siliquas rotundas ac hirsutas, plenas semine candicante. Alterum genus itidem hirsuto caule præditum est, minore tamen, folijs Erucae, maioribus tamen ac lationibus, laciniatis, floribus albicantibus, crucisq̃ effigiem referentibus, siliquis teretibus & oblongis, semine pullo rufescenteue refertis.

LOCVS.

Utrunq̃ in hortis satum prouenit. Et quamuis nullo cultu plerunq̃ germinet, terram tamen aratam & congestitiā magis amat.

TEMPVS.

Floret utrunq̃ Iunio ac Iulio mensibus, eodemq̃ tempore semen in siliquis suis profert.

TEMPERAMENTVM.

Sinapi calefacit & desiccatur quarto ordine.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Calfaciendi, extenuandi & extrahendi uim habet. Cōmanducatū capitis pituitā elicit.





SINAPI PRI  
MYM GENVE.

Geeler gartensenff.





SINAPIS ALTE  
RVM GENVS.

Weiß Gartenschiff.



**C**it. Succus eius hydromeliti mixtus contra tonsillarum præduros tumores, ac ueterem callosamq̃ arteriæ scabritiē conuenienter gargarizatur. Tritum naribus admotum, sternutamenta ciet. Comitilibus quoq̃ auxiliatur. Feminas uulvæ strangulatu oppressas excitat. Lethargicis, deraſo capite, illinitur. Ficiſ ammiſtum & impositum donec rubescat locus, ad coxendicum cruciatus, lienes, & omnis generis diuturnos dolores confert, cum permutandæ paſſionis cauſa ex alto in cutis ſuperficiem aliquid trahere uoluerimus. Alopecijs illitum medetur. Faciem purgat. Sugillata cum melle, aut adipe, aut cerato delet. Ex aceto contra lepras, & feras impetigines perungitur. Aridum contra febrium circuitus bibitur, aut potui polentæ modo inſperſum. Extrahentibus emplaſtris, ſcabiemq̃ extenuantibus utiliter ammiſcetur. Grauitati aurium & ſonitui, tritum cum fico impositum prodeſt. Succus ad hebetudines oculorum & palpebrarum ſcabritiem illinitur. Exprimitur autem ex uiridi adhuc ſemine ſuccus, & in ſole ſiccatur.

## EX PLINIO.

Sinapi Pythagoras principatum habere ex his, quorum ſublime uis feratur, iudicauit: quoniam non aliud magis in nares & cerebrum penetret. Ad ſerpentiū iſtus & ſcorpionum tritum cum aceto illinitur. Fungorum uenena diſcutit. Contra pituitam tenetur in ore donec liqueſcat, aut gargarizatur cum aqua mulſa. Ad dentium dolorem manditur. Ad uuam gargarizatur cum aceto & melle. Stomacho utiliſſimū contra omnia uitia, pulmonibuſq̃. Excreationes faciles facit in cibo ſumptum. Datur & ſuſpirioſis. Item comitilibus tepidum cum ſucco cucumerū. Senſus atque ſternutamenta capitis purgat, aluum mollit, menſtrua & urinam ciet. Et hydropicis imponitur. Cum fico & cumino tuſum ternis partibus comitali morbo. Et uuluarum conuerſionē ſuffitum excitat odore aceto mixto. Item lethargicos: & ſi uehementior ſomnus lethargicos premat, cruribus aut etiam capiti illinitur cum fico & aceto. Veteres dolores thoracis, lumborum, coxendicū, humerorum, & in quacunque parte corporis ex alto uitia extrahenda ſunt, illitum cauſtica ui emendat puſtulas faciendo. At in magna duritia ſine fico impositum: uel ſi uehementior urigo timeatur, per duplices pannos. Vtuntur ad alopecias cum rubrica, pſoras, lepras, phthiriaſes, tetanicos, opiſthotonicos. Inungunt quoq̃ ſcabraſgenas aut caligantes oculos cū melle. Succuſq̃ tribus modis exprimitur in ſicili, caleſcitq̃ in eo in ſole modicè. Exit & è cauliculo ſuccus lacteus, qui ita cum induruit, dentiū dolori medetur. Semen ac radix cum imaduere muſto, conteruntur, manuſq̃ plenæ menſura ſorbentur ad firmandas fauces, ſtomachum, oculos, caput, ſenſuſq̃ omnes. Mulierū etiam laſſitudines, ſaluberrimo medicinæ genere. Calculos quoque diſcutit, potum ex aceto. Illinitur & liuoribus ſugillatiſq̃ cum melle & adipe anſerino, aut cera Cypria. Fit & oleum ex ſemine madefaſto in oleo expreſſoq̃, quo utuntur ad neruorum rigores, lumborumq̃ & coxendicum perfrictiones.

## EX SYMEONE SETHI.

Sinapi uim habet diſſoluendi & diſcutiendi humiditates quæ in capite & ſtomacho ſunt. Confert etiā lienis affectib. à humiditate & flatu procreatis. Item quartanis morbis, qui ex aduſta pituita contracti ſunt: ad hæc & podagris à pituita factis. Officit uerò uiſui, & calido capiti, ac iecori. Adiuuat concoctionē & diſtributionē ciborum craſſarū partium. Minuit quæ in uentriculo ſunt humiditates. Illitum lepris, eas in melius mutat. Linguas etiam humiditate grauatas ſiccatur. Si cum melle ſumatur, tuſſes reſoluit. Cum caricis uerò iſchiadicis illitum, & lienofiſ utile eſt: trahit enim quæ intus ſunt ad corporis ſuperficiem. Suſſitum uerò & incenſum, ſerpentes fugat.





NERIVM

Oleander.



C

## NOMINA.

Oleander.  
Rhododaphne  
eius dicta.



Rhododendros  
quare.

HPION, ῥοδοδένδρον, ῥοδοδένδρον Græcis, Nerion & Rhododendron Latinis, officinis & barbaris Oleander, Germanis Slander dicitur. Rhododaphnen autem Græci dixerunt à rosæ floribus & lauri folijs, quæ fruticis huius præcipuæ sunt notæ. Nec refert quod Dioscorides amygdalæ folijs eius folia cōparauerit, lauro enim & amygdalæ nō dissimilis magnopere foliorū figura est. Fecit idem rosæ flos & arbor, ut eadē gens Rhododendrū nominauerit.

## FORMA.

Notus frutex, amygdalæ longiora & crassiora folia habens, florem rosarum figura, fructum amygdalæ similem, ueluti cornu, qui dehiscens lanea natura plenus est, pappis acanthinis simili. Radix illi est acuminata, longa, lignosa, gustanti salsa.

## LOCVS.

Nascitur in hortis, maritimis, & secundum amnes locis.

## TEMPVS.

Quo mense floribus & fructu prægnans sit Nerion, non satis constat: neque enim uel flores uel fructus eius nobis uidere licuit. Hinc est quod etiam pictura quam exhibemus hīdem careat.

## TEMPERAMENTVM.

Neriū Arabes calefacere in principio tertij ordinis, & in secundo siccare tradunt.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Flores & folia canēs, asinos, mulos & quadrupedes plurimos enecant: hominū uerò cum uino pota contra uenenatorū morsus præsidia salutaria sunt, præsertim si rutæ cōmiscueris. Infirmiora uerò animantia, ut oues, caprasq̃, si aquam biberint in qua folia eius maduerint, moriuntur.

D

## EX GALENO.

Nerium aut Rhododaphne notus omnibus est frutex. Foris quidem illitus discutendi uim obtinet. Intrò autem in corpus assumptus, perniciosus ac uenenosus non tantum hominibus, uerum etiam plerisq̃ pecudibus.

## EX PLINIO.

Rhododendros ne nomen quidem apud nos inuenit latinum: Rhododaphnen uocant, aut Nerium. Mirum, folia eius quadrupedum uenenum esse, homini uerò contra serpentes præsidium, ruta addita, & è uino pota. Pecus etiam & capræ si aquam biberint in qua folia ea maduerint, mori dicuntur.

## DE OXYACANTHA CAP. CCV

## NOMINA.

Berberis.

Oxyacantha un  
de dicta.



ΞΥΑΚΑΝΘΑ Græcis, Oxyacantha Latinis, officinis Berberis, Germanis Paisselbeer / Saurich / Erbsel / Versich uocatur. Hauddubiè Græci à spinarum acuminatis cuspidibus Oxyacanthan dixerunt.

## FORMA.

Syluestri pyro similis arbor est, sed minor & nimis spinosa. Fructum fert Myrto similem, plenum conferētumue, rubentem, fractu facilem, intus nucleos habentem. Radicem multifidam & altam. Huius deliniationis notæ, nulla prorsus reclamante, arbori quam uulgò Berberim barbara uoce nominant, adamussim respondent. Nanque arbuscula est pyri syluestris aspectu, sed humilior, ramis ex interuallo spinosis, folio lentè per ambitum aculeato, acinis rubentibus, in pediculo iuxta & racemo pendulis, gustu acido & subaustero, duobus intus granis, radice numerosa.

## LOCVS.





543

OXYACANTHA

Vernich.

2 2



C

## LOCVS.

Multis nascitur locis, syluis nempe, frutetis, campestribus, montanis, siccis & aquosis.

## TEMPVS.

Germinat ineunte uere, ab occasu autem Vergiliarū fructifera. Per Septembrē itaque ac Octobrem menses carpitur, campos syluasq̃ exornans.

## TEMPERAMENTVM.

Oxyacantha adstringit & desiccatur, atque adeo quorundam sententia frigida & sicca in secundo est ordine. Fructus tamen tenuium est partium, & paululum quidam incisium habet.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius fructus potus & comestus, alui profluuium, & muliebrem fluxum sistit. Radix trita & illita aculeos & spicula extrahit. Abortum facere tradunt, si sensim uenter ter radice feriat aut perungatur.

## EX GALENO.

Oxyacanthus arbor ut pyro syluestri similem habet speciem, ita & facultates minimè dissimiles. Quin & ipsi fructus. Pyri quidem syluestris prorsum atq̃ absolute austerus est, Oxyacanthus autem tenuium partium est, & modicè incidit. Porro arboris huius fructus, pyri syluestris similis non est, sed Myrti potius fructui, rubens scilicet & rarus. Habet uerò & nucleos. Cæterum non tantum esus, sed & bibitus omnes fluxionum affectus cohibet atque sistit.

## EX RECENTIORIBVS.

E baccis uinum exprimitur eodem ferè usu, quo uinum ex mælo punico. Condiuntur item acini uel melle uel saccharo ad restringendā sitim, depellendamq̃ febricitantium malaciam, quorū morosum nimis palatum cibum ferre quemcunq̃ respuit. Elanguescens appetentia grato huius acore recreatur.

## DE OSYRIDE CAP. CCVI.

## NOMINA.



ΣΥΡΙΣ Græcis, Osyris Latinis, officinis Linaria, nonnullis herba urinalis appellatur. Germanicè Flachstrauch / Lynstrauch / Harnstrauch / Unser frauen flachß / Wildflachß / Krotensflachß / Nabelstrauch. Linariam autem dixerunt recentiores à folijs quæ Lini faciē referre uident.

## FORMA.

Virgultum sarmentūmue nigrum est Osyris, tenues uirgas lentasq̃ habens. In quibus foliola sunt terna & quaterna, modo quina, interim & sena, ceu Lini nigra initio, dein colore mutato subrubescencia. Iam si rem diligenter expendas, nullam deliniationis notam Osyridi traditā, in Linaria dicta hodie deesse reperies. Siquidē hæc cauliculis fruticat nigricantibus, & qui ob suum lentorem haud facillè franguntur, tenuibus, atris quoque folijs, Lini faciē. Concolori denique semine tantisper dum maturescit, postquam ematuruit rubescence. Senescentes quoque ramuli nigritiam in ruborem uertunt. His accedit antiqui & manuscripti herbarij testimonium, qui Linariam eam esse herbam tradit, quæ Dioscoridi Osyris dicitur, floremq̃ habere luteum inquit. Respondet etiam per omnia pictura.

## LOCVS.


Pæssim in campestribus prouenit.

## TEMPVS.

Floret æstate tota & autumnō.

TEMPERAMENTVM.





OSYRIS

Garnkraut.



## TEMPERAMENTVM.

C

Osyridi amara inest qualitas, & obstructions aperiendi, adeoq̃ ut calida sit necesse est. Amara nanq̃, Galeno lib. iiii. cap. x. de simpl. medicament. facult. teste, qualitate prædita, omnia calida sunt. Sic etiam eodem autore lib. v. cap. xi. eiusdem tractationis, singula quæ poros & meatus expurgant, ab infarctūq̃ liberant medicamenta, calida sunt & tenuiū partium. Vehementer itaque errant, qui Linariam frigidam & humidam esse asserunt. Et certè præter ea quæ iam dicta sunt, uel hoc uno argumento erroneam illorum sententiam confutare omnium maximè licebit. Cum etenim Linariæ urinam mouendi facultatem inesse scribant uulgares etiam herbarij, colligitur illam non esse frigidam & humidam, quandò Galeno libro iam citato cap. xij. attestante, omnia quæ urinam ducunt ex acrimia atque adeò calidorū & siccorum sint genere.

Linaria non est  
frigida.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Huius decoctum potum morbo regio affectos iuuat.

## EX GALENO.

regiæ enim  
nō solum scopas,  
ut quidam arbi-  
trantur, uerum  
etiam regiæ præ-  
sunt & Phauo-  
rino testibus, hoc  
est comploria &  
nemusantia faciē  
medicamēta græ-  
ci dixerūt: è quo  
rum sanè nume-  
ro Osyris est, quæ  
cū amara sit, ex-  
tergere etiā quæ  
sunt in corpore,  
faciē potissimū,  
maculas potest.  
Hinc recte Pli-  
nius ex eius folijs  
mulieribus, ut po-  
te quæ plus alijs  
comere & uen-  
flare faciē so-  
lent, smegmata  
fieri tradit.

Osyridi, ex qua medicamenta ad exterendam leuigandamq̃ cutem, Græci regiæ uocant, fieri solent, amara inest qualitas, & obstructions expediendi facultas. quare & in iecinore consistentes obstructions adiuuat.

## EX AETIO.

Osyris est herba subfruticosa, tenuibus uirgulis, fractioni renitentibus, folijs Linariæ similibus, nigris primo, postea subrubescens, gustu amaris, unde regio morbo conferunt.

## EX PLINIO.

Smegmata mulieribus ex Osyridis folijs faciunt. Radicum decoctū potum, sanat arquatos. Eadem priusquā maturescit semen concisæ, & sole siccata, aluum sistunt. Post maturitatē uerò collectæ, & in sorbitione decoctæ, rheumatismis uentris medentur, & per se trita ex aqua cœlesti bibuntur.

## DE OCIMO. CAP. CCVII.

## NOMINA.

KIMON Græcis, Ocimum Latinis, recentioribus Græcis βασιλινός, id est, regium appellatur, quod nomen apud omnes nostræ ætatis herbarios & officinas usurpatur. Sunt tamen quibus Ocimum gariophyllatū nominetur. Germanicè Basilien/uel Basilgram dicitur. Ocimum autem quibusdā à nascendi celeritate dictum est, siquidem à satū tertio statim die emicat. Quod uerius Ocymo uidetur conuenire, quod pabuli & farraginis quoddam genus est, sic nominatū ab ὀκμος græca dictione, quæ citò significat. Proinde sunt qui significantius per z scribendū ducant Ozimum, ab ὄζω, quod redolere denotat, quoniam herba tota suauissimū spiret odorem. Ab eodem odore, quod basilicum, ca & regia domu dignum sit, Basilicum hodie nuncupatur.



Ozimum cur  
dictum.


Basilicum.

## GENERA.

Sunt qui duo Ocimi cōminiscantur genera: unum latiora folia habens, quod priuatim Basilicum: alterum angustiora, quod Ocimum gariophyllatum appellant. Nos tria tibi exhibemus ex uno promiscuè semine nobis nata. Primū maioris discriminis ratione Ocimū exiguū, Germanicè Klein Basilien/nominauimus. Alterum mediocre, Germanicè mittel Basilien. Tertiū magnum, Germanicè groß Basilien uocauimus. Neq̃ enim nisi folijs solis distare uident, quæ in primo genere exigua admodū sunt, in altero uerò paulò latiora, in tertio primi respectu latissima. Odor autem omnibus tribus unus idemq̃ est.

## FORMA.





OCIMUM  
EXIGUUM.

Klein Basilien.





OCIMUM  
MEDIocre.

Mittel Basilien.



OCIMUM  
MAGNUM.

Groß Basilien.





C

## FORMA.

Ocimum pedali altitudine profilit, surculosum, ramulis rotundis, folio Mercurialis, diluti uiroris. Floret particulatim, primò parte inferiore, demum superiore: flosculo candido, semine pullo nigro, cui cortex obducitur. Radix una descendit in altitudinem, crassior & lignosa, cæteræ à lateribus funduntur exiles ac prolixæ.

## LOCVS.

Pasim in figulinis uasis mulieres extra fenestras ædium fouent Ocimū. In hortis etiam satum prouenit.

## TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, dein semen producit.

## TEMPERAMENTVM.

Ocimum ex secundo est ordine calefacientium, cum excrementitia quadam humiditate.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Copiose comestum oculorum aciem hebetat, aluum emollit, flatus mouet, urinam cit, lac euocat, ægreq; in uentre mutatur. Illitum cum polentæ farina, rosaceo & aceto, inflammationibus, mariniq; draconis & scorpionis ictibus auxilio est. Per se autem cum uino Chio oculorū doloribus. Oculorum caligines succus eiusdem abstergit, eorundemq; fluxiones exiccat. Semen potum quibus atra bilis gignitur, difficultati urinæ, inflatisq; conuenit. Olfactu per nares attractum, copiosa sternutamenta mouet. Quod idem herba efficit. Porro instante sternutamento oculos comprimere oportet. Sunt qui Ocimum cauent minimeq; comedunt, quandoquidem manducatū, & in sole positum uermes gignat. Libyes autem adiecerunt, quod si feriantur à scorpione qui Ocimum ederint, nullo dolore conflictari.

D

## EX GALENO.

Ocimum excrementitiā humiditatem habet, proinde nec cōmodum est quod in corpus sumatur. Cæterum foris illitum, ad digerendum & concoquendū utile est. Pleriq; hoc etiam ut obsonio utuntur, ex oleo & garo offerentes. Vitiosioris autem succi est. Admentiantur ob hoc quidam dicentes, si tritum fictili nouo indatur, celerimè intra paucos dies scorpiones gignere, præsertim ubi quis quotidie ollam soli expositam calfecerit. Sed hoc sanè à uero abest. Id porro uerè de eo dixeris, prauī succi, stomacho inimicum, & concoctu pertinax olus esse.

## EX PLINIO.

Ocimum Chrysippus grauiter increpuit, inutile esse dicens stomacho, urinæ, oculorum quoq; claritati. Præterea insaniam facere, & lethargos, & iecinoris uitia, ideoq; capras id aspernari: hominibus quoq; fugiendum censet. Adijciunt quidam, tritum si operiatur lapide, scorpionē gignere: cōmanducatum, & in sole positum, uermes afferre. Alij uerò, si eo die feriatur quispiam à scorpione qui ediderit Ocimum, sanari non posse. Quinimò tradunt aliqui, manipulo Ocimi cum cancris decem marinis uel fluuiatilibus trito, cōuenire ad eum scorpiones à proximo omnes. Diodotus in empiricis, etiam pediculos facere Ocimi cibum. Secuta ætas alacriter defendit, nam id esse capras, nec minus quàm mentham & rutam scorpionū terrestrium ictibus, marinorumq; uenenis mederi cum uino, addito aceto exiguo. Vsu quoq; cōpertum, deficientibus ex aceto odoratum salutarem esse. Item lethargicis, & inflammatis refrigerationi. Illitū capitis doloribus cum rosaceo, aut myrteo, aut aceto. Item oculorum epiphoris impositum ex uino. Stomacho quoq; esse utile, inflationes & ructum ex aceto dissoluere sumptum. Aluum sistere impositum. Urinam citare. Sic & morbo regio & hydropicis prodesse. Choleras eo & destillationes stomachi inhiberi. Ergo etiam coeliacis Philistio dedit, & coctum dysentericis & colicis Plistonius. Aliqui & in tenasmo, & sanguinē excreantibus, in uino. Contra duriciam præcordiorū illinitur mammis. Extinguit quoq; lactis prouentum. Auribus

utilissi.



A utilissimū infantium, præcipuè cum adipe anserino. Semen tritum & haustum naribus, sternutamenta mouet, & destillationes capiti quoq; illitum. Vuluas purgat in cibo ex aceto. Verrucas mixto atramento sutorio tollit. Venerem stimulat.

EX SYMEONE SETHI.

Basilica ocima olfacta cor & caput iuuant. Si aqua irrigantur, humidiora fiunt, & somnum conciliant. Semen eorum cardiacis affectibus succurrit. Animi mœrorem ex atra bile ortam, in hilaritatem & lætitiā mutat.

APPENDIX.

Vides in referendis Ocimi facultatibus non parū inter se dissentire Dioscoridē, Galenū & Plinium, ita ut uix pugnantes illorum sententias conciliare possis. Quare cōsultum erit ut hic, quemadmodū in alijs etiam, Galeni amplectaris opinionē, qui quodammodo inter hos medius interiectus, cōmendat exteriorem eius usum in ijs quæ *σύντηξη καὶ ἀσφάλεια*, id est, concoctionem & disculsionē desiderant: damnat uerò internum, ob excrementitiū humorem quo grauat & lædit interanea. Et ad hunc etiam scopum respiciens, plerasq; alias Dioscoridis & Plinij contradictiones tollere poteris.

DE ORIGANO CAP. CCVIII.

NOMINA.



PIRANOZ Græcis, Origanus uel Origanum Latinis, officinis nomen suū retinuit, Germanis Wolgemut/Dosten/Braundosten/uel Bergmüntz nominatur. Origanum uerò quod montibus gaudeat appellationem apud Græcos inuenit, *ὄρος*, id est, monte, & *χαρς*, gaudio.

Origanum unde dictum.

B Herodianus quod uisum exacuat nomen duxisse testatur, ab *ὄρα* uidere, & *γάνω* clarifico, quasi aciem oculorum illustrans. Theodorus grammaticus nomen ex aduerso datū putat, à *ρίγῳ*, quod est algeo, fieri *ρίγανον*, quasi rigens, censet, & tandem ascita litera principe, o, in Origanum esse confectum, contrario tamen sensu, quod minimè refrigeret.

GENERA.

Origani genera seu rectius cognomina quatuor esse constat. Est enim Heracleoticum, Onitis, Tragoriganū, & syluestre. Primum ab Heraclea Ponti dictum, cætera à pecoribus cognomenta desumpserunt. Onitis, quod ab asinis impeteretur, ac in cibo gratum esset. Tragoriganū, quasi hircinum Origanum, non alia forsitan ratione quàm quod eius pabuli uoluptate animal hoc caperetur. Syluestre, quod sine cultura, & sua sponte proueniat, cognominatum fuit. Cæterum quum in tantacum nomenclationū tum historiæ ambiguitate uarietateq; tam Græcorum quàm Latinorum nō facile sit quicquam in solidum de his statuere, satis sit unum genus, syluestre nimirum & uulgare, pro omnibus pictum exhibere, quòd, ut Paulus ait, utcunque nominibus distinguantur, una tamen omnium sit facultas, adeoq; in re admodum incerta, multum operæ aut laboris temerè insumere minimè necessarium putaui.

Heracleoticum.

Onitis.

Tragoriganum.

Syluestre.

FORMA.

Origanum uulgare fruticulus est, tam folijs quàm ramis Serpyllo syluestri similis, comante supra cacumen umbella, in qua flores haud secus quàm in Serpyllo in albo purpurei, odore iucundo præditi emicāt. Ex qua sanè deliniatione satis liquet, Origanum hoc uulgare, Tragoriganū, uel saltem eiusdem speciem quandam esse, quod hoc ut Dioscorides refert, folijs & ramulis syluestri Serpyllo simile existat.

Vulgare.

LOCVS.

Montibus diuosisq; locis gaudet Origanum nostrum, falsimq; in his propter sepes nascitur.

TEMPVS.





ORIGANVM SYLVESTRE  
SEV VVLGARE.

Wolgemüt.



A

## TEMPVS.

Floret Iulio mense.

## TEMPERAMENTVM.

Omnes Origani species, Galeno & Paulo testibus, calefaciunt & exiccant in tertio ordine.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Heracleoticū exalfacit, unde decoctum eius cum uino potum uenenatorū mor-  
sibus prodest: cum passo autem ijs qui cicutam, aut meconiū: cum oxymelite ijs  
qui gypsum aut ephemerū hauserunt. Ruptis, conuulsis, hydropicis cum fico man-  
ditur. Aridū acetabuli mensura potum cum aqua mulsa, atros humores per aluum  
ducit, mensesq̄ ciet. Linctū ex melle tussibus medetur. Prurigines itidem, scabies,  
regiumq̄ morbū, decoctum eius cum in balnea descensum est, iuuat. Succus eius-  
dem adhuc uiuentis, tonsillas, columellas, orisq̄ ulcera sanat. Per nares cum oleo iri-  
no infusus trahit. Cum lacte aurium dolores mitigat. Conficitur ex eo & cepis, &  
rhu obsoniorū uomitorium medicamentū, omnibus ijs in ere Cyprio sub Canis ar-  
denti æstu per quadraginta dies insolatis. Herba uerò substrata serpentes fugat.  
Onitis eadem quæ Heracleoticū Origanum præstat, non tamen eadem efficacia.  
Syluestre priuatim folijs & floribus cum uino potis, uenenatorū morsibus auxilia-  
tur. Omnia autem Tragorigani genera calefaciunt, urinā mouent, bonam faciunt  
aluum, si decoctū eius bibatur: biliosa enim deſciunt. Lienosis cum aceto pota uti-  
lia: cum uino autem his qui Ixiam hauserunt. Menses ducunt. Tussientibus, peri-  
pneumoniciis, ex melle in eclegmate dantur. Est & efficax potio, quare cibum fasti-  
dientibus, & stomacho male affectis, & acida ructantibus datur. Item ijs quibus t̄ a  
maris iactatione nausea, & hypochondriorū calor excitatur. Oedemata cum po-  
lenta illita discutiunt.

## EX GALENO.

Origanus Heracleotica efficacior est Onitide. Syluestris uerò utraq̄ ualentior.  
Omnes autem incidendi, extenuandi & calfaciendi facultatem obtinent. Tragori-  
ganus quippiam etiam adstrictionis assumpsit.

## EX PLINIO.

Origani priuatim usus contra torsiones stomachi in tepida aqua, & cruditates.  
Contra araneos scorpionesq̄ in uino albo. Luxata & contusa in aceto & oleo & la-  
na. Tragoriganū urinam ciet, tumores discutit, contra uiscum potū uiperęq̄ ictum  
efficacissimū, stomachoq̄ acida ructanti & præcordijs. Tussientibus quoque cum  
melle datur, & pleuriticis, & peripneumoniciis. Heradium serpentes fugat. Percus-  
sis esui datur decoctū. Potu urinā ciet. Ruptis, conuulsis medetur cum Panacis ra-  
dice. Hydropicis cum fico, aut cum hyssopo, acetabuli mensuris decoctū ad sextā.  
Item scabiem, pruriginē, psoras, in descensione balnearū. Succus auribus infundi-  
tur cum lacte mulieris. Tonsillis quoq̄ & uuis medetur. Capitis ulceribus. Vene-  
na opij & gypsi extinguit decoctū, si cum cinere & uino bibatur. Aluum mollit ace-  
tabuli mensura. Sugillatis illinitur. Item dentiū dolori, quibus etiā & candorē facit  
cum melle & nitro. Sanguinē narium sistit. Ad parotidas decoquitur cum hordea-  
cea farina. Ad arterias asperas cum gallo & melle teritur. Ad lienem folia cum mel-  
le & sale. Crassiores pituitas & nigras extenuat coctum cum aceto & sale sumptum  
paulatim. Regio morbo tritum cum oleo in nares infunditur. Lassi perungun-  
tur ex eo, ita ut ne uenter attingatur. Epinyctidas cum pice sanat. Furunculos ape-  
rit cum fico trita. Strumas cum oleo & aceto & farina hordeacea. Lateris do-  
lores cum fico illitum. Fluxiones sanguinis in genitalibus tu-  
sum ex aceto illitum. Reliquias purgatio-  
num à partu.





ORCHIS MAS LA  
TIFOLIA.

Ungesprenge Knabentrautmennle.



ORCHIS MAS  
ANGUSTIFOLIA.

Gesprenge Knabenkraut  
männl.

aa 1







ORCHIS FOE  
MINA MAIOR.

Das grösser Knabenkraut  
weiblin.



ORCHIS SIVE CYNOSORCHIS  
FOEMINA MINOR.

Knabenkraut weiblich  
das kleinere.



aa 3



C

## NOMINA.

Testiculus  
canis.  
Orchis canis  
dicta.  
Cynosorchis.



ΠΧΙΞ ἡ κυνὸς ὄρχις Græcis, Orchis & Cynosorchis Latinis, Testiculus canis officinis, Germanis Knabenkraut uocatur. Orchis dicta hæc herba est, quod radices sibi inuicem haud secus atque duo testiculi cohaereant. Cynosorchis uerò, quod canum testiculis similem radicem habeat.

## GENERA.

Orcheos duo esse genera animaduertimus, marem nimirum & foeminam. Mas in uniuersum maior quam foemina proceriorque est, ut pictura ipsa pulchrè declarat. Estque duorum generum. Vnum latioribus folijs & candicantibus ferè floribus, quod Orchin marem latifoliam uocauimus. Alterum quod angustioribus folijs, & maculosis magis, floribusque purpureis constat. Nos maioris discriminis rationem habentes, Orchin marem angustifoliam nuncupauimus. Foemina itidem duorum est generum: una enim maior, altera minor est, ut pictura satis demonstrat.

## FORMA.

Folia habet circa caulem & ima eius parte per terram strata, oleæ molli similia, angustiora tamen, leuia & longiora. Caulem dodrantali altitudine, in quo purpurei flores. Radicem bulbo similem, oblongam, duplicem, in modum oliuæ angustam, superiorem alteram, inferiorem alteram: & hanc quidem mollem ac rugosam, illam uerò plenam.

## LOCVS.

Nascitur locis, Dioscoride autore, petrosis & arenosis. In Germania certè nostra in hortis & pratis, locisque sabulosis copiose prouenit.

## TEMPVS.

In Maio & Iunij principio carpitur.

## TEMPERAMENTVM.

Radix eius maior calida & humida est, gustantibusque dulcior esse apparet. Minor admodum elaborata est, ad calidius sicciusque tendit.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix editur ut bulbus cocta. Fertur de ea, si maiorem edant uiri, mares generari: minorem uerò foeminae, foeminas. Addunt etiam in Thessalia mulieres paruam cum caprino lacte bibendam dare, ut ad uenerea excitent: aridam uerò ad inhibenda atque dissipanda. Alterum etiam alterius potu resolui.

## EX GALENO.

Radix maior Orchios multam uidetur habere humiditatem excrementitiam & flatuosam: quapropter pota Venerem excitat. Altera uerò, minor uidelicet, contra non modo non stimulat ad coitum, sed planè cohibet ac reprimat. Eduntur bulborum more assæ.

## EX PLINIO.

Tumores & uitia partium earum erumpentia, cum polenta illita radix sedat, uel per se trita. Eadem ex lacte ouillo neruos intendit, & ex aqua remittit.





TRIORCHIS SERA  
PIAS MAS.

Knabenkraut nenne das kleiner.





TRIORCHIS  
FOEMINA.

Ragwurtz weible.



A

## NOMINA.



ΠΧΙΞ *σέρapiας, ή τριόρχης*, Paulo & Aëtio testibus, Græcis dicitur. Orchis  
sive testiculus Serapias Latinis. Officinæ eius cognitionē non habent.

Germanicè *Kagwur* dicitur. Serapias autem ab Andrea medico ob  
multos radices usus, ut inquit Dioscorides, appellata est. Sunt qui à Sa- *Serapias quare*  
*dicta.*

rapi Alexandrinorū deo nominatā uelint, propter lasciuia impudentē, qua is deus  
Canopi, ubi templum & cultu & religione excellens habebat, colebatur: de quo  
Strabo in xvij. suæ Geographiæ libro. Triorchis uerò, manifesto ex ea appellatio- *Triorchis cur*  
ne argumento, quod non duabus, sed tribus testicularis radicibus in terra nitatur. *dicatur.*

Qua una quidem re facile à prioribus discriminantur Orchibus.

## GENERA.

Duo esse Orchis Serapiadis seu Triorchis genera, res ipsa satis monstrat. Et si  
enim in folijs ac radicibus nihil aut parum discriminis habeant, tamen in floribus  
manifestè differre uidentur. Nam alterum genus, quod nos marem uocauimus, *Triorchis mar.*  
floribus constat purpureis, & parumper albicantibus. Alterum uerò, quod nos ut  
certius à priori discerneretur, fœminam nominauimus, flores obtinet diuersis co- *Triorchis fœ-*  
loribus distinctos, purpureo uidelicet, candido, uiridi ac nigricante, inferioreq; par- *mina.*  
te fuci planè effigiem exhibent.

## FORMA.

Folia habet Porro similia, oblonga, latiora & pinguia, in alarū cauis inflexa. Cat-  
liculos dodrantes, subpurpureos flores. Radicem minimis testiculis similem.

## LOCVS.

Prouenit in pratis & campestribus.

## TEMPVS.

B In fine Maij mensis & initio Iunij hoc genus apparet, dein nusquam inueniri  
potest.

## TEMPERAMENTVM.

Valentius quàm primo ordine exiccat.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix illita tumores disijciendi uim obtinet, atque ulcera expurgat. Herpetas  
cohibet. Fistulas abolet, inflammatione laborantia illita mitigat. Sicca nomas com-  
pescit, ulceraq; putrescentia & maligna oris sanat. Cum uino pota aluum sistit. Fe-  
runtur de hac etiam quæcunque de Cynosorche dicta sunt.

## EX GALENO.

Orchis Serapias ad Venerem nō similiter accommodus est. Oedemata illitus dis-  
cutit, & ulcera sordida purgat, & herpetes sanat. Siccatus multò magis desiccat,  
adeò ut & putrescentia contumaciaq; ulcera sanet. Habet etiam quippiam subad-  
stringens, ac proinde uentrem in uino potus sistit.

## EX PLINIO.

Eius radices sanant oris ulcera, thoracis pituitas, aluum sistunt è uino potæ.







## NOMINA.



INANTH, ὀνάνθη Græcis, Oenanthe Latinis, Filipendula officinis, & Saxifraga rubra, Germanis rot Steinbrech nominatur. Oenanthe autem dicta haud dubiè est quod cum uino floreat. Leucanthos uerò à florum quos producit candore. Filipendulam à numerosis illis & rotundis in radice capitibus tuberibusue, quæ quasi ex filo quodam pendere uidentur, appellatam esse constat.

Saxifraga rubra  
Oenanthe quare  
dicta.  
Filipendula.

## FORMA.

Folia Pastinacæ sylvestris habet, flores candidos, caulem crassum, dodrantalem, semen Atriplicis, radicem magnam, multa habentem capita rotunda. Ex qua descriptione palàm apparet, Oenanthem eam esse herbam quam ætas nostra Filipendulam uocat, quod nulla prorsus sit nota quæ illi non conueniat. Folijs enim Pastinacæ erraticæ est, quæ planè eius herbæ quæ uulgò Petroselinon hodie appellatur folijs similia sunt. Hinc est quod in uulgaribus herbarijs scribatur folia Petroselino similia habere: quamuis Staphylino legendum esse putem. Manuscriptus etiam herbarius Filipendulam folia Dauci agrestis habere tradit. Flores denique illi albi, caulis crassus, dodrantalis, Atriplicis semen. Radices quoque multa, quinque interdum aut sex, nonnunquã etiam plura capita rotunda, tanquam à filo pendencia, ut ait antiquus herbarius, habentes: ita ut hinc esse Oenanthem abundè constet. Sed demus non esse, nihil tamen inde periculi erit, quod scilicet Oenanthæ eadem quas Filipendula, sicut ex paulò post dicendis patebit, facultates obtineat.

## LOCVS.

Nascitur in petris & montibus asperis. Tubingæ certè in monte Austriaco nominato copiosissimè prouenit, & in sylua non procul ab arce eius oppidi distante.

## TEMPVS.

Iunio mense floret, quo sanè tempore quia facilè ex floribus agnoscitur, carpi potest. Radices tamen inter autumnii initia colligendæ erunt.

## TEMPERAMENTVM.

Amara admodum est Filipendula, ita ut non temerè hanc recentiores calidam & siccam in tertio ordine statuunt.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Oenanthæ semen, caulis & folia cū mulso ad secundas eiiciendas bibuntur. Radix cum uino contra stranguriam conuenit.

## EX PAVLO.

Oenanthæ secundas eiicit, urinæ stillicidio, morboq; regio medetur.

## EX PLINIO.

Caulis eius & folia cum melle ac uino nigro pota, facilitatem pariendi præstant, secundasq; purgant. Tussimè melle tollunt. Vrinam cient. Radix uesicæ uitij medetur.

## EX RECENTIORIBVS.

Filipendula in lotij stillicidio & urinæ remoratu, neque non renum doloribus, atque lapide eorundem, cōuenit. Eadem stomachi inflationes discutit, medetur & suspiriosis & anhelantibus, & omnibus morbis quos causa frigida concitauit. Farinam eiusdem cibus comitialium inspergunt.

DE OXY.





OXYS

Sauer Klee.



A

## NOMINA.



ΞΥΞ græcè, Oxys Plinio & Latinis, Trifolium acetosum & Alleluya officinis, uulgo Panis cuculi, uel quod cuculus auis eo uescatur, uel quia hoc erumpente, cuculus uocem suam edere incipiat. Germanis Sauer-  
 Klee / Büchle / Büchampffer / Büchbrot / Gauchle / Guckgauchle  
 & Nasentle appellatur. Oxys uerò ab acido sapore dicta est.

Trifolium ace-  
tosum.

Alleluya.

Panis cuculi.

Oxys quare  
dicta.

## FORMA.

Humilis herba est, longis tantum pediculis, tria summatim folia perinde atque Trifolium proferens, exigua, & in cacumine laciniata, sapore acido. Florem habet candidum, in simplici stylo inter folia profilientem: rufum in lunatis siliquis semen. Radicem in transuersum longam, geniculatā ac rufam. Antiquus & manuscriptus herbarius putat hanc herbam esse Lotum satiuā, cuius certè sententiā, quòd à Dio-  
 scoride non describatur Lotus, neq; probo neq; improbo. Cur tamen non sequar, facit quod herba quam Alleluya barbari uocant, non sit satiuā, sed passim in syluis & alijs locis umbrosis nascatur futuræ tempestatis prænuncia. Siquidem appropin-  
 quante aliqua tempestate, arrigitur contrā tanquam tempestati colluctatura.

## LOCVS.

Multis locis prouenit: nam in syluis circa petrosa & aquea loca nascentem con-  
 speximus. Nullibi autem copiosiore quam Tubingæ in primo statim conscensu  
 montis Austriaci ad dextram prouenire uidimus.

## TEMPVS.

Aprili atque interdum Maio mense floret, dum scilicet cuculi uox primū exau-  
 ditur, atq; hinc Cuculi panem dictam esse puto, ut dictum est antea. Obseruatū au-  
 tem est à nobis, atque adeo multorum aliorum experientia cognitū, quod eius her-  
 bæ copiosi flores, crebras illius anni pluuias, & aquarum inundationes certò por-  
 tendant: pauci contrā siccitatem.

## TEMPERAMENTVM.

Quum acidum in gustu saporem præ se ferat, idem cum Oxalide habere tempe-  
 ramentum, frigidum nempe & siccum, euidentissimum est.

## VIRE. EX PLINIO.

Datur ad stomachum dissolutum: edunt & qui enterocelen habent.

## EX RECENTIORIBVS.

Vlceribus, uulneribus & fistulis, potissimum autem oris, medetur. Sitim arcet,  
 & ut summanim dicam, easdem quas Oxalis, acetosam nostri nominant, facultates  
 obtinet.

## DE OPHRI CAP CCXIII

## NOMINA.



OPHRIN hanc herbam nominare placuit, quod inuenerim plantā binis  
 duntaxat folijs constantem hac appellatione insigniri. Germanicum  
 nomen nullum extorquere potuimus: neque enim ea est quæ Durch-  
 wach / hoc est, Perfoliata uocatur, ideoq; hanc à geminis folijs Zwey-  
 blatt nominauimus.

Ophris.

## FORMA.

Caulem à radice singularem ac rotundū emittit, per bina quæ tantum habet fo-  
 lia penetrantem, à cuius medio ad summum usque calyculi multi sunt, & in his ue-  
 luti linguæ dissectæ nutantes flosculi. Radix uerò illi subest tenuis, adnascens sibi  
 radículas multas, obliquas & odoratas obtinens.

bb

LOCVS.





OPHRIS

Zweyblatt.



A

## LOCVS.

Nascitur in montibus, & nullibi maiori copia quàm Tubingæ in pede montis Austriaci prouenit.

## TEMPVS.

Maio & Iunio mensibus floret, dein statim euanescit. Quapropter hoc potissimum tempore colligenda.

## TEMPERAMENTVM.

Gustanti glutinosa esse apparet, & quodammodo dulcis, ideoq; calidam & siccam esse conijcere licebit.

## VIRE S.

Iuxta dictarum qualitatuum missionem contrahendi & constringendi facultate præditam esse nemini non constat. Hinc est quod ad rupta, & uulnera cōglutinanda hac herba cōmodè utantur recentiores.

## DE ORMINO CAP. CCXIII.

## NOMINA.



ORMINON Græcis, Orminum & Geminalis Latinis, Gallitricum officinis, Germanis Scharlach appellatur. Orminon autem Græcis haud dubiè dictum est, quia Venerem extimulat.

Gallitricum.  
Orminon cur  
dictum.

## GENERA.

Ormini duo sunt genera. Vnum satium, quod Gallitricum simpliciter nominant, & germanicè Scharlach. Alterum syluestre, quod alio nomine Saluiam syluestrem herbarij uocant. Germani wilden Scharlach/oder wilde Salbey.

Saluia syluestris.

## FORMA.

Orminum satium herba est folijs Marrubio similis, caule quadrangulo, semicubitali, circa quem eminentiæ siliquis similes prodeunt, ad radicem uersus nutantes, in quibus semen est. Ex qua deliniatione abundè liquet herbā quam hodie Gallitricum uocant esse Orminum satium: hæc enim folijs Marrubio similis est, nisi quod sunt maiora & mirificè odorata: caule semicubitali, quadrangulo, ab imo rufescente, calyculis circa caulem siliquarum effigie prominentibus, & ad radicem deorsum spectantibus, in quibus semen nigrum & oblongū includitur: flosculis in candido purpureis, aut in dilutum ruborem inclinatis. Syluestre priori non admodū dissimile est, folijs satis ad Saluiam accedentibus, rugosaq; asperitate præditis: caule sesquipedali, leniter hirsuto, in quadrangulum striato: floribus è cœruleo in purpureum uergentibus, ad aquilini rostri effigiem falcatis, calyculis pluribus in terram inclinatis, in quibus ad summum quatuor semina, parua, rotunda & fuluescentia reperiuntur.

Orminum satium.

Syluestre.

## LOCVS.

Satium nusquam non in hortis satum prouenit. Syluestre autem passim omnia prata exornat, suaq; sponte in ijs nascitur.

## TEMPVS.

Vtrunque Iunio mense floribus & semine prægnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Orminum calidum & mediocriter siccum est, id quod amaritudo atque adstrictio in gustu satis monstrant.

## VIRE S.

## EX DIOSCORIDE.

Creditur semen satiui cum uino potum Venerē stimulare. Cum melle argema & oculorum albugines purgat. Illitum cum aqua cedemata discutit. Surculos extrahit. Herba ipsa illita eadem potest. Syluestre uehementiorem facultatem habet, quare unguentis miscetur.

bb 2

EX PAV-





ORMINUM  
SATIVUM.

Scharlach.





ORMINVUM  
SYLVESTRE.

Wilder Scharlach.



C

EX PAVLO.

Orminon Venerem stimulat, oculorum crassities cum melle repurgat, cedemata discutit, & extrahit aculeos. Syluestre domestico est ualentius.

EX PLINIO.

Semen ad Venerem stimulandam, & ad oculorum argema & albugines ualet. Vtroque genere tuso extrahuntur aculei ex corpore, per se illito ex aqua. Folia ex aceto imposita, panos per se uel cum melle discutunt. Item furunculos, priusquā capita faciant, omnesque acrimonias.

EX RECENTIORIBVS.

Recentiores etiam easdem facultates suo Gallitrico attribuunt: potissimum autem conferre ad albugines & oculorum caliginem tradunt, ut hinc etiam colligi possit, herbam hanc Orminon esse Dioscoridis.

## DE OROBO CAP. CCXV.

NOMINA.



POBOZ Græcis, Eruum Latinis dicitur. Officinæ græcam appellationem retinuerunt. Germanis Eruen / ad imitationem latini nominis, appellari possunt.

GENERA.

Duo sunt genera Erui: unum enim candidum, alterum autem rufum inuenitur. Nec inter se nisi floribus & radicibus differunt, quemadmodū pictura affabre monstrat. Rufum uerò syluestre est, suaque sponte in aruis, & inter dumeta prouenit.

FORMA.

D Exiguus frutex est, tenuis, angustis folijs, floribus uel candidis, uel in candido cœruleis aut puniceis, seminibus in siliquis sine septo cylindræis, quemadmodū pisa, se inuicem tangentibus.

LOCVS.

Lætatur loco macro, non humido, quia plerunque luxuria corrumpitur.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, iisdemque semina profert.

TEMPERAMENTVM.

Desiccat quidem Eruum excessu secundo intenso, calefacit uerò primo.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Capitis grauitatē facit Eruum, uentrem turbat, sanguinemque per urinā ducit si comedatur. Coctum tamen appositū boues saginat. Farina eius bonam facit aluū, urinam cit, corporis colorem cōmendat. Frequentior in esu aut potu sanguinē cum torminibus per aluum & uesicam ducit. Vlcerum cum melle purgat, & lentigines, & aspredinē cutis in facie, eiusdemque maculas & reliquū corpus. Nomas, gangrenasque cohibet, & mammarū duritias emollit. Fera ulcera, carbunculos, fauosque rumpit. In uino macerata canum, hominū, uiperarumque morsus illita sanat. Cum aceto autem difficultates urinae, tormina & tenesmos lenit. Prodest etiā ijs qui cibo non nutriuntur, nucis magnitudine frixa & cum melle sumpta. Decoctum eius fouendo perionnes, & in corpore pruritus sanat.

EX GALENO.

Orobus quatenus amaritudinis est particeps, catenus incidit, extergit, atque obstructions expedit. Cæterū si sumatur copiose, sanguinē per urinas euocat. Hominum cibus prorsus hoc semen damnat: est enim & insuauissimū & prauis succi. Eruo autem instar lupini præparato ex melle utimur, ut medicamento crassos pulmonis thoracisque humores expurgante. Candidum minus est medicamentosum, quā id quod ad flauum aut pallidum colorem tendit.

DE OROO





ERVUM  
SATIVUM.

Weiß Eruen.

bb 4



572



ERVUM  
SATIVUM.

Kotoderwald Eruch.



A

## NOMINA.



ΠΕΟΣΕΛΙΝΟΝ, ἢ πετροσελίον ἄγριον Græcis, Syluestre Petroselinum, & Apium montanū Latinis, officinis & barbaram sectantibus medicinā A. u. mont. m. Petroselinum dicitur. Id quod hinc accidisse puto, quod linguæ græcæ Petroselinū officinarum. inscitia, Oreoselinum dictionem in Petroselinum mutauerint: uel quia Petroselinum syluestre. simpliciter enunciauerint quod cum adiectione nominandum erat Petroselinū syluestre, ad differentiā nimirum Macedonici, quod uerè est Petroselinum ueterum. Germani Peterzilgen uocant. Nos teutsch Peterzilgen / oder Peterlin nominaui mus, ut discerneretur à Macedonico, de quo suo dicemus loco.

## FORMA.

Caulem habet unum dodrantalem à radice tenui exeuntem, circa quem ramuli & capitula Cicutæ similia, multò tamen tenuiora. In his semen oblongum, acre, tenue, odoratū, Cumino simile. Ex qua sanè descriptione sole clarius apparet, Petroselinum officinarum esse Oreoselinum ueterum: caule enim uno prouenit dodrantali ex radice pertenui, qui per ambitum ramulos spargit capitulis Cicutæ, tamen multò tenuioribus: in ijs semen, acrimoniā gustu præferens, odoratum, tenue, Cumino proximum. Neque obstat quod in plerisque exemplaribus Dioscoridis capitulorum Papaueris fiat mentio: error enim haud exiguus subest, quod scilicet non μικρὸν περιμειφθῆναι, hoc est, Papaueri similia, sed καυτεῖον, id est, Cicutæ legendum sit. Id quod in primis confirmant ea quæ scribit Plinius libro xix. capite octauo, in hunc modum: Oreoselinum est Cicutæ folijs, radice tenui, semine Anethi, minutiore tamen. Quod si tamen hæc sententia minus arriserit, nihil moror quin dicas Petroselinum germanicum, cum forma parum admodum à uero Petroselino distet, ut palàm sit utriusque picturas intuenti.

## LOCVS.

B Nascitur in locis petrosis & montanis, unde etiam nomen accepit. In Germania uerò nostra in hortis passim plantatur.

## TEMPVS.

Iunio & Iulio mense floribus & semine prægnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Calidum est in secundo gradu extenso, siccum uerò in medio tertij.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Semen & radix in uino pota urinam cient. Menses etiam ducunt. Miscetur antidotis, necnon medicamentis urinam cientibus & excalfacientibus. Non hallucinarinos oportet, existimantes Oreoselinum esse quod in petris prouenit: aliud enim ab hoc est Petroselinum.

## APPENDIX.

Vtunque autem diligenter hoc monuerit Dioscorides, tamen cauere non potuit quin posteritas medicorum Oreoselinum esse Petroselinum certò crediderit.

## EX GALENO.


Oreoselini similis Apio uis est.

## EX PLINIO.

Oreoselinum urinæ & menstruis efficax. Eo etiam purgantur fœminæ è uino.

DE OIS.





OREOSELINUM

Deutsch Petersilg.







576



SORBVM  
OVATVM.

Speierling.





OPHIOGLOSSVM

Waterzünglin..



Ὠφιογλωσσὸν  
cur dicta.



Lingua serpens  
tina.

HERBA hæc appositissima uoce græcè Ὠφιογλωσσὸν appellari potest, non quod sic eam ueteres aut recentiores græci nominauerint, sed quod cum germanica nomenclatura optimè quadret. Neque enim certò constat an Græcis, & sub quo nomine herba illa cognita fuerit. Quapropter ut no- uam ei inderemus appellationē necessum erat: meliorem uerò hac ipsa quam retu- limus, inuenire haud potuimus. Latine Ophioglossum, aut lingua serpentina dici potest: germanicè enim *Watersünglin* uocatur, à forma & figura quam refert. E singulis nanque folijs singulari pediculo prodit, quod ligulam serpentis forma sua referre uidetur, ut pictura affabrè monstrat.

## FORMA.

Folium unicū obtinet pingue, digiti longitudine, Plantagini aquaticæ uocatæ haud dissimile, è cuius sinu inferiore pediculus exit, cui quippiam herbacei coloris insidet, quod serpentinae linguæ uocati lapilli similitudinē refert.

## LOCVS.

Copiose in monte prope Tubingā Austriaco nominato prouenit. Amat & alia prata in montanis sita.

## TEMPVS.

Maior mense reperitur, subinde autem euanescit, ac nusquam apparet.

## TEMPERAMENTVM.

Citra caliditatem insignem exiccat, id quod gustus satis docet.

## VIRES.

Vulneraria est herba, maligna siquidē & curatu difficilia uulnera sanat. Tumor- res etiam discutit, & ferè Symphyti facultates obtinet.

## DE XANTHIO CAP. CCXIX

## NOMINA.

Lappa inuersa.  
Xanthion unde  
dictum.



ANΘΙΟΝ, ἡ φάσγανον græcè, Xanthium latine nominatur. Ab her- barijs nostræ tempestatis Lappa minor & Lappa inuersa uoca- tur. Germanicè *Bettlersleuß / oder Bübenleuß*. Xanthion di- ctum, quod *ῥαυλὰς*, hoc est, flauos capillos faciat.

## FORMA.

Caulem habet cubitalem, pinguem, angulosum, & in ipso alas multas. Folia Atriplici similia, incisuras habentia, odore Nasturtij. Fructū rotundū ceu grandem oliuam, aculeatum ut Platani pila, contactu uestibus adhaerentē. Ex qua quidem deliniatione nemo non uidet herbam cuius picturā damus esse Xan- thion, quod illi omnes notæ ad amussim respondeant. Caule enim est cubitali, pin- gui, anguloso, crebras fundente alas, folijs Atriplicis incisuras habentibus, Nastur- tium manifestissimè olentibus, fructu magnæ oliuæ modo rotundo, ut Platani pila spinoso, contactu uestes apprehendente. Nucleus qui in echinata pilula clauditur à pueris estur dulci & grato cibo.

## LOCVS.

Nascitur lætis & pinguibus locis, & lacubus paludibusue exiccatis.

## TEMPVS.

Fructus Autumno maturescit, quo sanè tempore colligi debet.

## TEMPERAMENTVM.

Cum discutiendi uires habeat, facilè colligitur temperamento esse calido & sicco præditum, id quod ex sapore etiam, qui est amarus & subacris, deprehendi potest.

## VIRES.





XANTHIVM

Bedderoleus.



C

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Potest fructus antequam penitus inarescat collectus, tusus, & in fictili uase reconditus, capillos flauos reddere, si quis cum usus exigit trybli pondus ex eo sumens, tepidaq; aqua madefaciens, nitro prius capite preparato illinat. Alij cū uino tulum ipsum reponunt. Fructus etiam cōmodē tumoribus illinitur.

EX GALENO.

Xanthion uocatur etiam Phasganion. Fructus discutiendi facultatē obtinet.

## DE XYLO. CAP. CCXX.

## NOMINA.

Gossipion.

Cotum.

Cotonium.

Cotonum.

Xylina ues.

Lana lignea.



YLON & Gossipium Plinio & alijs Latinis dicitur. Græci, quod sciam, eius nusquam meminerunt. Barbaris ac Arabibus Cotum & Bombax seu Bombasum, Germanis Baumwoll appellatur. Linum eius cottonium uulgò uocatur, sicut lanugo ipsa cottonū. Ab huius generis planta ueltes xylina, & lina xylina nominata sunt. Iurisconsulti lanam hanc ligneam nuncupant.

## FORMA.

Frutex est exiguus, folio uitium, sed minore, floribus luteis in medio purpurascens, fructu barbata nuci simili, lanugine pleno, quæ netur in linum candidissimum, mollissimumq;. Nux autem ipsa cum hiascens fatiscit, lanuginis globos repræsentat.

## LOCVS.

D Superior pars Ægypti in Arabiam uergens, Plinio lib. xix. capite primo teste, fruticem hunc gignit. In Creta etiam nascitur, & in Apulia, ac Maltha prope Siciliam insula. Nunc in Germaniæ nostræ hortis plantatur, ut plurima alia peregrina, nobis antea prorsus incognita.

## TEMPVS.

Tam fertilis hic frutex est, ut simulatque adoletit, quod duorum mensium spacio accidit, nunquam desinat florem & fructum proferre, donec asperitate & inclementia hyemis impediatur.

## TEMPERAMENTVM.

Arabes, ut annotauit Serapion, fruticis huius lanuginem calidam & humidam esse statuunt.

## VIRE. EX ARABIBVS.

Foliorum succus medetur infantium alui profluuiū atque torminibus. Semen tussi & thoracis uitij. Oleo seminis emaculantur lentigines & faciei pustulæ. Semen etiam eius genitale semen procreat.

DE PARTHE





XYLON

Baumwoll.



## NOMINA.

Cauta.  
Cotula foetida.



APΘENION, ἀμάρων, χαμαίμηλον Græcis: Partheniū, Amaracum, Solis oculus, Millefoliū Latinis: Thuscis Cauta, officinis & herbarijs Cotula foetida dicitur. Germanis Krottendill / Hundsblium / wild Chamillen. Cæterum cogitabunt hoc loco studiosi, Amaracum de quo nunc agimus diuersum esse ab eo quem alio nomine Samplychon Græci uocant, ut suo loco fusius dicemus.

## FORMA.

Folia Coriandro similia habet tenuia. Flores per ambitū candidos, in medio luteos, odore graui & subuiroso, gustuq̃ amaro. Hæc Dioscoridis descriptio pulchrè & per omnia herbæ illi quæ hodie uulgò Cotula foetida nominatur, respondet. Si quidem ea folijs est Coriandri tenuibus, flore per ambitum albo, intus luteo, odore graui, & sapore amaro. Folijs autem Coriandri, non quidem iam erumpentis & paulò antè enati, necdum maturescents, quæ sunt quadantenus lata & subrotunda, atque in extremitatibus incisa: sed maturi, cuius quidem in alto folia ad Chamæmeli aut Fœniculi foliorum formam accedunt, capillataq̃ sunt, constare scias. Sic enim utriusque folia similia sunt, ut Coriandrum Parthenij, & rursus Parthenium Coriandri prorsus referre folia uideatur. Quod ut disertè innueret Dioscorides, φύλλα λεπτά, id est, folia tenuia dixit, ut scilicet hac uoce latiora, quæ in infima sunt Coriandri parte, secluderet. Quod autem de ijs folijs Dioscorides locutus sit, extractandi ordine abundè liquet. De tribus siquidem herbis, Chamæmelo, Parthenio & Buphthalmo, quæ sanè inter se congeneres, atque folijs admodum similes sunt, ordine agit, quod nunquā fecisset si nulla inter has similitudo intercederet foliorum, adde etiam florum. Buphthalmū tamen folijs ad Fœniculi formam propius quàm reliquæ duæ accedit. Sententiam hanc nostram confirmat, quod aliqui Parthenium, ob similitudinē quam habet cum Anthemide, Chamæmelon dixerint. Tam similis enim est Chamæmelo, ut frequenter etiam ab imperitis pro illa carpatur. His accedit & hoc, quod ob foliorum tenuitatem nonnullis Millefolium appellatum sit Parthenium, quod fieri minimè potuisset si ad latiora Coriandri folia Dioscorides respexisset. Præterea esse Parthenium Cotulam, nomen quod illi Thusci indiderunt satis declarat: Cautam enim appellauerunt, unde diminutiū Cautula deductum est, & tandem corrupta uoce Cotula. Foetidam autem esse, grauis odor qui in ea omnium maximè sentitur, euidenter declarat. Nequaquā itaq̃ ea esse herba potest, quam Matricariā uulgò uocant, ut Hermolaus, & alij multi docti uiri hunc sequentes putant: quòd huius folia latiora sint, quàm ut cum Chamæmeli, Buphthalmi aut Coriandri tenuibus folijs cōparari queant, tantum abest ut similia sint. Huc accedit, quod omnium maximè euertere uidetur aduersariorū sententiam: nemo unquam ex recentioribus Matricariæ herbæ bilis & pituitæ per inferna tractricem facultatem tribuit, quam tamen Parthenio Dioscorides, Paulus & alij ueteres assignant, ut etiam hoc nomine Parthenium non possit esse Matricaria herba dicta uulgò.

Cotula uox unde  
deducta.

Parthenium nō  
matricaria.

## LOCVS.

Nascitur inter segetes & iuxta semitas, intermixta ferè semper Chamæmelo. In hortorum etiam sepibus, Plinio teste, prouenit.

## TEMPVS.


Primo statim uere, Maio potissimū mense, erumpit, ac totam æstatem durat.

## TEMPERAMENTVM.

Haud instrenuè, Galeno autore qui Amaracum uocat, calefacit, non autem uehementer desiccant. Itaq̃ in caliditate tertij est ordinis, in siccitate uerò secundi.

## VIRES.





PAR THENIVM

Krottendall.



C

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Sicca cum oxymelite, aut sale pota, non secus atque Epithymum bilem atram & pituitam per inferna ducit. Asthmaticis & melancholicis prodest. Herba ipsa floribus demptis à calculosis & asthmaticis utiliter bibitur. Decoctum eius ad insidendum prodest in uuluae duritia & inflammatione. Illinitur cum floribus sacris ignibus, & inflammationi.

## EX PAVLO.

Parthenium aridum in potu sumptum atram bilem per inferna deducit.

## EX PLINIO.

Siccatum cum melle & aceto potum, bilem trahit atram. Ob hoc contra uertigines utilis & calculosis. Ad insidendum decoctum in duritia uuluarum & inflammationibus. Illinitur & sacro igni, item strumis cum axungia inueterata. Magi contra tertianas sinistra manu euelli eam iubent, dicens cuius causa uellatur, nec respicere: dein eius folium ægri linguae subijcere, ut mox in cyatho aquae deuoretur.

## DE POLYGONATO CAP. CCXXII.

## NOMINA.

Sigillum Salomonis.  
Polygonatum  
cur dictum.



POLYGONATON Græcis, Polygonatū Latinis dicitur. Officinis, item herbarijs & uulgo, sigillum Salomonis, Germanis Weiswurz, hoc est, radix alba nominatur. Polygonatū autem à radice geniculorū frequentibus nodis ex interuallis tumente appellauerunt.

## GENERA.

Duo eius genera damus. Vnum uerum, latioribus folijs: alterum multò angustioribus, quemadmodum pictura graphicè ostendit. A folijs utriusque nomina sunt indita.

## FORMA.

Sigillum Salomonium.

Frutex est cubito altior, folia lauro similia habens, latiora tamen & leuiora, sapore mæli cotoneæ aut puniceæ: gustatum enim adstrictionem quandam respicit. Per singulos foliorum exortus candidos flores promit numero maiore quam folia, supputatione à radice facta. Radicem habet candidam, mollem, longam, geniculis plenam, densam, graueolentem, digiti crassitudine obtinentem. Iam si singulas Salomonij sigilli notas libeat prosequi, omnes, ne una quidem reclamante, adesse comperies. Nanque in montibus gignitur, frutice cubito proceriore, folijs lauri latioribus, & læuioribus, quæ gustata quandam mæli cotoneæ aut puniceæ saporem referant cum aliqua adstrictione. Flores per singulas foliorum eruptiones exiliunt candidi, qui folia numero longè superent, à radice ad cacumen supputata. Siquidem bini, terni, aut plures ab unoquoque foliorum sinu prodeunt. Radix illi candida, mollis, longa, crebris nodis articulata, densa, grauiter olens, digitali crassitudine. Floribus excussis baccae pisi ferè magnitudine dependent, ex uiridi nigricantes, & in quandam ordinem digestæ.

## LOCVS.

Nascitur in montibus.

## TEMPVS.

Maior mense floret, quo etiam tempore carpi debet.

## TEMPERAMENTVM.

Polygonatum mistam habet qualitatem. Est enim in eo adstrictionis pariter & acrimoniæ quippiam, necnon fastidiosæ cuiusdam amaritatis explicatu difficilis.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix illita uulneribus auxiliatur. Quinetiā uultus maculas delet & aufert.

EX GALE





POLYGONATVM  
LATIFOLIUM.

Weißwurz.





POLYGONATUM AN  
GUSTIFOLIUM.

Schmale Weiswurz.



A

EX GALENO.

Radicem Polygonati quidam uulneribus illinunt. Sunt etiā qui illo nauos maculasq; in facie detergent.

APPENDIX.

Hodie quoq; mulieres sigillo Salomonis sibi faciem extergunt & fucant, ut planè nullum sublit dubium, quin Polygonatum esse constanter credamus.

## DE POLYPODIO CAP. CCXXIII.

NOMINA.



**P**ΟΛΥΠΟΔΙΟΝ græcè, Polypodiū, Filicula latinè, officinæ græcam appellationem retinuerunt, Germanicè Engelsfuß/ Baumfarz/ Dropffwurz uocatur. Polypodio nomen à radice quæ polyporum modo cir-  
ros obtinet inditum est. Filiculam autem Latini à similitudine foliorū  
cum Filice nuncupauerunt.

*Polypodium nomen  
de dictum.  
Filicula.*

FORMA.

Herba est palmi altitudine, Filici similis, subhirsuta, incisuris diuisa, non tamen adeò tenuibus. Radix illi est hirsuta, cirros polyporum modo habens, minimi digiti crassitudine. Dersa hæc intus uiridis est, acerba, gustu subdulcis. Parte auersa folia fuluis maculis notata, sine semine.

LOCVS.

Gignitur in muscosis petris, & in agrestibus quercuum truncis.

TEMPVS.

Radix in fine Augusti carpenda.

TEMPERAMENTVM.

Polypodium dulcem simul & austeram habet uincens qualitatē, ut facultatis sit admodum desiccantis, citra morsum tamen.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Purgandi uim obtinet. Coquitur autem cum gallina, aut piscibus, aut Beta, aut Malua ad purgationem. Arida aquæ mullæ insparsa, bilem & pituitam ducit. Radix trita & illita luxatis confert, & ad fissuras quæ inter digitos sunt.

EX PAVLO.

Polypodiū exicat admodum citra morsum, & potum per inferna purgat.

EX PLINIO.

Radix in usu. Exprimitur succus aqua madefacta, & ipsa concisa inspergitur olei, & Betæ, & Maluæ, uel fassamento, uel cum pulicula coquitur ad aluum leniter soluendam, uel in febris. Detrahit bilem & pituitam. Stomachum offendit. Aridæ farina indita naribus Polypum consumit. Illita luxatis medetur.

DE PRASIO.



## NOMINA.



PAZION Græcis, Marrubiū Latinis, Prasium officinis uocatur. Ger. *Marrubium*,  
manis Andorn das weiblin / weiß Andorn / Marobel / Gottsvergesß. *Prasium*.

## FORMA.

Frutex est ab una radice ramosus, subhirsutus, albicans, uirgis quadrangulis. Folium pollicis æquale, subrotundū, hirsutū, rugosum, gustu amarū. Semen per interualla in caulibus est. Flores asperi uerticillorū figura. Hæc delinatio adamussim Marrubio hodie dicto respondet. Siquidem singulari radice, angulosis *Marrubium*,  
ramulis fruticat, lanuginosum: folijs ferè orbiculatis, pollicis magnitudine, incanis, hirtis, amaris, lacteo flore, uerticillato cinctu caulem ex interuallo amplexente, cui succrescit teres & asperum semen.

## LOCVS.

Nascitur circa domicilia collapsa, & inter rudera.

## TEMPVS.

Colligitur herba in æstate, Iulio potissimū mense, dum semine est prægnans.

## TEMPERAMENTVM.

Marrubiū in caliditate quidem secundi ordinis iam completi est, in siccitate uerò tertij mediū aut completi.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius folia arida cum semine decocta in aqua, aut uiridium expressus succus, datur cum melle asthmaticis, tussientibus & tabidis. Crassa è thorace cum iride sicca ducunt. Datur mulieribus quæ non purgantur, ut menstrua & secundas pellant. Item difficile parientibus, his qui à serpentibus morfi sunt, & qui letale quid biberunt. Vesicæ tamen & renibus nocent. Folia cū melle illita sordida ulcera purgant, *B* pterygia nomasq; cohibent. Dolores laterum mitigant. Ad eadem pollet ex folijs contusis expressus succus & sole coactus. Cum uino & melle illitus, oculorum claritatem exacuit. Morbū regium per nares expurgat. Aurium doloribus per se, aut cum rosaceo instillatus prodest.

## EX GALENO.

Prasium ut gustu amarum est, ita si quis utatur consentientē huic saporī actionē habet, iecur ac lienem obstructione liberans, & thoracem pulmonemq; expurgans, ac menses promouens. Sed & illitum detergit ac discutit. Succo eius cum melle ad aciei oculorum claritatem utuntur. Quinetiam & per nares morbum regium purgant, & ad aurium dolores inueteratos adhibent, in quibus utique obstructionem dissolvere, meatumq; ipsum & explantationes membranarū expurgare necesse est.

## EX PLINIO.

Huius folia semenq; contrita profunt contra serpentes, pectorum & lateris dolores, tussim ueterē. Iis qui sanguinē eijciunt eximiè utile, scapis eius cum panico aqua decoctis, ut asperitas succi mitigetur. Imponitur strumis cum adipe. Sunt qui uiridis semen, quantum duobus digitis capiant, cum farris pugillo decoctū, addito exiguo olei & salis, sorbere ieiunos ad tussim iubeant. Alij nihil cōparant. In eadē causa Marrubij & Fœniculi succis ad sextarios ternos expressis, decoctisq; ad sextarios duos, si cochlearij mensura in die sorbeatur in aquæ cyatho. Virilium uitijs tussim cum melle mirè prodest. Lichenas purgat ex aceto. Ruptis, conuulsis, neruorum contractionibus salutare. Potum aluum soluit cum sale & aceto. Item menstrua & secundas mulierū. Arida farina cum melle ad tussim siccam efficacissima est. Item ad gangrenas & pterygia. Succus uerò articulis, & è naribus morbo regio, minuendæq; bili cum melle prodest. Item contra uenena inter pauca potens. Ipsa herba sto machū & excreationes pectoris purgat. Cum iride & melle urinam ciet. Cauenda tamē exulceratæ uesicæ, & renum uitijs. Dicitur succus claritatē oculorū adiuuare.





MARRUBIVM

Weiß Andorn.



A

## NOMINA.



ΕΡΙΣΤΕΡΕΩΝ, ἢ ῥὰ Βοτάνη græcè: Verbenaca, Verbena, Columbaris seu *Verbenaca.*  
 Columbina, herba Sagminalis latinè, herbarijs & officinis Verbena uo *Verbena.*  
 catur. Germanicè Eifenkraut / uel Eiserhart / hoc est, ferraria, quod  
 nomen ut olim, sic hodie quoq; habet. Peristereon nomen inditū à co. *Peristereon cur*  
 lumbis, qui in ea uersari plurimum delectantur. Hierobotane autem, hoc est, sacra *dicta.*  
 herba ideo dicta, quod ea olim apud Romanos domus purgabatur, familia lustra- *Hierobotane.*  
 batur, louis mensa ad sacrificiū & epulas uerrebat, & sceciales in sacris legationibus  
 illa coronabantur, uel ut Dioscorides inquit, quod in expiationibus suspensa & alli  
 gata mirè utilis sit. Sagminalis uerò, quod inter sagmina, hoc est, gramina ex loco *Sagminalis.*  
 sacro, præsertim arce Capitolij, cum sua terra euulsa, primum hæc honorē haberet.

## GENERA.

Duo Verbenacæ & Græci & Latini fecerunt genera. Dioscorides & alij Græci  
 à plantæ habitu rectam & supinam. Plinius à sexu marem & fœminam. Recta Dio  
 scoridis, est Plinij mas, alioq; nomine Crista gallinacea, à ferratis folijs quæ gallina *Crista galli*  
 cæ cristæ formam referunt, dicitur. Recta autem nominata est, quod rectis ramu- *nacea.*  
 lis assurgat. Supina autem Dioscoridis apud Plinium fœmina est, Romanisq; Cin  
 cinnalis uocatur. Supinam uerò uocarunt, quod semper humi supinè procumbat.  
 Germani etiam per sexum genera illa distinguunt, uocantq; rectam Verbenacam  
 Eifenkraut das mœnne / Supinam uerò das weible.

## FORMA.

Recta siue mas herba est altitudinis palmi, aliquando etiam maioris. Folia huic *Recta.*  
 incisa, subalbida, è caule prodeuntia, qui ei unus est magna ex parte, quemadmodū  
 B & radix una. Flos luteus, quo solo ferè à fœmina differre uidetur. Hæc descriptio  
 pulchrè Verbenacæ mari respondet: est enim herba dodrantalis, interdum uerò  
 procerior, quemadmodū ea est quæ in Germania nostra prouenit: nunquam enim  
 aut rarissimè palmi altitudinē non excedit. Folia habet incisuris diuisa, albescentia,  
 erumpentia è caule. Singularis denique illi, ut plurimum, caulis & radix una. Su- *Supina.*  
 pina seu fœmina ramos profert cubitales, aliquando etiam maiores, angulosos, cir-  
 ca quos folia sunt per interualla quernis similia, angustiora tamen & minora, per  
 ambitum incisa, colore subcæsi. Radicem habet oblongam, tenuem. Flores pur-  
 pureos, tenues. Cuius iterum deliniationis notæ Verbenæ fœminæ adamulsim  
 conueniunt. Siquidem multis statim à radice angulosis coliculis constat, coma sub  
 tus incana, folio querno non dissimili, nisi quod minus est & angustius, multis per  
 ambitū incisuris: flosculo ex albore & purpura uersicolore. Quibus omnibus ma-  
 nuscripti codicis, qui Peristereon interpretatur Verbenam, accedit testimonium,  
 & communis omnium consensus, à quo sine manifestis coniecturis & rationibus  
 nunquam est discedendum.

## LOCVS.

Vtraque in planis & aquosis locis prouenit.

## TEMPVS.

Mas citius quàm fœmina apparet. Colligi debent, potissimū fœmina, circa Ca-  
 nis ortum, nam hoc tempore floret.

## TEMPERAMENTVM.

Vtraque desiccatur & adstringit.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Rectæ Verbenacæ folia cum rosaceo, aut adipe suillo recenti apposita, uulua-  
 rum dolores finire putantur. Ignem sacrum cum aceto illita reprimunt. Putrescen-  
 tia ulcera cohibent. Vulnera glutinant, ueteraq; ex melle ad cicatricem perducunt.

dd 2 Supina





VERBENACA RECTA  
SIVE MAS.

Leifentrautmennle.





VERBENACA SVPI  
NA SIVE FOEMINA.

Eisenkraut weible.



**C** Supinae autem folia & radix in uino pota illitaq̃, aduersus reptilia serpentesue faciunt. Eadem drachmae pondere cum thuris obolis tribus, & uini ueteris hemina, quadragenis diebus iciuno contra regium morbum bibuntur. Vetera cedemata, & inflammationes illita mitigant. Sordida ulcera purgant. Tota autem herba in uino decocta tonsillarum crustas abrumpit, & oris nomas gargarissata cohibet. Fertur sparso aqua triclino qua maduerit, latiores conuiuas fieri. Datur potandum in tertianis febribus tertium à terra geniculum cum adiacentibus folijs : quartanis, quartum.

EX GALENO.

Vim habet adeò desiccantem ut uulnera glutinet.

EX AETIO.

Verbenaca recta ad capitis dolores summo praesidio esse testatur Archigenes, si ea coronetur patiens, aut si teratur cum aceto & rosaceo & illinat, aut oleo decoquatur, ac foueatur caput. Nec tantum capitis dolores sedat, sed capillos quoq̃ fluentes compescit. Radicis decoctum calidum ore retentum dentium dolores mitigat, ac mobiles firmat, orisq̃ ulceribus medetur. Ad colicos radices semicontusas in aqua ad dimidiam decoquito, & diebus quinque decoctum potandum dato : efficacissimum id esse experientia compertum est. Facit & ad calculos atq̃ ad inchoantem elephantiam, si cum melle propinetur. Vtere itidem ad epilepticos, & ad quotidiana, quartanaue febre laborantes. Ad podagricos uerò & coxendiciū morbo affectos uino decocta exhibetur. Succus è radice expressi collutio ad fistulas commodissima est. Et si mororum liquori ac melli mixtus exuratur, & acidus illinatur, fistulas sanat. Potest etiam melle assumi, & fistulae tanquam collyrium injici, ac mirum in modum prodest.

**D**

EX PLINIO.

Aiunt si aqua spargatur triclino qua maduerit Verbenaca, latiores conuictus fieri. Aduersus serpentes conteritur ex uino. Omnibus uisceribus medetur, lateribus, pulmonibus, iecinoribus, thoraci, peculiariter autem pulmonibus, & quos ab ijs phthisis tentat. Dysenterias emendat ex aqua data carentibus febre, aut ex uino aminæo cochlearibus quinque, additis in cyathis tribus uini.

EX SYMEONE SETHI.

Verbenaca recta facit ad capitis dolores & defluentes capillos inuncta. Dentium dolores sedat, & motos atq̃ concussos cōfirmat. Oris ulcera sanat. Decoctum eius colicos & calculosos iuuat. Pota ijs qui primum elephantia laborare incipiunt, & comitiali morbo affectis succurrit. Item quotidiana & quartana laborantes similiter iuuat. Podagricos uerò & coxendicis morbo captos, uulneratosq̃ illita sanat.

## DE PTERIDE CAP. CCXXVI

NOMINA.

Filix.  
Pteris cur dicta.



ΠΤΕΡΙΣ, ἡ πτερίς Græcis, Filix Latinis dicitur. Officinæ latino nomine utuntur. Germanicè Waldesart. Pteris autem & Pterion ab alis auiū, quarum formā in ramulis disposita eius folia referunt, Græcis dicitur: pennatus enim, & pennatis folijs frutex Filix est.

GENERA.

**Pteris.** Duo Filicis sunt genera, mas scilicet & foemina. Mas Græcis simpliciter πτερίς, Latinis Filix mas, Germanis Waldesart mennle dicitur. Foemina Græcis θύλας πτερίς, Latinis Filix foemina, Germanis Waldesart weible appellatur.

FORMA.





FILIX MAS

Waldfarn männle.

dd 4



A

## FORMA.

Filix mascula folia habet sine caule, sine flore, sine semine, ex uno pediculo cubitali longitudine exeuntia, incisa, alarum auium modo explicita, odore subgrauia. Radicem in terræ superficie foris nigram, crassam, oblongam, adnascentias appendicisue multas habentem. Ex qua siquidem descriptione satis constat hanc quam sub hoc nomine pictam damus herbam esse Filicem masculam: hæc enim neque caulem (quod enim in ea supra terram extollitur, pediculi foliorum, non caulis rationem obtinet) neque florem, neque semen habet: folia ex uno pediculo cubitali à terra statim, aut ex stipite eius exeunt, utroque latere pinnata, subgravi odore. Radix denique illi est per summa cespitum nigra, & ut Theophrastus ait, crassa, oblonga, multis adnatis & capillamentis fibrata, atque, ut summatim dicam, omnes illi notæ adamussim respondent. Filix femina folia priori similia obtinet, non tamen uno singularique pediculo ut illa hærentia, sed adnascentes ramulos multos altioresque habentia. Radix illi longa, obliqua, in nigro colore subflava, aliquando uerò rubescens. Que descriptio iterum per omnia cum ea herba cuius picturam exhibemus ita conuenit, ut nulla prorsus sit nota quæ illi non respondeat.

Filix mascula.

Filix femina.

## LOCVS.

Nascuntur ubique, sed maximè in montibus, syluis & saxosis locis.

## TEMPVS.

Effodiuntur Vergilijs occidentibus, hoc est, autumnò.

## TEMPERAMENTVM.

Amaræ sunt Filices, paululum habentes adstrictionis, ut euidentissimum sit has calefacere & exiccare posse.

B

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Filicis masculæ radix pellit latos lumbricos pondere drachmarum quatuor cum aqua mulsa pota. Melius autem si cum Scammonia, aut ueratri nigri quatuor obolis detur: ueruntamen oportet sumentes allia præsumpsisse. Lienosis ut restituantur prodest pota. Radix etiam cum axungia illita contra ictus ab harundine factos utilis est. Eius autem hæc probatio. Peribit Filix quam per ambitum copiosior harundo coronet: & contra euanescet harundo, quam obsepiens multa Filix in orbem cinxerit. Feminae radices cum melle in eclegmate sumptæ, latos lumbricos pellunt. Cum uino autem pondere trium drachmarum pota, rotundos lumbricos eiciunt. Mulieribus datæ sterilitatem faciunt. Et si prægnans sumat, abortum. Sicca & in farinam trita, humidis & his quæ difficulter sanantur ulceribus insperguntur. Medentur iumentorum ceruicibus. Folia eius nuper prodeuntia oleum modo elixa comeduntur, aluumque molliunt.

## EX GALENO.

Filix mas radicem habet maximè utilem: latum enim lumbricum interficit, si quis eam quatuor drachmarum pondere in aqua mulsa sumpserit. Ad eundem modum fœtum quidem uiuum necare, mortuum autem eicere mirum non est. Viceribus imposita ualenter desiccandi facultatem obtinet, non tamen mordax est. Similem ei uim habet Thelypteris nominata.

## EX THEOPHRASTO.

Thelypteris seu femina Filix, contra lumbricos uentris & latos & graciles utilis est. Contra latos quidem cum melle mixta, contra tenues autem in uino dulci cum polenta data. Quinetiam mulieri si detur, prægnanti quidem abortum: simpliciter autem fœminis sterilitatem facere affirmant.

## EX PLINIO.



C

EX PLINIO.

Vfus radicis in trimatu tantum, neque antè neq; postea. Pellunt interaneorum animalia. Ex his tineas cum melle, cætera ex uino dulci triduo potæ. Vtraque stomacho inutilissima. Aluum soluit, primo bilem trahens, mox aquam. Melius tineas cum Scammoni pari pondere. Radix eius duum obolorum pondere ex aqua, post unius diei abstinentiam bibitur, melle prægustato, contra rheumatismos. Neutra danda sceminis, quoniam grauidis abortum, cæteris sterilitatem facit. Farina earum ulceribus tetris inspergitur. Iumentorum quoque ceruicibus. Folia cimicem necant, serpentem non recipiunt, ideo substerni utile est in locis suspectis. Vstæ etiam fugant nidore.

APPENDIX.

Filix semine pro-  
fus caret.

Falsum & cõmentitium haud dubiè est quicquid neoterici aliqui de Filicis semine fabulantur: quod scilicet una solstitiali nocte floreat, eademq; hora cum defloruit maturum in terram semen cadat, ideoq; nisi quispiam tunc affuerit, nec uideri florem, nec colligi semen posse, tum quia incredibilia sunt, tum quod omnes, Theophrastus scilicet, Galenus, Dioscorides, Plinius, sterilem & sine semine dixerunt. Neq; etiam medici uel Arabes uel Persæ ad magicas uanitates nati, seminis huius meminerunt. Quapropter omnia hæc agyrtarum cõmenta esse uidentur humanæ ignorantie ad quæstum impudenter illudentium, quæ certè uel una hac ratione abundè satis confutari possunt, quod cuncta illa fieri & obseruari natali nocte diui Ioannis Baptistæ præcipiunt, cum natalis ea nox & solstitialis illa duodecim dierum numero nunc inter se distent.

## D DE PEUCEDANO CAP. CCXXVII

NOMINA.

Fœniculus por-  
cinus.

Peucedanus uo-  
ce dicta.

Pinastellus.



ΕΥΚΕΔΑΝΟΣ Græcis, Peucedanus Latinis, officinis & herbarijs nostræ ætatis Fœniculus porcinus dicitur. Germanis Narstrang / Sewfenchel / oder Schwefelwurz / quod lachryma è radice sulphuri aut thuri similis exudet. Peucedanum autem nomen inuenit à pinu, quæ Græcis πινύς dicitur, cui folio par est. Hinc posteriores Latini Pinastellum eum uocauerunt.

FORMA.

Officinariū Peu-  
cedanus non est  
genuinus.

Caulem emittit tenuem, macilentum, Fœniculo similem. Comam habet circa radicem copiosam & densam. Florem luteum, radicem foris nigram, intus albam, graui odore, crassam, liquore plenam. Hæ sanè omnes notæ, nulla prorsus reclamante, huic quam pictam exhibemus herbæ conueniunt. Officinæ, quæ non rarò adulterinas pro genuinis uendunt herbas, Peucedanum ostendunt radice non succosa, sed lignosa, nec graui odore, sed iucundo: unde satis cõstare potest uerum non esse.

LOCVS.

Gignitur in montibus opacis, potissimum in monte prope Tubingam, cui olim arx imposita fuit, in itinere uersus Rotenburgum sito.

TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus, atque deinceps semen producit. Radix foditur exitu autumnii.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit ordine secundo iam completo: desiccat uerò tertio iam incipiente.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radice adhuc tenera Peucedani cultello incisa liquor effunditur, profluensq; statim in umbra reponitur: in sole siquidem languescit. Facit cum colligit capitis dolores & uertigines, nisi quis antea rosaceo nares præungat, & caput irrigat. Radix assata inutilis





PEUCEDANVS

Garstrang.



**C** inutilis fit. Colligitur & ex caulibus & ex radice sicut è Mandragora liquor atq; succus. Minus tamen efficax succo liquor, & uelocius expirat. Interdū etiam cōcreta inuenitur lachryma thuri similis, caulibus radicibusq; adhærens. Ex aceto & rosaceo inunctus lethargicis, phreneticis, uertiginosis, comitialibus, diuturnis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis: in uniuersumq; neruorū affectionib. ex oleo & aceto inungitur. Strangulatu uulua laborantes olfactus, soporeq; profundo correptos reuocat. Suffitu serpentes fugat. Aurium doloribus cum rosaceo instillatus prodest. Causis dentium erosio inditus eorundem dolores mitigat. Contra tussim in ouo sumptus facit. Difficultati spirandi, torminibus & inflationibus subuenit. Aluum leniter mollit. Lienem minuit. Difficiles partus egregie adiuuat. Ad uesicæ renūq; dolores & distentiones potus confert. Aperit uuluam. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior. Eius decoctum bibitur. Sicca trita sordida purgat ulcera, ossiumq; squamas detrahit, ueteraq; cicatrice obducit. Ceratis malagmatisq; calefaciendi ui præditis miscetur. Eligi debet recens, non cariosum, solidum, odoris plenum. Succus ad potiones amaris amygdalis, aut ruta, aut pane calido, aut anetho dissoluitur.

## EX GALENO.

Peucedani radice quidē maximè, sed tamen etiam succo & liquore utimur. Sunt autē hæc omnia eiusdē specie facultatis, sed ualentior liquor, admodū exalfaciens & digerens. Quare affectibus omnibus circa neruos consistentibus conuenire creditur, tum morbis in pulmone & thorace ex crassitudine atque uiscositate humorū factis. Et intrò quidem in corpus sumpta, sed tamen etiam olfactu prosunt. Porro quod incīdat atque extenuet, sæpe etiam dentium perforatorū dolores cavitati impositus protinus sedauit, quia uidelicet est tenuiū partium, & exalfactorius. **Q**uin etiam lienes induratos iuuat, nempe incidendo, digerendo & extenuando crassos humores. Sed & radice ad hæc uti licebit, quæ & squamas ab ossibus celerrimè detrahit, quia uidelicet ualidè desiccat, minus tamen quàm succus exalfaciens. Et ulceribus malignis arida illita optimum est remedium; ipsa enim expurgat, carnem generat, & ad cicatricem perducit.

## EX PLINIO.

Peucedani radices conciduntur in quaternos digitos offeīs cultellis, funduntq; succum in umbra, capite prius & naribus rosaceo perunctis, ne uertigo sentiat. Et alius succus inuenitur caulibus adhærens, incisq; manat. Probatur crassitudine mellea, colore ruffo, odore suauiter graui, feruens gustu. Et hic in usu & radix, & decoctum eius pluribus medicamentis. Succo tamen efficacissimo, qui resoluitur amaris amygdalis, aut ruta, bibiturq; contra serpentes, & ex oleo perunctos tueretur. Idem pectoris doloribus subuenit. Pituitam & bilem detrahit Peucedani radix. Eadem decocta lieni & renibus prodest. Perungunt & radicē sudoris causa eliciendi, quoniam caustica uis ei est. Peucedano ad recentia uulnera tanta uis est, ut saniem ossibus extrahat. Cum semine Cupressi bibitur, si sanguis per os redditus est, fluitq; ab infernis. Strangulatus uulua nidore ustum recreat, laxanturq; suffocationes eo: sed quidam ammiscent in uino semen Cupressi cōtritum. Potum cum coagulo uituli marini æquis portionibus comitiales sanat. Succus infantium ramici, & umbilicis eminentibus inungitur. Stranguriæ cum melle medetur.

Item semine lethargici excitantur, & ut perhibent ex  
euphorbio naribus tactis Peuce-  
dani succo,





638

PERSICA

Pfirsichbaum.

cc



C

## NOMINA.

Persica ar-  
bor dicta.

ΕΡΣΙΚΗ μᾶλος Græcis, Persica m̃alus Latinis: antiquum nomen herbarij vulgares retinuerunt: Germanis P̃fersichbaum appellatur. Persica fortè dicta, quod ex Perside primum aduectà sit.

## FORMA.

Persica folijs amygdalæ maioribus constat: flore subpuniceo, pomo carnosissimo, succulento, foris lanuginoso, dura intus & scabra nuce, in qua nucleus qualis amygdalis.

## LOCVS.

Pasim in hortis, uineis potissimū, nascitur. Gaudet autem aquosis.

## TEMPVS.

Floret primo statim uere, fructus uerò eius autumnī ferè exitu maturefcit, celerimè marcescens.

## TEMPERAMENTVM.

Persica arbor in germinibus & folijs uincentem amaram qualitatem habet, ut hoc nomine calidam esse nemo dubitare possit. Fructus eius in secundo ordine frigidus & humidus existit.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Persica poma stomacho grata sunt, matura bonum faciunt aluum, cruda uerò aluum constringunt. Siccata uehementius adstringunt. Siccorum decoctum haustum stomachi & uentris fluxiones sistit.

## EX GALENO.

Folia Persicæ trita & super umbilicum imposita lumbricos necant. Alioqui sanè etiam discutiens medicamentū est. Pomorum uerò eius succus & ueluti caro facile corrumpitur, omninoq; noxam infert, quapropter haud post alios cibos ultimoq; sicut nonnulli solent, illa offerri oportet: nam in summo natantia corrumpuntur. Huius uerò, quod omnibus cōmune est, meminisse oportet: quæcunq; uitiosi succi, quæ humida & lubrica sunt, facileq; descendunt seceduntue, præ alijs comedenda esse: sic enim & ipsa celeriter subeunt, & alijs præeunt, ac quasi iter muniunt. Postremo autem sumpta, unà secum alia quoq; in corruptionem trahunt.

## EX PLINIO VALERIANO.

Persicorū cibus est quidem stomacho inutilis, eò quod citò succus eius inacescat, & caro æque in digestionē uitiatur, uerum minimè grauis, dum non diutius in intestinis moratur, & ad ima semper exitu celeri festinat. Persicorum cibus negatur à medicis membra nutrire. Sed & Galenus suadet nunquam omnino post cibum sumere, corrumpi affirmans si cibis cæteris innatent. Persicorū folia trita & imposita uentris animalia perimunt & expellunt. Eadem sicca & in puluerem tusa, recentes plagas cruentorū uulnèrum claudunt. Nucleus persicorum capitis dolori cum oleo & aceto tritus illinitur: quamuis quidam cum solo rosaceo terere maluerint. Gummi gutta quam Persici truncus illachrymat, fluenti aluo medetur. Eadem mixta cum uino etiam in uesica lapillos frangit. Trita ex aceto impetigines reprimat. Decocta cum croco tumores faucium mitigat. Asperam arteriæ canalem leuiorem facit. Excreantibus sanguinem miro modo subuenit. Thoracis obstrictos sinus reserat: uitia pulmonis expurgat.

## APPENDIX.

Flores Persicæ saccharo conditi, instar rosarum aut uiolearum, aluum haud leuiter mouent atque subducunt.

DE PEPLO.





603

PEPLOS

Wolffamilch.

cc 2



C

NOMINA.

Esula rotunda.



ΕΣΛΟΣ Græcis, Peplos Latinis, officinis & uulgo Esula rotunda, Germanis Tcuselsmilch appellatur.

FORMA.

Exiguus frutex est albo liquore plenus: folijs paruis ut Rutæ, latioribus tamen. Tota eius coma dodrantalis, rotunda, humi fusa: semine sub folijs paruo & rotundo, minore quàm candidi papaueris. Radice una, ex qua totus frutex prouenit.

LOCVS.

Nascitur in hortis & uineis.

TEMPVS.

Colligitur melsibus, siccaturq̃ in umbra, & continuè uertitur.

TEMPERAMENTVM.

Idem cum Tithymallis habet temperamentū, atque adeo ex quarto calefacientium ordine est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Herba ipsa multos habet usus, radix uerò inutilis. Semen eius tusum, feruida q̃ aqua madefactū reconditur. Pituitam & bilem acetabuli pondere cum hydromelitis cyatho potū ducit. Obsonijs mixta herba aluū conturbat. Conditur in muria.

EX GALENO.

Peplos frutex liquorem similem Tithymallis habet, cum in alijs, tum quia purgat ceu illi.

EX AETIO.

Pituitam ac bilem ducit acetabuli mensura cum mulsæ cyatho bibitum Pepli semen. Sale etiam herba maceratur, flatusq̃ discutit, ut Hippocrates asserit. Summopere igitur confert flatuosis affectibus, qui in melancholia dominantur, item diurnis lienis & uteri & coli flatibus, tumefactisq̃ cedematibus in abdomine.

EX PLINIO.

Semine Pepli poto aluus soluitur, bilis ac pituita detrahitur. Media potio est acetabuli mensura, in aquæ mulsæ heminis tribus. Et cibus inspergitur obsonijsq̃ ad molliendam aluum.

## DE PILOSELLA CAP. CCXXX

NOMINA.



Pilosella unde dicta.

Von nomine ueteribus Græcis aut Latinis nominata sit hæc herba, ingenuè fateor me ignorare. Neq̃ enim est *μυρτὸς* Dioscoridis. Cum itaque græco & latino nomine destitueremur, barbaro uti nobis necesse fuit, nisi planè herbam hanc uulneribus glutinandis mirè utilem, præterire uoluissetemus. Herbarij itaq̃ nostræ ætatis à copiosis pilis quibus uestitur, Pilosellam, Germani *Neusörlin* uocant.

GENERA.

*Maior.* Duo eius herbæ genera reperiuntur, in nullo ferè nisi floribus distantia. Vnum genus maioribus folijs, & quæ se à solo sustollunt, floribusq̃ luteis, maior Pilosella nominatur, Germanis propriè *Nageltraut*. Alterū minoribus folijs, in terra sessilibus, floribus purpureis, & quasi in pappum euanescentibus, Germanis *Neusörlin* / oder *Naschnpßätlin* peculiariter appellatur. Sic etiam suam Pilosellam manu scriptus herbarius in maiorem & minorem digessit.

FORMA.

Herba est folijs in terram graminis modo sparsis, pilosis, albicantibus à terra, superne





PILOSELLA  
MAIOR.

Nagelkraut.



PILOSELLA  
MINOR.

Neußörlin.





A supernè uirentibus, floribus luteis aut purpureis, radice in exilitatē multam extenuata. Ex qua descriptione sole clarius sit, eam herbam quā à Græcis Myosotis, à Latinis autem Auricula muris dicitur, non esse Pilosellam; nam, ut reliqua taceam, neque maior neque minor Pilosella cœruleum flosculum uelut Anagallis obtinet: ut non parum errent herbarij nostri temporis qui Pilosellam alio nomine Muris auriculam appellari tradunt.

*Myosotis non est  
Pilosella.  
Auricula muris  
non est Pilosella.*

## LOCVS.

Nascitur utrunque genus locis montosis & collibus terrenis. Maior autem inuenitur etiam in asperis & incultis agrorum limitibus.

## TEMPVS.

Maior & Iunior potissimū mense florent. Minor tamen Pilosella paulo post initia Iunii mensis disperit, & nusquam subinde inuenitur.

## TEMPERAMENTVM.

Esse calidas & siccas Pilosellas gustus palam declarat: habent enim adstrictionē cum exigua quadam acrimonia coniunctam, ut hoc nomine ad purificanda ac subinde glutinanda uulnera sint mirificè utiles.

## VIRES EX RECENTIORIBVS.

Ferunt foliorum farinam uulnera mirum in modum glutinare. Herbae recentis succum exprimunt ad cohibendos quartanae febris horrores. Eodem tingunt gladiorum aciem, ut omne ferrum aliud domet, secetq̃: ferrum enim quod huius succo cōmaduit tantam contrahere duritiam, tamq̃ magnū induere robur produnt, ut chalybis aciem respuat. Has certè omnes facultates manuscriptus herbarius Pilosellae adscribit. Recentiores huius herbae radicem Maio mense effossam, siccatā, & in puluerem redactam, ac subinde potam, aut in cibo datam, efficacissimū esse ad  
B uersus ramicem remedium tradunt.

## DE PIMPINELLA CAP. CCXXXI.

## NOMINA.



T appellata sit Græcis aut Latinis herba hæc quam hodie uulgus herbariorum & officinae Pimpinellam uocant, nondum nobis certò scire licuit. Sunt qui Pampinulam & Bipennulam nominent. Germani Bi-  
binellen & Bibernellen appellant.

*Pampinula.*

## GENERA.

Duū est generum Pimpinella. Vna maior, radice admodū longa, folijs multifariam scissis, Sisaro haud dissimilibus, caulibus angulosis, floribusq̃ in summo exiguus & candidis. Altera minor, caulibus rufescentibus, folijsq̃ minoribus, & non dissectis multifariam, sed serratis tantum, aliàs priori per omnia similis.

## FORMA.

Herba est folio mucronato, dissecto, aut in extremitatibus serrato, caulibus ab eadem radice binis aut trinis, angulosis, & interdum rubentibus, in quorum summo nascuntur flores minuti & candidi, & ijs decidentibus semen exiguum Orcofelini semini simile. Radice crassa, longa, & subrubente, acri admodum.

## LOCVS.

Lucis & opacis locis minus, in pratis autem maius, affatim citra cultū erumpit.

## TEMPVS.

Æstate in autumnum usque floret.

## TEMPERAMENTVM.

Quum acrimoniam non exiguam in gustu præ se ferat, haud dubiè in secundo ordine calida & sicca erit, imò secundum calefaciendi ordinem excedere credibile est, & ad tertium ferè accedere.



PIMPINELLA  
MAIOR.  
Groß Bibinel.





PIMPINELLA  
MINOR.

Klein Bibinell.





C

## VIREs EX RECENTIORIBVS.

Pimpinellæ succus bibitur contra serpentium morsus. Ex uino pota calculos terit. Stranguriâ etiam decocta leuat. Succus eius potus omne uenenum discutit. Aqua eius ignis ui expressa oculorû caliginem discutit. Hæ sunt facultates quas illi antiquus herbarius tribuit. Alij tradunt succum eiusdem faciei maculas detergere posse. Est autem radicis Pimpinellæ tum usus præcipuus, quum sæuiantis populi pestilentie contagia arcere conamur: unice enim uenenis aduersatur, & corpora ab hac lue uindicat, ut adfirmant, si tantum in ore teneatur. Quod certè non potest ea quam hodie Sanguisorbâ uocant herba. Quare mirum in modum errant, qui hanc cum Pimpinella confundunt, ut fusius suo dicemus loco.

Sanguisorba nō  
est Pimpinella.

## DE PASTORIA BURSA CAP. CCXXXII.

## NOMINA.

Bursa aut pe-  
ra pastoris cir-  
dicta.



VO nomine herba quam uulgius Pastoriam bursam appellat græcis & latinis medicis dicta sit, ignorare me ingenuè fateor. Sunt qui peram etiam pastoris nomenclant, à folliculis in exiguae uulge similitudinem compressis, turbinata cordis effigie. Germanis Deschelkraut & Hirsenfessel uocatur.

## FORMA.

Herba raro pede altior, ramosa, Erucae folia habens, at minora. Flores exiguos, candidos. Semen in uulgis minutum & nigrum. Radicem candicantem & oblongam.

## LOCVS.

Nascitur propter uias passim, & in parietinis.

D

## TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus legitur.

## TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & adstringit.

## VIREs EX RECENTIORIBVS.

Ex aceto trita collectionum inflammationes refrigerat, ac eò confluentes humores cohibet. Imponitur sacris ignibus, & quibus stomachus æstuat. Succus eius purulentis auribus infunditur. Cruenta sanat uulnera. Medetur dysentericis, sanguinem excreantibus, neque non muliebri profluuio. Manuscriptus herbarius addit hanc sanguinem e naribus profluentem sistere mirificè posse. Herbam quoque manu tantum gestatam, mox idem efficere tradit. Quid multa? mirè efficacax est in comprimendis omnibus sanguinis eruptionibus.

DE PEDE





PASTORIA  
BURSA

Deschelkraut.





PES LEONIS

Synon.



A

## NOMINA.



QVAM uulgus herbariorū Pedem leonis nominat, non est Dioscoridis Leontopodion, id quod descriptio satis monstrat. Quo uerò nomine Græcis & Latinis appellata sit, mihi nondum constat. Sunt ex barbaris qui Alchimillam, alij etiam qui plantam leonis nominant. Sic autem dicta, quod folia habeat instar leonini pedis lata & rotunda. Germanis Synnaw/Löwentapen/Löwensüß/& vnser frawen mantel uocatur.

Leontopodion  
Dioscoridis non  
est Pes leonis her-  
bariorum.  
Alchimilla.  
Pes leonis cur  
dicta.

## FORMA.

Dodrantalē est herba, folia lata, crispa & rotunda octo serratis incisuris distincta, non tamen ad pediculos usque, qui statim ē radice exeunt, fissa habens. Flores item exiguos & luteos profert. Radicem digito crassiore, & sesquipalmo longiorem, subrubescens.

## LOCVS.

Pasim in pratis, in alto potissimum sitis, nascitur.

## TEMPVS.

Maiō mense erumpit, ac inter Iunij initia floret.

## TEMPERAMENTVM.

Folia & radix adstrictione uehementi participant, atque adeo exiccant. Recentiores id ipsum in secundo efficere ordine tradunt.

## VIRESEXRECENTIORIBVS.

Vulneribus glutinandis aptissima est. Decocto enim illius lauantur utiliter omnia uulnera. Linteum quoque in eo madefactum illis cōmodē imponitur. Mulierum mammas impense laxas linteum decocto eiusdem intinctum & impositum, duras solidasq; efficit. Decoctum denique hoc epotum interanea uulnera, rupturasq; glutinat. Et quod dictu mirum est, tanta eius plantæ in glutinando uis est, ut ramices intestinorum, in pueris potissimum, sanare possit.

## DE POLYGONO MARE. CAP. CCXXXIII.

## NOMINA.



POLYGONON ἀγῖον græcè: Proserpinaca, Seminalis à seminis multitudine, & Sanguinalis à cohibendo sanguine nominatur. Officinis Corrigiola & Centumnodia. Germanicè Weggras / Denngras / Wegdrutt appellatur. Polygonon à geniculorum frequentia, & multitudine dictum est.

Seminalis cur  
dicta.  
Sanguinalis.  
Corrigiola.  
Centumnodia.

## FORMA.

Herba est ramis tenuibus, teneribus, copiosis, geniculis intersectis, in terra graminis modo repentibus. Folijs Rutæ similibus, longioribus tamen. Iuxta singula folia semine, unde masculum uocatur. Flore albo aut puniceo.

## LOCVS.

Nascitur pasim, quotidieq; pedibus conculcatur, sua sponte in aggeribus & semitis proueniens.

## TEMPVS.

Æstate floret, quo etiam tempore legitur.

## TEMPERAMENTVM.

Vti adstrictionē quandam obtinet Polygonum, ita sanē uincit in eo aqua frigidum, ut uidelicet secundi sit ordinis medicaminū refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertij. Est etiam exiccatorium.

## VIRESEXDIOSCORIDE.

Vim habet adstringendi & refrigerandi succus Polygoni potus. Prodest sanguini ex-

ff

nem ex.





POLYGONVM  
MAS.

Weggras.



**A** nem expuentibus, &alui defluxionibus, cholericis & urinæ stillicidio. Vrinā enim euidenter ducit. Cum uino potus uenenatorū moribus auxiliatur. Valet etiam ad febrium circuitus una hora ante accessiōē sumptus. Muliebri profluuium appositus sistit. Aurium doloribus, & purulentis auribus instillatus confert. Cum uino decoctus melle adiecto, eximiē ad genitalium ulcera facit. Folia contra stomachi ardorem, sanguinis reiectionem, herpetas, ignes sacros, inflammationes, oedemata, & uulnera recentia illinuntur.

## EX GALENO.

Polygonū hīs sanē quibus stomachus æstu feruet extrinsecus illitum auxiliatur: ueluti etiam ignes sacros & calidas phlegmonas iuuat. Porro tale cum sit, & fluxiones reprimat, & hac ratione uidetur exiccatorium esse. Quare cum herpetum, tum ulcerum, aliorumq; bonum est remedium: efficacissimū autem inflammatione & fluxione laborantium partium. Est & cruentorum uulnery glutinatoriū. Sed & aurium ulceribus prodest: & si uel satis puris insit, hoc tamen etiam desiccet. Easdem ob facultates & muliebri profluuium, & dysenteria, & sanguinis eiectiones, & undecunque aliunde immoderatiores impetus sistit. Refert Dioscorides quod & urinam prouocet exhibitum stillicidio affectis. Non tamen affectum exactē discriminat in quo dari ipsum expediat.

## EX PLINIO.

Succus eius infusus naribus supprimit sanguinem, & potus cum uino, cuiuslibet partis profluuium excreationesq; cruentas inhibet. Vis eius spissare ac refrigerare. Semen aluum largius sumptum soluit, urinam ciet, rheumatismos cohibet: qui si non fuere, non prodest. Stomachi feruori folia imponuntur. Vesicæ dolori illinuntur, & ignibus sacris. Succus & auribus purulentis instillatur, & oculorū dolori per se. Dabatur & in febribus ante accessiones, duobus cyathis in tertianis quartanisue præcipue. Item cholericis, dysentericis, & in solutione stomachi.

## DE PEGANO CAP. CCXXXV.

## NOMINA.

**P**EGANON κατὰ τὴν γράμιν, Ruta hortensis latine: officinæ retinuerunt nomen latinum: & auten & Weinrauten germanicē uocatur. Peganon Græci, Plutarcho libro tertio sui symposij teste, à facultate, quod calore siccitateq; genituram coagulare, dixerunt: *πινυρδα* enim coagulare, & quasi in glaciem contrahere est. Hinc uterum gestantibus inimica etiam coronis inserta putatur.

## FORMA.

Frutex est Ruta hortensis grauissimi odoris, semper ferē uiuens: folio exiguo, penē rotundo, cæsi coloris, denso, surculosis ramis: flore luteo, angulosis calycibus, in quibus semen album continetur.

## LOCVS.

Prouenit passim in hortis, amat aprica & sicca loca.

## TEMPVS.

Floret æstate, semen autem Autumno maturescit, quo etiam tempore carpendum uenit.

## TEMPERAMENTVM.

Gustu non solum acri, sed & amaro est, ex tertio ordine excalfacientium, & strenuē desiccantium.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vrit, calfacit, exulcerat, urinam mouet, menstruaque ducit. Aluum sistit pota





RUTA HOR  
TENSIS.

Weinraut.



**A** & comesta. Letalium uenenorū antidotum est, si semen acetabuli mensura in uino bibatur. Folia per se ante cibum sumpta, & cum nucibus iuglandibus, aridisq; ficis, inefficacia uenena reddunt. Contra serpentes similiter sumpta profunt. Geniturā tam in cibo quā potu extinguit. Coctum cum anetho sicco, tormina sistit. Facit etiam ad lateris thoracisq; dolores, difficultatē spirandi, tusses, pulmonis inflammationem, coxendicum, articulorumq; cruciatus, rigores circuitibus certis repetentiū febrium, uti prædictū est, pota. Ad inflationes coli, uteri & recti intestini, decocta cum oleo & infusa. Vuluæ strangulatu liberat trita cum melle, si à genitali usq; ad sedem imponatur. Feruēfacta cum oleo & pota, lumbricos excutit. Articulorū doloribus cum melle, aque inter cutem, quæ hyposarca dicitur, cum ficis illinitur. Eisdem pota auxiliatur, in uino decocta ad dimidias partes, & si ea abstergantur. Cruda, saleq; condita ac comesta, uisus aciem exacuit, & oculorū dolores cum polenta illita sedat. Cum rosaceo & aceto capitis doloribus succurrit. Sanguinis narium profluvia trita & imposita sistit. Testium inflammationibus cum Lauri folijs illita, & exanthematis cum myrto & cerato prodest. Cum uino autem, pipere & nitro conficta, albæ uirilgini medetur. Cum isdem illita thymos & myrmecias tollit. Cum melle & alumine imposita lichenibus prodest. Succus in malicorio calfactus & instillatus aurium doloribus succurrit. Oculorū hebetudinibus cum succo Fœniculi & melle inunctus subuenit. Ignes sacros, herpes & achores cum aceto, cerussa & rosaceo inunctus sanat. Ceparum & alliorum acrimoniam cōmanducata domat.

## EX GALENO.

Ruta incidere atque digerere crassos lentosq; humores potest. Ob eam autem uim & urinas mouet. Quinetiā tenuium est partiū, flatusq; extinguit. Quare ad inflationes prodest, ac Veneris appetitum cohibet. Discutit atq; exiccat strenuē: est enim ex eorum medicamentorū numero quæ ualenter exiccant.

## EX PLINIO.

Quęcunq; Ruta & per se pro antidoto ualet, folijs tritis & ex uino sumptis. Contra aconitū maximē & ixiā. Item fungos, siue in potu detur, siue in cibo. Simili modo contra serpentū ictus, utpote quū mustelæ dimicaturæ cum his, Rutam prius edendo se muniant. Valent & cōtra scorpionū ictus, & araneorū, apum, crabronū, uesparū aculeos, & cantharidas, ac salamandras, canisue rabiosi morsus, acetabuli mensura si succus ē uino bibitur, & folia trita uel cōmanducata imponunt cum melle & sale, uel cum aceto & pice decocta. Succo uerò perunctos, aut etiā habentes, negant feriri ab his maleficijs. Serpentesq; si uratur Ruta, nidorem fugere. Efficacissima tamen est syluestris radix cum uino sumpta: eandem adiūciunt efficaciorē esse sub dio potam. Pythagoras oculis noxiam putauit falso, quoniam sculptores & pictores hoc cibo utuntur oculorū causa. Cum pane quoq; uel nasturtio satiuæ atq; syluestris propter uisum. Ut aiunt, multi succo eius cum melle attrito inuncti discusserunt caligines, uel cum lacte mulieris puerum enixæ, uel puro succo angulis oculorū tactis. Epiphoras cum polenta imposito. Lenit autem capitis dolores pota cum uino, aut cum aceto & rosaceo illita. Si uerò sint cephalæa, cum farina hordeacea, uel aceto. Eadem cruditates discutit, mox inflationes, dolores stomachi ueteres. Vuluas aperit, corrigitq; conuersas, illita in melle toto uentre & pectore. Hydropticis cum ficu, & decocta ad dimidias partes, potaq; ex uino. Sic bibitur & ad pectoris dolores laterumq; & lumborū, tusses, suspiria: pulmonū, iecinorū, renum uitia: horrores frigidos. Ad crapulæ grauedines decoquuntur folia poturis. Et in cibo uel cruda uel decocta conditæue prodest. Item torminibus in Hyssopo decocta, & cum uino. Sic & sanguinem sistit interiorem, & narium, indita: sic & collutis dentibus prodest. Auribus quoque in dolore succus infunditur, custodito ut diximus modo. E syluestri uerò contra tarditatē & sonitum cum rosaceo, uel cum lau-



reo oleo, aut cumino & melle. Succus & phreneticis ex aceto tritæ instillatur in tempora & cerebrum. Adiecerunt aliqui & Serpyllum, & Laurum, illinentes capita & colla. Dederunt & lethargicis ex aceto olfaciendū. Dederunt & comitialibus bibendum decoctæ succum in cyathis quatuor ante accessiones, quarum frigus intolerabile est. Alsiolisq̃ crudam dari in cibo. Vrinam quoque uel cruentam pellit. Fecundinarū etiam purgationes, secundasq̃, etiam emortuos partus, ut Hippocrati uidetur, ex uino dulci nigro pota. Itaque illitam & uuluarum causa etiam suffire iubet. Diocles & cardiacis imponit ex aceto & melle cum farina hordeacea. Et contra ileum decoctæ farina in oleo, & uelleribus collecta. Multi uerò & contra purulentas excreationes siccæ drachmas duas, sulphuris unam & dimidiam sumi censent. Et contra cruentas, ramos tres in uino decoctos. Datur & dysentericis cum caseo in uino contrita. Dederunt & cum bitumine infrictam potioni propter anhelitum. Ex alto lapsis feminis tres uncias, ex olei libra, uiniq̃ sextario. Illinitur cum oleo coctis folijs partibus quas frigus adusserit. Si urinam mouet, ut Hippocrati uidetur, mirum est quosdam dare uelut inhibentem potui contra incontinentiā urinæ. Psoras & lepras cū melle & alumine illita emendat. Item uutiligines uel rugas, strumas, & similia, cum hircino & adipe suillo, ac taurino seuo. Item ignem sacrum ex aceto & oleo, uel psimmythio. Carbunculum ex aceto. Nonnulli laserpitiū unā illini iubent, sine quo epinyctidas pustulas curant. Imponunt & mammis turgentibus decoctam, & pituitæ eruptionibus cum cera. Testium uerò epiphoris cum ramis laureæ teneris, adeò peculiari in uisceribus his effectu, ut syluestri Ruta cum axungia ueteri illitos ramices sanari prodant. Fracta quoque membra semine trito cum cera imposito. Radix Rutæ sanguinem oculis suffusum, & in toto corpore cicatrices aut maculas illita emendat. Ex reliquis quoque quæ traduntur, mirum est, cum feruentem Rutæ naturam esse conueniat, fasciculum eius in rosaceo decoctum addita uncia aloës, perunctis sudorē reprimere. Itemq̃ generationes impediri hoc cibo, ideo profluuiio genitali datur, & Venerē crebrò per somnia imaginantibus. Præcauendum est grauidis, abstineant hoc cibo, necari enim partus inuenio. Eadem ex omnibus satis quadrupedū quoq̃ morbis in maximo usu est, siue difficilè spirantibus, siue contra maleficorum animalium ictus, infusa per nares ex uino: aut si sanguisugam exhauserit, ex aceto, & quocunque in simili morborum genere, ut in homine temperato.

## EX SYMEONE SETHI.

Incidit crassos & tenaces humores, perq̃ urinam uacuat, & ad inflationes conducit, appetentiamq̃ Veneris compescit, ac strenuè exiccat. Ad inflatas aquas inter ceterum, & anasarcam, morfos à uipera, succum Papaueris aut aconitum bibentes, colicosq̃, pota & iniecta. Traditur quod comesta uisum acuet, ob id antiqui pictores hanc assidue degustabant. Nonnulli & succum eius melli cōmiscentes, medicamentum ad oculorū aciem acuendam cōficiunt. Succurrit difficultati urinæ si cum oleo coquatur, & ea uesica foueatur. Item difficulter spirantes cum melle data, confestim iuuat. Lethargicis pota, & per clysteres iniecta remedium fit. Intestina corroborat, non solum caliditate, sed proprietate quadā. Fertur etiam quod si prægnans mulier ex eius succo bibat, abortiat. Et si in dies quindecim folia assumat, idem facit. Obstructiones iecoris & lienis tollit. Si ieiunus quisquam ipsam assumpserit, eo die à ueneno non lædetur.





POTENTILLA

Genserich.

ff 4



Potentilla.  
Tanacetum syl-  
uestre.



VO nomine Græci & Latini hanc herbam appellarint, à nullo, quod sciam, adhuc proditum est. Recentiores herbarij Potentillam, aliqui ob similitudinē Agrimoniam & Tanacetum syluestre nuncupant. Germani, quod herba illa anseres in cibo delectentur, Genserich uocant.

## FORMA.

Herba Eupatorio, quod Agrimoniam hodie uocant, haud dissimilis. Caules ex una radice multos profert, humi stratos. Folia Eupatorio similia, supernè uiridia, infernè candicantia. Flores luteos singulari pediculo pendentes. Radicē extrinsecus rufescentem, intus candidam.

## LOCVS.

Nascitur passim circa semitas & loca aquosa, atque in fluuiorum ripis ac marginibus.

## TEMPVS.

Æstate floret, quo etiam tempore legi debet.

## TEMPERAMENTVM.

Potentilla nō est  
humida.

Quum folia eius & radix adstringant, temperamento à Pentaphyllo seu Quinquefolio nihil differre uidetur. Quare hæc, potissimum autem eius radix, ex tertio ordine desiccatoria est, minimumq; euidentis caliditatis habet. Errant itaq; mirum in modum recentiores, qui hanc humidam esse statuunt, nulla alia moti ratione quàm quod in humidis locis proueniat: quasi uerò Nasturtium aquaticum, quod Sisymbrium cardamine Dioscoridi uocatur, haud obstante quod in aquosis nascitur, non etiam in tertio desiccet ordine. Debuisset certè illos ab hac sententia deterere non leuis illa adstrictio, quæ certissimus est siccitatis index: adstringentia enim, Galeno libro quarto de simpli. medicament. facult. capite sexto teste, terrena sunt & crassa corporis consistentia, atque adeo sicca.

## VIRE S.

Recentiores Potentillā fluxionibus & puncturis oculorū prodesse, recentia uulnera glutinare, & exedentia sanare, mulierū menstrua cōpescere, artus & membra cōfirmare, rectè tradunt: nam id ipsum posse, adstrictio, quæ in hac herba haud modica est, abundè docet. Et cum habeat Quinquefolij temperamentū, eius etiam facultates obtineat necesse est. Dentiū itaq; dolorē finit. Exedentia oris ulcera sanat. Dysentericis & alui profluuijs, coxendicis articulorumq; doloribus subuenit. Sanguinis eruptiones sistit, aliāq; potest quæ à Dioscoride Quinquefolio tribuuntur. Quod uerò adijciunt hanc etiā lumbricos exterminare posse, id minus rectè faciūt. Ea siquidem facultas non huic, sed illi inest herbæ quæ uerè Tanacetū dicitur, quæ

Herbarij Potentillam cum Tanacetum confuderūt.

quidem est tertia, ut suo diximus loco, Artemisiæ species. Proinde non sine magno errore, Potentillam cum ea quæ propriè Tanacetum uocatur herba confuderunt.





PRUNELLA

Brauncellen.



C

## NOMINA.

Prunella.



ONDVM nobis constat quo nomine hæc herba ueteribus tum Græcis tum Latinis appellata sit. Vulgus tamen medicorū & herbariorū Prunellam nominant. Germani Braunnellen oder Gottheyl.

## FORMA.

Caulēs habet in medio striatos, pingues & hirsutos: folia Ocimo similia, coloris herbacei, & acuminata. Flores in summis caulibus spicatos, Lauandulæ uocatę herbæ non dissimiles. Radicem tenuem, multis capillamentis fibratam.

## LOCVS.

Nascitur passim in pratis.

## TEMPVS.

Maiō & Iunio mensibus floret.

## TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse constat, id quod ex gustu patet: glutinosa enim admodū, & modicē amara est.

## VIREs.

Vulnerariam esse herbam euidentissimū est. Succum eius cum aceto & rosaceo mixtum, uehementes capitis dolores sedare recentiores uno consensu tradunt, si tempora ex eo inungantur. Aphthas & oris ulcera, fauciumq; uitia succus eiusdem sanat.

## DE PENTAPHYLLO CAP. CCXXXVIII

## NOMINA.

Quinquefolium  
unde dictum.



PENTAPHYLLON Græcis, Quinquefoliū Latinis & officinis, Germanis Fünfffingerkraut/oder Fünffblatt appellatur. Nomen à numero foliorū habet: in unoquoq; enim pediculo quinq; esse deprehendunt.

## GENERA.

Maius Pentas  
phyllon.

Minus.

Erst Dioscorides unum duntaxat Pentaphylli genus faciat, tamē nos ad nostras respicientes terras tria eius genera in uniuersum produximus. Vnū quod maius appellauimus, prorsus ad Dioscoridis picturā accedēs, ut hoc nomine uerū esse Quinquefoliū putemus. Estq; duū generū: unum quod pallidos seu candidos flores obtinet, hinc est quod Quinquefoliū maius candidum appellauerimus, Germanicē groß weiß Fünff fingerkraut. Alterum floribus ornatur auri colorē æmulantibus, seu luteis. Nos ut discernere mus à priori, Quinquefoliū maius luteum nominauimus. Dioscorides etiā hæc duo genera innuere uidetur, cum inquit florem habere uel candidum uel auri æmulū. Tertiū minus diximus, quod priori haud dissimile est, non tamen passim ut illud quinque folia obtinens. Hoc, cum non haberemus aliud nomen quo ipsum appellaremus, inter Quinquefolij genera connumerare placuit. Videtur uerò Hippocrates etiam duo Quinquefolij genera nouisse, unū humilior, alterū procerius, ut hoc nomine nobis etiā liceat minus & maius statuere.

## FORMA.

Maius Quinque  
folium est uerum  
Pentaphyllon.

Ramulos habet festucarū instar graciles, dodrantes, & in ijs semen. Folia Menthae similia, in singulis pediculis quina, rarò plura, per ambitum serræ modo incisa: florem in candido pallidum, auri æmulū. Radicem subrubrā, oblongam, Elleboro nigro crassiorē. Ex qua sanè descriptione omnibus liquet, maius Quinquefoliū esse legitimum. Ex una siquidem radice subrubra & oblonga, ramulos profert tenues, ac prorsus festucaceos, & in ijs semen, folia Menthae, quina in singulis pediculis, per ambitum serræ modo crenata, florem luteum, aut aureum. Quibus accedūt natalis locus (in riguis enim nascitur) & immensa adstringendi facultas: quæ quidem singula ue-





QVINQVEFOLIUM  
MAIVS CANDIDVM.

Groß weiß Fünffingerkraut.



624

QVINQVEFOLIUM  
MAIVS LVTEVM.

Groß Fünffingerkraut.







QVINQVEFO  
LIVM MINVS

Klein Fünffingerkraut.



Cigula uerum esse Quinquefoliū docent. Adeoq̃ mirari satis non possum, cur non nulli adulterina hæc esse Pentaphylla sibi persuaferint.

## LOCVS.

Prouenit aquosis locis, & iuxta aquaductus. Interdum etiam in incultis, siccis & arenosis locis.

## TEMPVS.

Floret Maio & Iunio mensibus potissimum.

## TEMPERAMENTVM.

Vtriusq̃ certè folia, flores & radices uehementer adstringunt: atque adeo, ut Galenus ait, radix, cuius multus est usus, ex tertio est ordine desiccantiū, minimum habens euidentis caliditatis.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radice Quinquefolij decoctum ad tertias depressum deductūm ue, si in ore retineatur, dentium dolores sedat. Putrescentia oris ulcera collutione sistit. Arteriarum asperitates gargarizatum emendat. Contra alui profluvia, & dysenterias auxiliatur. Item articulorum & coxendicū dolores potum sanat. Cocta in aceto & illita, herpetas cohibet. Strumas discutit, duritias, cedemata, aneurysmata, abscessus, erysipelas, digitorum pterygia, condylomata, scabiesq̃ sanat. Teneræ radice succus, contra iccinoris pulmonisq̃ affectiones & uenena prodest. Folia cum hydromelite, aut uino diluto, & exiguo pipere, contra febrium circuitus bibuntur: in quartana quidem quaternorum ramulorum folia, in tertiana uerò trium, in quotidiana unius. Tricenis diebus pota comitiali morbo medentur. Succus foliorū per dies aliquot triū cyathorum mensura potus, celeriter regium morbum sanat. Vulneribus ac fistulis cum sale & melle illita medentur. Enterocelicis, id est, intestinorum ramice laborantibus succurrunt. Sanguinis eruptiones potum & illitum Quinquefoliū sistit. Inciditur ad expiationes lustrationesue, sanguinis profluvia & castimonias.

## EX GALENO.

Pentaphylli radix desiccatur uehementer, minimum uerò acris est: quare in multo est usu, uelut alia quoque omnia, quæ quum sint tenuium partium, citra morsum desiccant.

## EX PLINIO.

Quinquefoliū adhibetur purgandis domibus. Strumis medetur, & pectoris uitis. Idem ischiadicis bibitur & imponitur. Panos sanat. Impositū articulis utilissimum. Fistulis quæ in omni parte serpunt auxilio est cum sale & melle. Phalangio aduersatur, lichenas emendat. Succus de Quinquefolio potus cyathis tribus angine medetur. Idem iccinoris & pulmonis uitis, sanguinemq̃ reiicientibus, cuicunq̃ sanguinis uitio intus occurrit. Multi supra omnia laudant ad deploratos dysentericos Quinquefoliū, decoctis in lacte radicibus & potis. Item decoctum ad tertias in uino ictericis dari atq̃ illini utilissimū est. Eius folia ex aqua comitiales sanant. Item contrita ex uino sumpta triginta diebus in betonica farina pondo denariorum tredecim cum aceti scillitici cyatho, comitialibus morbis liberant. Celerrimè succus regio morbo medetur, tribus cyathis cum sale & melle potus. Quinquefolij folia quidam terna tertianis dedere, quaterna quartanis, plura cæteris, omnibus obolis tribus cum pipere ex

aqua mulla.

DE PISIS.





627

PISUM  
Gros Erbß.

gg 2



C

## NOMINA.

Pisum quare  
dictum.

ΠΙΣΟΝ, ἡ λεγόμενα græcè, Pisum latinè dicitur. Officinis hoc nomine notum. Germanicè Erbß/oder Erweyßsen. Sic autem à Pisa loco in quo olim copiosissimè nascebatur, nominatum est.

## GENERA.

Duo apud nos genera Pisorum reperiuntur. Vnum in aruis caducū, humi serpens, quod genus Germani Klein feld Erweyßsen nominant. Huius, utpote vulgaris, picturam haud damus. Alterum in altum scandit, arboribus aut palis quibus accubet adfixis, quibus sese capreolis uinciens illigat. Hoc Germani groß garten Erweyßsen uocant. Genus hoc pictum exhibemus.

## FORMA.

Caules in terram spargit concauos, ramososq; prætenui surculo: folio frequenti præter cæterorū morem longiusculo: flore papilionis forma, circa umbilicum purpureo: siliqua oblonga seu cylindracea: granis rotundis, & ut Plinius lib. xviij. capite xij. ait, angulos multos inæquales habentibus: radice imbecilla: ut mirari satis non possim, unde plerisq; suspicio orta sit, ut Pisum nostrum legitimum esse dubitauerint. Scio autē esse qui legumen hoc quod hodie passim Pisum appellatur, putent esse Cicer arietinū, quod scilicet ualuulæ seu siliquæ eius cornu arietini formā habeant. Quorum certè sententiam probare non possum, quòd, Plinio teste, Cicer arietinū sic non sit dictum quia ualuulæ effigiē arietini cornu exprimant, sed quia legumen ipsum seu granum Ciceris arietino capiti simile sit. Eam autem formā legumen hoc quod Pisum nominamus non refert.

## LOCVS.

Apricis gaudet locis, frigorū nancq; impatientissimū. Tepidum itaque locum, & cœlum frequentis humoris desiderat.

## TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, & subinde etiā semina in ualuulis profert.

## TEMPERAMENTVM.

Quū Pisum simile quid tota substantia cum faba, ut testatur Galenus, obtineat, necesse est ut non multum à medio temperamento in refrigerando & exiccando recedat.

## VIRESEXGALENO.

Simile quid tota substantia cum fabis obtinent Pisa, nec alio quàm illæ modo manduntur. In duobus autem euariant. Non enim similiter ac fabæ inflant, nec abstergendi facultatē habent, ideoq; segnius quàm illæ per aluum secedunt.

## EXPAVLO.

Pisum molle quidem & laxum est, non tamen adeò inflat.

## DE POLYTRICHO APVLEIANO

## CAP. CCXL.

## NOMINA.

Polytrichū Apu-  
leij cur dictum.

NON temerè adiectū est Apuleij, ne scilicet quispiam Dioscoridis & aliorum Græcorum intelligeret Polytrichon, quod sanè forma ab eo quod nunc describimus alienissimū est. Germanicè à colore aureo quam habet, guldiner Widerthron uocatur. Officinis incognita est hæc herba. Polytrichon dicta est à ramulis, qui capillorum instar tenues sunt.

## GENERA.



A

## G E N E R A.

Duo Polytrichi Apuleiani damus genera. Vnum maius, alterum minus: neque enim differunt nisi sola magnitudine.

## F O R M A.

Ramulos habet capillorum instar tenues, colore aurum referentes, circumque hos folia multa capillacea, in summo capitula lentis aquaticae ferè forma, eiusdem cum ramulis coloris.

## L O C V S.

Maius nascitur in pratis humidis & uliginosis. Minus in petris ac muris humidis.

## T E M P V S.

Mense Iulio utrumque reperitur.

## T E M P E R A M E N T V M.

In caliditate & frigiditate symmetra sunt: desiccant tamen, extenuant & digerunt.

## V I R E S.

Decoctum eorundem in aqua aut lixiuia capillorum radices firmat, ideoque in alopecia caput glabrum capillis uestit. Potum, uiscosorum crassorumque est thorace pulmoneque excreationibus non mediocriter confert: lapides frangit, & urinas ducit. Morbo regio correptis & lienosis auxiliatur. Strumas discutit, & in summa eadem quae Adiantum potest. Recentiores superstitione quadam ducti, illis multa ridicula & incredibilia tribuunt.

*Maius Polytrichum Apuleij.*

Das groß guldin Widerthon.



*Minus Polytrichum Apuleij.*

Das klein guldin Widerthon.







PERSICARIA

Flohkraut.



A

## NOMINA.



ON clām me est quā uariē à multis diuinatum sit, quo nomine Persicaria uocata ueterib. sit. Sed mea quidē sententia, in uniuersum omnes coniecturis usi non satis firmis, decepti sunt. Et ego quidem fateor ingenuē, nec mihi constare num à ueteribus descripta sit, tantum abest ut scire queam quo illam appellauerint nomine. Vulgus herbariorū uno consensu hodie, quod folia Persicæ habeat, Persicariā nominant. Germani *Blöhkr aut.*

*Persicaria.**Persicaria unde dicta.*

## FORMA.

Folia Persicæ arboris habet, fusca in medio macula plumbaginēue: caule geniculato, rubente, longo: flore spicaceo, primū candido, dehinc purpureo: semine minuto, radice lutea, numerosa.

## LOCVS.

In humidis & palustribus locis frequentius prouenit.

## TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floribus ornatur.

## TEMPERAMENTVM.

Frigidam & admodum siccam esse gustus abundē monstrat: mirificē enim gustata adstringit.

## VIREs.

Vulnerariam herbam esse temperamentū eius satis docet. Recte itaq; iuniores medici in uulneribus, & maximē fistulis curandis utuntur. Vtilis haud dubiē in dysenteria, alijsq; malis quæ refrigerationē & adstrictionem requirunt.

## B DE PERFOLIATA CAP. CCXLII

## NOMINA.



Nhæc herba ueteribus cognita fuerit Græcis & Latinis, affirmare certō non possum. Ego planē Cotyledonem putarem Dioscoridis, nisi radix in diuersam me traheret sententiam, quæ oliuæ instar rotunda non est. Hodie tamen, quod caulis eius singula folia dissecat atq; penetrat, Perfoliata ab omnibus appellatur. Germanicē *Durchwachs* & *Bruchwurz* dicitur.

*Perfoliata cur dicta.*

## FORMA.

Caulis illi rotundus, rubescens, folia singula penetrans, quæ Pisorum folijs haud dissimilia sunt, tenuia admodum & glabra. In summo coliculorum capitula, & in ijs flores lutei, & semina formam ferē Tithymalli, quam uulgo Esulam nominant, præ se ferentia. Radix candida, fibris capillata.

## LOCVS.

Nascitur in hortis sata, & interdum sua sponte in arenosis locis prouenit.

## TEMPVS.

Floret Iulio mense, & subinde semina producit.

## TEMPERAMENTVM.

Amara modicē est & adstringit, ut hinc colligi liceat calidam & siccam esse.

## VIREs.

Vulneribus & ulceribus tam externis quā internis curandis aptissima est herba: hæc enim glutinat. Valet autem potissimum ad ramices puerorum sanandos. Auxiliatur etiam exulcerationibus & prominentijs umbilici. Plurimus huius apud chirurgos usus.



632

PERFOLIATUM

Durchwachs.





A

## NOMINA.



PAZON Græcis, Porrum Latinis & officinis, Germanis Lauch appellatur. Porrum autem dictum putant, quod porrò eat, & longè lateq; grassetur.

Porrum unde dictum.

## GENERA.

Porri duo genera signauit antiquitas. Vnum capitatum, sic nominatum quod eius radix in caput increseat atque extuberet. Alterum sectiuum, cui frondens coma super terram eminens auferitur amputaturue. Hoc Germani pulchrè ad nomen latinum alludentes, Schnittlauch nominant, & Bryßlauch.

Capitatum Porrum.  
Sectiuum.

## FORMA.

Capitatum simplici capite ex albæ ceruicis angustis extuberante constat, fronde super terram carinata, & in angulum oblonga. Sectiuo uerò caulis est longus, intus cauus, multis in uertice floribus aceruatim collectis, & in specie absoluti orbis conglomeratis, id quod in bimo accidit: quod etiam sementescit, sparso per eius cacumen semine, & emoritur. Radix candicans, crassa, multis fibris capillata, ac tunicis quibusdam uestita.

## LOCVS.

Læto solo gaudet, odit rigua.

## TEMPVS.

Duodeuigesimo die à satū prorumpit, bimatumq; perfert.

## TEMPERAMENTVM.

Calefacit & extenuat perinde atque cepa, ut ex eius facultatibus euidentius innotescet. Symeon Sethi calidum & siccum in secundo facit ordine.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Porrum capitatum inflationē facit. Noxium succum creat, difficilia in somnia parit. Vrinam citet. Aluo accommodum. Extenuat. Oculorum obscuritatē facit. Menses pellit, uesicam exulceratā, renesq; lædit. Cum ptisana uerò coctum & comestū, ea quæ in thorace sunt educit. Coma eius in aqua maris & aceto cocta, in defelsionibus ad præclusiones uulvæ & duritias, utilis habetur. Vna & altera aqua coctū, aut aqua frigida maceratum, dulcescit, & multò minus inflat. Semen acrius est, & quandam adstrictoriā uim habet. Quare succus eius cum aceto, addito thure aut manna, sanguinem, maximè è naribus prorumpentē, sistit. Venerē stimulat. Contra omnia thoracis uitia pro delinctu efficax est, & ad tabem comestū. Purgat etiam arteriam. Sed si assidue estur, uisus obscuritatē inducit. Stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, contra bestiarū morsus auxilio est. Idem quoque illitus potest. Cum aceto, thure & lacte, aut rosaceo instillatus, aurium doloribus & sonitui prodest. Varos tollunt folia, cum rhoë obsoniorum illita. Epinyctidi medentur. Cruetas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis reiectiones cohibent seminis drachmæ binæ cum æquali baccarum Myrti pondere potæ.

## EX GALENO.

Corpus calefacit, & crassos in eo humores extenuat, glutinososq; incidit. Bis tamen aut ter in aqua decoctum, acrimonia spoliatur: quanquam ne sic quidem uim perdit extenuandi.

## EX AETIO.

Porri capitati acris saporis ueluti & cepe sunt, cuius ratione corpus calefaciunt, crassosq; humores attenuant, ac lentos incidunt, urinam prouocant, sanguinē purgant. Præstantissimus usus eorum qui bis coquuntur: ita enim acrimoniam deponunt, neque amplius deprauatum succum retinent.

## EX PAVLO.

Porrū mali succi est & acre. Vt autē Dioscorides ait, grauia facit in somnia, aluūq; bonam, urinā cit & extenuat. Habet & abstergerendi uim aliquā, cum ptisana: siquidem




PORRVM CA  
PITATVM.

Lauch.







PORRUM SE-  
CTIVUM

Schnittlauch.



**C** dem coctum, ea quæ in thorace sunt educit. Semen uerò eius nephriticis miscetur medicamentis. Folia etiam nonnihil adstringunt, ob eamque causam succus ipsorum sanguineum supprimit.

## EX PLINIO.

Porro sectiuo profluuia sanguinis sisti in naribus, contrito eo obturatis, uel gal-  
la mixto, aut menthæ. Item ex abortu profluuia, potio succo cum lacte mulierum.  
Tussi etiam ueteri, ac pectoris & pulmonis uitij medetur. Illitis folijs sanantur am-  
busta, epinyctides: ita uocatur ulcus aciem hebetans, & in angulo oculi perpetim  
humor emanans. Quidam eodem nomine appellat pustulas liuentes, ac noctibus  
inquietantes. Et alia ulcera cum melle trito. Vel bestiarum morsus ex aceto. Item ser-  
pentium. Aurium uerò uitia cum felle caprino, uel pari mensura mulsi. Stridores  
cum lacte mulieris. Capitis dolores, si in nares fundatur, dormiturisue in aurem,  
duobus succi cochlearibus, uno mellis. Succus & ad serpentium scorpionumque ictus  
in potu bibitur cum mero, & ad lumborum dolores cum uini hemina potus. Sangui-  
nem uerò excreantibus & phthisicis, destillationibus longis, uel succus, uel ex ipso  
cibus prodest. Item morbo regio, uel hydropicis. Et ad renum dolores, cum ptisa-  
næ succo acetabuli mensura. Idem modus cum melle, uulvas purgat. Tostus uerò  
editur & contra fungorum uenena, imponitur & uulneribus. Venerem stimulat,  
sitim sedat, ebrietatem discutit. Sed oculorum aciem hebetare traditur, inflationem quo-  
que facere, quæ tamen stomacho non noceat, uentremque molliat. Capitato maior  
est ad eadem effectus. Sanguinem reiicientibus succus eius cum caule aut thuris fa-  
rina, uel acacia datur. Hippocrates & sine alia mixtura dari iubet, uulvasque contra-  
ctas aperiri putat. Fecunditatem etiam foeminarum hoc cibo augeri. Contritum ex  
melle ulcera purgare. Tussim & destillationes thoracis. Pulmonis & arteriæ sanat  
**D** uitia, datum in sorbitione ptisanæ: uel crudum, præter capita, sine pane, ita ut alter-  
nis diebus sumatur: uel si purulenta excreantur. Sic uoci uel Veneri, somnoque mul-  
tum confert. Capita bis aqua mutata cocta, aluum sistunt, & inflationes ueteres.  
Cortex decoctus illitusque, inficit canos.

## EX SYMEONE SETHI.

Vrinam cit, & mali succi est. Assidue comestum uisus hebetudinem efficit. Diffici-  
lia inuehit somnia, & stomacho nocet. Semen genitale calefacit, & capitis dolores  
excitat. Iecur, renes & uesicam lædit. Confert ad hæmorrhoidas. Bis uerò aqua  
coctum, & aceto, garo & oleo, cuminoque conditum, salubre est ijs qui frigido sunt  
stomacho.

## DE PULMONARIA CAP. CCXLIII.

## NOMINA.



Pulmonaria est  
nominata.

**V**t ueteribus Græcis & Latinis nominata sit hæc herba, nondum scire  
licuit. Hodierni temporis medici & herbarij Pulmonariam uocant,  
Germani Lungenkraut. Sic autem haud dubie appellari cepit, quod  
pulmonum uitij, exulcerationibus potissimum eorundem, præbens  
remedium sit.

## FORMA.

Folia mollia habet, inuicem incumbens, leniter laciniata, cauis multis prædita,  
superiore parte uiridia, inferiore in luteo albicantia, ac ueluti punctis aut pustulis  
quibusdam notata, atque hoc nomine aliquam pulmonis humani formam referentia:  
unde etiam Pulmonariam dictam esse conijcimus.

## LOCVS.

Prouenit in quercu arbore, & saxosis locis.

## TEMPVS.





PVLMONARIA

Lungenkraut.



C

## TEMPVS.

Tota æstate inuenitur locis iam monstratis.

## TEMPERAMENTVM.

Recentiores frigidam & humidam esse, mea quidem sententia, falso statuūt: admodum enim adstringit, ut hoc nomine idem cum quercu in qua nascitur habeat temperamentum. Desiccatur itaque & paulò infra media calefacit, in genere eorum quæ tepida sunt.

## VIRE S.

Desiccandi & adstringendi facultatem obtinet, quamobrem uulnera recentia glutinat, potissimum autem pulmonis. Ad incipientes quoque ac crescentes phlegmonas utilis: nam quæ iam uehementes sunt, adstringentia respuunt. Confert autem haud dubiè etiam ad muliebri profluuium, & sanguinis expuitiones, & diuturnos alui fluores.

## DE PTARMICE CAP. CCXLV.

## NOMINA.

Sternutamentaria.  
Syluestre Pyrethrum.



Ptarmice cur  
dicta.

PTARMIKH Græcis, Sternutamentaria Latinis dici potest. Sunt qui syluestre Pyrethrum nomenclant, quod scilicet Pyrethri modo, quanquam mitius, linguam uellicet. Atque hinc est quod nonnulli pro uero Pyrethro, seducti eius titillante acrimonia, descripserint. Germanis wilder Bertram appellari potest. Ptarmice dicta est, quod flores eius naribus obiecti sternutamenta eliciunt.

D

## FORMA.

Breuis frutex est, paruis, multis, teretibus, & Abrotono similibus ramulis, circa quos folia multa, oblonga, oleaginis similia. In summo Chamæmeli capitulū, paruum, rotundum, olfactu acre, sternutamenta ciens, unde & nomen inuenit. Hactenus Dioscorides. Quod si itaq; naturam atque imaginem eius fruticis rectè expendas, undiquaq; ei plantæ cuius picturā damus, hæc descriptio quadrabit. Nam surculis fruticat exiguis, multis, rotundis, Abrotono non dissimilibus, lentè rufescentibus, qui folijs frequentibus, longiusculis, oleæ similibus, angustis, utrinq; leniter serratis ambiuntur, cacumine Anthemidis umbellam obtinente, quæ acri suo odore nares feriens sternutamentum irritat.

## LOCVS.

Inuenitur sæpius in montibus altis & saxosis locis.

## TEMPVS.

Floret æstate: radix eius extremo effoditur autumnno.

## TEMPERAMENTVM.

Eius temperies est calida & sicca, uiridis etiamnū ordine secundo, siccata tertio.

## VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Folia cum floribus illita sugillata emendare possunt. Flores sternutamenta efficacissimè mouent.

## EX GALENO.

Ptarmices flores ciendæ sternutationis uim obtinent, unde & herbæ nomen. Sugillata & reliquas ecchymoses discutit.

## EX PAVLO.

Ptarmices folia sternutamenta mouent. Totus autem frutex uiridis sugillata, liuoresq; alios dissipat.





639

PTARMICE

Wilder Bertram.

hh 2



## NOMINA.

Pyrethron cur  
dictum,  
Saliuaris herba  
quare nominata.



ΠΥΡΕΘΡΟΝ græcè, Saliuaris latinè dicitur. Officinæ græcam appellationem retinuerunt. Germanicè Bertram nominatur. Pyrethron autem à feruido, ac ignis simili, qui in eius radice est sapore, Græci dixerūt. Saliuaris uerò, quod mansa uel ore tantum detenta eius radix, copiosam saliuam eliciat, Romanis appellata est.

## FORMA.

Pyrethrum nos-  
trum Parmicis  
flores obtinet.

Herba est caulem foliaq̃ syluestris Dauci, & Fœniculi instar proferens. Umbellam Anetho similem orbiculatam. Radicem pollicis crassitudine, longam, sapore feruidissimā. Hæc Dioscorides. Vbi nobis monendus uenit lector, Pyrethrum nostri soli non ex omni parte huic descriptioni respondere. Non enim umbellam anetho similem, sed anthemidis potius orbiculatum capitulum, quod Parmici tribuit Dioscorides, habere deprehenditur. Cætera omnia adamussim respondent. Siquidem habet Pyrethrum caules & folia Dauci syluestris & Fœniculi, radicem pollicis crassitudine, gustus ardentissimi.

## LOCVS.

In Germania nostra, quod sciam, non nisi plantatum prouenit.

## TEMPVS.

Floret æstatis maxima parte.

## TEMPERAMENTVM.

Excalfacit & siccatur in tertio ordine, uel ut aliqui putant, in quarto.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Pituitā elicit radix: ideoq̃ dentium doloribus decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur. Mansa pituitam extrahit. Sudores ciet, inuncta ex oleo. Diuturnis rigoribus efficax. Contra refrigeratas partes corporis ac resolutas eximiè conducit.

## EX GALENO.

Pyrethri radice potissimū utimur urentem facultatem obtinente, qua utiq̃ dentium etiam refrigerantium dolores mitigat. Et ad rigores ante circuitum cum oleo infricatur. Ad hæc stupidos & resolutos adiuuat.

## EX PAVLO.

Pyrethri radix adurentem potestatem occupat, dentium qui frigori patuerunt dolores lenit. Item ad febrium rigores ante circuitum infricatur cum oleo. Ad hæc ijs quorum corpora ex refrigeratione stupent, & resoluta sunt, efficacissimè adhibetur.





PYRETHRUM

Bertram.

hh 3



642

BVXVS

Buchbaum.





A

## NOMINA.



ΜΥΞΟΞ Græcis, Buxus Latinis, Germanis Buchsbaum dicitur.

## FORMA.

Arbor immortalis coma uirens: folio Myrti, exiguo, subrotundo: flore herbaceo: semine rufo & rotundo, omnibus animantibus inuiso.

## LOCVS.

Gaudet frigidis & apricis, plurimamq; ubiq; Buxus.

## TEMPVS.

Perpetua fronde uiret, neque ei ullo tempore decidunt folia. Quo nomine potissimum hanc celebrat germanica illa cantilena, eiusdem ac Salicis contentionem continens.

## TEMPERAMENTVM.

Recentiores temperatam eius arboris essentiam esse statuunt, id quod ob multas causas, quas recensere superuacuum est, non uidetur uerisimile. Haud dubie uero adstringit, atque adeo exiccat.

## VIRE S.

Non admodum magnus. Buxi in medicina usus est. Folio eius in lixiuio decocto rufant, aut flauescere efficiunt capillos. Scobem eius decoctam in aqua alui profluuium sanare tradunt. Somnum capere sub hac arbore, cerebro uehementer incommodat, quod eius odor naturæ prorsus aduersetur. Ferunt serpentes uulneratas eius radice degustata, statim sanitatem recuperare.

## DE PETASITE CAP. CCXLVIII

B

## NOMINA.



ΠΕΤΑΣΙΤΗΣ Græcis, Petasites Latinis appellatur. Officinis penitus ignota. Germanis Pestilenzwurz nominatur, quod nimirum eius radix presentaneum sit contra pestilentialia febres remedium. Petasites autem à petaso, pileum significante, dicta est, quod folium eius pediculo superpositum, petasi modo amplum, ut fungus dependeat.

Petasites quare dicta.

## FORMA.

Pediculus est cubito maior, crassitudine pollicis, in quo petasi figura folium magnum, ut fungus dependet. Ex qua sanè descriptione satis perspicuum sit, herbam cuius picturam damus esse Petasiten. Hæc enim statim inter initia Martij, flores suos in albo purpureos, agglomeratos, & botri figuram referentes profert, citra quidem folia, quod Dioscorides omisit. Hi marcescentes sine fructu abeunt ac decidunt. Postea purpureos emittit pediculos, cauos, hirsutos, quibus folia superposita sunt magna, pilei ampli figuram obtinentia, supernè uiridia, infernè uerò candicantia: quæ in tantam crescunt amplitudinem, ut unum interdum, orbicularē mensam prorsus tegat. Radix illi crassa & longa, intus candida, uehementer odorata & amara. Quibus accedit quod uires huius herbæ à uiribus Petasites, ut ex sequentibus patebit, non discrepent: ut hoc nomine nihil euidentius sit, quàm eam herbam esse pland ueterum Petasiten.

## LOCVS.

Nascitur copiosissimè in pratis humidis & iuxta riuulos sitis.

## TEMPVS.

Initio Martij mensis, ut comprehensum est, floribus suis conspicua est herba, qui Aprili imminente statim citra fructum decidunt. Quo facto folia cum pediculis suis prodeunt,





PETASITES  
Pestilenzwurtzel.



**A** Ex tertio est ordine desiccantiū, id quod amaritudo eius, quam gustu deprehendimus, facile monstrat.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Facit ad maligna & phagedænica ulcera tritum & illitum.

EX GALENO.

Ad maligna & phagedænica ulcera, ea utuntur. Idem etiam de Petaſite tradit Paulus.

APPENDIX.

Experimento comprobatū est radicem hanc mirificè cōferre pestilentialibus febribus, quod sudorē uehementer moueat, si in puluerē redacta cum uino sumatur. Nec minori efficacia bibitur à mulieribus quas uteri tormina & præfocationes exercent. Valet etiam unicè ad enecandos lumbricos. Succurrit quoq; ijs qui spiritus difficultate laborant. Ducit urinā & menses. Efficax est ad uulnera præhumida, & ad reliquas cutis fœditates. Hęc uerò posse, amaritudo eius euidentissimè docet, cuius quidem hæ sunt facultates, ut ex ijs quæ sæpe iam diximus, & Galenus lib. iij. de simpl. medi. facult. cap. xvij. fusius docet, manifestum est.

DE PERICLYMENO CAP. CCXLIX.

NOMINA.



ΕΠΙΚΛΥΜΕΝΟΝ Græcis, Volucrū maius Latinis, Scribonio Largo Syluæ mater, uulgo Caprifoliū & Materſylua, & nonnullis Liliū inter spinas dicitur. Germanis Geyßblatt/ Speck oder Waldegilgen/ & Heunling. Sic sanè dictum, quod circumuoluendo ad se uicinas ar-

Syluæ mater.  
Caprifolium.  
Liliū inter  
spinas.  
Periclymenon  
unde dictum.

**B** bores aut frutices uocet.

FORMA.

Simplex frutex est, ex interuallis folia spargens ipsum amplectentia, subcandida, Hederg similia: flores candidos, Fabæ similes, subrotundos, quasi in folium procumbentes: semen durum, & quod difficile uellitur: radicem crassam, rotundā. Ex qua quidem descriptione perspicuū fit, fruticem quem pictum exhibemus esse Periclymenon: siquidem caulibus suis uicina amplectitur, gemina per interualla umbilicata folia habens, à terra cæsijs, supernè herbosis, ad Hederæ similitudinē: flores albos, Fabæ non dissimiles, subrotundos, potissimum antequam dehiscant, baccas hederaceas aut Rusci, radicem crassam.

LOCVS.

Nascitur in aruis ac sepibus, conuoluens se uicinis fruticibus. Nunc in hortis etiam passim plantatur.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Uehementer calefacit & desiccatur, id quod gustu etiam ipso deprehenditur. Folia siquidem acrimoniam quandam præ se ferunt gustata.

VIREs. EX DIOSCORIDE.

Huius semen postquā maturuit collectū, & in umbra siccātū, drachmæ pondere datur in uino quadraginta diebus, ut lienē minuatur absumatue, & lassitudinē discutiat. Orthopnceæ & singultui prodest. Urinā cit à sexto die cruentā. Partum accelerat. Habent easdem uires & folia: quæ triginta septem diebus pota, sterilitatē facere produntur. In periodicis febribus cum oleo inuncta, earū horrores mitigant.

EX GALENO.

Periclymeni utilis est tum fructus, tum folia, adeò uehementer incidentis & excalefa-



646



PERICLYMENVS

Geyssblatt.



A calefacientis facultatis, ut si plusculum bibantur, urinam sanguinolentā efficiant. Principio quidem urinam tantum mouent: porro foris cum oleo illita calfaciunt. Iuuāt & lienosos, & difficulter spirantes. Cōpetens potionis mensura est, drachmæ unius pondus cum uino. Cæterum desiccat quoque semen. Et quidam aiunt, si copiosius bibatur, sterilitatē omnino bibentibus asserre. Sunt etiam qui certum dierum numerum ad talem potionem præfiniunt, quemadmodū Dioscorides, qui septem & triginta dies eos tradi refert. Hic quoque cruentam urinam reddi à sexto die memorat.

## EX PLINIO.


Semen eius in umbra siccatur, & in pastillos digeritur. Hi resoluti dantur in uini albi cyathis tribus, tricenis diebus ad lienem, eumq; urina cruenta, aut per aluum absumit, quod intelligitur à decimo statim die. Urinam cient & folia decocta, quæ & orthopnoicis prosunt.

## APPENDIX.

Ex iam cōmemoratis facultatibus nemo non intelligit fruticem hunc esse Peridymenon: cum enim gustu acrimoniā præ se ferat, necesse est omnia hæc quæ ueteres Peridymeno tribuunt, possit. Quibus accedit, quod recentiores etiam herbarij suo Caprifolio easdem uires assignent. Exiccare enim ipsum tradunt ulcera humida & sordida, sanare impetigines, & alias cutis sceditates, lienem absumere, difficultati spirandi conferre, partus celeritatem facere, calculos pellere, faciei maculas abstergere, & alia posse quæ non attinet referre.

## DE PYROCAP CCL

## NOMINA.

B  YPOZ Græcis, Triticum Latinis dicitur. Officinæ antiquum latinum nomen retinuerunt. Germanis Weyssen appellatur. Triticum uerò dicitur, quod tritum ex spicis sit, ut autor est Marcus Varro.

*Triticum unde dictum.*

## GENERA.

Tritici summa genera tria obseruant qui frumentariæ rei periti sunt. Primum quod Robus dicitur, quoniam & pondere & nitore præstet. Germanis simpliciter Weyssen nominatur. Secundum trimestre, & nonnullis Sitanium dicitur. Trimestre quidem, quod tertio ferè satum mense maturescat: id quod tamen nostro in orbe non fit, in quo Martio mense satum, quinto tandem, hoc est, Iulio mense metitur. Germanis Amelhorn dicitur, haud dubiè non alia ratione, nisi quod ex hoc genere tritici amyllum optimum conficiatur. Eius picturam dare hoc tempore non potuimus. Tertiū genus tritici, non undiquaq; notum, Germanis welscher Weyssen/ & Weyssenbolb dicitur.

*Primum.*

*Secundum.*

*Tertium.*

## FORMA.

Primum tritici genus culmo est quàm hordeū altiore, tribus geniculis constante, folio arundineo, spica à folijs remotiore, incondita, & in nullos uersus disposita. Exeritur in area, ut alia quædā frumenta. Alterū culmo, geniculis, granisq; prioris simile, nec ab eo differt, nisi quod spicam multis aristis uallatam, & in duos uersus dispositam obtinet. Tertium genicula habet quaterna, aliàs præcedenti per omnia propemodum simile.

## LOCVS.

Passim prouenit Triticum primi & secundi generis. Postremum in Alsatia, & agro Tubingenli gignitur.

## TEMPVS.

Floret, ut alia ferè omnia frumenta, Iunio mense: in Iulio autem metitur.


## TEMPERA-



648

TRITICI PRI  
MVM GENVS.

Weyssen.





TRITICI TERTIUM  
GENVS.

Welscher Weysen.





Triticum ut medicamentū foris impositum, primi est ordinis excalefacientiū, non tamen nec resiccare, nec humectare manifestò potest. Porro quod ex eo conficitur amyllum, eo tum frigidius est, tum siccus.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Optimum ad secundæ ualitudinis usum Triticum habetur quod recens & iam perfectè adultum, & colorem mālī refert. Crudum in cibis rotundos lumbricos gignit. Canum moribus prodest mansum & illitū. Confectus ex eius similagine panis, plus alit quàm cibarius, quem Græci *συνισμύς* uocant. E Sitanj farina panis leuiorem cibum præbet, & qui facillè in membra demandetur. Farina eius cum hyoscyami succo illinitur aduersus neruorū fluxiones. Item contra intestinorū inflationes. Lentigines ex oxymelite tollit. Furfures autem acri in aceto elixi & calentes illiti, lepras pellunt. Incipientes etiam inflammationes omnes illiti leniunt. In Rutæ uerò decocto elixi, mammas turgentes sedant. Viperarū ictibus auxiliantur, & torminosis profunt. Confectū ex farina triticea fermentum calefaciendi extrahendiq̃ uim habet. Priuatim quæ in plantis pedum sunt extenuat. Cetera tubercula, furunculosq̃ ex sale concoquit, & aperit. Sitanj farina contra uenenatos ictus cum aceto aut uino cōmodè illinitur. Eadem si decocta in glutini modum delingatur, cruenta excreantibus succurrit. Contra tussim & exasperatam arteriam, cum menta & butyro decocta efficax est. Tritici pollen si ex aqua mulsā, aut hydrelæo decoquatur, omnē discutit inflammationē. Panis & cum melicrato coctus & crudus inflammationes omnes illitus mulcet, cum emolliat, & quadantenus refrigeret, mixtus herbis succisq̃ quibuscūq̃. Vetus autem & aridus per se, adiectisq̃ alijs quibuscūq̃, citam aluum cohibet. Recens muria maceratus & illitus, uetustas impetigines sanat. Glutinum ex similagine & polline, quo chartæ glutinantur, sanguinem excreantibus prodest, si liquidius ac tepidum cochlearis mensura detur sorbendum.

## EX GALENO.

Triticum quiddam lentoris, & obstruentis naturæ habet. Quod uerò ex pane fit cataplasma, uim obtinet magis digerentem, quàm quod ex Tritico: nimirum quum & salem & fermentum panis adiuncta habeat: quippe cum fermentum uim habeat attrahendi digerendiq̃ ea quæ in alto resident. Plura de Tritico petenda erunt ex capite primo, libri primi de alimentorum facultatibus, quo in loco uarię panis species exponuntur.

## EX PLINIO.

Grana Tritici ferro combusta, ijs quæ frigus uulneris præsentaneo sunt remedio. Farina ex aceto cocta, neruorū contractionibus auxiliatur: cum rosaceo uerò & fico sicca myxisq̃ decoctis. Item suppuratis neruis cum hyoscyami succo illinitur. Ex aceto & melle lentigini. Furfures tonsillis faucibusq̃ gargarizatione profunt. Sex Pompeius prætorij uiri pater, Hispaniæ citerioris princeps, quum horreis suis uentilandis præsideret, correptus dolore podagræ, misit in Triticum sese super genua, leuatusq̃ siccatis pedibus mirabili modo, hoc postea remedio usus est. Vis tanta est, ut cados plenos siccet. Paleam quoq̃ tritici uel hordei calidam imponi ramicum incōmodis experti iubent, quæq̃ decoctæ sunt aqua foueri.





POTAMOGETVM  
Samrauc.



C

## NOMINA.

Potamogeton un  
de dicta.  
Stachyites.



POTAMOGETON, *ἡ σταχυίτης* græcè, Fontalis & Potamogeton Latinis dicitur. Officinis ignota est herba. Germanis *Samtraut* uocatur. Potamogeton autem quasi fluminibus uicina dicta est: siquidem aquosis & palustribus locis nasci amat. Stachyites uerò quasi spicata, ob caulem quem ex se mittit floribus & semine spicatum.

## FORMA.

Folium Betæ simile habet, densum, & paulum extra aquam eminens. Ex qua quidem breui admodum deliniatione satis intelligi potest, herbam cuius picturam damus esse Potamogetona. Caulem namque rotundum habet, geniculis intersectum, è quibus pediculi exeunt folijs Betæ aut Plantaginis uestiti, paulum supra aquam eminentibus. Flores etiam spicatos, Plantaginis instar, profert, ac subinde semē. Quid multa: folia huius herbæ planè referunt folium Indum uocatum officinis.

## LOCVS.

Nascitur in lacustribus & aquosis locis.

## TEMPVS.

Floribus prægnans est Iulio mense.

## TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & exiccat, ut gustus etiam abundè docet.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Refrigerat & adstringit: pruribus, ulceribusque uetustis, & ijs quæ pascendo serpunt, confert.

## EX GALENO.

D Adstringit & refrigerat similiter Polygono, sed essentia eius crassior quam Polygoni est.

## EX PLINIO.

Potamogeton ex uino dysentericis & celiacis medetur. Peculiariter refrigerat, spissat. Vfus in folijs, cruribus uitiosis utilia, & contra ulcerum nomas, cum melle uel aceto.

## DE PEDE ANSERINO CAP. CCLII

## NOMINA.

Pes anserinus  
eor dicta.



VO nomine ueteribus tum Græcis tum Latinis sit appellata hæc planta, nondum cognoscere potui: quapropter nouam ut illi nomenclaturam inderem necesse fuit. Aliam autem & commodiorem non licuit inuenire præter eam, quam alludentes ad germanicam appellationem imposuimus. Nam si folia eius spectes in ambitu laciniata, planè anserini pedis formam ac similitudinē repræsentant. Hinc appositissimè Germanis nostris uocata est *Gensfüß* / oder *Gensfüßle*. Quum uerò eadem herba suis inimica admodum sit, atque adeo mortem inferat, factum est ut à mulierculis etiam sit nominata *Sewtod* / & *Schweinföd*. Etsi uerò in officinis eius herbæ nullus sit usus, tamen quia passim nascitur, & temerè fortassis à nonnullis uires eius ignorantibus usurpari posset, eam silentio transire nolimus, quò scilicet facultas tam uulgaris herbæ omnibus patefieret.

## FORMA.

Caulem profert cubitalem, striatum: folia ad Halicacabi formam accedentia, in ambitu tamen laciniata, atque adeo anserini pedis speciem referentia: flores exiguos ruben-



PES  
ANSERINVS

Sensfuß.





C rubentes, semen racematim, ueluti in atriplice syluestri, singulis ramis insidens: radicem obliquam, multasq; adnascantias habentem.

## LOCVS.

Pasim in hortis, alijsq; locis ubi finum reponitur, nasci solet.

## TEMPVS.

Iulio mense potissimum floret.

## TEMPERAMENTVM.

Haud dubie in secundo refrigerat ordine, non secus atque Solanum hortense.

## VIRES.

Suibus exitium affert herba hæc comesta, id quod experientia cognitum est. In humano corpore idem potest quod Solanum hortense. Quare facultates eiusdem suo quares loco.

## DE PETROSELINO CAP. CCLIII.

## NOMINA.

Apium saxatile.

Officinæ er-  
ratum.



ETPOZEAINON Græcis, Apium saxatile Latinis, & Petroselinum appellatur. Germanicè frembder Peterfilien nominari commodè, ad alterius quod Oreoselinum est, ut suo diximus loco, differentiam, potest. Officinæ eius herbæ cuius nunc picturam damus semine pro Amomo utuntur, non tamen sine magno errore, quum constet omnibus, modò conferre inter se utriusque historiam non pigeat, Amomum ab ea herba esse diuersissimum. Nos ut tandem sciremus è qua stirpe semen hoc decerperetur, terræ illud mandauimus, & hæc cuius pictura formā ostendit herba erupit, quam nos uerum esse Petroselinum, ut paulò post ostendemus, credimus.

## FORMA.

Dioscorides ne-  
gligencie insinu-  
atur.

Petroselinum, inquit Dioscorides, semen Ammi simile obtinet: odoratius tamen, acre, & aroma olens. Breuis quidem delinatio hæc est, atque imperfecta, ut nihil mirum sit, nos hætenus quod uerum esset Petroselinum non potuisse cognoscere. Merito itaque hoc loco, ut compluribus etiam alijs, Dioscorides negligentiae insinulari potest, ut qui mancas ac mutilas plerasq; posteritati relinquere stirpium historias uoluerit. Si uerò quispiam paucas etiam has notas expendat, haud dubie herbam hanc cuius picturam oculis subieciimus, Petroselinum esse comperiet. Semen enim eius Ammi tam simile est, ut ab eo uix discerni queat: odoratius etiam existit, & acre, ac aroma olet. In summa, nulla est nota quæ illi nō respondeat, ut hoc nomine uerum Petroselinum esse credam. Quinetiam tota eius herbæ forma, quæ non multum à nostro & Germanico Petroselino abest, atque odor, Selini speciem esse docent, ut pro Petroselino usurpare hanc ipsam officinæ tutò possint: semini enim quo hodie utuntur, non Macedonicum Petroselinum, sed Hipposelinum, ut suo diximus loco, existit.

## LOCVS.

In Macedonia frequens optimumq; nascitur, hinc Macedonicū dicitur: inq; saxis & præruptis potissimū locis, unde cepit appellari Petroselinū. Nascitur & alijs in locis, ut lib. i. de antidotis testatur Galenus, at minus laudatum.

## TEMPVS.

Floret Augusto mense, atque subinde semen profert.

## TEMPERAMENTVM.

Petroselinum ut gustu acre est cum amaritudine, sic & in operibus calidū. Fuerit itaq; & ipsum ternj ordinis tum excalfacientium, tum desiccantium.

## VIRES.





PETROSELINVM  
Frembder Petersilien



C

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vrinam cit, & menstrua ducit. Stomachi & coli inflationibus auxiliatur, & torminibus. Laterum quoque, renum & vesicæ doloribus in potu sumptum succurrit. Miscetur antidotis urinam cientibus.

## EX GALENO.

Petroselini semen maximè usui est, quum tota etiam herba unà cum radice similem, sed imbecilliorē, facultatem sortiatur. Incidendi etiam uim habet: hinc menses & urinas largiter prouocat. Flatus quoque extinguit.

## APPENDIX.

Sunt qui hanc herbam quam pro Petroselino damus, Sisona esse putent: quorū sententiæ cur non magnopere repugnē, facit in primis Dioscorides, qui Sisona perinde atq; Petroselinū suis notis haud descripsit. Dein quod uiribus nō discrepent, atque adeo in usu huius aut illius nullum sit periculū. Nos tamen nostram sententiam propter adductas paulò antè rationes deserere; nisi euidentibus conuicti argumentis, non possumus.

## DE ROSA CAP. CCLIIII.

## NOMINA.

Rhodon cur  
dictum.



Ο Δ Ο Ν græcè, Rosa latinè, officinis eodem seruato nomine appellatur. Germanicè Rosen. Rhodon autem Græcis, Plutarcho auctore, nominatur, quod largum odoris effluuium emittat.

## GENERA.

D

Theophrastus libro sexto, cap. vi. de plantarum historia, genera rosarum multa esse tradit, quæ foliorū multitudine, paucitate, asperitate, leuitate, colore & odore differunt. Plinius etiam lib. xxi. capite quarto, ex loci diuersitate multa rosarum genera colligit. Nos simpliciter duo duntaxat illarum genera faciemus, syluestres scilicet & domesticas. Syluestres, quæ etiā Caninæ rosæ uocantur, asperiores tum uirgis, tum folijs sunt, ac odore, colore, magnitudine à domesticis superantur. Germani Heydrosen & Wildrosen uocant. In utroque uerò genere duplices existunt, puniceæ nimirum & candidæ. Nos utrumque genus una pictura complexi sumus.

## FORMA.

Vulgò omnibus nota est Rosa. Virgas siquidem fuscis maculis tinctas, & aculeis plenas emitit: folia incisuris diuisa, nigricantia & aspera. Germinat primum inclusa granoso cortice, quo mox intumescente, & in uirides alabaistros fastigiato, paulatim rubescens dehiscit, ac sese pandit, in calycis medio sui stantis complexa luteos apices staminaq; capillamentis insidentia, quæ propriè flores dicuntur. Syluestris spongiolas etiam producit, quas pleræq; officinæ Germaniæ nostræ, non sine detestando errore pro Bedegar usurpant: fructum quoq; parit rotundū, initio uiridem, dein puniceū.

## LOCVS.

Domestica passim in hortis prouenit. Syluestris etiam nusquam non in campestribus & dumetis nascitur.

## TEMPVS.

Rosa ut nouissima inter uernos flores erumpit, ita etiā statim deficit. Decerpenda itaq; erit Iunio mense ubi primum erupit, ne mox nusquam compareat.

## TEMPERAMENTVM.

Rosarum uis ex aquea calida substantia duabus alijs qualitibus, adstringenti uidelicet & amaræ mista, composita est. Flos earū magis etiam ipsis Rosis adstringit, ac proinde sanè exiccatorius est.

## VIRES.





ROSA

Rosen.



C

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Rosa refrigerat & adstringit, sed sicca magis adstringit. Succus recentibus folijs *Vignis.* exprimendus, detracto forfice ungue. Sic appellatur quod candidū est in folio: reliquū mortario premi & teri debet in umbra donec densetur, & ita ad oculorū circumlitiones recondi. Siccantur etiam folia in umbra crebrò uersata, ne mucescant. Ex aridis rosis in uino decoctis expressus liquor, ad capitis, oculorum, aurium, gingiuarum, sedis, recti intestini ac uulug dolores penna illitus, collutus infususue, conducit. Eadem sine expressione contusa & illita, præcordiorum inflammationibus, stomachi humiditati, & sacris ignibus medentur. Siccae ac tritæ femoribus insperguntur. Misceri solent compositionibus quas antheras uocant, & uulnerarijs antidotis. Vruntur folia ad honestandas palpebras. Flos qui in medijs Rosis inuenitur siccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita pota, aluum profluentem, & sanguinis reiectiones sistunt.

## EX PLINIO.

Vfus succi ad aures, oris ulcera, gingiuas, tonsillas, gargarizatu: stomachū, uuluas, sedis uitia, capitis dolores. In febre per se, uel cum aceto ad somnos, nauseas. Folia uruntur in calliblepharum. E siccis femina asperguntur. Epiphoras quoque aridas leniunt. Flos somnum facit. Inhibet fluxiones mulierum, maximè albas, in posca potus, & sanguinis excreationes. Stomachi quoque dolores, quantum in uini cyathis tribus. Semen his optimum crocinum, nec anniculo uetustius, & in umbra siccatur. Nigrum inutile. Dentium dolori illinitur. Vrinam ciet. Stomacho imponitur. Item igni sacro non ueteri. Naribus subditum caput purgat. Capita pota, sanguinem & uentrem sistunt. Ungues Rosæ epiphoris salubres sunt: ulcera enim oculorū Rosa sordescunt, præterquàm in ijs epiphoræ, ita ut arida cum pane imponatur. Folia quidem uitæ stomachi, rosionibus, & uitæ uentris, & intestinorū, & præcordijs utilissima uel illita. Cibo quoque Lapathi modo condiuntur. Cauendus quoque in ijs situs celeriter insidens. Et aridis & expressis aliquis usus. Diapasmata inde fiunt ad sudores coercendos, ita ut à balneis inarescant corpora, dein frigida abluantur. Syluestris cum adipe ursino alopecias mirificè emendat.

## EX SYMEONE SETHI.

Odorata calidis capitibus prodest, humida uerò offendit, eaq̃ destillationi obnoxia reddit. Sumpta uerò ad febres ex flaua bile procreatas iuuat, & roborat stomachum & iecur. Proprietate autem quadam testes lædit, prohibetq̃ acres exhalationes ne ad caput ferantur.

## APPENDIX.

Spongiolæ ac fructus Cynorrhodi seu syluestris Rosæ mirificè ualent contra calculum, & urinæ difficultates, si leuigatæ in puluerem exhibeantur.

## DE RAPHANO CAP. CCLV.

## NOMINA.



Raphanus unde  
dictus.

Radix

ΡΑΦΑΝΟΣ, ῥαφανίς Græcis: Raphanus, Radix, Radicula Latinis dicitur. Hæc autem generis sunt nomina, ideoq̃ errant non pauci nostræ ætatis medici & herbarij, qui Radiculæ nomen ad satiuū duntaxat Raphanum transferunt. Raphanus autem sibi nomen ῥα τὸ ῥα φάνει id est, quod facile appareat, adsciuit: nam die tertio à satū profilit. Radicis uerò nomen sibi arrogauit, quod cæteras amplitudine corporis superet, uel quam paucissimis magnitudine cedat. Etenim plerumq̃ in tantam molem coalescit, ut frigidis locis quibus gaudet, sicut in Germania, Plinio lib. xix. cap. v. teste, infantium puerorum magnitudinē æquet. Et memini me stupendæ magnitudinis Raphanos Erfordię, Turingiæ celeberrimo oppido, uidisse.

GENERA.





RAPHANVS  
SATIVVS.

Rettich.



660



RAPHANVS  
SYLVESTRIS.

*Hermetich.*



## G E N E R A.

A Raphani Græci duo faciunt genera, satiui & syluestris. Satiuus officinis hodie peculiariter Raphanus minor dicitur, Germanicè *Retrich*. Syluestris Latinis *Armoracia* appellatur. Germani ad uocem Romanā alludentes, *Wertzetich* & *Kren* nominant. Nostri hodie herbarij, sua potius quàm ueterum autoritate freti, Radicem simpliciter, generis nomine, uocant. Nonnulli Raphanū maiorem appellant, propter folia ipsa, quæ satiui folia magnitudine superant; aut quia acrimonia maiore, aut uiribus efficacioribus præditus est.

Raphanus minor.

Armoracia.

Raphanus maior

## F O R M A.

Radix satiua caudice uno assurgit nonnunquā arboreo, radice ad Rapi similitudinē, folijs laciniatis, angulisq; horrida: floribus candidis, & semine in siliquis. Syluestris dicta *Armoracia* fronde copiosior quàm corpore, folia satiuae ferè similia habet, magis tamen ad *Lampsanæ* formā accedentia, longa & acuta: radicē gracilem, mollem, Sinapi instar acerrimā, adeò ut caput tentet, & lachrymas incitet.

Satiua radix.

Syluestris.

## L O C V S.

Raphanus in hortis nascitur. Amat autem terram pinguem, Palladio lib. ix. cap. quinto teste, solutam & diu subactā. Syluestris etiam hodie in hortis habetur, sicq; translatus ad culta, edomita feritate mitescit meliorq; fit. Crescit aliàs circa margines itinerū, & loca arenosa, inq; pratis nonnunquā sua sponte copiose prouenit, ut fit in prato ad oppidum *Tubingam* sito, sacrificorū uocato.

## T E M P V S.

Cum frigoris patientissimus sit Raphanus, non solum estate, uerum etiā hyeme colligi potest. Estq; illius usus quotidianus. Floret æstate.

## T E M P E R A M E N T V M.

B Raphanis satiua excalefacit quidem ordine tertio, desiccatur uerò secundo. Syluestris autem in utroq; efficacior est. Quin & semen ipsum planta efficacius est.

## V I R E S. E X D I O S C O R I D E.

Raphanus satiuius excalefacit, flatus gignit, ori suauis est, sed stomacho inimicus, Ruētus & urinam cit. Bonam facit aluum. Si quis à cibo ipsum sumpserit, distributioni eius magis conferet. Presumptus autem, cibum subleuat. Prodest ante cibum datus uomituris. Sensus exacuit. Decoctus contra ueterem tussim, & crassitiem in thorace natam prodest. Cortex eius cum oxymelite sumptus maiori efficacia uomitiones citat. Hydropicis utilis. Illitus lienosis etiam confert. Cum melle ea quæ serpendo pascunt sistit. Sugillata tollit. Contra uiperarum ictus auxiliatur. Alopecias pilis explet. Lentigines cum farina loliacea exterit. His qui à fungis strangulantur subuenit. Menses trahit. Semen eius uomitum proritat, urinamq; mouet. Cum aceto potum lienem extenuat. Coctum cum oxymelite calido angina laborantibus utiliter gargarizatur. Contra *Cerastris* morsum ex aceto potum auxilio est. Cum aceto illitum gangrænas efficaciter disrumpit scarificatue. Syluestris tam folia quàm radix olcrum modo in cibo coquuntur. Excalefacit autem, urinam cit, æstuosus est.

## E X G A L E N O.

Facultas inest Raphano discutiendi, itaque ad sugillata, & alios id genus liuores ob eam facultatem conducit. Radix eius ex eorum numero est quæ obsonij potius quàm nutrimenti nomine frequenter comeduntur. Vis illi extenuatoria, cum qua conspicuè unā excalefacit: acris enim in ea qualitas exuperat. Verno tempore caulem in altum assurgentem producere solet, ceu alia quæ nata sunt excaulescere. Hic elixus estur ex oleo, garo & aceto, ut *Rapæ* caulis, *Sinapi* & *Lactucæ*. Et sanè caulis hic magis quàm crudus Raphanus nutrit, ut qui acrimoniam in aqua deponat: quanquā minimam sanè & ipse alendi potestatem habeat. Quidam non solum cau-

kk lem, sed



Clem, sed unà Raphanos ipsos elixantes comedunt Raparū modo. Caterum cum medicos, tum idiotas illos mirari subit, qui à cœna crudos eos concoctionis iuandæ gratia edunt. Ipsi quidem se experientia id abundè compertū habere dicūt, nūllus tamen exemplum illorum sine damno imitari potuit. Hactenus Galenus, cuius equidem uerba eò libentius recitauimus, quod uulgi errorem Raphanos à cœna comedentis lepidè notare uideantur.

## EX PLINIO.

Raphani decocti mane poti ad ternos cyathos, cōminuunt & eijciunt calculos. Iidem in posca decocti, contra serpentū morsus illinuntur. Ad tussim etiam mane ieiunis prodest Raphanus cum melle. Semen eorum tostum, ipsumq̃ cōmanducatum ad lagonoponon: In aqua folijs eius decoctis, bibere uel succum ipsius cyathis binis. Contrā phlegmoni ipsos illinire tusos utile. Inchoantibus autem recentem corticē cum melle, ueternosis uerò quamacerrimos mandere. Semenq̃ tostū, dein contritū cum melle suspiriosis. Iidem & contra uenena prosunt. Caterum cerastis, scorpionibus aduersatur, uel ipso semine infectis manibus impunè tractantibus. Imposito Raphano scorpionibus, moriuntur. Salutares & contra fungorū aut hyoscyami uenena æquē, ut Nicander tradit. Et contra ixiā quoq̃ dari duo Apollodori iubent, sed Citieus semen ex aqua tritum, Tarentinus succum, Lienem item extenuant, iecinori prosunt & lumborum doloribus. Hydropicis quoque ex aceto & sinapi sumpti, & lethargicis. Praxagoras & iliosis dandos censet. Plistonius & colicis. Intestinorū ulcera sanant. At purulenta præcordiorū, si cum melle edantur. Quidam ad hæc coquere eos in luto illitos malunt, sic & fœminas purgari. Ex aceto & melle sumpti intestinorū animalia detrahunt. Item ad tertias decocto eorum potio cum uino enterocelis prosunt. Sanguinem quoque inutilem sic extrahunt.

**D** Medius ad hæc & sanguinē excreantibus coctos dari iubet. Et puerperis ad lactis copiam augendā. Hippocrates capillos mulierū defluos fricari Raphanis, & super umbilicum imponi, contra tormenta uulvæ. Reducunt & cicatricē ad colorem. Semen quoque ex aqua impositū sistit ulcera quæ phagedænas uocant. Democritus Venerem hoc cibo stimulari putat, ob id fortassis uoci nocere aliqui tradiderunt. Folia quæ in oblongis tantum nascuntur, excitare oculorum aciem dicuntur. Vbi uerò acrior Raphani medicina admota sit, Hyssopū dari protinus imperant. Hæc antipathia est. Et aurium grauitati succum Raphani instillant. Nam uomituris, summo cibo esse eos, utilissimū est. Syluestris urinæ duntaxat eijciendæ utilior.

## DE RIBE CAP. CCLVI.

## NOMINA.

Ribes.



**R** AECIS cognitus fuerit nec ne frutex ille, nondum compertū habeo. Mauritanis & officinis hodie Ribes nominatur. Germanis *S. Johans treublin* oder *beerlin*/ quod scilicet circa diui Ioannis Baptistæ diem fructus eius fruticis ad maturitatem pertingant.

## FORMA.

Frutex est nullis spinis horridus, sed topiarius magis, uitis pusilla folijs, baccis rubentibus ex pediculis longis dependentibus refertus, ut pictura ipsa abundè docet. Vnde manifestum sit Mauritanorū Ribes à nostro diuersum esse, quod non uitis, sed lata potius, magna, rotunda & uiridia folia habeat. Quanquam non lateat Arabes etiam in Ribes descriptione non admodum concordēs esse.

LOCVS.





663

RIBES

S. Johans beerlin.

kk 2



C

## LOCVS.

Pasim in hortis nascitur, ac eorundem puluinos & areas sepit.

## TEMPVS.

Circa diui Ioannis Baptistæ natales ferias, & Iulio potissimū mense, baccis ac uuis rubentibus frutex ille ornatur.

## TEMPERAMENTVM.

Folia & fructus uehementer adstringunt. Mauritani frigidum & siccum faciunt in secundo ordine.

## VIRESEXMAVRITANIS.

Baccæ acido sapore placent. Refrigerant æstuantē stomachū: sitim restinguunt, quæ cum alios, tum maximè febricitantes excruciat. Cibi fastidia discutunt, & appetentiam inuitant. Ecce dam uentris proluuiem cohibent. Vomitiones sistunt, stomachum firmant. Alui profluuiū quod bilis attulit, retinent: erosiones & uellicationes eiusdem tollunt. Sanguinis feruorē demulcent, & bilis acrimoniā domant. Seplasiarū succū eius fructus condiunt, ad anni totius usum, Rob de ribe appellantes.

## DE RHODIA RADICE CAP. CCLVII.

## NOMINA.

Rhodia radix  
curdica.



Ῥοδία ῥίζα græcè, Rhodia radix latinè nominatur. Officinis ignota, germanicè Rosenwurz uocatur. Rhodiam autem tam Græci quàm Latini dixerunt, quoniam contrita Rosas redolet. Quapropter Rosæ, quas Græci ῥοδα nominant, non Rhodus insula, ut imperiti putant, huic ra-

di dici nomen fecerunt.

## FORMA.

Radix rhodia Costo similis est, leuior tamen minorisq; ponderis, & inæqualis, odorem Rosarū cum teritur reddens. Reliqua eius facies Telephiū refert, nisi quod flore & semine carere uidetur, id quod Galenus etiā asserit, & in Corollario suo annotauit Hermolaus. Dioscorides etiam illorum nullam facit mentionem.

## LOCVS.

Nascitur potissimū in Macedonia. Nunc in multis Germaniæ hortis plantatur.

## TEMPVS.

Radix autumnō effodienda.

## TEMPERAMENTVM.

Rhodia radix in calefaciendo secundi ordinis, aut certè tertij incipientis.

## VIRESEXDIOSCORIDE.

Vtilis est capitis doloribus, si madefacta fronti & temporibus cum modico rosaceo imponitur.

## EXGALENO.

Tenuium partium, & discutientis est facultatis.

DE SAMPVS.





665


RHODIA RADIX  
Rosenwurtz.

kk 3



## NOMINA.

Maiorana.

Duplex Amara-  
rum.

AMYXON, ἡ ἀμαρανός Græcis: Maiorana, Amaracus Latinis: officinæ latinam appellationem retinuerunt, Germanis Maio-  
ran / uel Meyran dicitur. Animaduertendū autem nos hic de  
Amaraco ea loqui quæ iucundo placet odore. Duplex enim Græ-  
cis Amaracus est. Vna quæ Dioscoridi alio nomine Parthenium  
dicitur, ingrato prorsus & uiroso odore prædita, meritoq; ea de  
causa hodie Cotula fœtida nominata. Altera de qua hic agimus, odorata, quam  
Sampsuchon Græci priuatim nominant. Id, ne imperitis uox illa πολύσιμος impo-  
neret, monendum esse duximus.

## FORMA.

Herba est Sampsuchum furculosa, per terram serpens: folijs hirsutis & rotun-  
dis, Calaminthæ tenuifoliæ similibus, admodum odoratis. Hæc delinatio adamus-  
sim herbæ Maioranæ uulgò dictæ fauet: est enim surculis lentè rubentibus, folijs  
pilosis, & rotundis, iucundo odore, semine copioso, quod bullulis quibusdam con-  
tinet: flore candido & exiguo. Serpit etiam per terram: uerum id non ubiq; fit, inter-  
dum enim rectà surgit in altum.

## LOCVS.

Pasim in hortis & fictilibus uasis prouenit. Gaudet autem locis umbrosis, aqua  
& fimo.

## TEMPVS.

Æstate dum floribus prægnans est carpitur.

## TEMPERAMENTVM.

D Sampsuchum tenuium partium, & digerentis est facultatis: desiccatur enim & ca-  
lescit ordine tertio.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Calefaciendi uim obtinet, & coronamenti apta. Decoctū eius potum, incipien-  
ti aquæ inter cutē prodest, & ijs quos urinæ difficultas, & tormina discruciant. Ari-  
da folia ex melle illita, sugillata tollunt. In pello subdita menses ducunt. Cōtra scor-  
pionis ictum ex sale & aceto illinuntur. Luxatis cerato excepta imponuntur. Simi-  
liter & cedematis. Aduersus oculorum inflammationes cum polline polentæ illi-  
nuntur. Miscentur acopis & malagmatis calefaciendi gratia.

## EX PLINIO.

Sampsuchum scorpionibus aduersatur ex aceto & sale illitum. Menstruis quo-  
que multum confert impositum. Minor est eidem potu uis. Cohibet oculorum epi-  
phoras cum polenta. Succus decocti tormina discutit. Vrinis & hydropicis utile.  
Mouet & narium sternutamenta. Fit ex eo oleum quod Sampsuchinum uocatur,  
aut Amaracinum, ad excalfaciendos emolliendosq; neruos. Vuluas calefa-  
cit. Et folia sugillatis cum melle, & luxatis cum  
cera profunt.

DE SPANA-





AMARACVS

Maio:an.

kk 4



## NOMINA.



*Spanachia cur  
dicta.*

*Spinacia inde  
vocata.*

*Hispanicum olus*

**SPANACHIA** Græcis recentioribus, Spinacia uel Spinaceum olus Latinis appellari potest. Arabicæ factionis principes Hispanach, hoc est, Hispanicum olus nominant. Germani *Spinet* / oder *Spinnat*. Spanachiam haud dubiè ab oleris raritate dixerunt Græci: rarò enim illo utebantur medici, quod cibo magis forsitan, quàm medicina nata esset, nec quicquam illustre sortita. Vel, quod etiam simile ueri est, ab alijs nationibus emendicato spinaceo nomine. Spinacia uulgò dicta est ab insigni seminis spiculorum nota: etsi enim herba ipsa glabra & mollis sit, semen tamen in spinas occalescit. Hispanicum uerò olus nominauere, forsitan quod inde primum duxerit originē, ad cæteras tandem nationes translata.

## FORMA.

Exit septem diebus à fatu, folio primùm triangulo, molli, mox intybi, plerunq; quà pediculo cohæret laciniato, inertis sapore, exigua radice, tenuibus capillamentis fibrata, caule cubitali, nonnunquā altiore, intus cauo: floribus in uertice rotundis, racematim coeuntibus, exiguis: semine spinulis horrido.

## LOCVS.

Nullum solum respuit, sed ubicunque satum fuerit hic latissimè prouenit.

## TEMPVS.

Seritur Septembri mense, non horrens hyemis frigora, ut uerno tempore cibū suppeditare possit. Martio etiam mense seritur, Iunio autem & Iulio mensibus semen & flores profert.

## TEMPERAMENTVM.


**D** Spinachia primi refrigerantium & humectantium ordinis est.

## VIRES.

Aluum emollit. Melius Atriplice suppeditat alimentū, sed aluo parum hærens facile exigitur. Flatus colligit, & uomitiones concitat, nisi excrementitius humor abijciatur. Ventrem decoctæ ius proluit. Stomacho inutile. Et cæteras ferè omnes Atriplicis uires sibi fertur arrogasse.

DE SANI-





A detailed botanical illustration of a plant, likely a species of spinach or a related leafy vegetable. The plant features a central, upright stem with several large, deeply lobed leaves. The leaves are characterized by their elongated, triangular shape with deeply serrated or lobed margins. The stem is densely covered with small, round, fleshy structures, possibly seed pods or young leaves, which are arranged in a terminal cluster at the top. The root system is shown as a thick, horizontal rhizome with several smaller, fibrous roots extending downwards. The entire plant is rendered in a light, sketchy style, with some areas highlighted in yellow.

SPANACHIA

Spinet.



670

SANICVLA  
FOEMINA.

Sanickel wible.







SANICULA  
MENZ.

Sanicel menziesii.



C

## NOMINA.

Diapensia.

Sanicula car  
della.

ERBA quam omnes hodie Saniculā uocant, à nullo, quod sciam, ueterum descripta est, sed à recentioribus inuenta, ut multar aliarum uulnerarie herbarum. Sunt autē qui Diapensiam nominent. Germanis Sanickel dicitur. Nomen Saniculam à sanandis uulneribus traxisse uulgò constat.

## GENERA.

Duū est generū. Vna quæ propriè appellatur Sanicula, ideoq; marem, ut certius esse discrimen, appellauimus. Germanicè Sanickel mennle. Altera ab omnibus ferè herbariis pro specie Osterin uulgò uocari habetur, sed falso, quando neq; in folijs, neque in radice ulla appareat acrimonia, sed perinde atque in mare Sanicula, amaritudo & adstrictio. Germanis errore etiā quodam die klein Weisterwurz nominatur. Nos eandem cum & forma & facultate ad ueram Saniculam, quam marem fecimus, proximè accederet, Saniculam fœminam nuncupauimus. Germanicè Sanickel weibele.

## FORMA.

Sanicula uera, atque adeo mas herba est folio uitis, aut Apij, in quinque partes dissecto, rubentibus in fine sectionū maculis quibusdam: furculis quoq; rubris ad radicem, quæ multis ei capillamentis fibrata subest: capitulis in summis coliculis pusillis, herbacei coloris & subnigris. Fœmina quod ad folia attinet priori similis, rubentibus tamen maculis caret, itemq; rubris ad radicem furculis, quod in ea hæc singula candida sint. Flores in summo candidos, ac subinde semen striatum & oblongum profert.

## LOCVS.

Nascitur in syluis & umbrosis locis.

D

## TEMPVS.

Carpenda cum suis capitulis Maio & Iunio mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Non est simplicis nature, sed, ut indicio est gustus, adstringit simul & amara est, ut hoc nomine calefactoriam & exiccatoriam esse nulli dubium sit. Statuunt autem calidam & siccam ordine secundo.

## VIRES.

Sanicula herbarum succum uulneratis in potu mirificè conferre experientia compertum est. Tumores quoque reprimere decoctam herbam impositam, aut eius succum illitum tam in homine quàm in pecoribus constat. Neque enim aliud præsentius est auxilium, cum ad fauces uel pulmones uitium decubuit. Et in summa, omnia quæ Symphyton, præstat etiam Sanicula. Potissimū uerò sanguinis spūto, dysenteria, renumq; uitij medetur.

DE SONCHO.



## NOMINA.



ορχος græcè, Sonchus, Cicerbita latinè dicitur. Sunt qui Lactucellā & Lacteronem appellent, quod scilicet caulis eius dissectus copioso diffluat lacte. Germanicè *Wosj* / oder *Genßdistel* uocatur. Sonchus autem sibi nomen uendicauit *ἐκ τῆς σῶσιν χέρον*, eò quod salubrem fundat succum, utpote qui sua sorbitione stomachi rosiones leniat, & lactis abundantiam nutritibus sumministret, genitalibusq; locis collectione laborantibus præsidio sit. Cicerbitæ tamen uocabulū, quo omnis Hetruria adhuc utitur, recens esse adiectitiumq; & ex non multo tempore Dioscoridi accreuisse uidetur.

Sonchus cur dista.

Cicerbita.

## GENERA.

Sonchi duo sunt genera. Alterum syluestrius, aculcatius, & nigrius, quod *Genß distel* germanicè uocatur. Alterū tenerius esculentumq; ac minus nigrum, Germanis *Wasentöl* dicitur. Et Apuleio Lactuca leporina, quod cum leporē animus defecit æstu, hac sibi herba mederi soleat.

Sonchus aspera.

Non aspera.

## FORMA.

Cubitalis & angulosus Soncho caulis est, cauus & aliquando rubescens, & qui fractus copioso lacte manat. Folia habet per interualla in ambitu scissa. Florem luteum, qui, ut Senecionis, breui digestus abit in pappos, uanescitq; in lanugines.

## LOCVS.

Vbiq; ferè in macerijis hortorum, potissimū autem in uincis Sonchus prouenit.

## TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus Sonchus uterq;.

## TEMPERAMENTVM.

Temperamentū eius quodammodo mixtum est: constat enim ex aquea terreaq; essentia, utraq; leuiter frigida. Nam & adstrictionis cuiusdam est particeps. Et siue cataplasmatis in morem imponatur, siue edatur, manifestè refrigerat. Postea uerò quàm planè resiccatus fuerit, terrestre eius temperamentū redditur, modicam habens caliditatem.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Vis utrique Soncho refrigeratoria, modicèq; adstringens. Proinde stomacho æstuantī & inflammationibus illiti profunt. Succus eorum in sorbitione datus stomachi rosiones morsusue mitigat, & lactis abundantia efficit. In lana appositus, sedis ac uulue inflammationibus opitulatur. Tam herba quàm radix illita scorpionum ictibus subuenit.

## EX GALENO.

Sonchus ubi adoleuerit, ex spinosis plantis est. Cæterum uiridis etiamnū & tener estur perinde ut cætera olera syluestria.

## EX PLINIO.

Albus qui è lacte nitor, utilis orthopnoicis Lactucarū modo. Erasistratus calculos per urinam pelli eo monstrat, & oris graueolentiam cōmanducato corrigi. Succus trium \* cyathorū mensura in uino albo & oleo calefactus adiuuat partus, ita ut à potu ambulent grauidæ. Datur & in sorbitione. Ipse caulis decoctus facit lactis abundantia nutritibus, coloremq; meliorē infantium: utilissimus ijs quæ lac sibi coire sentiant. Instillat auribus succus, calidusq; in stranguria bibitur, cyathi mensura: & in stomachi rosionibus cum semine Cucumeris, nucleisq; pineis. Illiniē & sedis collectionibus. Bibitur cōtra serpentes scorpionesq; radix uerò illinitur. Eademq; decocta in oleo punici mālī calyce, aurium morbis præsidium est. Hæc omnia ex albo. Cleomporus nigro prohibet uesci, ut morbos faciente, de albo consentiens. Agathocles etiam contra sanguinem tauri demonstrat succo eius uti. Refrigeratoria tamen uim esse cōuenit nigro, & hac causa imponendū cum polenta, Zeno radice albi stranguriā docet sanari.

\* al. obolorum





SONCHVS  
ASPERA.

Genßdistel.





SONCHVS  
NON ASPERA.

Gasetöl.



## C

## NOMINA.



ΕΡΙΣ Græcis, Seris & Intubus Latinis uocatur. Reliqua quæ illi sunt nomina, in generum distinctione mox dicemus.

## GENERA.

- Satiuus Intubus.** Intubum Latini in duo genera digesserunt, in satiuū & erraticum. Satiuū, qui non nisi cultu & humana diligentia prouenit. Erraticū uerò, qui suæ spontis & liber, sub nulla olitoris lege uagatur & errat, dixerunt. Satiuus Intubus, quem priuatim, Plinio lib. xx. cap. viij. teste, Serin nominarūt ueteres, in duas distrahitur species. Vna latiore folio constat, Lactucæ similior. Hæc corrupta ab Intybo uoce, in Hetruria passim Endiuiā appellatur. Et debet in omnibus pro uera Endiuiā usurpari officinis. Nam quæ hodie sub hac uoce utuntur, non est uera Endiuiā, sed Lactuca syluestris, ut suo diximus loco. Germanicè Endiuicn uocari potest. Altera angustiora folia habet, & subamara est. Hæc diminutiuo à Seris nomine Seriola dicitur, quod deinde corrumpentes recentiores Scariolam fecerunt, germanicè Scariol appellari poterit. Erraticus iterum Intybus in duas species, Plinio loco antea citato auctore, degenerat. Vna, quæ Græcis ab insigni amaritudine *πικρίς, ἢ λυχνόρυς* nominatur, Latinis autē Ambubcia. Vulgus herbariorū & officinæ Cichoreā uocant, Germani Wegwarten / quasi uiarum custodem, uel Wegweiß / quod peregrinis quasi uiam indicare uideatur. Altera, quæ latiore folio prodit, Plinio Hedypnois nominatur, haud dubiè non alia ratione, nisi quod suauiter dormire, somnumq; irreperere faciat. Vel, si paulò durior hæc uidetur interpretatio, quod flos eius præter alias Serides suauiter admodū spiret. Theophrasto libro septimo de plantarū historia, capite septimo, & Plinio lib. xxi. cap. xv. Aphaca alio nomine appellatur: diuersa tamen ab ea quam suprā descripsimus, & quæ aliàs Vicia syluestris dicitur. Vulgo **Dens leonis.** Dens leonis, quod folium sinuatim per lacinias denticulatū sit, & Rostrum porci num nominatur. Officinis nostris, quæ barbaris delectantur uocibus, Taraxacon, aut Altaraxacon dicitur. Germanis *Röhlkraut / Psaffenrölin / Psaffenblatt.*

## FORMA.

- Satiuus Intubus.** Satiuus Intubus caulem edit magnum, rotundum, striatum, frequentibus surculis brachiatū. Germinat foliatu statim à radice uenoso. Flos illi in ramusculis cœruleus, & nonnunquam etiam candidus emicat. Prima autem eius species, ut diximus, folio latiore, altero angustiore constat. Erratici Intubi genus primum, quod **Cichorium.** Cichorium uocant, germinat à radice post Vergilias, folio Betæ laciniato, ferè semper in solo procumbente: caule magno, fistuloso, frangi cōtumace, multis ramulis brachiato, ad uinctum quoque lentis: flore cœruleo, interdum albo, particulatim usque in autumnū erumpente, qui nubilo etiam die solis exortu panditur, & cum eo circumagitur in occasum, noctu semper compressus, & interdum hiscens. Hinc panditur rudissimus quorundā error, qui hanc herbā quam Germani Wegwart nominant, Heliotropiū esse cōtendunt, cum tamen primum folia repugnent, quæ non sunt Ocimo similia, neque candida, sed nigricantia magis. Deinde non candidum, sed magna ex parte cœruleū florem habet. Radix denique eius, ut Heliotropij, non inuulis, sed, experientia teste, mirè efficax. Quibus omnibus accedit manifesta cum alijs satiuis Intubis similitudo, quæ una satis docet Intubū esse syluestre, & non Heliotropiū. Vt quorundam temeritatē non satis mirari queam, qui contra apertam ueritatem, & omnium medicorum cōsensum, secus pronunciare audent. **Leonis dens.** Alterum, quod Leonis dens nominatur, folijs multis constat, utrinq; denticulatis, in terra sessilibus, cauliculis dodrantalibus, concauis, leuibus & enodibus, flore luteo, sti-



INTYBVM SATIVVM  
LATIFOLIUM.

Endivien.







INTYBUM SATIVUM  
ANGUSTIFOLIUM.

Scariol.





INTYBVM SYL-  
VESTRE.

Wegwart.





HEDYPNOIS

Körkraut.



A teo, stipantibus in circulum foliolis coronato, qui senescens euanescit in lanuginē, quæ cum aura raptim fertur.

## LOCVS.

Satius non prouenit nisi in hortis cultu & diligentia humana: haud tamen difficulter ubi satus fuerit, emergit. Erratici prima species passim iuxta itinera nascitur. Altera in hortis, & passim ferè etiam sponte sua gignitur.

## TEMPVS.

Satius Iunio & Iulio mensibus floret. Cichoriū eodem ferè tempore incipit florere, & in autumnum usque durat. Hedypnoidis in Martio erumpunt flores, & in æstatem usque perdurant.

## TEMPERAMENTVM.

Seris olus est subamarū, & magis quod syluestre est, quod ob id ipsum Picrida quidam nuncupant, quidam uerò Cichorium appellant. Est autem ea sicca frigidaque temperaturæ, utrunque secundo abscessu. Porro domestica magis etiam quam syluestris refrigerat. Sed & humiditatis multæ admistio siccitatem extinguit. Vtraque autem adstringentis qualitatis particeps est.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Omnes adstringunt & refrigerant, & stomachū adiuuant. Aluum sistunt coctæ, si cum aceto assumantur. Syluestres autem stomacho meliores. Comesti imbecillū & æstuantem leniunt. Cardiacis per se, aut cum polenta utiliter illinuntur. Podagricis & oculorū inflammationibus succurrunt. Herba & radix illita, percussis à scorpione subuenit. Ignibus sacris cum polenta medetur. Succus eorum cum cerusa & aceto utiliter his quæ refrigerationem desiderant inungitur.

## EX PLINIO.

B Intubi quoque nō extra remedia sunt. Succus eorum cum rosaceo & aceto capitis dolores lenit. Idemque cum uino potus, iecinoribus & uesicæ & epiphoris imponitur. Cichoriū refrigerat. In cibo sumptum & illitum collectiones, succusque decocti uentrem soluit. Iecinori & renibus, & stomacho prodest. Item si in aceto decoquatur, urinæ tormina discutit. Item morbum regium è mulso, si sine febre sit. Vesicam adiuuat. Mulierum purgationibus quidem decoctū in aqua adeo prodest, ut emortuos partus trahat. Adhuc magis, succo torius cum oleo perunctos fauorabiliores fieri, & quæ uelint facilius impetrare. Hedypnois stomachum dissolutū adstringit cocta: crudaque sistit aluum. Et dysentericis prodest magis cum lente. Rupta & conuulsa utroque genere iuuantur. Item quibus genitura uoletudinis morbo effluat. Seris utraque stomacho utilissima, præcipue quem humor uexat. Cum aceto in cibo refrigerant uel illitæ, discutuntque & alios quam stomachi. Cum polenta syluestrium radices stomachi causa sorbentur, & cardiacis illinuntur super sinistra mammam ex aceto. Omnes hæ & podagricis utiles, & sanguinē reijcientibus. Item quibus genitura fluit, alterno dierum potu.

## EX SYMEONE SETHI.

Stomacho bonum est Intubum, si cum aceto quis eo utatur. Postquam decoctū est, aluum sistit. Obstructiones auferendi uim habet, ut nullum aliud olus. Sanguinis feruorem sedat, & inflammationes iecoris discutit, & ictericos iuuat. Iecur proprietate quadā corroborat. Mediocriter somnū inducit. Tradunt quidā post uenæ sectionē, aut cucurbitas, si quis cum aceto utatur, iecinoris sanitatē conseruare. Veneris appetentiā extinguit, & semen genitale in his qui frigidam habent temperaturam, minuit. Vtile est ad sanguinis excreationē. Huius etiam decoctum iecinori admodum utile. Semen febres ex flaua bile

ortas iuuat: at lieni nocet.

DE STAPHY-





PASTINACA SATI  
VA PRIMA.

Jam Pasteney.



PASTINACA SATI  
VA ALTERA.  
Geelrüben







PASTINACA ER  
RATICA.

Wilde Pasteney.



A

## NOMINA.



TAΦΥΛΙΝΟZ græcè, Pastinaca latinè dicitur, Germanicè Pastiney / oder Pastnachen. Pastinacæ uerò nomen à pascendo dictum uidetur: *Pastinaca unde dicta.* natura enim ei calens, sapor uehemens, alit corpus, & Venerem cit.

## GENERA.

Duplex Pastinacæ genus. Vna enim satiuæ est, quæ iterum duorum est generū. Vnum genus quod uulgò Carota dicitur, Germanicè zam Pastiney / & rot Rûben. Alterū, quod quidam inter Rapa connumerant. Hinc est quod Germani geel Rûben uocant. Syluestris altera, quæ propriè Staphylinus Græcis nominatur, germanicè autem wild Pastiney / oder Vogelneß.

## FORMA.

Folia Gingidij habet Pastinaca syluestris, latiora tamen & subamara. Caulem rectum, asperumq̃, umbellam Anetho similē obtinentē, in qua flores candidi, exiguum quiddam purpurei in medio habentes, & ferè ad croceū accedentis. Radix digiti crassitudine, dodrantalis, odorata, quæ cocta mandit̃. Hortenses syluestribus per omnia similes sunt, nisi quod flores in medio purpureū quiddam non habeant, & radix unius in suprema sui parte purpurea sit, alterius autē magis lutea.

## LOCVS.

Pasim circa itinera, loca petrosa, & hortorū maceries sua sponte proueniunt erraticæ. Satiuæ in hortis nascuntur.

## TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus flores & semina Dauco similia producit utraq̃.

## TEMPERAMENTVM.

Calefacit & abstergit utraq̃, magis tamen syluestris.

B

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Erraticæ semen potum aut appositū menses ducit. Vrinæ difficultatibus, hydro picis, & pleuriticis in potu confert. Contra uenenatorum morsus & ictus utile. Ferunt non lædi à uenenatis qui id præsumperint. Cōceptus adiuuat. Radix ipsa urinam cit, & Venerem stimulat. Foetus ex utero pellit apposita. Folia trita cum melle imposita ulcera depascentia expurgant. Hortensis Pastinaca cibo aptior est. Ad eadem, sed minori efficacia, prodest.

## EX GALENO.

Pastinaca satiuæ imbecillior, syluestris ad omnia potentior. Vrinæ mouet, & menses prouocat cum herba quidem tota, tum maximè semen & radix. Habet porro etiam absterforium in se quippiam: quamobrem pascentia ulcera quidam folijs eius cum melle, quò pura reddant, illinunt.

## EX PLINIO.

Pastinacæ erraticæ semen contritum, & in uino potum, tumentē aluum, & suffocationes mulierū doloresq̃ lenit in tantum ut uulvas corrigat. Illitum quoq̃ è passo uentri earū prodest. Viris uerò cum panis portione æqua tritum. Ex uino potum contra uentris dolores. Pellit & urinā, & phagedænas ulcerū sistit recens cum melle impositū. Vel aridæ farinæ inspersam radicē eius Dieuches cōtra iecinoris & lienis, ilium, lumborū & renū uitia, ex aqua mulsā dari iubet. Cleophrantus & dysentericis ueteribus. Philistion in lacte coquit, & ad stranguriā dat radicis uncias quatuor. Ex aqua hydropicis, similiter & opisthotonicis, & pleuriticis, & comitialib. Habentes eam feriri à serpentibus negantur, aut qui antè gustauerint, non lædi. Percussis imponit̃ cum axungia. Folia contra cruditates mandunt̃. Orpheus amatorij inesse Staphylino dixit, fortassis quoniā Venerem stimulari hoc cibo certum est: ideo cōceptus adiuuare aliqui prodiderūt. Ad reliqua & satiuæ pollet, efficacior tamen syluestris. Semen satiuæ quoq̃ contra scorpionū ictus, ex uino aut posca salutare est. Radice eius circumsalpti dentes, dolore liberantur.

mm

DE STRYCHNO.





SOLANVM  
HORTENSE.

Nachtschatt.





687

HALICACABUM  
VVLGARE.  
Judendocken.

mm 12





HALICACABVM  
PEREGRINVM.  
Welsh Schluten.





**SOLANVM**  
**SOMNIFERVM.**

*Dollkraut.*

mm 3





STRAMONIA.

Rauchopffelkraut.



A

## NOMINA.



ΤΡΥΧΝΟΣ græcè, Galeno per unius literæ abiectionem τρυχον, Solanum latinè, officinis Solatrum, uulgo Cuculus, Vua lupina, Vua uulpis, Morellaq; dicitur. Germanicè Nachtschatt.

Solatrum.

Morella.

## GENERA.

Quatuor, Dioscoride & Galeno autoribus, Solani sunt genera. Primū hortense dicitur, quod scilicet olim in hortis cum alijs oleribus quæ edendo sunt, seminabatur. Hodie sua sponte, & inuitis cultoribus prouenit. Nigrum alio nomine, à nigris nimirum folijs, aut in extrema maturitate fructu nigro, appellatur. Germanis simpliciter Nachtschatt uocatur. Secundum, quod priuatim Halicacabum nominatur. Vesicariā quoq; uocant à folliculis quos producit, uesicarum in animantibus speciem imitantibus, uel quod uesicæ caclulis medeatur. Officinæ Arabes secutæ, corrupto Halicacabi nomine, Alkakengi appellant. Germani nostri Judenbütlin/ oder Doctlin/ Judentirschen/ Schlutten/ Boberellen/ Rot Nachtschatten. Est præterea alia Halicacabi species nuperrimè inuenta, & aliunde in Germaniam allata, cuius nemo antiquorum scriptorum, quod sciam, mentionem fecit. Nos discriminis gratia Halicacabū peregrinū nominauimus. Germanicè welsch Schlutten non ineptè nuncupauimus. Tertium Solanum somnificū, ab effectu scilicet nominant. Sunt qui Solatrum dormitoriū uel marinum dicant, quod rupibus non longè à mari inueniatur. Quartum Græcis μαννισον, hoc est, furiosum nominatur, officinis Solatrum mortale.

Solanum hortense.

Halicacabum, Vesicaria.

Alkakengi.

Solanum somnificum.

Solanum furiosum.

## FORMA.

B Solanū hortense frutex est esculentus, exilis, alas multas habens, folia nigra Octimo maiora & latiora, fructum rotundū, uiridem, cum autem maturuerit nigrum, aut rufum. Flos huic candicat. Halicacabū folijs priori simile, latioribus tamen. Caules eius postquam increuerunt in terram inclinant. Fructum fert in folliculis rotundis uesicis similibus, rufum, rotundum, leuem, uuarum acinis similem, quo coronarij utuntur texentes coronas. Peregrinum planta est pergulis operiendis aptissima: latissimè enim suis clauiculis sese diffundit. Folia habet oblonga, & lacinata. Flores candidos, uesiculas Halicacabo similes, in quibus semen includitur pisitis aut ciceribus simile, in cuius medio effigies ueluti cordis humani insculpta & incisa apparet. Somnificum frutex est ramos habens multos, densos & lignosos, difficile fragiles, folijs pinguibus refertos, mæli cotonei similitudine, florem rubrū, grandem. Semen in siliquis croceum. Radicem corticem habentem subrubrum, grandem. Furiosum folium obtinet Erucæ simile, maius tamen, satis ad spinam quam Pæderota uocant accedens. Caules à radice proceros decem aut duodecim emittit, ulnarū cubitorū uel quatuor altitudine, capitulum effigie oliuæ insidens, sed hirsutum ut Platani pilulæ, maius tamen & latius. Florem nigrum, post hunc fructum racemosum, rotundum, nigrum, denis aut duodenis acinis constantem, Hederae corymbis similibus, mollibus ut uuæ. Radicē candidam, crassam, cauam, cubitalem. Cæterum plantatur nunc in hortis Germaniæ herba Italis uocata Stramonium, & pomum spinosum, quam nonnulli inter Solani species numerant, non quod descriptioni respondeat, sed quod eius folia opij odorem referre uideantur. Quare ut alijs occasionem daremus cogitandi de hac planta, hoc loco eius picturam inserere placuit. Flores huius herbae suauem Lilij spirant odorem. Videtur uiribus parum à posterioribus generibus Solani distare. Germanicè à pomis appellare libuit, stechend oder rauch opffeltraut.

Hortense.

Halicacabum.

Somnificum.

Furiosum.



C

## LOCVS.

Hortense passim in opacis locis, & semitis obuiū est. Nascitur & in hortis. Halicacabum in uineis copiosissimè prouenit. Somnificū in saxosis nec procul à mari locis producitur. Furiosum in montanis, ac uento perflatis locis, & ubi Platani nascuntur.

## TEMPVS.

Hortense tota ferè æstate floret, autumnō autem fructus eius maturefcit. Halicacabum uescas illas suas in fine Augusti, & inter initia Septembris mensis colore primum uiridi, mox paulatim rubescente profert.

## TEMPERAMENTVM.

Hortense refrigerat & adstringit in secundo ordine, medium autem absolutè in humectando & exiccando, Galeno lib. v. simpl. cap. ix. teste. Idem faciunt Halicacabi folia. Somnificum tertij est refrigerantiū ordinis. Manici seu furiosi cortex radicis refrigerat secundo ordine incipiente, & desiccat in secundo iam completo, & tertio incipiente.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Hortense refrigerandi facultatē obtinet, quapropter folia ignibus sacris, herpetibus cum farina polentæ illita profunt. Per se autem trita & imposita argilopas, capitisq; dolores sanant. Stomacho æstuanti auxiliantur. Parotidas cum sale trita & illita discutunt. Succus eius ualet aduersus ignes sacros, & herpetas, cum cerusa, rosaceo & lithargyro. Ad argilopas uerò cum pane. Infantium quoq; ardori, quem syriasin uocant Græci, cum rosaceo perfusus proficit. Miscetur collyrijs pro aqua aut ouo contra acres fluxiones ad inunctiones. Aurium dolori instillatus prodest. Muliebria profluvia in lana appositus sistit. Succus fuluo gallinarum in domibus oberantium fimo subactus & linteo appositus argilopis remedio est. Halicacabum uim usumq; hortensis Solani habet, uerum non comeditur. Fructus eius potus, cō quod urinā mouet, regium morbum expurgat. Vtrorumq; herba exprimitur, & succus siccatus in umbra reponitur, ad eadem utilis. Somnifici radicis cortex in uino drachmæ pondere potus somnificam facultatē obtinet Papaueris succo mitiorem. Fructus uehementer urinam cit. Corymbi eius ferè duodecim hydropicis dantur. Plures autem poti ecstasin faciunt. Remedio est aqua multa copiosa potui data. Succus eius medicamentis dolorem leuantibus & pastillis miscetur. In uino decoctus & in ore retentus dentiū doloribus succurrit. Radicis succus cum melle inunctus oculorū hebetudines tollit. Furiosi radix in uino drachmæ unius pondere pota non illepidas neq; iniucundas imagines speciei sue efficit. Duarū uerò drachmarum pondere pota, ad tres usq; dies ecstasin affert. Quatuor autē drachmæ haustæ interimunt. Remedio est aqua multa maiore copia pota, & uomitione reiecta.

## EX GALENO.

Solanum esculentū quod in hortis nascitur, notū est omnibus, utunturq; illo ad omnia ea quæ refrigerari & adstringi postulant. Cæterorū uerò non esculentorum unum quidem nuncupatur Halicacabum, fructum habens rufum, acino uuarum tum figura, tum magnitudine adsimilem, quo etiam ad coronas utuntur. Alterū autem fruticosum, quod somnificū, & tertium quod furiosum dicitur. Halicacabum igitur in foliorū facultate hortensi simile est, fructum habens ciendæ urinæ idoneum: proinde multis compositis facultatibus quæ ad iecur, ad uescam & renes accommodantur, miscetur. Solani uerò somnifici cortex radicis si cum uino bibatur, somnū accersit drachmæ pondere sumptus. Sed & ad cætera Papaueris succo persimilis est, nisi quod eousq; imbecillior est, ut ipse tertij habeatur ordinis refrigerantiū, quum hic in quarto sit constitutus. Huius semen urinā mouendi facultatem habet. Si autem plus



**A**tem plus duodecim corymbis hauseris, dementiā furiāque adsciscet. Porro quod reliquum est ex dictis Solanis, ad medicationes quę intrō in corpus adhibentur, inutile est. Nam si quatuor eius drachmę sumantur, mortem inferent: si pauciores, insaniam. Vna certē innoxie offertur, cæterū nec ipsa utile quid obtinet. Verum si foris corpori illinatur, ulcera maligna & depascentia curat. Sed ad talia radicis cortex optimus est.

## EX PLINIO.

Strychno, quam quidam Trychnon scripsere, utinam nec coronarij in Ægypto uterentur, quos inuitat Hederę florū similitudo, in duobus eius generibus. Quorum alterum cui acini coccinei, granosi folliculi, Halicacabū uocant. Nostri autem uesicariam, quoniam uesicę & calculis prodest. Frutex est surculosus uerius quā *vesicaria.* herba, folliculis magnis latisq; & turbinatis, grandi intus acino, qui maturescit Nouembri mense. Tertio folia sunt Ocimi, minimē diligenter demonstranda. Remedia enim, non uenena tractamus: quippe insaniam facit paruo quoq; succo. Quamquam & Gręci autores in iocum uertēre. Drachmę enim pondere lusum pudoris gigni dixerunt, species uanas imaginesq; conspicuas obuersari demonstrantes. Duplicatum hunc modum, legitimā insaniam facere. Quicquid uerō adijciatur ponderi, repręsentari mortem. Hoc est uenenum quod innocentissimi autores simpliciter Dorycnion appellauere, ab eo quod cuspides in pręlijs tingerentur illo passim nascente. Quin & alterum genus soporiferum est, atq; etiam opio uelocius ad mortem. Laudatum uerō à Diocle & Euenore: quippe pręsentaneum remedium ad dentes mobiles firmandos, si colluerentur: huic tamen exceptionem addidere, ne diutius id fieret: delirationem enim gigni eo. Cōmendatur & in cibis tertium genus, licet pręferatur hortensis saporibus. Et nihil esse corporis malorum, cui non salutare sit Strychnos, Xenocrates prędicat. Somnifici radicem bibunt qui sunt uaticinandi callentes, quod furere ad confirmandas superstitiones aspici se uolunt. Remedio est (id enim libentius retulerim) aqua copiosa mulsa calida potui data. Nec illud pręteribo, aspidum naturę Solanū somnificum in tantum aduersum, ut radice eius propius admota soporentur, illud sopore enecante uim earum. Ergo trita ex oleo percussis auxiliatur.

## APPENDIX.

Quod nos somnificum esse dicimus Solanum, aliqui hortensē non sine maximo errore esse putant, plurimumq; suis conferre, ac easdem à letalibus morbis pręferuare asserunt. Nos tamen non laboramus magnopere quomodo suis succurrat, sed quid in homine possit magis consideramus, quum constet pleraque alijs animantibus esse cibum, quę homini uenenum sunt. Experientia uerō cognitum est, geminos pueros statim ex esu acinorum huius generis Solani mortuos esse. Quod sanē exemplum nos mouet ut somniferum esse credamus, potissimū cum in uniuersum ferē illi descriptio quadret, uno hoc dempto, quod semen non habet in siliquis croceum. Sunt autem notę quędam in hortensis etiam deliniatione quę illi non conueniunt. Neque enim exilis est frutex, sed propemodum arborescens: neque etiam florem candidum, sed spadiceum obtinet. Quod uerō ad flores & fructum attinet, uidetur accedere ad historiā Solani furiosi, ut suspicio ferē sit duorum horum generum historias esse confusas: quam quidem auget Theophrastus, qui in eorundē descriptione nonnihil à Dioscoride uariat. Quicquid uerō sit, certum est Solani esse speciem, quod forma ipsa foliorū abundē docet: atq; huic uehementē refrigerandi uim, maximē si paulō copiosius sumat, inesse, ut hoc nomine pro somnifero Solano eius usus medicis nullo periculo esse queat. Nos uulgi sententiā sequuti, appellauimus *Dolltraut*. Posset etiam germanicē uocari *Schlaff Nachtschatt*. Sunt qui *Sewtraut* nominant. Quod si tamē hęc nōnullis haud satisfecerint, certē necesse erit Mandragorę speciem esse fateantur tertiā, quam pingit Theophrastus lib.



- C stus lib. vi. de hist. plant. cap. ij. ijs uerbis: ἰδιότῃ δὲ ὁ κατὰ τὸ μανδραγόρα τῷ μέλει τε καὶ ῥα γῶδῃ τε καὶ οἰνώδῃ ἐστὶν τῷ χυμῷ. hoc est, fructus Mandragoræ peculiaris, quia niger, acinosusq̃, & uinosus suo sapore sentitur. Hæc enim omnes notæ in fructu huius fruticis reperiuntur. Sed plura ea de re in capite de Mandragora diximus.

## DE SYMPHYTO MAGNO CAP. CCLXV

## NOMINA.

Symphytum car  
ditum.



ΥΜΦΥΤΟΝ, ἡ σύμφυτον μέγα Græcis, Symphytū & Solidago Latinis, officinis & herbarijs Consolida maior, Germanis Walwurz/Schwarz wurz/Schmerwurz/grosse beynwell. Nomen illi apud Græcos Latinosq̃ egregia constringendi & conglutinandi uis fecit.

## FORMA.

Consolida maior  
Obiecto diluatur

- Caulē emittit binūm cubitorum, aut maiorem, leuem, crassū, angulosū, Sonchi modo inanem, circa quem folia sunt non magnis interuallis distantia, hirsuta, angusta, oblonga, ad Buglosi foliorum figuram accedentia. Habet caulis secundum angulos eminentias quasdam productas. Folium tenue ex singulis alis prodit. Flores lutei, & semen Verbasci. Totus uerò caulis & folia quandam lanuginē modicē asperam, tactu pruritu mouentem, habent. Radices in superficie extræ nigræ, intus candidæ & glutinosæ, quarum est usus. Hæc siquidem delinatio adamussim huic herbæ quæ uulgò Consolida maior appellatur, competere uidetur, quod nulla prorsus sit nota quæ illi non quadret. Sed obtrudet quispiam, florum colorem non respondere, quem Dioscorides luteum esse dicit, quum in nostra Consolida alius sit. Cui ita responsum uolo. Coloris ista in floribus diuersitas non tanti momenti est, ut aliud à Consolida maiori Symphyton esse, conuincere possit: neque enim ubique terrarum, etiam earundem herbarum, flores similes sunt. Exemplo est Buglossum, quod Boraginem hodie officinæ uocant: hoc enim interdū albos, quos nos Norimbergæ & Culmachij sæpe uidimus: magna autē ex parte purpureos producit flores. Sic quoque Symphytum frequenter flore subrubro, uel leniter purpurascēte, ut Onoltzbachij, rarius candido conspicitur. Tubingæ tamen omnia flore albo uisuntur. Luteis floribus nullum in Germania uidisse me memini. Quod autem alios quàm luteos nonnunquam proferat flores Symphytum, satis docet Apuleius in cōmentariolo illo quem de herbis conscripsit, qui illius flores nigros esse tradit, subrubros aut subpurpureos haud dubiè innuens. Nos una pictura utrosq̃ flores exhibemus. Germani candidis floribus Symphytum fœminā, subrubris uerò marem appellant. Cæterum non est quod in Symphyti descriptione te perturbet aut remoretur, quod idem caulis simul leuis & angulosus dicitur: id enim sic intelligendum uenit, quod caulis nō perpetuò leuis aut angulosus sit, sed modo hunc, modo illum producat pro soli diuersitate.

## LOCVS.

Locis aquosis, palustribusq̃ abundè prouenit.

## TEMPVS.

Per integram æstatem floret. Radix tamen in autumnno carpēda uenit.

## TEMPERAMENTVM.

Modicè, ordine scilicet secundo, calefacit, exiccat & contrahit.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radices tritæ & potæ cruenta expuentibus, ruptisq̃ prosunt. Recentia uulnera illitæ glutinant. Carnes si unā coquantur cogunt, Inflammationibus, sedis potissimum, cum Senecionis folijs utiliter illinuntur.

EX GALE.





SYMPHYTVM  
MAGNUM.

Walwurtz.



C

## EX GALENO.

Symphytū magnum similem petræo facultatem habet, non tamen gustantibus dulce, neq; odorantibus odoratum apparet, sed ijs sanè ab illo diuersum est. Cæterum quatenus uiscositatē quandam & mordacitatē obtinet, Scillæ simile est. Vti-  
tor eo ad omnia quæ petræo. Potest autem petræum collectū in thorace, pulmo-  
neq; pus expurgare. Habet etiam contrahendi uim, qua sanguinis eiectionibus au-  
xiliatur. Enterocelijs imponitur, & ad conuulsa & rupta cum oxymelite bibitur.  
In uino decoctum ad dysenteriam, & profluuium muliebre rubrum constringen-  
dum exhibetur.

## EX PLINIO.

Symphyti radix illita, enterocelas cohibet. Vulneribus sanandis tanta præstan-  
tia est, ut carnes quoq; cum coquuntur, conglutinet addita, unde & Græci nomen  
imposuere. Olsibus quoque fractis medetur.

## SYMPHYTI PETRAEI VIRES.

Quum Dioscorides & Galenus ad Symphyti facultates lectorem in Symphyti  
magni historia ablegent remittantq; necesse est ut illas ordine cōnumeremus mo-  
re quidem nostro primum ex Dioscoride, deinde ex Galeno & Plinio.

## EX DIOSCORIDE.

Decoctum in aqua mulsa & potum Symphytū petræum, quæ in pulmone sunt  
expurgat. Sanguinē reiicientibus & renum doloribus cum aqua datur. Ad dysen-  
teriam & rubra sceminarum profluvia in uino decoctum bibitur. Ad conuulsa &  
rupta ex aceto mulso sumitur. Cōmanducatum sitim arcet. Gutturis asperitatibus  
prodest. Recentia uulnera glutinat, & intestinorū ramices illitum coërcet. Carnes  
D cum unā coquitur conglutinat.

## EX GALENO.

Symphytū petræū ex contrarijs constat facultatibus: habet enim incidendi uim  
quampiā, qua collectū in thorace & pulmone pus expurgare potest. Habet etiam  
quandam contrahendi facultatem, qua eiectionibus sanguinis auxiliatur: & tertia  
ad eas inest humiditas quædam non immodicè calida, per quam gustantibus dulce  
apparet, & odoratu iucundum. Mansum sitim extinguit, & arteriæ asperitates sa-  
nat. Porro secundum omnium dictarū uirium mistionē simul digerere abundè po-  
test, simulq; corpora contrahere & constringere. Proinde enterocelijs imponitur,  
& ad conuulsa & rupta cum oxymelite bibitur. Cæterum qui ipsum in uino deco-  
ctum ad dysenteriam, & rubrum muliebre profluuium exhibent, tanquam desic-  
cante & contrahente utuntur. Qui uerò ad nephritin renūmque dolorem, tanquam  
expurgante & incidente,

## EX PLINIO.

Vtilissimū lateribus, lienibus, renibus, torminibus pectoris, pulmonibus, san-  
guinem reiicientibus, faucibus asperis. Bibitur radix trita, & in uino decocta, & ali-  
quando superlinitur. Quin & cōmanducata sitim sedat, præcipueq; pulmonem re-  
frigerat. Luxatis quoque imponitur & cōuulsis, lieni, interaneis. Aluum sistit coa-  
cta in cineres. Detractis quoq; folliculis trita cum piperis nouem granis, & ex aqua  
pota. Vulneribus sanandis tanta præstantia est, ut carnes quoque cum co-  
quantur, conglutinet addita, unde & Græci nomen  
imposuerunt. Olsibus quoq; fra-  
ctis medetur.





CUCUMIS SATIVUS  
VULGARIS.

Cucumber.






698

CUCUMIS TUR-  
CICUS.  
Türkisch Cucumer.





CUCUMER  
MARINVS.

Bitter Cucumer.





CUCUMER  
CITRVLVS.  
Citrullen.



PEPO  
Pfeben.

nn 3





Cucumer unde  
dictus.



Sicys.

Adagium.

Textrices mas-  
gna ex parte  
impudica.

ἡ σίκυς, καὶ σίκυς ἡ μέρη Græcis, Cucumis & Cucumer Latinis dicitur. Officinæ latinam appellationē retinuerunt. Aëtius Anguriū etiam uocari tradit. Germani Cucumern uocant. Cucumer autem, ut Varroni placet, dicitur à curuore, quasi Curuimer. Sicyn uerò Græci ex aduerso nasse uidentur. Hinc celebratum Græcis prouerbiū est, ut ex Athenæo annotauit Hermolaus: Texens pallium mulier cucumerē deuoret. quòd textrices magna ex parte, si Aristoteli credimus, impudicæ sint, & opportunæ Veneri. Vt ergo hys impetus infrenet & elanguescat, adagiū edendos cucumeres textricibus consulebat.

#### GENERA.

Pepones.  
Melo-pepones.

Melones cit-  
ruli.

Cucumis.

Anguria.

Citreoli aut  
Citruli.

Pepon.

Melon.

Cucumerū genera sunt Pepones & Melo-pepones, in quos statim degenerant, figura tantum & quantitate inter se dissidentes. Siquidem qui magnitudine excedunt, aut in longitudinē procedunt, quales multis locis nascuntur, Pepones quondam uocati fuerunt. Sed qui formam & effigiē māli referunt, & humi rotundantur, Melo-pepones Græcis uocantur, factō ex Pepone & mālo nomine: neq; inter Pepones & Melo-pepones aliud quā quod sumitur ex figura quondam, ut diximus, discrimen fuit. Torum hoc genus Palladius Melones, quasi μῆλωνες, id est, pomeos, à mālorum figura appellauit, quo nomine maior pars hodie medicorū simul cum officinis utitur. Sunt itaq; in uniuersum tria Cucumerū satiuorum genera. Primum genus absolutē Cucumis, à nostræ ætatis herbarijs, cum adiectione Cucumis citrinus, hoc est, flauus, à colore quem habet cum maturuerit, appellatur. Aëtius, quod equidem sciam, primus Anguria uocari tradit, quæ ueteribus σίκυς, id est, Cucumeres nominantur. Horum sanè plura sunt genera, nos quatuor potiora cōmemorabimus, quorū etiā picturas exhibemus. Primi generis est uulgaris Cucumer, fructū obtinēs oblongū & maculosum, germanicè uocat gemeyn Cucumern. Sunt qui illum priuatim Anguriā appellent. Ad quod sanè nomen alludentes Germani nostri, alio nomine Gurken nominant. Alterius generis Cucumer est peregrinus, quem uulgus Turcicū nuncupat, priori multò maior ac procerior folijs, floribus & fructu, qui ut in primo nō est maculosus, sed tamen oblongus etiā. Germani Türckisch Cucumern appellant. Fructus eius admodū flauus existit, hinc est quod multi eundē priuatim Citrulum & Citreolū, quasi citrinū, hoc est, flauū uocent. Huius semina alba & lata sunt. Tertiū generis Cucumer est qui marinus dicitur, Turcico, quod ad folia, flores & semina attinet, ferè similis, nisi quod in hoc omnia sint minora. Fructus uerò rotundus, ut pictura monstrat. Vulgus Zucco marini uocat. Germani meer Cucumer. Officinis perinde atq; Turcicus ignotus. Quarti generis Cucumer est, quem officinæ hodie Citrulū uocant. Folia habet ferè Colocynthis, multifariā dissecta & incisa: fructū rotundū, herbacei coloris, & in eo semina lata, & colore spadicea, hoc est, in rufo atra. Nos officinas respicientes nominauimus hunc Cucumerē citrulū, germanicè Citrullen. Alterū genus Cucumeris Pepon est, qui nunc simpliciter Pepon, καὶ ὁ πεπόνις, hoc est, maturescere dicit. Is enim mitis ac tener maturitate flaccescit. Germani Pseben appellant. Tertiū genus Cucumeris hodie Melon ab omnibus uocatur, Germani Meloun nominant. A priorē forma & suauitate differt: rotundior siquidē & māli cotonei quasi formā referēs, mitiorq; existit. Discrimen hoc sentientes posteriores Græci σίκυς simpliciter dixerunt, quem nos priuatim modo Cucumerē uocamus. Adiecta autem Peponis uoce, hunc quem nostra ætas priuatim Peponē nominat, σίκυς πεπόνις, id est, Cucumerē Peponē dixerunt, mitē scilicet & maturitate tenerū Cucumim innuentes. Sub quo eum etiam, quem à tereti ac rotunda māli effigie μῆλωνες peculiariter dixerunt, complexi sunt.

#### FORMA.

Cucumis.

Cucumis sarmentis uiticulisq; prælongis serpit, in ramosq; uitis modo se diffundit, ta-



A dit, tamen ob caulis infirmitatē humi spargitur, ni propius ad sit cui caducus incumbat: folio anguloso, flore luteo, fructu cartilagineo, & interdum maculoso, coloris tum herbacei, tū citrini, tum nigri. Pepo uite serpit praelonga, flagellis ultro citroq̃ reptantibus, uirgineis ferē frondibus, scabris, flore luteo, fructu cartilagineo, orbiculatim striato, prominulis puluinorū toris, strigilibus in uertice pomi & umbilico coeuntibus, ibidemq̃ stellatim decussatis, cute aspera uelut lentiginibus occupata, carne intus suauis, seminibus in utero liratim digestis.

## LOCVS.

Pingui gaudet solo, locisq̃ apricis uberior prouenit Cucumis. Nascuntur & pepones bene cultis locis, eoq̃ lātius si subinde rigentur. Amant tamen aprica loca, & sole irradiata: ideoq̃ cum annus est pluuiosus & nubilus, non æquē ut in siccis annis proueniunt. Libertate etiam gaudent, qua possint ultro uagari. Magna copia Peponum & Melonum apud Norimbergam, celeberrimū Germaniæ nostræ oppidum, prouenit.

## TEMPVS.

Æstatis fine, Iulio potissimū mense, maturescunt. Citius tamen Melones, quā priuatim Cucumeres dicti.

## TEMPERAMENTVM.

In Cucumeribus superat humida & frigida temperies, non tamen uehementer, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis aut semen aut radicem arefaciat, haud etiam humidæ fuerit naturæ, sed iam desiccantis, idq̃ in primo quodammodo ordine, aut in secundo incipiente.

## VIREs. EX DIOSCORIDE.

B Satiuus Cucumis bonam facit aluum, stomachoq̃ accommodatus est. Refrigerat, nec corruptionē sentit. Prodest uesicæ. Olfactu animo deficientes restituit. Semen eius mediocriter urinā cit. Cum lacte aut passo uesicæ exulcerationibus subuenit. Folia eius cum uino illita, morsus canum sanant, cum melle uerò epinyctidas. Peponis autem caro comesta urinam cit. Inflammationes oculorum illita sedat. Superior eius cortex contra adustionem infantium, quam siriasin uocant, syncipiti imponitur. Fronti ut oculorū fluxiones auertat, imponitur. Mixtus farinæ, & cum semine in sole siccatus succus, smegma fit ad extergendā cutem, & nitorem in facie conciliandum. Radix sicca, & cum hydromelite drachmæ pondere pota, uomitiones mouet. Quod si quis modicē à cœna uomere cupiat, gemini oboli satis erunt. Sanat & ulcera in modum faui concreta, ceria uocant, cum melle illita.

## EX GALENO.

Cucumis esculentus maturus quidē tenuioris essentia est, qui uerò immaturus est, crassioris. Sed & abstergendi & incidendi facultate participant, quare & urinā mouent, & corpus splendidum reddunt: at magis si quis semine arefacto contusoq̃ atq̃ cribrato, uice pulueris absterforij utatur. In semine & radice maior abstergendi facultas, quā in fructus ipsius carne. Vniuersa Peponū natura frigidior cum largā humiditate existit. Habent & quandā abstergendi uim, ideoq̃ urinam cient, & deorsum expeditius quā Cucurbita & Melo pepones rapiuntur. Quod porro abstergant, discere licet sordidam cutem defricando. Quamobrē maculas etiam solis calore factas, & lenticulas faciem occupantes, & in superficie alphas extergere possunt. Semen quod in eorum ueluti carne continetur, ad hoc efficacius, adeo ut renibus etiam calculo infestatis sit accommodatum. Gignit in corpore uitiosum succum, potissimū quando non rectē concoquitur. Tum uerò morbū etiam qui cholera dicitur, inducere consuevit. Etenim priusquam ad corruptionem peruenit, uomitioni quoque idoneus est: largiusq̃ ingestus, nisi quis aliquid eorum quæ boni sunt succi supermandet, omnino uomitum concitabit. Melo pepones minus hu-



**C** midi quàm Pepones sunt, nec adeò prauis succi, segnius item prouocant urinam, tardiusq̃ deorsum descendunt. Ad uomitū excitandum non eandem uim Peponibus obtinent, sicut nec celeriter in uentriculo, quando illic prauus humor coaceruatur, aut alia corruptionis causa illum infestauerit, corrumpunt. Ventriculo haudquam ceu Pepones officiunt. Cucumeres autem urinam mouendi facultatem, perinde atque Pepones habent, sed imbecilliores: minus nanque substantia humidi, ideoq̃ nō facile, ut illi, in uentriculo corrumpuntur. Inuenias qui hos ceu alia multa, quæ bonæ hominum parti concoqui non possunt, conficiant, ob totius scilicet naturæ cum eis proprietatem.

## EX PLINIO.

Pepones qui uocantur, refrigerant, maximè in cibo, & emolliunt aluum. Caro eorum epiphoris oculorum, aut doloribus imponitur. Radix sanat ulcera concreta in modum faui, quæ ceria uocant. Eadem contra uomitiones siccatur, in farina tusa datur, quatuor obolis in aqua mulla, ita ut qui biberit, quingentos postea passus ambulet. Hæc farina & in smegmata adiicitur. Cortex quoque uomitionē mouet, faciem purgat. Hoc & folia cuiuscunq̃ satiui illita. Eadem cū melle epinyctidas sanant; cum uino canis morsus. Cucumis odore defectum animi.

## EX SYMEONE SETHI.

**D** Anguria, quæ Cucumeres dicuntur, secundum uerò cōmunem sermonem Tetrangura, ob frigidū & humidum temperamentū noxia sunt, & mali succi. Ex his autem parua magnis anteferre oportet. Hæc urinā ducunt, & si in aceto macerentur, in acutis præsertim febribus, mitiorē calorem reddunt. Crebrior uerò horum usus semen genitale minuit, in Veneremq̃ impetū aufert. Semen autem horū desiccātū, caliditatem quandā possidet, contrariamq̃ his actionē efficit, urinamq̃ magis prouocat. Pituitā glutinosā Tetrangura in uentriculo gignunt, quæ cruda per uenas diffunditur. Propterea qui his crebrius utuntur, illi propter humores temporis spatio in uenis, & alijs corporis cavitatibus coactos, longis corripiuntur febribus. Semen uerò horum urinā cit, sed minus quàm Peponū, quoniam celerius in uentriculo corrumpuntur. Meliora in his sunt quæ habent semen exiguū. Calidos autē & siccos stomachos iuuant, & si in ardente febre cum aceto porrigantur, ualde profunt. Propriū uerò horum est nausæ uentriculi calore excitatas, sedare. Horum autem interiora esse oportet: nam quæ foris sunt, mali succi existunt, & difficulter admodū concoquuntur, & ferè uenenata. Habent uerò & alias proprietates, ut animo deficientes propter excedentē calorem reficiant. Si autē pituitā in uentriculo nanciscant, nausæ faciunt, & colicos affectus, & hypochondriacas passionēs.

## DE SICY SYLVESTRI CAP. CCLXVII.

## NOMINA.

Cucumis anguina.  
Cucumer asinus.



ΙΚΥΣ ἄγριος, ἡ ἰλατιέλα, sic autē propriè uocatur succus eius Græcis, Cucumis anguinus, syluestris & erraticus Latinis, officinis & barbaris Cucumer asinus, Germanis wild Cucumer / uel esels Cucumer appellatur.

## FORMA.

Solo fructu à satiui Cucumere distat, quem multo minorē habet, glandibusq̃ longiusculis similem. Folia & sarmenta satiui similia. Radicem albam & magnam. Totus frutex amarus.

## LOCVS.

Ruderibus sabulosisq̃ locis prouenit. Nusquā tamen in Germania, quod sciam, nisi satus nascitur.

## TEMPVS.





CUCUMIS SYL-  
VESTRIS.

Wild Cucumber.



## TEMPVS.

C

Augusto mense floret, atque subinde autumnno fructum tempestiuū producit, qui seminibus ac succo plenus est, qui decerpto pediculo confectum exilire solet.

## TEMPERAMENTVM.

Calidus & siccus est Cucumis syluestris, ut ex uiribus latius patebit.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

*Elaterij confectio.*

Foliorū succus instillatus aurium dolori conuenit. Illita ex polenta radix omne uetus cedema discutit. Imposita cum resina terebinthina, tubercula rumpit. Decocta ex aceto & illita podagras discutit. Ischiadicis infunditur eius decoctum, eoq̃ in dolore dentes colluuntur. Arida trita, alphas, lepras & imperiginē abstergit. Cicatrices nigras, & in facie maculas expurgat. Radicis succus sesquioboli pondere, & item cortex acetabuli quarta parte, bilem pituitamq̃ deijciunt, præsertim in hydro picis. Purgat uerò citra stomachi iniuriam. Radicis selibram accipere oportet, inq̃ duobus uini, præsertim Libyci, sextarijs conterere, ac dandi ex eo terni cyathi, donec tumor abundè subsederit. Quod uerò Elateriū uocatur, ex fructu huiusce Cucumeris paratur ad hunc modum. Eligito Cucumeres qui tacti saliendo succum ex se profundunt, ac nocte una repositos dimitte. Postridie cribrum rarius neque crebra foramina habens crateri superponito, supinoq̃ cultro sursum uersus aciem habente sigillatim Cucumeres utrisq̃ manibus prehensens diuidito, & per cribrum in subiectum craterem humorem exprimito, simulq̃ carnosum in eis quod iam cribro adharet exprimito, ut & illud descendat. Quæ expressa sunt in paratā peluim cōijcito. Coaceruatis autem in cribro quæ antea dissecta fuerunt, ea dulci aqua perfundito, & cum expresseris abijcito. Humorē in pelui agitatū, & linteo opertum, soli exponito, dumq̃ steterit totam supernatantē aquam, cum humore cōcreto, percolato. Facitoq̃ id sæpius donec supernatans aqua subsidat, quam cum diligenter excolaueris, coniectum in mortarium sedimentū terito, & in pastillos conformato.

*Vires Elaterij.*

Elaterium uerò à bimatu ad decenniū purgationibus utile. Integra quantitas obolus est, minima semiobolus, pueris chalci duo. Copiosius enim potum, periculū adfert. Pituitā & bilem per inferna pariter & superna trahit. Optima autem per ipsum difficulter spirantibus fit purgatio. Quod si itaque in animo est per aluum purgare, adiecto salis duplo, & stibij quod colorari sufficiat, ex aqua cataportia erui magnitudine dato. Postea cyathus unus aquæ tepidæ sorbeatur. Ad citandas uerò uomitiones aqua diluens Elaterium, subiectas linguæ partes penitissimè penna oblinito. Quod si quispiam difficiliter uomat, oleo aut unguento irino diluito. Somnum inhibeto. Porro ijs qui supra modum purgantur, uinum cum oleo mixtum continuo dare conuenit: etenim uomendo emendantur. Quod si uomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densare possunt offerenda sunt. Ciet Elateriū menses. Fœtus enecat in pello subditum. Morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum. Diuturnos capitis dolores finit. Efficaciter angina laborantibus inungitur, cum uetere oleo, melle, aut felle taurino.

## EX GALENO.

Cucumeris syluestris, & fructus ipsius succus, quem Elaterium uocant, & non minimè radicis ac foliorū, ad medicationes perutilis est. Elateriū itaq̃ menses ciet, & fœtum interimit appositum, ceu alia omnia amara & subtilium partiū, maximè si aliquam habeant caliditatē, ueluti Elaterium. Summè siquidem amarum est, leuiter calidum, ut ex secundo sit ordine calefacientiū. Porro tale protinus quoq̃ digerendi uim obtinet. Sic igitur eo angina laborantes inungunt quidam cum melle, aut oleo uetere. Bonū item est regio morbo affectis fusum cum lacte in nares. Hoc etiam usu dolores capitis sanat. Atq̃ Elateriū quidem eiusmodi est. At radicis succus, ut & foliorum, licet similem uim habeat, imbecilliorē tamen. Sed & ipsa radix adsimi-



A ad similem facultatem possidet, abstergit nanque, digerit atque emollit. Porro cortex eo potentius desiccatur.

## EX PLINIO.

Ex Cucumere sylvestri fit medicamentum quod uocatur Elaterium, succo expresso est fructu. Cuius causa nisi maturius incidatur, succus exilit, oculorum etiam periculo. Obscuritates & uitia oculorum sanat, genarumque ulcera. Tradunt hoc succo tactis radicibus uitium, non attingi uuas ab auibus. Radix autem ex aceto cocta podagris illinitur, succoque dentium dolori medetur. Arida cum resina impetiginem & scabiem, quam psoam & lichenas uocant. Parotidas & panos sanat, & cicatricibus colorem reddit. Et foliorum succus auribus surdis cum aceto instillatur. Nullum ex medicamentis Elaterio longiore auro durat. Incipit a trimatu. Melius autem quo uetustius erit, quod iam ducentis annis seruatum esse autor est Theophrastus. Et usque ad quinquagesimum lucernarum lumina extinguit. Hoc enim ueri experimentum est, si admotum prius quam extinguat, scintillare sursum ac deorsum cogat. Efficax est contra scorpionum ictus Elaterium, & ad purgandum uterum, aluumque. Modus portione uirium a dimidio obolo ad solidum. Copiosius necat. Sic & contra phthiria si bibitur & hydropises. Illitum, anginas & arterias cum melle, & oleo uetere sanat.

## DE SMILACE HORTENSI

## CAP. CCLXVIII.

## NOMINA.



**SMILAX** *μπαλιν* graece, Smilax hortensis latine, officinis inusitata: recentiores Graeci ac herbarii, & qui Arabum, praesertim Serapionis & Aui-cennae, sectantur placita, Phasiolos uel Faseolos. Galenus & alij ueteres Graeci Dolichos appellant. Germani *Jaselen* / *welsch oder wild*

*Phasioli*  
*Dolichi*

*Dolichos* uocant.

## FORMA.

Folia Hederæ similia habet, molliora tamen: caules tenues, & capreolos uicinis fruticibus se implicant, in tantum incrementum, ut tabernacula effingere possint. Fructum Foenograeco similem profert, longiorem tamen maioremque, in quo semina renibus similia, non unius coloris, sed ex parte subrufa continentur. Ex qua certe deliniatione sole clarius fit Smilacem hortensem Dioscoridis non esse nisi phaseolos uulgo uocatos, cum sint folijs Hederæ, mollioribus atque uenosis, cauliculis tenuibus, clauiculis propinquis fruticibus se implicantibus, ramis incremento suo tentoria & hortorum cameras fornicisue facientibus, siliquis Foenograeco haud dissimilibus, longioribus autem & maioribus, seminibus intus uersicoloribus, & renibus in uniuersum similibus. Quae certe unica nota ad docendum Smilacem hortensem esse Phaseolos sufficere posset. Accedit quod Phaseolorum apud Serapionem descriptio non sit alia quam apud Dioscoridem Smilacis hortensis, id quod manifestè patebit utraque conferenti. Ceterum etsi duo Phaseolorum uideantur esse genera: sunt enim aliqui candidi, nonnulli uerò rubentes, tamen quia in folijs nulla est prorsus diuersitas, & Dioscorides quoque innuat semina haec non esse unius coloris, sed ut Serapion interpretatur, quaedam ad candorem, quaedam uerò ad ruborem accedant, ideo sub unica pictura utriusque coloris Phaseolos exhibemus: neque enim distant alia ratione, quam quod albi producant flores candidos, rubentes uerò purpurascens. Licet non ad candidos & rubentes tantum haec Dioscoridis uerba, *ἐκ ἰσχυροῦ*, referenda esse existimem, sed ad alios etiam: sunt enim nonnulli fusci, alij uerò gilui, caerulei & caesi, alij maculis & orbibus atris uariecati, nisi quis omnes iam dictos colores sub candido & rubro, ex quibus si comixti esse uidentur, complecti uelit.

*ισχυροῦ*

LOCVS,





SMILAX HORTENSIS.

Welsh Bonen.



## LOCVS.

**A** Smilax de qua hic agimus, ut ex nomine satis constat, in hortis nata prouenit, & cum longis serpat flagellis, propè poni ridicè paliue debent, quas capreolis suis, ubi increuerit, complectatur.

## TEMPVS.

Æstate florent, ac subinde siliquas & in ijs semen producunt.

## TEMPERAMENTVM.

Symeon Sethi & Mauritani in primo ordine calidos & humidos esse Phascolos statuunt. Galenus etiam in libro primo de alimentorū facultatib. humidiores natura esse asserit.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Olerū modo esui apta est siliqua cum semine Asparagi modo elixa. Vrinam pel-  
lit, insomniaq̃ grauiā & tumultuosa facit.

## EX GALENO.

Dolichi non minus quā Pīsa nutriunt, similiter etiam flatu carent: sed quod ad suauitatē attinet & deiectionē, peiores sunt. Alibiles itaq̃ sunt, nisi quando integri & etiamnū uirides unā cum suis siliquis ex oleo & garo ab hominibus ingeruntur. Aliqui uinum etiam adhi-  
cūt. Sed horum in repositione, ut Pīforū, nullus est usus: quippe quum natura sint humidiores, citò corrumpi cōsueuerunt. Attamen si quis hos tutò reponere cupiat, siccare prius diligenter & exactè oportebit. Siquidem eo modo & à putrefactione, & à corruptione tota hyeme uindicantur, eundem quem nobis Pīsa usum exhibentes.

## EX AETIO.

**B** Siliquæ seu Lobi qui nunc passim uocant, apud omnes antiquos Dolichi & Phasioli appellati, de genere Pīforum sunt, similes illis quantū ad minimam flatus generationem: quantum uerò ad iucunditatē cibi & egestionem, peiores. Peculiariter autem Lobi dicuntur, quoniam ferè isti tantum eorum omniū quæ siliqua uestiuntur, cum siliquis suis comeduntur.

## EX SYMEONE SETHI.

Qui ex ijs magis rubri sunt, calidiores. Manifesta quoque in ijs humiditas, quod citò putrescant. Humorē generant crassum & pituitosum. Medium locum habent, ut ait Galenus, inter ea quæ facili & difficulter cōcoquuntur, celeriter & tardè transeunt, inflant & non inflant, parum & multum nutriunt. Ante alios cibos cum sapa sumpti, uentrem proritant. Cum sinapi oblati, plurimum noxæ deponūt. Albi igitur Phasioli crassiores, & difficilioris coctionis, ac humidiores sunt quā rubri. Proprietate autem quadam turbulenta somnia facit, sed ad bonam habitudinē corporis conferunt, & urinas mouent. Et horum decoctum menses mouet.

## DE SATYRIO TRIFOLIO CAP. CCLXIX

## NOMINA.



**S**ATYRION τριφυλῶν Græcis, Satyrium trifolium Latinis, officinis nostris incognitum aut inusitatū: uulgo Testiculus uulpis aut sacerdotis, *Testiculi uulpi.* Germanis Stendelwurz nominatur. Satyrio autem nomen fecerunt *Satyrium unde dictum.* Satyri, qui primi syluestres dī colludentes nymphis per syluas & antra, *Trifolium.* ad firmiorem Venerem herbam hanc inuenerunt. Trifolium uerò, quoniam tria fert folia ad terram uersa.

## FORMA.

Folia tria fert Rumici aut Lilii similia, minora tamen & rubentia. Caulem nudum, longum, cubitalem, Florem Lilii similem, album. Radicem bulbo similem,

oo māl





**SATYRION**  
TRIFOLIUM.

**Stendelwurz.**



A mālī modo extuberantē, foris rūfam, intus oui modo albam, gustu dulcē & ori gratam. Quod uerò hic dicimus Lilio similem, non sic intelligendū uenit quasi quantitate & tota figura Lilio similis flos sit, quando euidentissimū sit Liliū quantitate sua Satyrii florem multis modis superare. Deniq; nec figura etiam per omnia respondet: quare hæc similitudo ad colorem & floris essentiam referri potius debet, quæ planè eadem est cum Lili color & essentia, id quod conferenti hos duos flores manifestum fiet.

## LOCVS.

In montosis & apricis nascitur.

## TEMPVS.

In Iunio mense potissimum compâret.

## TEMPERAMENTVM.

Calidum & humidum est, quamobrem gustu dulce apparet.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix in uino austero, nigro, ad opisthotonū bibitur. Ferunt etiam hanc impetum ad Venerem excitare.

## EX GALENO.

Satyrium excrementitiā & flatuosam humiditatē possidet, quocirca ad Venerē incitat. Hæc uerò & herbe ipsius radix præstare potest. Porro ut nonnulli scribunt, cum uino nigro austero potum opisthotonum sanat.

## EX PLINIO.

Radix cum Satyrio gemina sit, eius inferior pars & maior mares gignit, superior ac minor fœminas.

B

## DE SATYRIO BASILICO

## CAP. CCLXX.

## NOMINA.



ATYPION βασιλικόν posterioribus Græcis, Satyriū regium Latinis, officinis Palma Christi, Arabibus Bucheiden, Auicennæ Digiti citrini, Germanis Kreuzblumen uocantur. Palmā Christi propter similitudinem quam eius radix cum humana habet manu, dixerunt.

Palma Christi.  
Digiti citrini.

## GENERA.

Duo eius sunt gênera, quorum alterum mas folia non maculosa, floresq; purpureos habet. Alterum fœmina maculosis est & paulò latioribus folijs, floribus in purpureo albescentibus. Radicum etiam in colore est differentia, quod maris quidem radix flauescat citra albedinem, fœminæ autem cum albedine. Quam sanè differentiam Auicenna etiam expressisse uidetur, dum unam ex flauo & albo cōmistam esse colore, alteram uerò ex flauo sine albedine inquit.

Mas.  
Fœmina.

## FORMA.

Folia cum reliqua superficie Cynosorcho similia sunt. Radix tamen ei subest lutea aut flauescens, instar manus ramosa: modo enim quatuor, modo quinque, modo sex aut plures radices prodeunt, quæ ferè humanos digitos imitari uidentur.

## LOCVS.

Prouenit in montibus, & locis soli expositis.

## TEMPVS.

In Maio & Iunio mensibus inuenitur. Mas quidem Iunio, fœmina uerò Maio.

## TEMPERAMENTVM.

Vtruncq; amarū est, magis tamen amarum quod maculosis constat folijs. Ideoq;

oo 2 non



SATYRIUM BASI  
LICVM MAS.

Kreuzblüm männle.







SATYRIUM BASILI  
CVM FOEMINA

Kreutzblüm weible.



C non perperam censent Auicenna & alij quidam ex recentioribus medicis, qui calidum esse & siccum in secundo ordine tradunt.

## VIRES EX RECENTIORIBVS.

Vsus eius ad erugandā cutem, ad neruorū dolores, & contra noxia medicamenta. Fertur & amuletum esse radix gestata. Semen ex uino sumptum nouem diebus, comitiales sanat. In eundem effectum uinum diluitur herbę decocto. Scobs radices propinatur in uino ad arcendam quartanā, quam & uomitione curat paulò ante accessionem pota, Plura in præsentia rescire de huius facultatibus non licuit.

## DE SVCCISA CAP. CCLXXI.

## NOMINA.

*Succisa.*



*Morsus diaboli.*

VO nomine ueteres aut posteriores Græci appellauerint hanc herbam, cognitamq; illam habuerint nec ne, nobis nondum constat. Nonnulli Geum esse arbitrant. Nos Succisam nominare uoluimus, partim quod id nominis latinum esset, & pulchrè huic herbæ quadraret, cuius radices circunrosæ sunt, partim quod antiquus manuscriptus herbarius sic uocaret. Vulgus superstitione quadam motum credit cacodæmona, tantæ efficacis radicem inuidere hominibus, atque hac ratione ubi succreuerit statim eam undiquaq; circunrodere. Hinc est quod Diaboli morsum appellitent. Quam etiam superstitionem plusquam muliebrem secuti Germani, Teuffels abbißz / hoc est, præmorsam à diabolo, nominant.

## FORMA.

- D Binum cubitorum fastigiatur altitudine, folijs Plantaginis minoris, aut Cirsij leuioribus, solidioribusq; leniter laciniatis. Floribus purpureis. Radicib. subnigris, succisis & circunrosis.

## LOCVS.

Nascitur locis incultis & montanis, saltibus, ac interdū etiam pratis & dumetis.

## TEMPVS.

In Augusto eius magna est passim in locis iam dictis copia.

## TEMPERAMENTVM.

Supra modum amara est, unde calidam & siccam esse satis constare cuius potest.

## VIRES.

Præsentaneo remedio ad maturandos, atque adeo sanandos carbunculos adhibetur, si herba uiridis trita imponatur, aut uinum in quo decocta fuerit bibatur. Radix per se estur, aut uinum eius decocti in uulug doloribus bibitur. Hæc manuscriptus herbarius. Hodie, cum habeat facultatem discutiendi & incidendi, utuntur ea ad dissoluendos sanguinis grumos.

DE SCABIO-





715

SVCCISA

Tetterwurtz.

00 4






SCABIOSA.

Apostemkrant.



NOMINA.



Thæc herba quo nomine Græcis uocetur, fatemur nos ignorare. Sunt qui Aëtio *Ψάρα* dictam uelint: uerum cum nomine tenus eam tantum prosequatur non adiecta descriptione, nihil certi constitui potest. Vultus Scabiosam uocat, quo nomine nobis utendum erit donec legitimū compertū fuerit. Germani Scabiosen/oder Apostemtraut nominant. Scabiosam uerò aut à scabro herbæ habitu, aut quod scabiei medeatur appellatam esse euidentissimum est: id quod etiam Plora uox prætere uidetur. Stecbe Dioscoridis non esse multis argumentis constat, quæ prætereo.

Scabiosa.

Scabiosa hyle dicta.

Scabiosa non est Stecbe.

FORMA.

Folia carnosæ, Erucae modo laciniata & multifida habet, subhirsuta, non tamen aculeis horrentia. Flores speciosos, diuturnos, coloris ex cæsis aut purpureo albicantis. Radicem crassam.

LOCVS.

Pasim in omnibus, potissimū autem humidis pratis prouenit.

TEMPVS.

In Iunio, antequā gramine denudentur prata, pasim floret.

TEMPERAMENTVM.

Quum sit uehementer amara, calidā & siccam esse nemo nescit, idemq; cum Succisa temperamentum habet.

VIRE S.

Easde quas Succisa facultates obtinet. Potissimū autem scabiem & tussim sanat.

DE SMILACE ASPERA CAP. CCLXXIII

NOMINA.



ΜΙΛΑΞ *τραχὺς* Dioscoridi, *μίλαξ* Galeno, Smilax aspera Latinis dicitur, officinis nostris incognita, germanicè *groß stehend* oder *scharpff Windt*/ab aculeis quos habet, nominari aptè potest.

Smilax et milax

FORMA.

Folia habet Peryclimeno similia, uel, ut Theophrastus ait, hederacea: ramulos multos, tenues, Paliuri aut Rubi modo aculeatos. Circumuoluitur arboribus sursum deorsum se circūagens. Florem candidū, fructum racemosum fert, cum maturerit rubentem, gustu leuiter mordentē. Radicem crassam & duram.

LOCVS.

In palustribus & asperis nascitur, Plinio autem teste in conuallibus opacis.

TEMPVS.

Smilacē quidem asperam nascentem, non uidi: sicca enim aliunde ad me transmissa est, ita ut certò indicare quo tempore floreat aut fructum producat, haud possum. Id quod ideo referre uolui, ne nos calumniandi ansam habeat osorperuersus, si non ex omni parte picturam natiuæ ipsius herbæ formæ respondere uiderit. Cogitet enim non uiridem, sed siccam nos pingendam tantum dedisse. Theophrastus tamen libro iiij. cap. ult. de histor. plant. hanc uerno tempore florere scribit.

TEMPERAMENTVM.

Quale sit eius temperamentū, uires satis declarant, & folia ipsa atq; fructus, quæ singula in gustu lenem quandam mordicationē præ se ferunt, ut calidam esse & siccam haud dubium sit.

VIRE S. EX DIOSCORIDE.

Huius folia & fructus si antè & post bibantur cōtra letalia uenena efficacia sunt.

Traditum





SMILAX  
ASPERA.

Groß stechend Winde.



A Traditum est, quod si quis tritum eorum aliquid nuper genito infanti bibendū dederit, nullum illi postea uenenum nociturū. Conciditur etiam in alexipharmaca.

## EX GALENO.

Milax aspera clauiculis plena est, ut arboribus sursum deorsum diuersimodē circumuoluatur. Folia gustata acrimoniā aliquam habent, & alioqui si illis utaris calefaciunt.

## EX PLINIO.

Coronam ex ea factam impari foliorū numero, aiunt capitis doloribus mederi. Contra uenenata efficacissimi acinorū corymbi, in tantum ut acinorū succo infanti bus saepe instillato, nulla postea uenena nocitura sint.

## DE SMILACE LEVI CAP. CCLXXIII.

## NOMINA.



SMILAX *λαία* Dioscoridi, *μύλαξ* Galeno & Paulo dicitur. Latinis Smilax leuis. Officinis & herbarijs Volubilis maior, à nōnullis Campanella, & *volubilis maior.* Funis arborum, Germanis Winden traute / glatte Winden / oder weiß *Funis arborum.* Glocken uocatur. Læuis autem non alia ratione, nisi quod aculeis careat, dicta est. *Smilax leuis cui nominata.*

## FORMA.

Hederæ similia folia habet, molliora tamen, læuiora & tenuiora. Ramulos supra dictæ similes, aculeis carentes. Conuoluitur & hæc arboribus, ut prior. Fructū fert Lupino similem, nigrum, paruum, super quem semper flores albi, copiosi, & orbiculati per totam Smilacē exeunt. Æstate tabernacula per ipsam fiunt, autumnob  
B tem folia cadūt. Ex qua descriptione planum fit omnibus, herbam hanc quam uul-  
gus herbariorū Volubilem maiorem uocat, esse Smilacem læuē, quod illi scilicet singulæ notæ à nobis cōmemorate conueniant. Id quod etiā pictura Smilacis asperæ, si cum hac cōferas, satis demonstrat, quam uno hoc nomine dedimus, ut ex eiusdem collatione manifestius leuis ipsa agnosceretur. His accedit antiqui & manuscripti herbarij testimoniū, qui Smilacem leuē, Volubilē maiorem interpretatur. Eius etiam pictura, Volubilem quam maiorem appellamus, penitus exprimit.

## LOCVS.

Nascitur passim per fruteta, & sepibus sese inuoluit. Amat culta, & in ijs etiā potissimum gignitur.

## TEMPVS.

Æstate floret, autumnō semen profert.

## TEMPERAMENTVM.

Modicam amaritudinem in gustu præ se fert.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Huius semen cum Dorycnio, & utrunq; trium obolorū pondere potum, somnia multa & turbulenta facere fertur.

## EX GALENO.

Milax læuis facultate quodammodo prædictæ similis est,

## EX PLINIO.

Nullius est effectus.

## APPENDIX.

Empirici hodie succo Volubilis maioris ad calidas utuntur passionēs, capitis potissimum & oculorum.



720



SMILAX  
LEVIS

Groß glatte Winde



A

## NOMINA.



IZYMBPION Græcis, Sisymbriū Latinis appellatur. Sisymbriū dici putat Varro à Sisymbrio, quæ fuit ueteribus comædijs meretricula. Coronam etiam Veneris nonnulli dixerunt, uel quod ob odoris suauitatē quam præ se fert, eo iuuentus quæ amoribus gaudet coronata, in comestationibus suis blando odoris oblectamento suas illecebras cōmendaret. Vel potius, quod Sisymbrij caulis articulatim per internodia uerticillato florum ambitu concinnè coronetur.

Corona Veneris  
cur dicta.

## GENERA.

Sisymbrij duo sunt genera. Vnum quod simpliciter Sisymbriū dicitur: hoc seplarij Balsamitæ, ut manuscriptus etiam testatur herbarius, uulgus autem Menthā aquaticam, Germani *Sischmünn*/ *Wassermünn*/ oder *Bachmünn* uocant. Alterum cum adiectione Sisymbriū cardamine nominatur. Officinis Nasturtiū aquaticum, Germanis *Brunnentress*. Sic uerò dictum, quod sapore Cardamum, hoc est Nasturtium, imitetur.

Balsamita  
Mentha aquatica.  
Nasturtiū aquaticum.

## FORMA.

Sisymbriū hortensi Menthæ simile, quadrato caule, quadantenus purpurascente, folijs Menthæ, serratis, latioribus & odoratoribus: floribus internodia geniculatim coronantibus, uerticillato semper ambitu. Sisymbriū cognomento cardamine folia inter initia orbiculata habet, cum autē creuerint ut Eruce folium laciniatim finduntur. Caule prosilit cauo, sesquipedali, ima sui parte pluribus radicularum fibris subinde capillato, è cuius alarū cauis cirri frequentes sinuatim erumpunt. Flore candido. Semine Eruce instar in siliquis acris & exiguis.

Sisymbrium.

Sisymbrium cardamine.

B

## LOCVS.

Utrunq; riguos tractus amat. Primum autem potissimū circa stagna & piscinas nascitur. Alterum nusquam non in aquatilibus.

## TEMPVS.

Æstate, potissimū uerò Augusto mense, cum Mentha florent.

## TEMPERAMENTVM.

Sisymbriū primū exalfacit atq; resiccat in tertio ordine. Alterū autē quum siccū est, itidem tertij est ordinis exalfacientij & exiccantiū: quum humidū & uiride, secundum.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Sisymbrium primum uim calfaciendi obtinet. Semen eius ad strangurias & calculos cum uino potum prodest. Tormina & singultus sedat. Folia temporibus & fronti illinuntur contra capitis dolorem. Aduersus etiam apum & uesparum ictus ualent. Vomitiones potum sistit. Alterum cardamine cognominatū calefacit, urinam ciet. Comeditur quoq; crudum. Lentigines & cutis à sole nigriciem & asperitatem exterit tota nocte illitum, mane autem ablutum.

## EX GALENO.

Sisymbriū primum tenuiū partium est, digerentis, calefacientis & exiccantis facultatis. Semen quoque eius tenuium partium est & calidum. Quocirca ipsum quidam cum uino exhibent singultientibus, & tormina patientibus. Sisymbriū quod quidā Cardaminem uocant, quandoquidē Cardamo, id est, Nasturtio simile quidam gustu præfert, eadem ferè potest.

## EX PLINIO.

Utrunq; Sisymbriū efficax aduersus aculeata animalia, ut sunt crabrones & similia. Sedant capitis dolorē, item epiphoras. Alij panē addunt. Alij per se decoquunt in uino. Sanat & epinyctidas, cutisq; uitia in facie mulierum intra quartum diem noctibus impositū, diebusq; detractū. Vomitiones, singultus, tormina, stomachi

pp. dissolu-





SISYMBRIVM

Fischmünz.





SISYMBRIVM  
CARDAMINE.

Brunnentee.



c dissolutiones cohibet siue in cibo sumptum, siue in succo potum. Non edendū grauidis nisi mortuo conceptu. Quippe etiam impositum eijcit. Mouet urinam cum uino potum. Syluestre & calculos. Quos uigilare opus sit excitat infusum capiti cum aceto.

## DE SIO CAP. CCLXXVI

## NOMINA.



Sium unde dictū.

Anagallis aquatica.

Lauer.

ION, ἡ ἀναγallis ἢ ἡ λαιὴ Græcis: Sium, Lauer & Anagallis aquatica Latinis dicitur. Officinis ignota herba. Germanis Wasserpungen/ Bachpungen/ oder Pungen appellatur. Sium autē nomen sibi adsciuit à concussu, quod Græci σίωμ dicunt: nam excutiendi uim nactum est, utpote quod à renibus calculos pellat, urinā & menses ducat. Anagallis aquatica, quod flores eius Anagallidis scæminæ floribus per omnia respondeant. Lauer nomen haud dubiè à lauando cōtraxit, quod sonantibus aquis enatū semper elui gaudeat.

## FORMA.

Puillus est frutex, rectus, pinguis, folijs latis, Olusatro similibus, minora tamen; & odorata. Quæ deliniatio prorsus astipulatur huic herbæ quam Germani Wasserpungen nominant. Hæc enim riuulis gaudet, frutex puillus pinguisq; est, latis folijs, Hippofelino similibus, & digitis leniter friata iucundū expirantibus odorē. Floribus cœruleis, Anagallida scæminam referentibus.

## LOCVS.

Inuenitur in aquis citato lapsu repentibus, aut etiam resedibus. Sæpe uerò intumescantibus demersum uidetur.

D

## TEMPVS.

Iunio mense floribus prægnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Quum amara admodū sit hæc herba, ut calefaciat & exiccet necesse est. Atq; hinc iterum colligere licebit, ut patebit ex uerbis Aëtij, eam esse Sium.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Sij folia cocta crudaq; comesta calculos cōminuunt & excernūt. Vrinās mouent. Foetus & menses educunt. Dysentericis utiliter comeduntur.

## EX GALENO.

Sium quantum gustu odoratū est, tantum etiam calefacientis facultatis est participes. Digerit autem & urinā mouet, & calculos renum frangit, & menses euocat.

## EX AETIO.

Sium quatenus gustu odoratū est, eatenus calefacit, & exiccat. Discutiendi etiā uires habet, urinā mouendi, calculos in renibus dissoluendi, ac menses ciendi.

## EX PLINIO.

Prodest urinis, renibus, lienibus, mulierumq; mensibus, siue ipsum in cibo sumptum, siue ius decocti, siue semē è uino drachmis duabus. Calculos rumpit, aquisq; quæ gignunt eos, resistit. Dysentericis prodest infusum. Item lentigini illitum, & mulierum uitij in facie, noctu illitū momento cutem emendat, & ramices lenit, & scabiem equorum.

## APPENDIX.

Veterinarij in hodiernū usq; diem hæc herba in tumoribus discutiendis, & scabie equorum sananda utuntur, ut hinc manifestū fiat illam esse Sium.

DE STRATIO-








## DE STRATIOTE MILLEFOLIA

CAP. CCLXXVII.

## NOMINA.

Millefolium.

Stratiotes unde  
dicta.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ὁ χιλιόφυλλος Græcis, Stratiotes millefolia Latinis, officinis & herbarijs Millefolium, Germanis Garben/ Schafgarben/ Schaftripp/ Tausendblatt / & Gerwel nominatur. Stratiotes uerò Græcis, id est, militaris dicta est, quod uulnera ferro facta sanet, atque adeo in militia & castris multus eius usus sit.

## FORMA.

Frutex est exiguus, dodrantalis & maior. Folia habet pulli auium pennis similia. Suntq̃ foliorum exortus admodū breues, incisuris diuisi. Breuitate uerò & asperitate Cumino syluestri maximè assimulantur, & etiamnum breuiora. Huius denique umbella densior & plenior: surculos enim in cacumine paruos habet, in quibus Anethi modo umbellæ sunt. Flores illi candidi & exigui sunt.

## LOCVS.

Nascitur in agris asperis, & præcipuè circa uias ac semitas.

## TEMPVS.

Per integram floret æstatem.

## TEMPERAMENTVM.

Nonnihil adstrictionis habet, atque adeo exiccat.

## VIREΣ. EX DIOSCORIDE.

Eximiè utilis est herba ipsa ad sanguinis eruptionē, & ad ulcera & tetera ac recentia: item ad fistulas.

## EX GALENO.

**D** Vulnera glutinare potest, & ulcerib. utilis est. Sunt qui ea ad sanguinis eruptiones utantur, & ad fistulas.

## EX PLINIO.

Hetruria Millefolium appellat herbam in pratis tenuem, à lateribus capillamenti modo foliosam, eximij usus ad uulnera. Boum neruos abscissos uomere, solidari ea, rursusq̃ iungi addita axungia affirmant.

## APPENDIX.

Recentiores ad eosdem usus Millefolium suum adhibent, ad sananda nimirum omnis generis uulnera, dissoluendum sanguinem concretū, & ad constringendos menses. Vnde à Stratiote millefolia non esse diuersum omnibus perspicuū sit.

DE SARRA-







727

STRATIOTES  
MILLEFOLIA

Garten.

PP 4



**SOLIDAGO**  
SARRACENICA.

Geognisch Wundkraut.





# DE SARRACENICA SOLIDAGINE

729

CAP. CCLXXVIII.

## NOMINA.



VVM nobis non constet quo nomine ueteribus nominata sit herba hec, placuit usitatā ac tritam nostri temporis herbarijs appellationē usurpare, donec ueriores comperire contingat. Non tamen latet à nonnullis corrupta uoce Cartafilaginē, uel magis deprauata Filaginē nominari, cum dicendum esset Ceratophylacē, quia nimirum partem oculorū ceratoida, hoc est, corneam, defendat, salutēq̃ percussam ac lēsam restituat. Cū uerò hoc nomine non appellandā censeam, facit in primis quod descriptio Ceratophylacis illi non conueniat. Dein quod pictura eiusdē in manuscripto herbario illi herbę quam Fortem uocant, prorsus non respondeat. Herbam itaq̃ Fortem, uel ut alij habent Sortis, nominamus eam quę Germanis heydnisch Wundkraut uocat, quod fortē à Sarracenis reperta putetur. Hinc, ni fallor, à quibusdā Consolida Sarracénica dicitur. Fortis uerò à uehementi odore.

Herba Fortis nō est Cartafilago, seu ut rectius dicam, Ceratophyllax.

## FORMA.

Caulem rubescentē, duūm triūmue cubitorum ac cauum habet, ē quo prodeunt folia oblonga, in extremitatibus serræ modo incisa, Saliciq̃ similia. Flores luteos in pappos euanescentes. Radicē multifidam, forisq̃ rubentem.

## LOCVS.

Nascitur in syluis & in montibus altis. Copiose autem in monte post arcem Turingensem, quem germanico nomine die öden burg uocant, prouenit.

## TEMPVS.

Augusto mense floret.

## TEMPERAMENTVM.

Gustu adstringit, modiceq̃ amara est, atque adeo siccare euidentissimū est.

## VIRES EX RECENTIORIBVS.

Vulneraria herba est, id quod germanica appellatio abundē satis monstrat. Imposita itaq̃ uulneribus carnem primum generat, dein statim glutinat. Sicca in puluerem trita recentia uulnera, si inspergatur, celeriter sanat. Fistulis etiam medetur, malignaq̃ ulcera mundificat, ac confestim sanat.

# DE SAXIFRAGA CAP. CCLXXIX

## NOMINA.



ΑΡΞΙΦΡΑΓΟΝ, ἡ σαξίφραγος, ἡ ἐμπέτρον Græcis, Saxifragon & Saxifraga Latinis. Officinis quibusdam perperam Capillus Veneris dicitur, ut in Adianto docuimus. Rectius muraria ruta uocaretur. Sunt qui Saluiā uitam hodie nominent. Germanis Mairauten & Steirauten appellant. Saxifragon, quod calculos ē corpore pellat frangatq̃. Empetron uerò, quoniam in saxis proueniat. Officinę hodie alias præter hanc latinorū Saxifragas ostendunt, de quibus suo dicemus loco.

Officinā error

Saxifragon cui dictum. Empetron.

## FORMA.

Surculosus frutex saxi hærens, iuncis tenuibus, Epithymi non dissimilibus, nigris, breuibus, folijs Trichomanis, maioribus, interius leuibus, auersa uerò parte annexa puncta habentibus, sine flore, sine semine, radice nigra, superuacua.

## LOCVS.

In saxi & asperis locis prouenit. Ideo eius magna copia inuenitur apud uetusta ædificia, in lapidum cōmissuris.

## TEMPVS.





SAXIFRAGA

Maurlauten.



## TEMPVS.

Vere & æstate inuenitur, potissimum autem Iunio mense.

## TEMPERAMENTVM.

Satis ex facultatibus eius gustuq̃, in quo manifesta quædam adstrictio apparet, colligitur hanc herbam calidam & siccam esse.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

In uino cocta & pota, febricitantibus opitulatur, stranguriæ & singultui medetur. Lapides uesicæ frangit, & urinam mouet.

## EX PAVLO.

Saxifraga urinam ciet, & calculos conterit.

## DE SILIQVASTRO CAP. CCLXXX.

## NOMINA.



SILIQVASTRVM conuenientissimo nomine à Plinio lib. xx. cap. xvij. dicta est herba hæc, à siliquis nimirū magnis & oblongis quas producit. Eadem etiam ab eodem Piperitis, quod semen eius gustatum piperis saporem & acrimoniā præ se ferat, nominatur. Alia tamen est ab ea quam uulgò Piperitim appellant, ut supra etiam monuimus. Sunt qui piper Hispanicum, alij piper Indianum, nonnulli etiam piper ex Chalechut uocant. Auicenna uidetur appellare Zinziber caninum. Germanicè dici potest Chalechutischer oder Indianischer Pfeffer.

Siliquastrum.

Piperitis.

Piper Indianum.

Zingiber caninum.

## GENERA.

Maïus & minus est Siliquastrū. Maïus siliquas producit maiores, & colore subnigras, aut fuscas. Minus contrā minores profert, & colore puniceas. Nos tamen utrunq̃ genus una pictura complexi sumus, utq̃ hiantes duæ pingerentur siliquæ curauimus, non sanè quod sponte sua sic rumpantur, sed ut quale intus esset semen cerneretur. Præter hæc, genera alia sunt bina, quorum unum longissimas & colore puniceas, alterum uerò latiores multoq̃ breuiiores producit siliquas. Damus itaq̃ quatuor Siliquastri distincta genera, ut ex pictura manifestissimè deprehendit. Horum primum discriminis gratia maius, alterum minus, tertium longum, quartum latum appellauimus Siliquastrum.

## FORMA.

Herba est caule rubro & longo, crebris geniculis, folijs Lauri, floribus candidis, semine in siliquis oblongis & magnis albo, uel potius flauescente, tenui, gustu Piperis acerrimo. Radice unica, subalba, capillamentis fibrata. Ex qua nimirum deliniatione satis constat herbam cuius picturam damus esse Plinij Siliquastrum seu Piperitim. Caule siquidem, ut ex Castore collegit Plinius, rubro & longo, densis etiam geniculis, unde folia Lauri folijs similia erumpunt, semine albo, tenui admodum, gustu piperis. Quibus omnibus etiā Siliquastri & Piperitidis nomenclaturæ, quæ huic optimè quadrant, accedunt.

## LOCVS.

In Germania iam in sictilibus ac testaceis satum pascim ferè prouenit. Per paucis antè annis Germanis incognitum fuit.

## TEMPVS.

Æstate quidem floret, atque mox decedente flore siliquæ primum herbaceæ, dein puniceæ aut fusci coloris subnascuntur, plenæ semine.

## TEMPERAMENTVM.

Valenter excalfacit atque desiccatur, id quod seminis immensa acrimonia, & foliorum amaritudo euidentissimè monstrat; ut certè non temerè pleriq̃ hoc semine locoueri






SILIQVASTRUM  
MAIVS ET MINVS.

Calechutischer Pfeffer.





SILIQVASTRUM  
TERTIVM.

Langer Indianischer Pfeffer.





SILIQVASTRUM  
QVARTVM.

Breyer Indianischer  
Pfeffer.



A coueri Piperis utantur: eisdem enim facultates haud dubiè habet, quas etià ex Dioscoride sumptas subiiciamus.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Piper cōmuniter calefaciendi facultatē habet, urinā mouendi, cōcoquendi, extrahendi, discutiendi, & quæ pupillas oculorū obtenebrant exterendi. Prodest rigoribus circuitu certo inuadentibus potū & inunctū. Venenatorū moribus succurrit. Fetus ex utero ducit. Tussi & omnibus thoracis affectib. in edegmate & potu sumptum auxiliat. Cum melle inunctū angina correptos iuuat. Tormina cum teneris Lauri folijs potū soluit. Pituitā ex capite purgat cum Staphysagria cōmanducatū. Dolores leuat, ualitudinemq̃ tuetur. Appetentiā mouet. Concoctionē adiuuat ad intinctus additū. Strumas cum pice exceptū discutit. Cum nitro alphas abstergit.

## EX PLINIO.

Siliquastrū utile gingiuis, dentibus, oris suauitati, & ruētibus.

## APPENDIX.

Auicenna Zinziber caninum abstergere cutis & faciei maculas, lentesq̃ tradit. Item strumas aliosq̃ tumores, eius semen digerere scribit, ut hinc etià eisdem cum uero Piperis habere facultates colligere liceat.

## DE SCORODO CAP. CCLXXXI

## NOMINA.



KΟΡΟΔΟΝ græcè, Allium latinè appellatur. Officinæ latinum nomen retinuerunt. Germanicè Knobloch/oder Knoblauch. Scorodon autē *Scorodon unde dictum.* dicit, ut nōnullis placet, quasi *σκαρόν ποδόν*, id est, rudis Rosa, quod asperè supra modum redolet, & olfacientiū nares offendat. Latini Allium *Allium.* à Græco tortalsis uerbo *ἐκμάδα*, id est, exilire, uocāt, quod nimirū exiliendo crescat.

## GENERA.

Tria in uniuersum Allij sunt genera. Vnum hortense & satiuū domesticū uel, *Allium hortense.* quod Germani garten oder heymisch Knoblauch uocant. Alterū syluestre, quod Græci *ὀλισσισπόδον*, id est, anguinū Allium nominant, in aruis ac campestribus spon- *Anguinū Allium* te nascens. Cuius nos duo genera damus, quorum primū Germanis wilder Knoblauch dicitur, alterum uero *feldknoblauch*. Tertium itidem syluestre, ursinum co- *Ursinum.* gnominant, in syluis proueniens, Germanis *Waldknoblauch* appellatur.

## FORMA.

Allium hortense fronde uiret cępitia, caule tereti & inani. In cacumine flores in *Hortense.* globum circumaguntur, in quo semē emicat. Radicis bulbus tenuis, uelatur membranis, mox pluribus coagmentatur nucleis, & hīs separatim uestitis, in cuius uertice complures fibræ cirrōrum exemplo crispantur, tedioso habitu, & aspero sapore. Syluestre folijs constat prælongis, teretibus, intus concavis, iunceā speciem repræ- *Syluestre.* sentantibus, caule procero, leni, purpureos flores ostentante, cacumine tum colore tum forma conspicuo, radice bulbosa & cępitata, nucleis spicatum cōpactilibus intumescēte, summo uertice capillamentis fibrato. Ursinū odore molli, folijs gran- *Ursinum.* dibus, & Ephemeris non letalis folijs similibus, floribus in summo candidis, capite prætenui.

## LOCVS.

Hortense passim in hortis satum & plantatū prouenit. Syluestre sponte in aruis, ut diximus, & campestribus nascitur. Ursinū autem in nemoribus.

## TEMPVS.

Hortense & syluestre æstate florent. Ursinū autē uere, Aprili & Maio mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Allia desiccant & calfaciunt quarto excessu.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Facultas Allio est acris, calfacit, flatūs excernit, aluum turbat, stomachū exiccat.

qq 2 Sitim






ALLIUM  
HORTENSE.

Gartenknoblouch.






ALLIVM SYLVE  
STRE PRIMVM.

Wilder Knoblauch.





ALLIVM SYLVE  
STRE ALTERVM.

Feldknoblouch.





ALLIVM VR-  
SINVUM

Waldknoblauth.



**C** Sicum efficit. Inflationes permutat alteratue, & summam corporis cutem exulcerat. Eadem potest Anguinum allium. Comestū latos uentris lumbricos expellit. Vrinās ducit. Contra uiperarū morsus & hæmorrhoidū prodest, ita ut non aliud magis, si uinum iugiter sumatur, aut in eodem tritum bibatur. Contra rabioforū morsus utiliter illinitur. Allium ipsum in cibo sumptum contra aquarū mutationes confert. Asperas arterias clarificat. Veterem tussim crudum & coctum comestū lenit. Cum Origani decocto potum, pediculos & lendes enecat. Vstum & cū melle subactum illitumq̃, hypopya & alopecias sanat. Exanthemata cum nardino unguento, sale & oleo curat. Alphos, impetigines, lentigines, achoras, lepras, furfuresq̃ eximit. Cum teda & thure decoctum, si in ore contineatur, dentium dolorem leuat. Contra muris aranei morsus cum ficulneis folijs, & Cumino illinitur. Comæ decoctum in infelsionibus menses & secundas trahit. Eiusdem gratia suffitur. Factum ex eo & nigra oliua intritum, quod Græci *μνηστῆρ* uocant, urinā cit, & obstructiones aperit, Vtile etiam hydropicis.

## EX GALENO.

Excalefacit corpus, crassos in eo humores extenuat, glutinososq̃ incidit. Bis tamen aut ter in aqua decoctū, acrimonia spoliatur: quanquā nec sic quidem uim perdit extenuandi, uerum facultatē quandam obscurissimā alendi corporis acquirit, cuius antea quā coqueretur, nihil prorsus obtinebat. Cæterū Allium non modo ut obsoniū, uerum etiam ut medicamentū sanitati accōmodum, quod obstructa soluere & discutere possit, usurpatur. Est autem Allium ex eorum ciborū genere, qui & flatum discutiant, & minimè sitim inferant, Ophioscorodon domestico, uel reliqua omnia syluestria, ualentius est.

## EX AETIO.

**D** Allium comestū flatus discutit, sitim reprimat, crassos & lentos humores incidit. Habet tamen quidpiā uirosū, & mali succi, quod amittit si aqua elixetur. Ab eius assiduo usu præsertim calidas temperaturas cauere oportet.

## EX PLINIO.

Allio magna uis, magnæ etiam utilitates contra aquarū & quorumlibet locorū mutationes. Serpentes abigit & scorpiones odore: atq̃, ut aliqui tradidere, bestiarum omniū ictibus medet̃, potu uel cibo, uel illitu. Priuatim contra hæmorrhoidas prodest, cum uino redditū uomitu. Ac ne contra araneorū murum uenenatū morsum ualere miremur, aconitū, quod alio nomine pardalianches uocatur, depellit: item Hyoscyamū: contra canū morsus, inq̃ uulnera cum melle imponitur. Ad serpentū quidem ictus potū cum restibus suis, efficacissimè ex oleo illinitur. Attritisq̃ corporū partibus, uel si uelica intumuerit. Quin & suffitu eo, secundas partus euocari existimauit Hippocrates: cinere eorū cum oleo, capitis ulcera manantia sanitati restituens. Suspiriosis coctum, aliqui crudum id dedere. Diodes hydropicis cum Centaurea, aut in fico duplici ad euacuandā aluum: quod efficacius præstat uiride, cum Coriandro in mero potum. Suspiriosis aliqui & tritū in lacte dederunt. Praxagoras & contra morbū regiū uino miscuit: & contra ileum in oleo & pulte, sic illinens. Strumis quoque. Antiqui & insanientibus dabant crudum. Diodes phreneticis elixum. Contra anginas tritum imponi & gargarizare prodest. Dentiū dolorem tribus capitibus in aceto tritis imminuit: uel, si decocta aqua colluantur, addaturq̃ ipsum in caua dentiū. Auribus etiam instillatus succus cum adipe anserino. Phthiriales & prurigines potum, tusum item in aceto & nitro. Cōpescit & destillationes cum lacte coctū, uel tritum permixtū mæ caseo molli: quo genere & raucitatem extenuat: uel phthisin, in fabæ sorbitione. In totum autē coctum utilius est crudo, elixumq̃ tosto, sic & uoci plus confert. Tineas & reliqua animalia interaneorū pellit, in aceto mulso coctū. Tenasmo in pulte medetur. Temporū doloribus illitum, elixum, & pustulis coctum cum melle, deinde tritum. Tussi cum adipe uetusto deco-



A sto decoctū, uel cum lacte. Aut si sanguis etiā excreetur, uel purulenta sint. Et pituita sub pruna coctum, potum, & cum mellis pari modo sumptū. Cōuulsis & ruptis cum sale & oleo. Nam cū adipe tumores suspectos sanat. Extrahit fistulis uitia cum sulphure & resina, etiam harundines cum pice. Lepras, lichenas, lentigines exulcerat, sanatq; cum origano, uel cinis eius ex oleo & garo illitus. Sic & sacros ignes. Sugillata aut liuentia ad colorē reducit, cōbustum ex melle. Credunt & comitialē morbum sanare, si quis in eo cibo utatur aut potione. Quartanas quoq; excutere potū caput unum cum Laſerpitij obolo. In uino austero tussim, & alio modo acceptum. Suppurationes quantaslibet sanat, fracta incoctū fabæ, atq; ita in cibo sumptum, donec sanitatē restituat. Facit & somnos, atq; in totum rubicundiora corpora. Venerem quoq; stimulat cum Coriandro uiridi tritum, potumq; ē mero. Cæterū contra pituitam & gallinæ & gallinaceis prodest. Mixtum farre in cibo, iumentis urinam reddere, atq; non torqueri tradunt, si eo trito natura tangatur.

## EX SYMEONE SETHI.

Cōmodissimū est crassum & tenacē, aut crudum humorē aggregantibus: cum enim incidit, & obstructions ab eo factas tollit. Habet uerò quippiam mali succi, quod decoctū aqua abijcit. In frigidis temperaturis sæpe sanitatē præseruat. Temperatura uerò calidos, lædit, & maximè oculos, caput, pulmonem, & renes eorum. Proprietate autem quadā sitim à salso humore factam sedat, & lumbricos eiicit, & flatus discutit. Etsi uerò sanum uisum offendat, nihilominus tamen eius hebetudinem propter humiditatē ortam sanat. Semen in calidis corporibus exiccat. In frigidis uerò & humidis corporibus idem calefacit, Veneremq; excitat. Est etiam remedium contra uenena, & morsus uenenatorū, perinde atq; theriaca: unde & Galenus hoc theriacam rusticorum uocat. Hoc ipsum fugiunt serpentes, tanquam Rutam. Quapropter Persæ coquinas ipsorum Allijs replent. Non solum autem flatus discutit, sed etiam horum generationē prohibet. Colicos affectus à flatibus ortos, & diurnos coxendiciū qui à pituita proueniunt dolores, iuuat. Alimentū & sanguinē extenuat, & faciem rubificat, asperamq; arteriam purgat. Si uerò affetur, & corrosis dentibus aut propter humiditatē dolentibus imponatur, prodest. Non solum uerò sumptum ad uenenatorū morsus confert, sed etiam postquā tritum est, superpositum. Lædit prægnantes & lactentes, mensesq; ducit.

## DE SANCTI IACOBI FLORE

CAP. CCLXXXII.

## NOMINA.



VM herba hæc ueteribus Græcis & Latinis cognita fuerit, nondum certò affirmare aut inficiari audeo. Vulgus tamen herbariorū sancti Iacobi florem aut herbam nominat. Officinis incognita est. Germani S. Jacobs blium appellant.

## FORMA.

Herba est fruticosa, cauliculo rubente, multifariā striato, folijs exiguis, Erucae instar confectis, floribus luteis, forma Chamemeli floribus haud dissimilibus, radice adnascantias multas habente.

## LOCVS.

Nascitur in agrorū marginibus, & aquarum ripis, locisq; arenosis.

## TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floret.

## TEMPERAMENTVM.

Amara est & adstringit, ideoq; calidam & siccam esse constat.

## VIRES.





S. IACOBI  
HERBA

G. Jacobs blum.



A

## VIREs.

Recentiorū medicorum experientia cognitū est, herbam hanc uulneribus mirificè mederi, & ad interanea prodesse. Fistulas quoque iſdem curare, & ne ultrà ſerpant prohibere, impositam tradunt. Quæ sanè omnes facultates pulchrè eius temperamento respondere uidentur.

## DE SELINO HORTENSI

CAP. CCLXXXIII.

## NOMINA.



SELINON *ἑλινόν* Græcis, Apium hortense aut satium Latinis uocatur. *Apium hortense* Officinæ latinum retinuerunt nomen. Germanis *Epſſich/oder Epſich* nominatur. Selinon autem Græci uocant, quali *ἑλινόν*, hoc *Selinon quare dictum.* est, paludibus impulsū: paludosis enim gaudet, & in iſs enatum lætius exurgit.

## FORMA.

Apium hortense sæpe cubitalem æquat altitudinē: caule rotundo, tenuiter striato, multisq; ramulis brachiato: folijs tripartitò dissectis, & leniter crispis, in extremis laciniatis: flosculis candidis, & quibus minores haud temerè reperiās: semine exiguo: radice singulari, longa, capillata. Hæc itaq; herba, cuius picturā damus, est uerum Apium, quod illi omnes respondeant notæ, adeò ut temerè nonnulli putent esse uulgare nostrum Petroselinum.

## LOCVS.

In hortis satum prouenit: amat autem loca potissimū aquosa. Hinc est quod sua sponte nō procul à Canſtadio Ducatus Vuirtenbergenſis oppido in paludosis proueniat.

## TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret ac semine prægnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Calidum est in secundo ordine, & siccum in medio tertij.

## VIREs. EX DIOSCORIDE.

Ad oculorū inflammationes cum pane aut tenui polenta illitū prodest. Æstus stomachi mulcet. Mammas grumis induratas diſſicit. Crudū aut coctum comestū urinā mouet. Decoctum eius radicūq; potum, letiferis medicamētis aduersatur, uomitū ciens. Aluum cohibet. Semen efficacius urinam cit. Succurrit & ferarū morſibus, & iſs qui lithargyrū hauserunt. Inflationes discutit. Miscetur etiam utiliter medicamentis dolorem leuantibus, theriacis, & tussī medentibus.

## EX GALENO.

Apium usque adeo calidū est, ut & urinas & menses cieat. Flatus quoq; discutit, & magis semen quàm herba ipsa. Ori, stomachoq; gratissimum.

## EX PLINIO.

Rami Apij largis portionibus per iura innatant, & in cōdimentis peculiarē gratiā habent. Oculis illitū cum melle, ita ut subinde foueantē feruenti succo decocti, alijsq; membrorū. Epiphoris per se tritum, aut cum pane, aut polenta impositū, mirè auxiliatur. Pisces quoq; si ægrotent in piscinis, apio uiridi recreantur. Verū apud eruditos non aliud erutum terra in maiore sententiarū autoritate est. Ad cibos non est admittendū, imò omnino nefas: nam id defunctorū epulis feralibus dicatū existimant. Ipsi quoq; uisus claritati inimicū. Eos qui ederint sterileſcere mares foeminasq; tradunt. In puerperijs uerò ab eo cibo comitiales qui ubera hauriunt. Innocentiorē tamen esse marem. Ea q; causa est, ne inter nefastos frutices damnet. Marum duritiā impositis folijs emollit. Suauiores aquas potui incoctū præstat. Succo maximè radice cum uino lumborū dolores mitigat. Eodem iure instillato grauitatem





APIUM  
Epfich.



A uitatem aurium. Semine urinā ciet, menstrua ac secundos partus. Et si foucantur semine decocto sugillata reddit colorī, cum oui albo illitum. Aut ex aqua coctum potumq̃ renibus medetur. In frigida tritum oris ulceribus. Semen cum uino, uel radix cum ueteri uino uesicæ calculos frangit. Semen datur ex tribus cyathis ex uino albo.


## EX SYMEONE SETHI.

Vrinam cit, obstructions tollit, non inflat, magis uerò flatus discutit, & menses ducit. Difficulus autem concoquitur, atq̃ ob eam causam oportet ipsum in medio ciborū sumi. Paululum quid uentrem sistit. Proprietate uerò quadam comitiales lædit, & oportet hos omnino abstinere. Sæpe enim quidam qui ferè ex hoc morbo conualuere, parati autem eum incidere, ex eius usu iterum comitiales facti sunt. Offendit etiam testes. Semen autem quàm folia ualidius & efficacius, & eo radix. Prodest ad singultus à crasis excrementis profectos. Abstergit renes & uesicā. Obstructions in uenis & arterijs factas aperit. Semen præsumptū, ebrietatem arcet. Conferet etiam ad bonum \* corporis odorem, multiq̃ crebriore huius usu grauem \* cor-  
poris odorem abegerunt. Mulieres ad rem ueneream promptiores facit. Si in hu-  
ius decocto calculosi desidant, calculos, ut ferunt, eiicit, & difficultatē urinæ sanat, & renes curat. Lactantes mulieres oportet ab eius usu abstinere: minuit enim lac. /

\* al. oris  
\* oris

S▷ BARBARAE HERBA▷  
CAP. CCLXXXIIII.

## NOMINA.

**B**  **Q**UE huius herbæ aliud nomen, quàm quo uulgò appellatur, afferre potuimus. Superstitione enim quadam ducti prioris temporis herbarij, diuæ Barbaræ herbam nominarunt. Nec nos aliud nomen utcun-  
que inuestigantes ex herbariæ rei peritis extorquere potuimus, Germanis S. Barbara traut uocatur.

S. Barbara herba cur diuæ.

## FORMA.

Caulem habet rotundū, solidum, striatum, folia Erucae modo laciniata, flores luteos, siliquas teretes, semine refertos, radicem ex obliquo prodeuntē, & oblongam.

## LOCVS.

Pæssim in campestribus nascitur.

## TEMPVS.

Maio & Iunio mensibus floret, ac subinde in siliquis semen profert.

## TEMPERAMENTVM.

Gustanti primum subacris esse, dein parum etiam adstringere uidetur, ut calidā & siccam esse nemo dubitare debeat.

## VIRE S.

Vulnerariam herbam esse & temperamentū eius & experientia docet. His uerò potissimū ulceribus medetur quæ impura sunt, & in quibus caro supercrescens fuerit; nam quia ualenter siccatur, ideo sordes extergere, & carnes minuere potest.





S. BARBARAE  
HERBA.

C. Barbara fruct.



SAXIFRAGA MA  
IOR SEV ALBA

Hoher Steinbrech.





## NOMINA.



Nueteribus Græcis & Latinis herba hæc cognita fuerit, nondum mihi constare ingenuè fateor. Vulgus herbariorū & officinæ Saxifragā maiorem, & albam, quod scilicet mirificam in cōminuendis frangendisq̃ calculis uim, ac flores albos habeat, hodie uocant. Germani hohen Steimbrech/uel weissen Steimbrech appellant.

## FORMA.

Caulem habet lanuginosum, subrubicundū, folia exigua, rotunda, in extremitatibus incisa, flores candidos, radicem exilem, cui granula Coriandri seminis quantitatē referentia adhærent, partim alba, partim rubea, quibus officinæ pro semine eius utuntur.

## LOCVS.

In pratis & montibus, potissimum siccis, prouenit.

## TEMPVS.

Maior mense floret, dein statim euanescit.

## TEMPERAMENTVM.

Quum flores, folia & radix gustanti amara sint, calidam & siccam in ordine tertio esse uerisimile existit.

## VIREs.

Vrinā mouet, calculos frangit & conterit. Stranguriæ itaque confert: abstergit enim expurgatq̃, & quæ in uenis est crassitiem, sicut omnia alia quæ amara sunt, incidit. Menses quoque cit, crassaq̃ ac glutinosa ex thorace educit.

D

## DE SAXIFRAGA LVTEA

## CAP. CCLXXXVI.

## NOMINA.



Saxifraga citridia.

NOMEN hoc in præsentia fingere adlubuit, cum scilicet aliud quo herbam hanc appellaremus non occurreret, ut hac ratione à priori discerni posset. Saxifragā autem uocare placuit, quod nimirū calculos frangat. Ad quod sanè nomē alludentes Germani Steintlee nominant, quod idem ualet, ac si Trifolium frangens lapidem dicerent. Alio nomine gulden oder geelen tlee/ &, quod sententiam nostram confirmat, Steimbrech/ à cōminuendo lapide appellant. Luteā uerò diximus à luteis floribus, uolentes eam ab alba discriminare Saxifraga. Cōmodissimè itaq̃ germanicè geeler Steimbrech uocabitur. Perperam ea officinæ nonnullæ pro Meliloto usurpant, ut suo etiam loco indicauimus.

officinæ error.

## FORMA.

Caulem cubiti ferè altitudine obtinet, folia scenogræco similia, in quouis pediculo tria: floribus pisi, multò tamen minoribus, luteis, odoratis, deorsum nutantibus, semine per ramulos diffuso rotundo, radice subcandida.

## LOCVS.

Pasim in aruis & segetibus prouenit.

## TEMPVS.

Floret tota æstate, potissimū autem Iulio mense, in quo semen etiam producit.

## TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse gustus abundè docet: amara enim & subacris existit.

## VIREs.

Abstergit, expurgat, & quæ in uenis est crassitiē incidit, atque adeo obstructions iecinoris





SAXIFRAGA  
LUTEA.

Großes Steinflee.



Ciccinoris & lienis tollit. Vrinā mouet, menses cit, lapidem frangit, & quæ in thorace sunt glutinosa extenuat & educit. Rectè itaq; recentiores in obstructionibus renum & uesicæ, earundemq; partiū calculis hac herba utendum esse docent. Succus etiam eius herbæ ac florum eiusdem ad caliginē oculorum instillatus confert.

## DE SISARO CAP. CCLXXXVII

### NOMINA.

Sifer.

Serullum pro Siferculo.



IZAPON Græcis, Sifer Latinis, uulgo Pastinaca, quod ei congener sit, appellatur. Sunt qui extritis priorib. literis diminutrice forma Serullū, aut Seruillam, aut Cheruillā, pro Siferculo nominent. Germani ad corruptam hanc appellationē respicientes, Gerlin & Geirlin uocant.

### GENERA.

Duo sunt Sifari, Plinio lib. xx. cap. v. autore, genera. Vnum satiuū, quod iterum duū est generum: unum enim magnum dicitur, Germanis *groß zam Nozen*. Alterū uerò minus, quod idem priuatim *Geirlin* / *weiß Nozen* / *klein zam Nozen* / uel *Nozhelen* nominant. Alterum erraticum, quod *wild Nozen* appellant. *Baucias*. Officinis nonnullis *Baucias* dicitur.

### FORMA.

*Sifaron satiuum*. Sifaron satiuū caulem habet angulosum, folia oblonga, & in extremitatibus incisa, flores magnū luteos, minus uerò candidos, semen latum & foliaceū, radices intus candidas, iucundi gustus, esuiq; gratissimas. *Erraticum*. Erraticū caule est bicubitali, folijs Pimpinellæ, sed maioribus, flore luteo & umbella Anethi, semine lato & rotundo, ut satiuum, radice tenui ac longa.

D

### LOCVS.

Copiose in Germania nostra prouenit: gaudet enim frigidis locis. Satiuum quidem in hortis, erraticū uerò passim in incultis, uberius autem in apricis pratis.

### TEMPVS.

Vtruncq; æstate floret, atque subinde semen producit.

### TEMPERAMENTVM.

Sifaron Paulus in tertio ordine, Galenus autem rectius in secundo calidum esse statuit. Satiuum autem siccum quidem simul in primo ordine, quandoquidē Venerem stimulat: erraticum uerò, quoniam adiectam habet amaritudinē quandā cum leuicula adstrictione, siccus existit.

### VIRES. EX DIOSCORIDE.

Suauis ori elixa Sifari radix, stomacho utilis, urinā cit, & appetentiā excitat.

### EX GALENO.

Sifari radix cocta, stomacho grata est, & urinam mouet.

### EX PAVLO.

Sifari radix cocta, stomacho utilis est, & urinæ ciendæ. Semen tenue est & diffusorium, ualidumq;: idcirco ijs quos singultus & tormina male habent, cum uino exhibetur.

### EX PLINIO.

Sifer erraticum satiuo simile est & effectu. Stomachū excitat, fastidium discutit. Ex aceto laserpitriato sumptum, aut ex pipere & mulso, uel ex garo, urinam ciet, ut Opion credit, & Venerem. In eadem sententiā est Diocles. Præterea cordi conuenire conualescentiū, aut post multas uomitiones perquam utile. Heraclides contra argentum uiuum dedit, & Veneri subinde offensanti, agrisq; se recolligentibus. Satiui priuatim succus cum lacte caprino potus, sistit aluum.





SISARVM SATIVVM  
MAGNV. M.

Groszamporen.





SISER  
SATIVUM.

Gerleim.





SISER SYL  
VESTRE.

Wild Moen.



Ficus.



ΥΚΗ *ἡμῶν* Græcis, Ficus sativa Latinis & officinis, Germanis Feigenbaum dicitur.

## FORMA.

Ficus sativa arbor est non magnopere procera, quanquā amplissimæ quædam inueniantur, uel pyris æmula magnitudine, caudice breui, cortice leui, medulla carnosa, folio perquam magno umbrosoq̃, profundè admodū laciniato, sine flore, pomo quod supra folij pediculū nascitur, tubinato, molli, intus granoso, succo cum maturescit lacteo, postea melleo: radicibus multis, obliquis ac longis.

## LOCVS.

Iam in plerisq̃ Germaniæ nostræ hortis plantatur, at in paucissimis fructus maturos producit. Calidiora & aprica loca amat: arbor enim omniū ferè tenerrima & delicatissima, gelicidia & glacies horret.

## TEMPVS.

Germinat sub Arcturum post uer, aut paulò ante solstitium.

## TEMPERAMENTVM.

Ficus arbor calidæ temperaturæ est, tenuiumq̃ partiū, ceu indicant tum liquor eius, tum foliorum succus. Valenter enim eorum uterq̃ calidus est. Ficus quoque recentes & aridæ primo ordine completo calefaciunt, aut secundo incipiente: desiccant uerò in medio primi.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Fici maturæ, teneræ recentèsue stomacho noxiæ. Aluum soluunt, sed facilè ab eis contracta fluxio sistitur. Exanthemata & sudores prouocant. Sitim sedant, calorē restinguunt. Siccæ nutriunt, calefaciunt, sitim magis afferunt, bonam faciunt aluum. Fluxionibus tamen stomachi & uentris inutiles: arteriæ uerò, uesicæ & renibus utiles. Amicæ etiam ijs quos longa ualetudo decolorauit, asthmaticis, comitiali morbo laborantibus & hydropicis. Decoctæ cum Hyssopo & potæ, quæ in thorace sunt purgant. Veteri tussi, & diuturnis pulmonis affectibus profunt. Aluum molliunt, tussæ cum nitro & croco manducatæ. Decoctū earum arteriæ & tonsillarum inflammationibus gargarizatu confert. Cum hordeacea farina cataplasmati miscetur, & in muliebria fomenta cum scenogræco, aut ptisana. Cum Ruta decoctæ, in torminibus infundunt. Coctæ, tritæ illitæq̃, duritias discutiunt, parotidas ac furunculos emolliunt. Panos maturant, maximè iride, nitro, aut calce addita. Crudæ cum antedictis tussæ, eadem efficiunt. Cum malicorio, pterygia purgant. Cum atramento sutorio difficiles curatu & maleficas tibiæ fluxiones sanant. Quin cum uino decoctæ, addito absinthio & hordeacea farina, hydropicis illitæ auxiliantur. Crematæ & cerato cōmixtæ, perniones sanant. Crudæ & tritæ sinapi humido exceptæ, ac auribus impositæ, sonitus & prurigines curant. Succus tam syluestris quàm satiuæ Fici, coaguli modo lac coagulat, concretumq̃ ut acetum dissoluit. Exulcerat corpora, ac uenarum ora aperit. Soluit aluum. Vterum laxat, cum Amygdala trita potus. Menstrua ciet cum luteo oui appositus, aut tyrrhenica cera. Podagricorū cataplasmatibus cum farina scenigræci & aceto utilis. Lepras, lichenas, discolorē à sole cutem, alphos, scabies, achoras, cum polenta expurgat. Instillatum plagæ percussis à scorpionibus, uenenatorū ictibus, & rabiosi canis moribus auxiliatur. Dentium doloribus lana exceptus prodest, & cauis eorum inditus. Myrmeciam tollit cum adipe circumlita in ambitu carne.

## EX GALENO.

Fici arboris liquor, & succus foliorū eius non mordicat tantū, aut absterget uehementer, sed & ulcerat, & ora uasorū referat, & myrmecias eiicit. Verum & purgare potest.





FICVS SA-  
TIVA.  
Feigenbaum.



- C** potest. Ficus aridæ tumores duros concoquunt, eosq̃ statim discutiunt. Atq̃ ipsæ per se illitæ eiusmodi uim obtinent. Sed & decoctū earum eiusdem utiq̃ naturę est. Verum ubi magis cōcoquere consiliū est, miscenda est farina triticea: ubi uerò plus digerere, hordeacea. Panis horum in medio est. In præsentiarū hæc de caricis nouisse sufficiat. Scire uerò oportet, quod quæ pinguiore sunt, magis possunt concoquere: quæ uerò gustu acriores, magis tum extergere, tum discutere. Cæterū quod ex ijs plurimū in aqua coctis efficitur, simile est melli non solum consistentia, sed & facultate. Porro Ficus uirides comestæ propter admistam humiditatē facultatis sunt imbecillioris: subducunt tamen aluum utræq̃ tum humidæ tum siccæ. Præterea Ficus cōmeabiles sunt, & facile in totū corpus peruadunt, penetrantq̃. Nam & abstergendi ui pollent haud obscura: cuius gratia cōmansæ, è calculosis renibus arenularū uim propellunt. Caricę licet multiplici utilitate cōmendantur, si quis tamen crebrò largiterq̃ esitauerit, sentiet non esse innoxias. Non admodū enim probum sanguinē gignunt, quapropter pediculorū quoq̃ agmen eas comitatur. Incidendi extenuandiq̃ uim habent, quo nomine aluum stimulant ad excretionē, renesq̃ expurgant. Iecori autem lieniq̃ inflammatione obseisis officiant, uelut Ficus quoq̃, cōmuni ratione omniū dulcium epularū, non peculiari quadam eximia facultate. Obstructis autē illis, aut scirrho tentatis, ipsæ ex sese proprijs uiribus nihil profunt, nec obsunt: sed incidentibus, extenuantibus, & abstergentibus iunctæ, non medio ceter auxiliantur: ideoq̃ medici nonnulli in dictis lienis iccorisq̃ affectibus eas longē ante cibum cum thymo, aut pipere, aut zingibere, aut pulegio, aut satureia, aut calamentha, aut origano, aut hyssopo dare soliti sunt. Ad eundē modum cum alio quouis acrem qualitatem, aut omnino incidendi extenuandiq̃ uim gerente caricis assumere, nō solum ita affectis, sed sanjs quoq̃ ex usu fuerit. Siquidē iccoris meatus,
- D** per quos fertur alimentū, patentes apertosq̃ seruari non solis laborantibus, sed bene ualentibus etiam tutissimū est. Proinde hoc pacto Ficus extenuante sale, aceto garoq̃ conditas uulgò comedunt, experimento id utile esse cōpertum habentes.

## EX PLINIO.

Fici succus lacteus, aceti naturā habet: itaq̃ coaguli modo lac contrahit. Excipitur ante maturitatē pomi, & in umbra siccat ad aperienda ulcera, cienda menstrua, appositus cum luteo oui, aut potus cum amylo. Podagris illinitur cum farina focnigraci & aceto. Pilos quoq̃ detrahit, palpebrarumq̃ scabiē emendat. Item lichenas & pforas. Aluum soluit. Lactis ficulni naturā aduersatur crabronū, uesparumq̃, & similibus uenenis, priuatim scorpionū. Idem cum axungia uerrucas tollit. Folia & quæ non maturuere Fici strumis illinuntur, omnibusq̃ quę emollienda sunt discutiendæ. Præstant hæc & per se folia. Et alij usus eorū, tanquam in fricando liene & alopecijs, & quæcunq̃ exulcerari opus sit, & aduersus canis morsus. Ramorū teneri cauliculi cuti imponunt, idem cū melle ulceribus quæ ceria uocantur, illinuntur. Extrahunt infracta ossa cum Papaueris folijs syluestris. Canum rabiosorū morsus, folio trito ex aceto restringunt. Enigra Ficu candidi cauliculi illinuntur furunculis, muris aranei moribus cum cera. Cinis earum ē folijs, gangrænis, consumendisq̃ quæ excrescunt. Fici maturæ urinā ciunt, aluum soluunt, sudorē mouent, papulasq̃. Ob id autumnō insalubres, quoniā sudantia huius cibi opera corpora refrigerant. Nec stomacho utiles, sed ad breue tempus. Nec uoci contrariæ intelliguntur. Nouissimæ salubriores quàm primæ. Medicatæ uerò nonnunquā iuuenum uires augent. Senibus meliorem ualitudinē faciunt, minusq̃ rugarū. Sitim sedant, calorem refrigerant: ob id non negandæ in febribus constrictis, quas stegnas uocāt. Siccæ Fici stomachū lædunt, gutturi & faucibus magnificē utiles. Natura ijs excalfaciendi. Sitim afferunt. Aluū molliunt, rheumatismis eius & stomacho contrariæ. Vesicæ semper utiles, & anhelatoribus, ac suspiriosis. Item iecinorū, renum, lienum uitijs, Corpus & uires adiuuant, ob id antē athletæ hoc cibo pascebantur.

Pythago.




**A** Pythagoras exercitator, primus ad carnes eos transtulit. Recolligentibus se à longa ualitudine utilissimæ. Item comitialibus & hydropicis, omnibusq; quæ maturanda aut discutienda sunt, imponuntur. Efficacius calce aut nitro admixto. At coctæ cum hyssopo pectus purgant, pituitam, tussim ueterem. Cum uino autem ad sedem, & tumorē maxillarum, & furunculos, panos, parotidas, decoctæ illinuntur. Viles & decocto earum fouere foeminas. Decoctæ quoq; eadem cum scenogræco utiles sunt pleuriticis & peripneumoniacis. Cum Ruta coctæ, torminibus profunt. Tibiarū ulceribus cum æris flore. Pterygijs cum punico mælo. Ambustis, per nionibus cum cera. Hydropicis coctæ in uino, & cum absinthio & farina hordeacea, nitro addito. Aluum sistunt manducatæ. Scorpionū ictibus cum sale tritæ illinuntur. Carbunculos extrahunt in uino coctæ & impositæ. Carcinomati, si sine ulcere est, quam pinguisimā Ficum imponi, penè singulare remediū est: item phagedænæ. Cinis non ex alia arbore aciem purgat acrior, conglutinat, replet, adstringit. Bibitur & ad discutiendū sanguinem concretū. Item percussis, præcipitatis, cōuulsis, ruptis, cyathis singulis aquæ & olei. Datur tetanicis & spasticis. Item potus uel infusus coeliacis, dysentericis. Et si quis eo cum oleo perungat, excalfacit. Item cum cera & rosaceo subactus, ambustis cicatricē tenuissimā obducit. Lusciosos ex oleo illitus emendat, dentiumq; uitia, crebro fricatu. Produnt etiam, si quis inclinata arbore, supino ore aliquem nodum eius morfu abstulerit nullo uidente, atq; in aluta illigatum licio è collo suspenderit, strumas & parotidas discuti. Cortex tritus cum oleo, uentris ulcera sanat. Crudæ grossi uerrucas & thymos nitro farinaq; additis tollunt, spodijsq; uicem exhibet fruticum à radice exeuntiū cinis. Bis tostus adiecto psimmythio digeritur in pastillos, ad ulcera oculorum & scabritiam.

## EX SYMEONE SETHI.

**B** Ficus admodū nutriunt, non tamen adstrictam & robustam carnem efficiunt, ut panis ac caro, sed laxam. Ventrem flatibus implent, nisi probè coquantur. Minus uerò quàm cætera opora sunt mali succi, & uentrem proritant, & facile exeunt. Effatu dignā extergendi facultatē obtinent: proinde arenosa multa si edantur nephreticis excernuntur. Maturæ Ficus nihil ferè obsunt, proximeq; ad caricas accedunt, quæ multa utilia habent. Malum hoc illis inest, quod sanguinem non admodū bonum gignunt, unde & pediculi procreantur. Oportet autem post usum Ficuum, alimentum quod extenuet, ingerere. Ad hæc Fici pulmonem & thoracem iuuant. Aiunt insuper cōtra uenena facultatē habere, si quis singulis diebus ieiunus ijs utatur. Caricæ pectus iuuant, & tusses. Vrinam ciunt, satisq; nutriunt, corporis etiam bonam habitudinē efficiunt. Ante cibum sumptæ, uentrem irritant, sed nisi celerius uentrem pertranseant, non bonum sanguinē gignunt. Quapropter si ad satietatem usque eduntur, scabiem & pruritum excitant. Cibus autem bonus est, & aduersus uenena remedium, si cum nucibus aut amygdalis comedantur. Renes expurgant, & iccōris, lienisq; obstructions auferunt, uerum calefaciunt, & sitim inferunt, & flauam in calidioribus temperamentis bilem procreant. Impositæ parotidibus & reliquis abscessibus, emolliunt & concoquunt, potissimum in ijs quibus sunt carnes molliores. Podagricis cum scenogræco & aceto impositæ, non parum iuuant.





SPARTVS

Pfrimmet.



## NOMINA.



SPARTON, *σπάρτιον* Græcis, Spartum Romanis uocatur. Officinis incognitum. Germanis *Pfirsimmen* appellari potest. Sparton uerò dixerunt, quod funiculi ac uinculi usum in alligandis uitibus præbeat.

*Spartum unde dictum.*

## FORMA.

Frutex est uirgas longas proferens, sine folijs, ualidas, difficulter fragiles, quibus uites ligant. Siliquas phaselorum modo fert, & in ijs semina lentis formam habentia, Florem luteum, ueluti *Leucoion*.

## LOCVS.

Aridum solum amat, estq; ueluti terræ iuncus.

## TEMPVS.

Floret circa Idus Iunias, ac subinde siliquas producit.

## TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum esse, & gustus & uires indicant.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Sparti semen & flores in aqua mulsa pota quinque obolorū pondere, per superna cum intensione ueluti *Elleborus* citra periculū purgat. Semen per inferna purgat. Quinetiam maceratis in aqua uirgis eius, deinceps uerò tussis & expressis, si succus cyathi unius mensura ieiunis bibatur, ischiadicis & angina laborantibus auxiliatur. Quidam etiam muria, aut marina macerantes, ischiadicis clysterem infundunt. Strigmenta autem cruenta elicit.

## EX GALENO.

Sparti, quo & uites apud nos alligant, tum semen, tum uirgarum succus, non instrenuē trahentis est facultatis.

## EX PAVLO.

Sparti, quo uites ligant, & semen & flos cum mulsa pondere quinque obolorum pota, per superiora purgant ueratri modo sine periculo. Semen per inferiora quoque purgat. Virgæ ipsius ad coxendicum dolores proficiunt.

## EX SYMEONE SETHI.

Sparti, quo uites ligantur, semen & flores cum aqua mulsa si bibantur pondere obolorum quinque, per superna purgant, ut *Elleborus albus*, sine periculo. Semen autem per inferna purgat. Virgæ uerò ischiadicis prosunt.

## DE SMYRNIO CAP. CCXC

## NOMINA.



SMYRNION Græcis, Smyrnion Latinis, officinis *Leuisticū*, Germanis *Liebstock* dicitur. Smyrnion dictū, quod huic idem sit odor qui *Myrrhæ*. Errant qui *Leuisticum* hodie nominatā herbam, eam esse putant quæ *Dioscoridi* *Ligusticum* appellatur. Neq; enim caulem geniculatum, neque etiam folia *Meliloto* similia profert. Tolerabilior est sententia eorum qui arbitrantur secundam esse *Dauci* speciem.

*Smyrnion cur dictum.*

*Leuisticum non est Ligusticum.*

## FORMA.

Caulem habet *Apio* similē, adnascantias obtinentē multas. Folia latiora *Apio*, ad terram confracta, subpinguia, robusta, cum acrimonia odorata, medicataq; & colore sublutea. Umbellā supra caulem *Anetho* similem. Semen rotundū, nigrum, sapore acre. Radicē acrem, odoratā, teneram, succosam, fauces mordentē, foris nigram, intus pallidam, aut subalbidā. Caterū si quis singulas has notas uelit expendere, facile perpendet *Smyrniū* eam esse herbam quam hodie *Leuisticū* nominant. Siquidē ea ut *Apiū* caulem profert concauū, ac stolones multos. Folia quoq; *Apij*,

*Smyrnium esse Leuisticum.*





SMYRNIVM

Liebstöckel.



A at latiora, ad terram contrafacta, subpinguia, firma, cum quadā acrimonia odorata, odore tamen medicato, colore in luteum languido: muscariū in capitibus caulium Anetho simile: semen rotundū, nigrum, acri sapore: radicem odoratā, acrem, gustu fauces mordentem, succosam, mollem, foris atram, intus subalbidam, aut pallidam. His accedit quod Leuisticū forma & odore Apio ualde simile est, ita ut nonnulli hac ratione moti putauerint esse Apī speciem quandā: ut congenerē esse herbam, quemadmodū testatur Galenus, nemini dubiū esse debeat. Vnde iterum li-  
 quidō colligi potest esse Smyrnion, quod certē statim ab Apio Dioscorides, tanquā similem congeneremq̃ herbam, idipsum describat. Conueniunt etiam utrarumque herbarum facultates, ut paulō pōst monebimus. Item Dioscorides scribit Pæoniam fœminā folia Smyrni habere. Quid uerō folijs Pæoniæ fœminæ, quàm folia Leuistici hodie nominati magis simile; ut nemo dubitare debeat subinde Smyrnion esse Leuisticum.

*Leuisticū forma  
et odore Apio si-  
mile.*

## LOCVS.

Nascitur hodie passim in hortis. Humida autem loca amat.

## TEMPVS.

Floret æstiuo tempore.

## TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum in tertio ordine.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Calefaciendi facultatem habent radix, herba & semen. Olerū modo comeduntur folia muria macerata, aluumq̃ sistunt. Radix serpentū moribus pota succurrit. Tussēs & orthopnoas mitigat. Vrinæ difficultati medetur. Illita recentia cedemata, phlegmonas, & duritias discutit. Vulnē ad cicatricem perducit. Feruefacta & subdita, abortus facit. Semen eius lienis, renum & uesicæ uitij prodest. Menses & secundas pellit. Cōmodè datur ischiadicis cum uino. Inflationes stomachi lenit. Sudores & ructus ciet. Potū peculiariter hydropicis, & febriū circuitibus prodest.

## EX GALENO.

Smyrnion est eiusdem generis cum Apio & Petroselino: fueritq̃ Apio quidem ualidius, Petroselino autem imbecillius. Menses itaque & urinas mouet. Cilices in Amano monte natum Petroselinū uocant. Est quidem & ipsum Smyrnion, minus uerō Petroselino & Smyrnio acre est. Proinde & ulceribus imponi potest, quia uidelicet sine molestia desiccat. Sed & digerere quæ indurata sunt, ualet. Reliqua facultas eius Apio & Petroselino similis est. Quocirca & semine utimur ad menses, urinas & asthmata. Hæc Galenus. Ex ijs Galeni uerbis liquidō apparet duplex esse Smyrnion, unum quod alio nomine Hipposelinon, de quo suo diximus loco, dicitur; alterum autem quod in Amano nascitur monte, de quo hic nobis sermo est.

## EX PLINIO.

Vrinā & menses ciunt folia & radix. Aluum sistit semen. Radix suppurationes recentes, & collectiones discutit: item duritias illita. Prodest contra phalangia, ac serpentes, admixto cachry aut polline, aut apiastro in uino pota, sed particulatim, quoniam uniuersa uomitiones mouet, qua de causa nonnunquā cum ruta datur. Partus adiuuat, & secundas pellit. Medetur tussi & orthopnoæ radix uel semen. Item thoracis, lienis, renum & uesicæ uitij. Radix autem ruptis, conuulsis auxiliatur. Sudores ciet & ructus, ideo inflationem stomachi discutit. Vulnē ad cicatricem perducit. Datur ischiadicis in uino cum crethmo. Exprimitur succus radicis, utilis fœminis, thoracis & præcordiorū desiderijs: calefacit enim, concoquit, & purgat. Semen peculiariter hydropicis datur potu, quibus & succus illinitur. Concoctiones facit. Sapore simillima piperi, ideo ad obsonia utuntur cum mulso, oleo & garo, maximè in elixis carnibus.




C

## APPENDIX.

Confer cum iam dictis facultatibus eas quas Leuistico recentiores tribuunt, & comperies prorsus easdem esse. Tradunt enim eius semē mouere menses & urinas, inflationes tollere, serpentū moribus mederi, calculos confringere, sudores ciere, uulnera conglutinare, lienisq; obstructions auferre : adeò ut hinc iterum constet, Leuisticum à Smyrnio non esse, saltem uiribus, diuersum.

## DE SILPHIO CAP. CCXCI

## NOMINA.



ΙΑΦΙΟΝ Græcis, Laser, & Laserpitium Latinis dicitur. Vulgo & officinis corrupta uoce, deflexa tamen quadam à Laserpitio pristini nominis umbra, Osteritiū uocatur. Primum siquidē, ut dictum est, Laserpitium, dein deprauata nomenclatura, Osteritiū, postremo Ostritium ccepit appellari. Qui sanè lapsus facilis admodum fuit. Abiecta

Ostritium cur  
dictum.

namq; prima litera, Asteritium, & dein a mutato in o, Osteritiū, ac postremo magis concise Ostritium nominare imperiti cceperūt. Veteribus Germanis haud dubie Laservurg dicta est hæc herba, quam quidem uocem, utpote semilatinā, posterius non rectè intelligentes, in Meysterwurg mutarunt. Qua quidem appellatione adhuc hodie omnes utuntur Germani.

## FORMA.

Caulem ferulæ similem habet, folia uerò Apij, aurei coloris, semen latum, foliaceum, radicem quæ corticem nigrum obtinet, à qua liquor etiam modicè rubens, translucidus, myrrhamq; redolens, ac odoratus destillat. Ex qua quidē descriptio-

D Laserpitium ger  
manicum.

ne luce clarius constat, herbā hanc cuius picturā damus, esse Laserpitiū, saltem germanicū. Caulis enim ei sceniculaceus, seu ferulæ, hoc est, geniculatus, folia Apij in auri colorē languescentia, semen foliaceū & latum, nempe quod figura exile foliolū exprimit: radix crassa & multa, foris nigricans, intus candida, miraq; flagrans iucunditate, quæ si uulneratur, liquor profluit lentus, ac modicè rufus, suauissimumq; spirans odorem, & linguam sua acrimonia uellicans, ut sanè nulla sit prorsus nota quæ reclamare uideatur. His accedit quod facultates Ostritij nominati à Laserpitij uiribus non discrepant, quemadmodum ex sequentibus patebit.

## LOCVS.

Nascitur in Syria, Armenia, Media & Aphrica. Quod ex Armenia & Aphrica affertur suauissimum odorem habet, præsertim Cyrenaicum, unde & ὀρεός, id est, succus Cyrenaicus appellatur. Nec hoc Laserpitium aliud est quàm concretus ille succus, quem officinæ Belzuinum, uel Ben Iuinum uocant. Quod uerò ex Media & Syria affertur, Dioscoride teste, uirosus odorem obtinet, ac putrilaginē respicit, ideoq; uidetur esse id quod hodie officinæ palsim Asam foetidam nominant. Quod etiam hinc colligi potest, quod in hodiernum usque diem ex Syria Alexandrina, & hinc Venetias deportatur. Nostrum in montosis locis prouenit, ac in omnibus ferè hortis nunc plantatur.

Succus Cyre-  
naicus.  
Belzuinum est  
Laserpitium.  
Asa foetida.

## TEMPVS.

Iunio mense flores admodum exiguos ac candidos, instar Anisi, profert, atque subinde semen latum.

## TEMPERAMENTVM.

Silphij liquor calidissimus est. Verumenimvero & folia, & caulis, & radix sat strenuè exalfaciunt. Nostrum etiam Laserpitiū in uniuersum calidius atq; acrius est pipere ipso, adeoq; calefacit & exiccat in tertio ordine. Radix autem & semen, folia & caulem superant, ut in eo etiam efficacissimus omnium aliarum partium sit liquor, secundo loco folia, postremo caulis.

## VIRES.





LASERPITIVM  
GERMANICVM.

Meysterwurcz.



## C VIRES. EX DIOSCORIDE.

† *περὶ τοῦ αἵματος  
διὰ τὴν λέγαν  
διὰ.* Laserpitiij liquor acris est, inflat. Inunctus cum uino, pipere & aceto, alopecias sanat. Oculorū aciem exacuit. Incipientes suffusiones cum melle inunctus dissipat. Cauernis dentium in eorundem dolore inditur, aut cum thure in linteo circumponitur, aut colluitur eo os cum Hyssopo, & Ficis coctis in posca. His prodest, quos bestia in rabiē efferata momorderit, uulneribus impositum. Valet aduersus omnia animantia quæ uirus ei aculantur, uenenata tela, potus aut inunctus. Scorpionum plagis oleo dilutus circumliniū. Gangranis † antea scarificatis immittitur. Carbunculisq; cum ruta, nitro & melle, uel per se. Clauos, callosq; prius circumscarificatos tollit, cerato, aut aridorū Ficum carne præmollitus. Recentes lichenas ex aceto sanat. Excrecentias carnis, polyposq; si aliquot diebus cū atramento sutorio aut erugine illinatur. Extuberantia cum forfice extrahit. Diuturnis asperæ arteriæ asperitatibus opitulatur. Vocem subito exasperatā irrauescentēmue, dilutus aqua & absorptus confestim restituit. Vuam cum melle inunctus reprimat. Angina laborantibus ex aqua mulsa utiliter gargarizatur. Coloris bonitatē ijs qui eo uescunt auget. In sorbili ouo datus rufi auxiliatur, pleuriticisq; in sorbitionib. Suffusis felle, & hydropicis cum aridis Ficis utiliter exhibetur. Cum pipere, thure & uino potus, rigores soluit. Neruorum distentione laborantibus, opisthotonicisq; datur oboli pondere deuorandus. Hærentes gulæ hirudines, gargarizatū cum aceto deijcit. Ad lac intus in grumos concretū. Comitialibus ex oxymelite sumptus succurrit. Menses ciet cum pipere & myrrha potus. Celiacos in acino uuæ sumptus iuuat. Cum lixi uio potus, repentinis conuulsionibus & rupturis prodest. Ad potiones dissoluitur amaris amygdalis, aut ruta, aut calido pane. Foliorū liquor eadem potest, sed multo minori efficacia. Cum oxymelite manditur ad expediendam asperam arteriam, præsertim amissam uocem. Utuntur eo cum Lactucis, pro cruce comedentes.

D

## EX GALENO.

Omnes Silphij partes flatulentæ magis sunt essentia, ac proinde concoctu difficiles. Foris tamen impositæ corpori, efficaciores, & omnium potissimū liquor, admodum trahentē facultatē obtinens. Attamē excrecentias imminuendi, & liquandi uim quandam propter iam dictam temperiē habent. Liquor Cyrenaicus quidē omnes & caliditate & tenuitate exuperat, ac proinde etiam omniū maximē discutit.

## EX PLINIO.

Folia Silphij ad expurgandas uuluas, pellendosq; emortuos partus, decoquuntur in uino albo odorato, ut bibatur mensura acetabuli à balneis. Radix prodest arterijs exasperatis, & collectionibus sanguinis illinitur. Sed & in cibis concoquitur agrē. Inflationes facit & ructus. Vrinæ quoque noxia. Sugillatis cum uino & oleo amicissima, & cum cera strumis. Verrucæ sedis crebriore eius suffitu cadunt. Liquor eius per se algores excalfacit. Potum neruorum uitia extenuat. Fœminis datur in uino. Et lanis mollibus admouetur uulua ad menses ciendos. Pedum clauos circumscarificatos ferro, mixtus ceræ extrahit. Vrinam ciet ciceris magnitudine dilutus. Andreas spondet, copiosius sumptum nec inflationes facere, & concoctioni plurimum conferre senibus & fœminis. Item hyeme quàm æstate utilius, ueruntamen aquam bibentibus, cauendumq; ne qua intus sit exulceratio. Ab ægritudine recreationi efficax in cibo. Tempestiuē enim datus, cauterium obtinet: assuetis etiam utilius quàm expertibus. Ad extera corporum, indubitatas confessiones habet. Venena telorum & serpentium extinguit potus: ex aqua uulneribus his circumliniū. Scorpionum tantum plagis ex oleo. Vlceribus uerò non maturefcentibus, cum farina hordeacea, uel fœco sicca. Carbunculis cum ruta, uel cum melle, uel per se uisco superlitū ut hæreat. Sic & ad canis morsus. Excrecentibus circa sedem, cum tegmine punici mâli ex aceto decoctus. Clauis pedū, qui uulgò morticini appellant, nitro mixto, antè subactus. Carnes replet cū uino & croco, aut pipere, aut murium



A murium fimo & aceto. Perniones ex uino fouet, & ex oleo coctum imponitur: sic & callo. Clauis pedum superrasis præcipuè utilitatis. Contra aquas malas, pestilentes tractus, uel dies. In tussi, uua, fellis ueteri suffusione, hydropicis, raucitatibus: confestim enim purgat fauces, uocemq; reddit. Podagras, in spongia dilutus posca lenit. Pleuriticis in sorbitione uinum poturis datur, contractionibus, opisthotonicis, ciceris magnitudine cera circumlitus. In angina gargarizatur. Anhelatoribus & in tussi uetusta, cum Porro ex aceto datur, atq; ex aceto his qui coagulum lactis forbuerint. Præcordiorū uitij, syntecticis, comitialibus in uino, in aqua mulsa linguæ paralyti. Coxendicibus & lumborum doloribus cum decocto melle illinitur. Non censuerim, quod autores suadent, cauernis dentiū in dolore inditum cera includi, magno experimento hominis qui se eadem causa præcipitauit ex alto.

## APPENDIX.

Laserpitiū nostrum ex traditione recentiorū unice uenenis aduersatur. Item pestilentia populariter grassantis arcet contagia. Lentitiam pituitosorū humorum incidit ac discutit: quapropter tussi quam frigus attulit, medet. Crassa quæ in thorace coeunt, discutit. Coloris corporis bonitatē hīs qui eo uescuntur, efficit. Concretum in corpore lac & sanguinem resoluit. Stomachū esu corroborat. Pituitam uentriculi deijcit, & elanguescētē appetentiam inuitat. Menses & urinam ciet. Rabiosi canis morfu, aut serpentis ictu liberat, si contrita folia uulneri indantur. Hypochondriorū uitij auxiliatur. Item lumborum doloribus. Carbunculos cum polenta tritum & impositū sanat. Cum uino potum rigores discutit. Herba ipsa in uino & aqua cocta uulnera interna glutinat: & in summa, omnia quæ Angelica uocata herba, & maiori efficacia, potest. Vt hinc etiam constet Osteritium à nostris nomenatum, easdem habere quas ueterum Laserpitium, inefficaciores tamen, facultates.

*Laserpitij germanici facultates.*

B Quare cum metus sit ne Laserpitiū adulterinum, aut saltem non optimū ad nos afferatur, præstat nostro uti, quod scilicet exigua admodū pecunia comparari possit, & uiribus satis efficax sit. Nam eadem quæ Dioscorides & Plinius Laserpitio assignant, recentiorum testimonio præstare ualet.

## DE STACHY. CAP. CCXCII.

## NOMINA.



TAXYZ Græcis, Stachys Latinis dicitur, officinis ignota. Germanis riechender Andorn nominatur. Stachys uerò dicta, quod uerticillato florum ambitu, & orbibus spicarum caules cingentibus coronetur.

*Stachys unde dicta.*

## FORMA.

Frutex est Marrubio similis, sed altior, folia ferens plura, sed rara, hirsuta, dura, odorata, incana. Virgas ab una radice plures emittit Marrubio candidiores. Ex hac descriptione perspicuum sit omnibus, herbam quam pictam damus, esse Stachyn: est enim fruticosa, Marrubijq; similitudinem refert, nisi quod altior est: folia quoq; plura, at rara obtinet, item hirsuta, dura, odorata & albicantia. Virgulas denique, etsi pictura id ipsum non ostendat, ab una radice plures emittit, candidiores quam Marrubium. Quibus omnibus florum purpureorū uerticillatus accedit ambitus, ac orbes spicarum, qui caules circundant.

## LOCVS.

Asperis locis, montibus ac collibus prouenit.

## TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Stachys gustu acri & amaro est, tertij ordinis excalfacientij. Vnde iterū liquet hanc herbam esse Stachyn, quod gustata acris & amara uideatur.

## VIREs.





STACHYS

Riechender Andorn.



## A VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim habet excalfactoriā & acrem. Ideoq; decoctum foliorum eius potum, menses & secundas pellit.

## EX GALENO.

Menses prouocat, abortum facit, & secundas eijcit.

## EX PLINIO.

Pellit menstrua.

## DE SECALE CAP. CCXCIII.

## NOMINA.



SECALE dicitur Plinio lib. xvij. cap. xvi. & Farrago, Germanis *Rodent* & *Rohn* nominatur. Magno in errore uersantur qui hoc frumenti genus Siliginem esse existimant. Siquidem ex hac, Plinio lib. xvij. cap. ix. teste, lautissimus fit panis, tener, candidus, & primatum tenens: ex illo cibarius, ater, & pondere precipuus, ad arcendam pauperum famem tantum utilis, qui ueterascens acorem etiam contrahit. Item Siligo habet spicam erectam, Plinio loco iam citato, cap. x. autore, nec rorem continet, quæ rubiginem faciat: hoc uerò procumbentē, & ideo quod imbres retineat, rubigini opportunū. Siligo præterea grano est candido, leui, & multipliciter tunicato: hoc contrā nigro, striato, & glumis ferè explicito. Deniq; Siligo sine arista est, hoc uerò aristis horret. Postremū ex Siligine pistrinarū opera fiunt laudatissima, ex Secale nullum ferè tentatū est. His itaque rationibus euidentissimū esse puto, hoc frumenti genus quod Germani nō, stri *Rodent* uocant, non esse Siliginem.

Secale non est  
Siligo.

## B FORMA.

Secale frumenti genus uulgò notissimū, stipula est culmo triticeo, graciliore & proceriore, geniculis ut plurimū quatuor, spica innocentiorib. aristis horrente, non erecta, sed semper propemodum procumbente, grano glumis explicito, & ob id caduco, tristi, nigricante, strigoso. Plinius cap. xvi. libri xvij. scribit, Secale fecunda, sed gracili stipula esse præditū, nigritia triste, sed pondere præcipuū. Quæ singula satis monstrāt, frumentū quod *Rodent* uocant Germani, esse secalen, & nō siliginē.

## LOCVS.

Gignitur qualicumque solo, ideoq; passim in Germania, præsertim Rhetia, & Vindelica feritur.

## TEMPVS.

Floret Iunio mense, metitur autem Iulio.

## TEMPERAMENTVM.

Magis uidetur excalfacere quàm Triticum, minus tamen refrigerare quàm Hordeum. Magis item exiccare quàm Triticū, minus tamen quàm Hordeū aut Zea.

## VIRES.

Habet aliquid lentoris & obstruentis naturæ. Hinc panis ex eo confectus, potissimum si à furfuribus non sit probè purgatus, stomacho grauis esse solet. Reliquæ uires ex capitibus de Tritico & Hordeo colligendæ.

DE SIDE-





SECALE

Kocher.





SIDERITIS  
PRIMA

Gladkraut.



## NOMINA.

Chamæpitys  
adulterina.

Sideritis cur  
dicia.



CHAMÆPITIS Græcis, Sideritis prima Latinis dicitur. Magna officinarū pars hac herba pro Chamæpity uera utitur, non sine errore, cum satis ex forma illius constet, ut paulò post monstrabimus, non esse Chamæpityn. Germanis Glidtrant appellatur. Sideritis uerò nominata, quod glutinandis uulneribus apta, præcipuum in bello habeat usum.

## FORMA.

Herba est folia Marrubio similia habens, longiora tamen, ad saluiae aut quercus figuram accedentia, uerum minora & aspera. Caules fundit quadratos, dodrantales, aut longiores, gustu non iniucundos, aliquo modo adstringentes, in quibus per interualla uelut in Marrubio uerticilli in orbem circumacti, & in his semen nigrum. Ex qua quidem deliniatione sole clarius cōstat, herbam cuius hic picturam exhibemus, esse Sideritin primam. Siquidē folia Marrubij habet, sed longiora, ad saluiae similitudinem aspera & rugosa, minora tamen. Caulem quadratum & hirsutum, non iniucundi gustus, aliquantum subadstringentis, quem per interualla uerticillati orbes coronant, ut in Marrubio uidere licet, in quibus flores subcandidi ac lutei, & subinde semen nigrum. Radicem exiguam & subluteam, quod silentio transiit Dioscorides. Non esse uerò hanc herbam luam arthriticam, nec Chamæpityos generibus posse annumerari, hinc conijcere licebit: primū, quod non sit pumila, sed in altum surgat, fruticis uerius quàm herbæ specie. Quod uerò neque primum neque secundū genus Chamæpityos dici queat, hinc manifestū fit, quod utrumque folijs Semperuiui minoris sit, à quibus saluiae, qualia hæc habet, diuersissima sunt. Nec etiam tertium, quia folia eius non sunt exilia.

## LOCVS.

Nascitur asperis, petrosis & incultis locis.

## TEMPVS.

Iunio mense florere incipit, nec desinit nisi in Autumni fine.

## TEMPERAMENTVM.

Sideritis habet quandam abstergendi facultatē, id quod amaritudo eius satis indicat: & pauculam adstrictionem. Plurima tamen eius pars humida est, & medio-criter frigida.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia eius illita uulnera glutinare, & inflammationē arcere possunt.

## EX GALENO.

Phlegmonem sedat, & glutinandi uim obtinet.

## EX PLINIO.

Sideritis tantam uim habet, ut quamuis recenti gladiatoris uulneri illigata, sanguinem claudat.

DE SORGI.



SORGI

Welcher Hirß.

tt 2





## DE SORGI CAP. CCXCV

## NOMINA.



**P**EREGRINVM est hoc genus frumenti, & ex Italia ad nos allatū, ideoq; Germani welschen Hirsi uocant. Alij Sorgsomen / quod scilicet in Italia Sorgi nominetur. Neq; constat quo nomine ueteribus sit appellatum, nisi farris genus sit, quod in Gallia nunc rubrum & barbatū frumentum nuncupant. Probē enim illi hęc nomenclatura uidetur couenire, quod nimirum eius spica rubra & barbata sit. Certō tamen nihil affirmare audemus, nam Panicum etiam referre, quamuis magnitudo repugnet, uidetur.

## FORMA.

Culmos habet quatuor aut quinq; altos, crassos, geniculatos, rubicundos, folijs uestitos longis, latis, & in summitate acuminatis, harundini non dissimilibus: spicā quā Panicū maiorē ac densiorē, rufam & barbatā, in qua semen rufum, rotundū, lentis magnitudine, & acuminatū. Florem luteum. Radicem multis fibris capilla tā.

## LOCVS.

Non prouenit nisi satum, & nunc in multorū hortis colitur ac plantatur, non tamen facile emergit.

## TEMPVS.

Floret Iulio & Augusto mensibus, flore, ut diximus, luteo, nec nisi extrema ferē autumnī parte ad maturitatem peruenit.

## TEMPERAMENTVM.

Semen dulce est, & Panicum planē in gustu refert, ideoq; temperamento ab hoc minimē differre putamus.

## VIREs.

Tametsi de illius facultatibus nihil comperti habeamus, tamen quia Panicū gustu refert, easdem illi facultates obtinere existimamus, quas suo loco inuenies.

## DE SERPENTARIIS OFFICINARVM

## CAP. CCXCVI

## NOMINA.

Officinarum  
etiam.



**V**O nomine ueteribus medicis Græcis & Latinis appellatæ sint, nemo hactenus, quod sciam, indicare potuit. Recentiores herbarij & officinæ non sine magno & intolerando errore Serpentarias uocant, non certē quod in nomenclatura tantum sit situm, sed quod forma & uiribus plurimum ab ea herba quam Græci *σπασμωγος*, Latini autem Dracunculū ac Serpentariam nominant, plurimum discrepent, ut suo loco latius demonstrabimus. Germani nostri has herbas *Naterwurz* sua lingua appellant.

## GENERA.

Duo sunt Serpentariæ recentiorū & officinarū genera, forma non multum uariantes. Vnum quod leuibus admodū folijs, & radice in se contorta constat. Hinc *Bistorta* est quod herbarijs nostri temporis Bistorta dicatur. Nos certioris discriminis gratia marem fecimus, germaniceq; *Naterwurz* mennle uocauimus. Alterum rugosioribus folijs, maioriq; radice, & minus intorta, ac multum capillata uidetur. Vulgares herbarij Colubrinā nuncupant. Nos fœminā cōstituimus, ideoq; germanicē *Naterwurz* weibele uocauimus. Serpentarias uerō utrunq; genus dixerunt, propterea quod ubi primum ē terra prodeunt, linguæ serpentinae pelle tenui uestitæ, formam obtinent.

## FORMA.

Cauliculo constant tenui ac iunceo; glabrescente, per ima tantum foliato, spicoso florū uertice, quibus dilutioris purpuræ color inest: folio Rumicis à terra cæsis, superne





SERPENTARIA MAS  
SEV BISTORTIA

Waterwortz mennle.





COLUBRINA SEV SER-  
PENTARIA FOEMINA.

Wasserpfeife.



A pernè uiridi & herbaceo: radice, mas quidem draconis modo inuoluta & contorta, fœmina uerò oblonga, maiore ac capillata, extrà nigricante, intus rubefcente.

## LOCVS.

Nascuntur locis umbrosis & humidis, pratis potissimū Martianæ syluæ.

## TEMPVS.

Florent Maio mense & Iunio, quo maximè tempore, ut omnes aliæ quę floribus ornantur plantæ, dignosci ac inueniri possunt.

## TEMPERAMENTVM.

Vtriusq; radix mirificè adstringit, ut refrigerandi ac exiccandi facultate prædita esse nemini sit dubium. Antiquus manuscriptus herbarius frigidas & siccas esse in tertio ordine censet.

## VIRES.

Radices illarum glutinant uulnera, foetum in utero retinent, uomitū biliosum reprimunt, dysenteria sanant. Hæc antiquus herbarius. Nostræ uerò ætatis medici, aliorū errata impudenter sectantes, ad longè diuersos usus Serpentariæ utriusq; radices adhibent, nempe ad eos ad quos Dioscorides, Galenus & alij ueteres suum Dracontū, cum tamen uiribus inter se maximè discrepent, quod gustus etiā abundè testatur, cum Dracontij radix acris sit, illarū uerò uehementer adstringat. Ut igitur errorē hunc relinquant, subinde medicos & seplasiarios hortor, nisi fortè perdere magis quàm sanare in delicijs habeant: sciantq; Serpentarias suas non alias quàm Britannicā habere facultates, adstringendi nimirum, priuatim ad ea quæ in ore & tonsillis sunt depascentia ulcera accommodatas, & ad omnia alia quibus adstrictione opus est. Folia etiam in farinam trita labiles dentes confirmant.

## DE SCORDIO CAP. CCXCVII.

B

## NOMINA.



KOPAION Græcis, Latinis Trixago palustris dicitur. Officinis ferè omnibus incognita. Germanis allusione quadam ad Romanā appellatio nem aptè Wasserbatenig nominabitur. Scordion autem Græcis ab Allij dicta est herba hæc, quod nimirū eius folia affricta, Allij, quod Græcis Scorodon uocatur, odorē referant. Ab hoc mali & ingrati odoris sensu, isdem etiam *διόσμορον* appellata est. Ut uerò Trixago dicta sit, similitudo fecit: Trixagini enim, quæ Græcis Chamædryos nominatur, similis est. Palustris autem, quoniā humentibus ac palustribus locis nascatur.

Scordion unde dictum.

Dyosmon: Trixago palustris cur uocata.

## FORMA.

Folia Trixagini seu Chamædryi similia habet, maiora tamen, nec sic in ambitu incisa, odore aliquantū Allium referencia, gustu adstringentia & amara. Caules quadrangulos, in quibus flos subrubescens. Hæc delinatio sic refert herbā hanc, cuius picturā damus, ut ouum ouo non sit tam simile. Folio siquidem est Trixaginis, maiore, & per ambitum non ita profundè serrato & inciso, odore aliquatenus Allium reddente, adstringentis & amari gustus, quadrangulis caulibus: flore in caulibus, instar Chamædryos & Teucrij, subrubro, & minimè in summis caulibus, ut aliqui putant, quemadmodū pictura ipsa abundè docet. Hæc itaque herba in theriacos pastillos inferenda erit, & non syluestre Allium, ut maximo in errore uersentur seplasiarij institores, qui pro re tam salutari atq; omnibus putridis marcoribus, Galeno lib. i. de antidotis autore, aduersante, syluestre Allium usurpant. Sed indignius erratum, quàm quod multis explodi debeat. In hunc autem eisdem uicinitate uocabulorū potissimū incidisse errorem, libro primo Paradoxorū, cap. xxiiij. abundè monstrauius.

Seplasiariorum error.





SCORDIVM

Wasserbatenig.



A

## LOCVS.

Nascitur in montanis & humentibus locis. Nec inter se pugnant Dioscorides & Plinius, dum hic in campis humidis pinguibusq̃, ille autem in montanis nasci scribit. Vterq̃ enim uerum dixit: in campestribus siquidem & montanis, non tamen omnibus prouenit, sed, quod Dioscorides etiam adiecit, humentibus tantum. Plantatum autem Scordium non difficulter nascitur, & possunt de uno duntaxat ramo complures prouenire, modò solo humido cōmittantur.

## TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, flos tamen non nisi diem unum durare uidetur, sic continuò unus alium sequitur.

## TEMPERAMENTVM.

Tum ex saporibus, tum etiam facultatibus paulò pòst exponendis satis constat Scordiū calidum esse. Nam, Galeno etiam teste, amarum quid obtinet, & acre.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Herba uim calefaciendi habet, & urinam cit recens trita & pota. Arida quoque cum uino decocta contra serpentiū morsus, & letalia uenena bibitur. Ad stomachi rosiones, dysenteriā, & urinæ difficultatē pondere duarum drachmarū cum hydromelite. Purgat crassa purulenta ē thorace. Facit ad ueterē tussim, rupta, conuulsa, cum nasturtio, melle & resina in ecligmate arida cōmixta. Hypochondriorū uetustas inflammationes excepta cerato lenit. Succurrit eadem podagris cum acri aceto circumlita, aut ex aqua illita. Menses supposita mouet, uulnera glutinat, uetusta ulcera purgat, & cum melle ad cicatricē ducit. Siccata carniū excrescentias reprimi. Succus præterea ex ea expressus ad prædicta uitia bibitur.

## EX GALENO.

Expurgat simulq̃ excalfacit uiscera, tum menses urinamq̃ mouet. Præterea conuulsa ruptaq̃ & laterū dolores ab obstructione & frigore natos sanat potum. Deniq̃ uiride illitum magna uulnera conglutinat: uerum sordida purgat, & maligna ad cicatricem perducit, illitum aridum.

## EX PAVLO.

Scordium uarium existit, ut quod amarū, acerbū & acre sit. Purgat igitur simul & calfacit uiscera, urinas & menstrua cit, refrigerata omnia recalfacit, uulnera glutinat, repurgatq̃, aridum illitum cicatricem inducit.

## DE STICHADĒ CAP. CCXCVIII.

## NOMINA.



**STICHAS** græcè, Stichas uel Stoechas latinè appellatur. Officinæ cognomento Arabicam uocāt. Germanis nominatur *Stichasraur*. Stichas uerò nomen accepit à Stoechadibus ex aduerso Malsiliæ sitis Galliæ insulis, in quibus prouenit. Arabę factionis autores patriam Stichada reliquis omnibus prætulerūt, hinc sequaces illorum gentili cognomento Arabicā nuncuparunt.

*Stichas arabica.**Stichas unde dicta.**Arabica quare uocata.*

## FORMA.

Herba est tenuibus ramulis, comam similem Thymo habens, longiore tamen folio, & gustu acris, & aliquantū subamara. Hactenus Dioscorides, qui flores atq̃ spicam prorsus omisit. Sunt autem flores, ut pictura abundè monstrat, exigui & cœrulei, spica uerò flauescit, semine referta exiguo, triquetra, & coloris spadicei. Radix illi est tenuis & lignosa.

## LOCVS.

Nascitur, ut antea est cōmemoratū, in insulis Galliæ ē regione Malsiliæ, quę Stichades appellantur, à quibus etiam gentilitiam appellationē accepit. Prouenit etiā in Arabia, alijsq̃ cōpluribus locis, & in multis etiam Germaniæ nostræ hortis.

## TEMPVS.





STICHAS

Stichaskraut.



## TEMPVS.

**A** Floret eo quo Lauandula tempore, nimirum ante Solstitium æstiuum, hoc est, Iunio mense.

## TEMPERAMENTVM.

Stoechadis qualitas gustu quidē amara est, & mediocriter subadstringens. Temperamentū uerò compositum ex terrena essentia frigida exigua, unde sanè adstringit: & ex tenui, altera, quæ terrena est, copiosiore, à qua utiq; amara est.

## VIREs. EX DIOSCORIDE.

Decoctum eius, quemadmodum & Hyslopi, ad thoracis uitia efficax est, Miscetur antidotis utiliter.

## EX GALENO.

Obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareq; tum omnia uiscera, tum totum corpus est nata.

## EX PLINIO.

Menses cit potu, thoracis dolores leuat. Antidotis quoq; miscetur.

## DE STRUTHIO CAP. CCXCIX.

## NOMINA.



**T**ΡΟΥΘΙΟΝ Græcis, Radicula, siue Lanaria herba Latinis, Mauritanis & officinis Condisi, nonnullis herba fullonum, uulgò Saponaria, Germanis Seyffenstrant dicitur. Vnde uerò Græci hanc herbam Struthiū appellauerint, non satis constat, nisi fortè à foliorū positura, quæ auium alas quadantenus imitant, nomen illi indiderint. Nam gens ea *spothay* & *spadiay* passerem, & minores alias aues appellat. Vel forsitan quod Venerem stimulet. Græci enim, ut dictum est, *spothay* passerem uocant, & ab eius auis salacitate lasciuos, & in Venerem procliuiores homines *spothay*, quasi passerem uocant. Porro strutheum, ut est apud Festum, nuncupant obscenā uirilem partem. Qua imitatione Martialis & Catullus passerem pro uirili membro in suis uersibus usurpasse uidentur. Lanariam uerò dixerūt, quod ad candorem & mollitiem lanarū ea usa fuerit antiquitas. Nam cum succidæ lanæ cespypo spurcatæ colores respuerent, prolutæ huius radices succo, ad quoscunq; suffectus imbibendos præparabantur, quibus cespypum erat impedimento. Sic sordescentes lanas ueteres hac herba eluebant, ad munditiē contrahendam, quæ primum ab insectoribus quærebatur, sordidis colores aspernantibus. Sic quoq; à præcipua & utiliore parte, Radicula Romanis est appellata. Saponaria recentiorib. dicta est, quoniam eluendis uestimentorū maculis, sordibusq; lanarum expurgandis, saponis uicem exhibet. Herba autem fullonū nominata est, quod ea interpollandis uestibus, & mangonio poliendis fullones utantur.

## FORMA.

Struthion herba est caule lanuginoso, folijs oleæ prodeuntib. ex interuallo quasi geniculatim, plerunq; quinis in unum coeuntibus, in summo coliculorū floribus candidis: radice, quam summo cespite non in altum ultrò citroq; per longitudinem fundit, magna, tereti & oblonga, quæ conciditur purgandis lanis.

## LOCVS.

Nascitur in Asia Syriaq; saxosis & asperis locis præcipuè. Nunc in hortis quibusdam plantatur.

## TEMPVS.

Floret æstate, Iunio maximè mense, sed per duos cōtinuos menses floribus prægnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Calidum & siccum temperamento, ex quarto quodammodo ordine.

## VIREs.





STRUTHIVM

Scyffentraut.



## VIRES. EX DIOSCORIDE.

**A** Radix eius acris est, urinam cit, iecinorosis auxiliatur, tussi & orthopnoeis cum melle cochlearis mensura sumpta. Aluum subducit. Eadem cum Panace & Capparis radice sumpta, calculos frangit, & per urinam exturbat. Lienem induratum minuit. Subdita menses elicit, & foetum manifeste enecat. Cum polenta & aceto illita, lepras tollit. Cum farina hordeacea in uino elixa, tubercula discutit. Miscetur praeterea collyrijs & malagmatis quae ad claritatem oculorum conficiuntur. Sternutamenta cit, & trita cum melle naribus infusa, per os purgat.

## EX GALENO.


Struthij radice potissimum utimur, gustu acri quidem existente. Sed & abstergit, & irritat, ideoque sternutamenta mouet, ceu caetera omnia quae gustu acria sunt, & temperamento calida.

## EX PLINIO.

Medetur morbo regio ipsa radix decocta, & ius potum: item thoracis uitij. Urinam cit, aluum soluit, & uulvas purgat. Ea & ex melle prodest magnifice ad tussim orthopnoeae cochlearis mensura. Cum polenta uero & aceto lepras tollit. Eadem cum Panace & Capparis radice calculos frangit, pellitque. Panos discutit, cum farina hordeacea & uino decocta. Miscetur & malagmatis & collyrijs, claritatis causa. Ad sternutamenta utilis inter pauca. Lienem quoque ac iecinori, Eadem pota denarii unius pondere ex multa aqua, suspiciosos sanat.

## DE SCILLA. CAP. CCC.

## NOMINA.

**B**  **K** I A A A Graecis, Scilla Latinis, Squilla, exemplo Varronis, omnibus nunc officinis uocatur. Germanis autem Meerzwibel.

## FORMA.

Scillae radix caepae modo multipliciter tunicata corticosaque, ex qua prius, ut in croco, caulis profilit, tum ex eo flos in luteo candidus emergens insidit, qui cum senuerit folia demum multis post diebus emicant lata, nullo nixa pediculo, capitia quadam specie, & pleraque ex ijs in terram deflexa.

## LOCVS.

Scilla undique, ut caepae & allia, prouenit.

## TEMPVS.

Scillam ter florere, triaque tempora sationum ostendere, Theophrastus libro septimo capite duodecimo tradit. Primum enim florum prouentum, arandi primum tempus significare scribit, secundum medium, tertium nouissimum. Quot enim fuerint isti, totidem & arari tempora ferme occurrunt. Scillae praeterea flos, ut est Berytius auctor, uirgata specie profiliens, modo celeriter non emarcescat, largos frugum prouentus, ac uberem annonam nobis promittit.

## TEMPERAMENTVM.

Admodum incidentem facultatem obtinet, non tamen admodum calidam, sed secundum hoc eam quispiam secundi ordinis censeat excalfacientium.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vim acrem & feruentem habet. Assata uero multipliciter obtinet usum. Pasta aut luto oblita, in clibanum conicitur, aut carbonibus obruitur, donec circumlita pasta sufficienter tosta fuerit. Qua amota, si non emollescat, altera pasta aut luto circumlinitur, & eadem quae prius fiunt. Nam quae ita non assatur, noxia magis est, praesertim interaneis data. Torretur item in olla indito operculo, & in clibanum coniecta. Sumitur ex ea, abiectionis extremis partibus, quod maxime medium est, quod concisum, effusa priore aqua, coquitur, nouaque superinfusa usque dum nec amaritudinem, neque

uu acri-





SCILLA

Meerzwibel.



**A** acrimoniam habeat aqua. Siccatur autem in umbra dissecta, & lino traiecta, ita ut ne taleolae inuicem se contingant. Sic igitur secta, ad oleum, uinum, acetumque scilliti cum utimur. Ad rimas uero pedum crudae Scillae interanea pars in oleo seruefacta, aut cum resina liquefacta imponitur. Decocta in aceto demorsis à uipera cataplasma est. Assae eiusdem pars una tosti salis partibus octo subigitur, daturque ieiunis cochlearis unius duorumue pondere ad emolliendam aluum. Additur potionibus & odoramentarijs medicamentis, & ijs cum quibus urinam ciere uoluerimus, hydropicisque & stomachicis, quibus innatant cibi, & morbo regio, torminibus, in uetere tussi, asthmaticis, cruenta reijcientibus. Trium uero obolorum pondus in delinctu ex melle sumpsisse satis est. Coquitur eadem cum melle, sumiturque in cibo ad eadem, maximè coctionem adiuuans. Strigmentitia per aluum ducit. Cocta & simili modo sumpta, idem potest. Cauendus Scillae usus ijs, quibus interaneum aliquod exulceratum erit. Prodest uerrucis & perionibus assam inungere. Semen eius tritum, cum caricis aut melle exceptum, si manditur, aluum emollit. Pro foribus domus suspensa tota amuletum est.

## EX GALENO.

Præstat assam aut elixam sumere: sic enim uirium eius uehementia exoluitur.

## EX PLINIO.

**B** Scillarum in medicina alba est quæ masculus, femina nigra. Scilla quæ candidissima fuerit, utilissima erit. Huic aridis tunicis direptis, quod reliquum est uino est, confutum suspenditur lino modicis interuallis, postea arida frustra in cadum aceti quam asperrimi pendentia immerguntur, ita ne ulla parte uas contingant. Hoc fit ante Solstitium diebus quadraginta octo. Gypso deinde oblitus cadus, ponitur sub tegulis, totius diei solem accipientibus. Post eum numerum dierum tollitur uas, Scilla exhibitur, acetum transfunditur. Hoc clariorem aciem facit. Salutare est stomachi laterumque doloribus, parum sumptum binis diebus. Sed tanta uis est, ut auidius haustum extinctæ animæ momento aliquo speciem præbeat. Prodest & gingiuis & dentibus, uel per se comanducata. Tineas & reliqua uentris animalia pellit ex aceto & melle sumpta. Linguae quoque recens subiecta præstat ne hydropici sitim sentiant. Coquitur pluribus modis in olla, quæ coniiciatur in clibanum aut furnum, uel adipe aut luto illita, aut frustatim in patinis. Et cruda siccatur, deinde conciditur, coquiturque in aceto, tum serpentium ictibus imponitur. Tosta quoque purgatur, & medium eius iterum in aqua coquitur. Vfus sic coctæ ad hydropicos. Ad urinam ciendam tribus obolis cum melle & aceto potest. Item ad spleneticos & stomachicos, si non sentiant ulcus, quibus innatet cibis. Ad tormina, regios morbos, tussim ueterem cum suspirio. Discutit & ex folijs strumas, quadrinis diebus soluta. Furfures capitis, & ulcera manantia illita, ex oleo cocta. Coquitur & in melle cibi gratia, maximè uti coctionem faciat. Sic & interiora purgat. Rimas pedum sanat in oleo cocta, & mixta resinæ. Semen eius lumborum dolori ex melle imponitur. Py-

thagoras Scillam in limine ianue suspensam, malorum  
medicamentorum introitum pel-  
lere tradit.



784



STAPHIS AGRIA

Bismüntz.



# DE STAPHIDE AGRIA

785

A

CAP. CCCL

NOMINA.



ΤΑΦΙΣ ἄγρια Græcis, herba Pedicularis & Pituitaria Latinis, officinis Staphisagria, Germanis Bismünz. Pedicularis autem Pituitariaq; Latinis à uiribus quas habet, dicta est: erumpentibus enim è corpore pediculis ex oleo inuncta aduersatur, & cōmanducata feruore multam pituitam trahit.

Pedicularis quare dicta.  
Pituitaria unde.

FORMA.

Folia habet Labruscæ, incisuris diuisa, coliculos rectos, molles, nigrosq; flores llati similes, semen in uasculis uiridibus similibus Ciceri triangulū, asperum, in nigro subrufum, intus candidū, gustu acre. Hæc descriptio herbæ huic cuius hic effigiem damus per omnia quadrat, floribus tantum exceptis, qui minimè llati similes sunt, neq; in colore, neq; in quantitate. llati enim flores lutei sunt, & exigui, huius contrà subcæsi, ac multò maiores, ut hinc ferè suspicer eam herbam non esse quam ueteres pingunt Staphida agrian. Cæterū cum proximè tamen ad picturam accedat, neque uiribus distet admodū, inter Staphidis agrias species rectè à plerisq; hodie herbariæ rei studiosis cōnumeratur. Folia enim fert plerunq; septem, aliquando etiam paucioribus incisuris diuisa, coliculos rectos, nigros, & in folliculis herbaceis semen triquetrum, in nigro subrufum, intus candidum, gustu acre, ita ut illi omnes notæ, demptis floribus, respondeant.

LOCVS.

Nascitur, Plinio authore, in opacis. Ea cuius picturam exhibemus, nunc passim in hortis plantatur.

B

TEMPVS.

Floret æstate.

TEMPERAMENTVM.

Quum urendi uim habeat Staphis agria, consequitur eandem in quarto ordine esse excalfacientium & desiccantium.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Eius grana quindecim si quis trita in aqua mulsâ dederit, crassa per uomitū purgant. Sed qui biberint, ambulare debent. Quinetiam assidue attendere oportet, & aquam mulsam potui dare, quod strangulationis pericula inferant, & fauces deurant. Trita eadem, & ex oleo inuncta, pediculationi, prurigini & scabiei auxiliatur. Plurimā cit pituitā cōmanducata. Decocta in aceto, dentium dolori, si ea colluantur, subuenit. Gingiuarū rheumatismū sistit. Vlcerâ oris, aphthas nominant, cum melle sanat. Miscetur præterea urentibus malagmatis.

EX GALENO.

Vehementer acrem obtinet facultatē, adeò ut ex capite purget pituitam, abstergatq; ualenter. Itaq; ad scabiē accōmodata est. Sed & urendi uim aliquam habet.

EX PLINIO.

Nucleis eius ad purgationes uti non censuerim propter ancipitē strangulationē, nec ad pituitā oris siccandā; fauces enim lædunt. Phthiriasi caput & reliquū corpus liberāt triti. Facilius admixta sandaracha. Item pruritu & psoris. Ad dentiū dolores decoquuntur in aceto. Ad auriū uitia, rheumatismū gingiuarū, ulcera oris manantia. Flos tritus in uino contra serpentes bibitur. Semen enim abdicauerim, propter nimiam uim ardoris. Quidam eam Pituitariā uocant, & plagis serpentium utiq; illinunt. Item phthiriasi, qua Sylla dictator consumptus est. Nascuntur quoq; in sanguine ipso hominis animalia exesura corpus. Resistitur Staphidis agrias succo, cum oleo perunctis corporibus. Hæc quidem in aceto decocta, etiam uestes eo tædio liberat.



786



SESELI  
MASSILIENSE.


Sesel.



A

CAP. CCCII.

## NOMINA.



ΣΕΣΑΙ το μασσαλιανόν Græcis, Sefeli Malsiliense Latinis, officinis Siler *Siler montanū.* montanū dicitur. Semen tamen quod à seplasiarijs hoc nomine uenditur, non Malsiliensis, sed, si amaritudinē respicias, Æthiopici, uel, quod magis uero simile est, Peloponnesiaci (neutrius enim integram imaginē uidimus) Sefeli semen est: latius enim, odoratius, & carnosius Malsiliensi existit. Germanis incognita hæcenus planta fuit, ob id Sefel rectē illam appellabunt.

## FORMA.

Folia gerit Fœniculi, crassiora tamen. Caulem uegetiorē, umbellam Anetho similem, in qua semen est oblongum, angulosum, & degustanti confestim acre: radicem longam, & odoratam. Ex qua Dioscoridis deliniatione satis constat stirpem, cuius picturam damus, esse Sefeli Malsiliense, quod huic nimirum, nulla prorsus nota reclamante, tota descriptio suffragetur. Quid multa? dato etiam quod singulæ illi non responderent notæ, tamen cum eas quas ueteres Sefeli attribuerunt facultates obtineat, citra omne periculum pro eo usurparetur.

## LOCVS.

Optimū iuxta Malsiliam, teste Dioscoride, Galliæ urbem nascitur, unde etiam cognominatū est Malsiliense. Prouenit autem alijs quoq; in locis calidioribus, & nunc in plerisq; Germaniæ hortis, sed non nisi satum & cultum.

## TEMPVS.

Floret æstate, & semen subinde producit.

## TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccatur in secundo ordine.

B

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Semen & radix calefaciendi uim obtinent. Stranguriæ, orthopnceæ, uteri suffocationibus & comitialibus pota medentur. Menfes & fectus ex utero ducunt. Interaneis omnibus prosunt, & diutinas tusses sanant. Ipsum semen cum uino potum coctioni confert, tormina discutit, & epialis febribus utile est. Ad arcenda in itinere frigora cum pipere & uino bibitur. Datur capris alijsq; quadrupedibus bibendū, ut partus iuuat.

## EX GALENO.

Sefeli & radix & semen usque adeo excalfacit, ut admodum urinā mouere queat. Sed & tenuium est partium, ut & comitialibus, & orthopnceis competat.

## EX PLINIO.

Prodest homini ad tussim ueterē, rupta, cōuulsa, in uino albo potum. Item opisthotonicis, & iecinorū uitijs, & torminibus, & stranguriæ, duarum aut trium ligularum mensura. Sunt & folia utilia, ut quæ partus adiuuent etiam quadrupedum. Hoc maximè pasci dicuntur ceruæ parituræ. Illinitur & igni sacro. Multum in summo cibo concoctionibus confert, uel folio, uel semine. Quadrupedum quoque aluum sistit, siue tritum potui infusum, siue mandendo cōmanducatum e sale, Boum morbis medetur, uel si contritum infunditur.



788



SANGVISORBA  
MAIOR.

Groß Koldblekraut.



SANGVISORBA  
MINOR.

Klein Köhleskraut.





## NOMINA.



*Sanguisorba cum dicta.*

*Error eorum qui Pimpinella cum Sanguisorba confundunt.*

VVM ignoraremus quo nomine stirpem hanc ueteres Græci & Latini, si modo h̄s cognita fuit, appellarint, maluimus interea uulgari uti nomen clatura, donec aliud certius nomen inueniremus. Elatinen tamen esse iudicarem, si folia pusilla, pilosa, & rotunda obtineret. Nunc quum neque pusilla, neque pilosa, neque rotunda, sed mucronata esse uideantur, certi statuere nihil possum. Sanguisorba uerò dicta est hæc herba, non quod uulneribus iniecta ferrū & spicula facile & citra sensum doloris exigat, ut nonnulli arbitrantur: id ipsum enim non posse mirifica quæ illi inest adstringendi facultas abundè ostendit: sed potius quod ei in sistendo sanguine undecumque emanarit, mira admodū insit efficacia, adeo ut hunc ipsum quasi absorbere uideatur. Erroris autem huius nulla alia causa est, nisi quod hanc stirpem multi cum ea quæ hodie Pimpinella uocatur, confundant, quæ certè propter caliditatē quam obtinet haud exiguam, quandā etiam trahendi facultatē habere uidetur, adeo ut infixa corpori extrahere facile queat. Quod uerò cum Pimpinella confuderint non alio factum est nomine, quàm quod huius folia proximè ad Pimpinellæ folia, quæ itidem ut hæc serrata sunt, accedere uidentur. Sed hæc confusio non caret errore, ut paulò post dicemus. Germanis hæc herba *Kölblestraut* / à capitellis quæ rufescentibus punctis maculata sunt, dicitur. Nonnulli etiam Germanorum *Hergots bärclin* nominant. Quidam etiam à sistendo sanguine *Blutstraut*.

## GENERA.

*Sanguisorba maior.*

*D Minor.*

Duo sunt eius herbæ quæ Sanguisorba uocatur genera. Vna enim maioribus constat folijs ac longioribus, coliculis tamen tenuioribus, ideoque ab hac foliorū forma maior à nobis dicta est. Altera minoribus folijs, coliculis autem maioribus esseprehenditur, quare ab ista foliorū effigie rectè minor appellari potest, ut inter eas aliquod discrimen esse herbariæ rei studiosi hac ratione animaduertant.

## FORMA.

Herba est à radice crassa & longa, statim foliosa, minor potissimū, coliculos habens plurimos rubentes, folia aspera, in extremitatib. latè crenata & serrata, in summo coliculorū capitella rufescentibus punctis maculata, quæ si hiant flores exeunt herbacei, in medio croceam comam ostendentes.

## LOCVS.

Nascuntur locis incultis, aridioribus, & soli expositis. Vnde iterum colligere licebit non esse Elatinen, utcumque à facultatibus illius non discrepet, quòd Dioscoride & Plinio testibus, Elatine in cultis & segetibus proueniat.

## TEMPVS.

Florent Maio & Iunio mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Gustantibus adstrictionē haud uulgarem ac uiscositatē herba præ se ferre uidetur. Quapropter siccam admodum consistentiā nacta est, simulque corpora contrahere, & constringere potest, atque adeo emplasticam, eo quod glutinosa sit, facultatem obtinet.

## VIREs.

Ex h̄s quæ diximus abundè constat utranque Sanguisorbam in restringendis ac suppressendis sanguinis profluuijs esse efficacissimas, adeo ut nonnulli constanter asserant, eas etiam manibus gestatas sanguinem undecumque manantē sistere posse. Experientia certè compertū est ad muliebri profluuiū sanandū, nullum posse reperiri præsentius h̄s stirpibus præsidium. Glutinant etiam uulnera illarū folia, carcinomatosisque & fistulis medentur. Generosum denique ac strenuum remediū easdem esse ad dy,



A ad dysenterias, & reliquos uentris fluxus, si ex aqua aut uino bibantur, nemini non notum est. Quid multa? Elatines herbae, cuius certe haec duae stirpes genus esse uidentur, facultates habent. Quare toto caelo errant qui herbas has, ut supra etiam commemoratum est, cum Pimpinella confundunt, quod haec ipsa acris admodum sit & multum calida: illae contra sapore, haud secus atque Elatine, adstringente. Verum non tantum differunt facultatibus, imò etiam odore, coloreque foliorum, maxime uero florum diuersitate, ut quiuvis ex utriusque herbae picturae collatione statim deprehendet.

Pimpinella non solum facultatibus, uerum etiam forma à Sanguisorba diuersa.

## DE SCOLYMO CAP. CCCIII

## NOMINA.



SCOLYMOZ Graecis, Carduus & Strobilus Latinis, Columellae Cinara dicitur. Sunt qui hodie Arcocum corrupta uoce nominent, primam uocis syllabam articuli uice praepoentes. Alij paulò rectius Alcocalum uocant: Cocali siquidem nomine, nux pinea, cui Scolymi capitulum simile est, uenit. Nunc uulgo herbariorum ab articulo statim duabus interiectis literis Articocalus, aut expuncta uocali a, Articoclus, uel magis curtato, ut ferè sit, uocabulo, Articols uel Articoca nuncupatur. Germani instar uulgi Articoca nominant, aut Strobildorn. Strobilum autem Romani hanc stirpem non alia ratione dixerunt, quam quod eius capitulum, ut diximus, structili nucleorum serie pineam nucem referre uidetur. Cinaram uero sunt qui appellatam putent, quod satum & cultum cineribus gaudeat. Alij à Cinara potius puella, quae in eius speciei Carduum mutata est, dictam esse uolunt.

Carduus.  
Strobilus.  
Cinara.  
Alcocalus.  
Cocalus.  
  
Articocalus.  
Articoca.  
Strobilus cur dista.  
Cinara quare appellata.

## FORMA.

B Folia habet Chamæleontis, & spinæ albae uocatae similia, nigriora tamen ac crassiora. Caulem emittit oblongum, foliosum, in quo capitulum spinosum. Radicem uero rigrum & crassam. Haec Dioscorides. Caterum caput eius & uertex in squarosum extuberat globum, corticosis unguibus turgentem, spicisque squamatim coagmentatum, quorum orbis exterior uiret, interior niueo candore nitescit. Flos purpureo rutilat colore, qui tandem euanescit in pappos. Caput uetustate tandem dissilit in corticeas laminas, semen ostendens Cnici figura. Nos tamen integram Scolymi faciem ac picturam hoc tempore dare non potuimus, quod primo anno fructum suum non ostendat. Curabimus autem alio tempore ut studiosi integram eius habeant picturam.

## LOCVS.

Nusquam, quod sciam, in Germania prouenit Cinara, nisi sata & culta. Quare Scolymus qui in hortis colitur & plantatur, uerè Cinara existit. Quod ideo monendum esse duximus, quia inter Graecos esse constat, ut est Paulus & Aëtius, qui Scolymum à Cinara discriminant. Non est autem aliud inter eas stirpes discrimen, quam quod Scolymus ferus est & syluester, Cinara uero domita cultu, ideoque à nonnullis Carduus altilis nominatur.

Scolymus horten-  
sis proprie  
Cinara dicitur.  
  
Scolymus.  
Cinara.  
Carduus altilis.

## TEMPVS.

Quum Solstitium aestiuum agitur, Scolymi flos erumpit, Hesiodo in lib. ij. cui titulus Opera & dies, teste, qui ea florente cicadas acerrimi cantus esse, & mulieres libidinis audidissimas, uirosque in coitum pigerrimos, capite, genibus, ac toto corpore praesirij aestu arefcentibus, scribit.

## TEMPERAMENTVM.

Quae secundum qualitatem editur actio, calidum in secundo ordine completo, aut tertio incipiente, medicamentum indicat, siccum uero in secundo.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix Scolymi illita graueolentiam alarum, & totius corporis emendat. Item si decocta in





SCOLYMVS

Strobiliform.



A et in uino bibatur. Vrinā etiam copiosam fetidāq; pellit. Herba cum recens nascitur tenerescitue, aspatagorum modo in olera transit.

## EX GALENO.

Scolymi radix copiosam urinam graueolentē elicit, si quis eam in uino coctā bibat: adeoq; graueolentia sanat, tum alarum, tum totius corporis. Atq; hoc sanē medicamentū ex tota inest essentia, utpote eius succo existente purgatorio. Et in libro secundo de alimentorū facultatibus: Praui succi edulium est Cinara, praeipue cum iam durior euaserit: tum enim biliosi humoris copia abundat, totaq; eius substantia durior existit, adeoq; ut ex ipsa melancholicus, ex succo uero eius tenuis & biliosus humor producat. Proinde coctam edere praestiterit adiecto Coriandro, deinde ex oleo, garo, uinoq; sumatur. Si tamen in patina aut sartagine ad esum praeparatur, absq; ijs comedatur. Plerique enim siccius ueluti cacumina comedunt, quae spondylos nominant.

## EX PLINIO.

Vrinam ciere Scolymum praeipue traditur. Sanare lichenas & lepras ex aceto. Venerē stimulare in uino, Hesiodo & Alceo testibus, qui florente caccadas acerri mi cantus esse, & mulieres libidinis audissimas, uirosq; in coitū pigerrimos scripsere, uelut prouidentia natura hoc adiumento tunc ualenssimo. Item graueolentia alarū emendat radicis emedullae uncia, in uini falcem heminis tribus decocta ad terias, & à balneo ieiunio, itemq; post cibum cyathis singulis pota. Mirū est, quod Xenocrates promittit experimento, uinum id ex alis per urinam effluere.

## DE SPHATULA FOETIDA

## CAP. CCCV.

## NOMINA.



**H**ERBA quam officinae Sphatulam foetidam uocant, quod grauem exhalet odorē, quomodo ueteribus sit appellata nondum certū scire possum. Nomen quidem ipsum Xiphij seu Gladioli speciem esse docet: Sphata siquidem Latinis gladium significat. Non esse autem Xiphium radix eius euidenter admodū ostendit, quae non est bulbosa, nec gemina, ita ut altera alteri infideat, sed capillamentis fibrata. Neq; etiam Sparganiū esse partim folia eius quae in terram non procumbunt, partim quae semina, quae non in pilulis, sed folliculis aut siliquis profert. Non uidetur etiam esse Xyris, quod illa radicem habeat longam & rufam, Sphatula uero foetida nec longam nec rufam, sed rotundam, albam & capillatam. Tamen quicquid sit gentilem ijs esse foliorum similitudine constat. Germani eam Wandteuſtraut, a necandis cimicibus appellant.

## FORMA.

Folia Iridi similia habet, minora tamen & angustiora. Caulem ex se mittit, in cuius summo folliculos aut siliquas Paoniae foeminae non dissimiles profert, quibus dehiscenſibus semen in ijs apparet rotundum & rubrum. Radicem obtinet capillamentis multis fibratam.

## LOCVS.

Circa sepes & dumeta nascitur, frequens in Italia, nusquā tamen in Germania, quod sciam, nisi lata prouenit.

## TEMPVS.

Fructum seu siliquas suas autumnō profert, ac subinde in ijs, ubi dehiscunt, semen ostendit.

## TEMPERAMENTVM.

Vehementer acrem qualitatem obtinet, adeo ut gustata, fauces quasi urere uideatur. Proinde calidam & siccam admodum esse constat.

## XX

## VIRES.



794

SPHATVLA  
FOETIDA.  
Wandeleuskraut.






## VIREs.

Non multum à Staphidis agriæ uiribus abesse apparet: ualenter enim abster-  
git. Hinc ad scabiem, eius potissimū succus, abigendam utilis est. Surculos etiam &  
spicula, perinde atque Xiphium & Xyris, sine dolore extrahit. Cimices quoque ne-  
cat atque fugat.

## DE TRICHOMANE CAP. CCCVI.

## NOMINA.



**T**RICHOMANES græcè, Trichomanes, Capillaris latinè uocatur. Of-  
ficinis Polytrichon falso dicitur: id enim nominis Adianto herbe, *Polytrichon offi-  
cinarum.* quam hodie Capillum Veneris uocant, Dioscoride & ueteribus  
alijs testibus, debetur. Germanicè Widertode/oder Abthon ap-  
pellatur. Trichomanes autè à facultate sua Græci nominauerunt, *Trichomanes  
cur dictum.* quod scilicet fluentem capillum expleat, & subnasci faciat: *μακρόν  
capillaris.* enim ea gens rarum uocant, *μακρόν* autem capillum. Hoc etiam nomine Capilla-  
rem Latini dixerunt.

## FORMA.

Filici simile est Trichomanes, paruum admodum. Ex utraq; parte ordine quo-  
dam folia habet tenuia, Lentis figura, contraria inuicem, in ramulis tenuibus, splen-  
descitibus, subnigris & austeris. Cuius quidem descriptionis notæ omnes, nulla  
penitus reclamante, herbe illi quam hodie officinæ Polytrichon uocant, pulchrè  
quadrant. Siquidem cauliculis iuncis, quincuncialibus, à radice statim penè folia-  
tis constat, folijs rotundis, lenticulæ forma, aduersis inter se pediculis, ramulis sub-  
nigris & nitentibus, sine flore, sine semine.

## LOCVS.

Nascitur in palustribus atque umbrosis locis, humentibus muris, & iuxta fon-  
tes, haud secus atque Adiantum.

## TEMPVS.

Carpitur æstate & autumnii initio.

## TEMPERAMENTVM.

Trichomanes in caliditate quidem & frigidityte symmetrum est, uerum desic-  
cat, extenuat & digerit.

## VIREs. EX DIOSCORIDE.

Eadem potest quæ Adiantum. Cum itaque Adiantum aliunde in Germaniam  
sit deportandū, & Trichomanes passim proueniat, licebit hoc in alterius inopia uti.  
Et consultius multò ut Trichomane utantur officinæ, quàm Adianto adulterino.  
Prodest igitur Trichomanis decoctū potum asthmaticis, dyspnoicis, felle suffusis,  
lienosis, urinæq; difficultatibus. Calculos frangit. Aluum sistit. Venenatorū mor-  
bus, & stomachi fluxionibus in uino potum medetur. Menses & secundas ducit,  
sanguinis autem reiectiones sistit. Crudum illinitur uenenatorū moribus. Alope-  
cias explet, strumas dissipat. Furfures & achores cum lixiuio exterit. Cum ladano,  
myrtino, susino, aut hyssopo & uino capillos defluentes continet. Decoctū etiam  
eius cum lixiuio & uino si eo abstergantur, idem potest.

## EX GALENO.

Alopecias densat, & strumas & abscessus discutit, lapidesq; frangit potum. Vi-  
scoforum crassorumq; ex thorace pulmoneq; excreationibus non mediocriter con-  
fert. Ventris profluuiū sistit, nullam tamen manifestam caliditatē affert, sicut nec  
frigiditytem.

## EX PLINIO.

Calculos è corpore mirè pellit, frangitq; utique nigrum. Qua de causa potius  
quàm quod in saxis nasceretur, & à nostris Saxifragum appellatum crediderim.





TRICHOMANES

Widerode.



**A** Bibitur è uino quantum terni decerpere digiti. Vrinam cient. Serpentiũ & araneorum uenenis resistunt. In uino decocti aluum sistunt. Capitis dolores corona ex ijs sedat. Contra scolopendræ morsus illinuntur, crebrò auferendi ne pereant. Hoc & in alopecijs. Strumas discutiunt, furfuresq; in facie, & capitis manantia ulcera. Decoctum ex his prodest suspiriosis, & iecinori, & lieni, & felle suffusis, & hydropicis. Stranguriæ illinuntur, & renibus cum Absinthio. Secundas cient & menstrua. Sanguinem sistunt ex aceto, aut Rubi succo poti. Infantes quoque ulcerati perunguntur ex ijs cum rosaceo & uino prius. Folium in urina pueri impubis, tritum quidẽ cum aphronitro, & illitum uentri mulierum, ne rugosus fiat, præstare dicitur. Perdices & gallinaceos pugnaciores fieri putant, in cibum eorum additis, pecoriq; esse utilissimos.

## DE TELI CAP. CCCVII

## NOMINA.



**H**AIZ, *αἰζαῖς, αἰζόνη, βόκρος* Græcis, Fœnumgræcũ Latinis: officinæ genuinum nomen retinuerunt: Germanis *Bockshorn* / oder *Kühorn* dicitur. Magna græcarum appellationũ pars à siliquarum quas producit figura desumpta est: hæ enim corniculis similes existunt. Hinc Cera-  
tis à cornu simpliciter dici cœpit: *αἰζαῖς* enim Græcis cornu est. Agoceros autem à caprini cornu similitudine, quemadmodum à bubuli Buceros, quod sanè nomen Theophrastus libro quarto de historia plantarum illi imposuit. Cum itaque corniculis similes habeat siliquas, factum est ut illam Columella simpliciter Siliquã nominauerit, Plinius Siliciam, Varro Siliculam.

*Cera-  
tis cur  
dicitur.  
Agoceros:  
Buceros.*

**B**

## FORMA.

Cauliculis emicat exilibus, rubicundis, folio penè Trifolij, flore candido & exiguo, semine in siliquis oblongis, ac cornu instar incuruis fuluo. Radice subrotunda & oblonga innititur.

## LOCVS.

Satum Fœnogræcum passim ferè prouenit.

## TEMPVS.

Iunio & Iulio mensibus floret, & unâ siliquas producit. Semen tamen in Augusto maturum legitur.

## TEMPERAMENTVM.

Fœnumgræcum calidum est secundi ordinis, desiccatur primo.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Molliendi & dissoluiendi facultatem habet Fœnogræci farina. Facit ad inflammationes quæ intus forisq; sunt si cum aqua mulsâ decocta trita illinatur. Lienem cum nitro & aceto subacta & illita minuit. Decoctũ eius in sessu ad muliebria mala, quæcunque per inflammationes aut præclusiones consistunt, utile est. Expressus Fœnogræci in aqua decocti succus, capillos, furfures & achores exterit. Cum anserino adipe pessi uice apponitur, loca quæ iuxta uterum sunt emolliens & relaxans. Viride cum aceto imbecillis & exulceratis locis prodest. Decoctũ eius aduersus tenebricosos, & grauiter olentia dysentericorũ excrementa confert. Oleum eius cum myrtino capillos & in genitalibus cicatrices abstergit.

## EX GALENO.

Fœnumgræcũ feruentes inflammationes irritat. Quæ uerò minus sunt calidæ, & magis duræ, eas digerendo curat.

## EX AETIO.

Fœnumgræcũ habet etiam abstergendi uires. Varijs modis comeditur, sed copiosius sumptum caput tentat. At cremor decocti Fœnogræci cum modico melle





FOENOGRAECVM

Bockshorn.



A exhibitus, omnes deprauatos intestinorū humores educit. Permodicū esse oportet quod permiscetur mel, ne erodat. In diuturnis uerò doloribus qui sine febris thoracem infestant, pingues simul palmulæ elixantur, inde succo expresso melleq̃ admixto suppositis carbonibus rursus decoquuntur usq̃ ad congruam consistentiam. Datur id diu ante cibum, obseruariq̃ oportet ne ijs exhibeatur quibus facile caput dolet; palmulæ enim capiti infestæ sunt.

## EX PLINIO.

Vis eius siccare, mollire, dissoluere. Succus decocti sceminarum pluribus malis subuenit: siue duritia, siue tumor, siue contractio sit uulū, fouentur, insidunt. Infusum quoq̃ prodest. Furfures in facie extenuat. Spleni addito nitro decoctum & impositum medetur. Item ex aceto. Sic iecinori decoctū. Diodes difficile patientibus semen eius dedit acetabuli mensura tritum in notem cyathis sapæ ad tertias partes bibere, ut qui biberent in calida lauarentur. Et in balneo sedantibus dimidiū ex relicto iterum dedit, mox à balneo reliquum, pro summo auxilio. Farinā Fcenogræci cum hordeo aut lini semine decoctam aqua multa cōtra uulū cruciatus subiecit. Itemq̃ imposuit imo uentri. Lepras, lentigines, sulphuris pari portione mista farina curauit, nitro antè preparata cute, sæpius die illinens, perungiq̃ præcipiēs. Theodorus Fcenogræco miscuit quartā partem purgati Nasturtij acerrimo aceto ad lepras. Damion Fcenogræci semen acetabuli dimidia mensura cum sapæ & aquæ notem cyathis ad menses ciendos dedit potu. Nec dubitat quin decoctū eius utilissimum sit uuluis, interaneisq̃ exulceratis, sicuti semen articulis atq̃ præcordijs. Si uerò cum Malua decoquatur, postea addito mulso potus, ante cætera uuluis interaneisq̃ laudatur: quippe cum uapor quoque decocti plurimū proffit. Alarum etiam graueolentiā decoctum Fcenogræci semen emendat. Farina porrignes capitis furfuresq̃ cum uino & nitro celeriter tollit. In hydromelite autem decocta addita axungia genitalibus medetur. Item parotidi, podagræ, chiragræ articulis, carnibusq̃ que recedūt ab ossibus. Aceto uerò subacta luxatis. Illinitur & lieni decocta in aceto, & melle tantum. Carcinomata subacta ex uino purgat, mox addito melle per sanat. Sumitur & sorbitio ē farina ad pectus exulceratū, longamq̃ tussim. Diu decoquitur donec amaritudo desinat, postea mel additur.

## DE TELEPHIO CAP. CCCVIII.

## NOMINA.



ΗΛΕΦΙΟΝ, ἢ ἀνίσχυρος Græcis, Telephiū & Illecebra Latinis, officinis & uulgo Crassula maior appellatur. Sunt qui Fabam crassam, à foliorū quam cum faba habent similitudine, nominēt. Germanis Wundttraut / Knabenttraut / Sogzwang / Sogwein dicitur. Telephiū uerò dictum est, quod ulceribus malignis & deploratis, quibus Telephus Mysiæ rex ab Achille uulneratus consenuit, quæ eam etiam ob rem Telephia uocantur, auxilietur.

Crassula maior.

Faba crassa.

Telephium unde dictum.

Telephia ulcera.

## GENERA.

Dioscorides duo genera facit. Vnum floribus albis, quod nobis Telephiū album nominare placuit, germanicè Wundttraut das weible. Alterum floribus luteis, quod Norimbergæ me uidisse memini. Damus pro illo Telephiū purpurascens, quod ad differentiā prioris Telephiū purpurascens appellare uoluimus, germanicè Wundttraut das mennle. Præter flores qui in primo candidi sunt, in hoc autem purpurascens, foliorum etiam colore differunt, qui in candido uiridis & herbaceus existit, in purpurascens autem paulò pallidior. Cætera omnia in ijs similia apparent, folia potissimū, quæ fabacea prorsus sunt, nisi quod pinguiora, & crassiora existunt,

Telephium album.

Telephium purpurascens.





TELEPHIUM  
ALBUM

Wundkraut weible.





TELEPHIUM  
PURPURASCENS.

Wundkraut mennle.



C

## FORMA.

Folijs & caule Portulacæ similis herba Telephium. Alas binas in singulis foliorum geniculis inhærentes habet. Ramuli à radice senî septeniue prodeunt, referti folijs cœruleis, crassis, glutinosis, carnosis; flores illi lutei, uel albi, uel purpurascens: radix ima, quod Dioscorides omisit, innumeris tuberibus scatet. Non est autē cur diuersum Telephiū hoc nomine ab ea herba, quam herbarij hodie Crassulam maiorem nominant, suspicemur, cum omnes reliquæ notæ à Dioscoride cōmemoratae, illi adamussim conueniant. Et solenne certē est Dioscoridi ut multas notas, in his potissimū herbis quæ ipse non uidit, atque adeo ex aliorū fide pingit, easq̃ maximè quidem necessarias omittat, & silentio transeat. Quibus etiā accedit locus natalis, & facultates Telephij, quæ eadem sunt cum ijs quæ Crassulæ maiori recentes herbarij adscribunt. Sunt qui alterum acetabulū esse putent, quorum sanè sententiam non admodum absurdam esse iudico.

## LOCVS.

Nascitur inter uites, locis cultis & incultis humidis.

## TEMPVS.

Vere statim profilit, Iulio autem & Augusto mensibus floret.

## TEMPERAMENTVM.

Telephiū exiccat ordine secundo intenso, aut certē principio tertij, nō tamen insigniter calida, uerum in hoc forsan quispiam ipsum primi esse ordinis censeat.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Folia senis horis illita, albas uutiligines sanant; sed oportet postea hordeacea farina illinere locum. Quinetiā alphos tollunt cum aceto in sole inuncta. Sed ubi inaruerint, absterguntur.

D

## EX GALENO.

Telephiū detergendi & exiccandi facultate est præditū: proinde ad putrida ulcera conuenit, & leucas & alphos cum aceto sanat.

## EX PLINIO.

Illinitur lentigini, & cum inaruit teritur. Illinitur & uutiligini, ternis ferè mensibus senis horis noctis aut diei, postea farina hordeacea illinitur. Medetur & uulneribus & fistulis.

## APPENDIX.

Recentiores herbarij sua Crassula maiori in curandis uulneribus, & sistendo sanguinis profluuiū utuntur, ut eandem esse cum Telephio uel hoc saltem nomine nemo dubitare debeat. Magnam autem efficaciam habere in internis potissimū uulneribus & ulceribus, mirificeq̃ herniosis prodesse iisdem tradunt.

## DE TRINITATIS HERBA

## CAP. CCCIX.

## NOMINA.



Iouis flos.  
Herba Trinitatis  
unde dicta.  
lacea.

VO nomine priuatim planta hæc Græcis aut Latinis appellata sit medicis, ignorare me fateor. Constat tamen Violæ inodora genus esse, & mea quidem sententia Iouis florem. Vulgus à triplici colore floris, herbam Trinitatis nominat. Sunt qui laceam, & herbam clauellatā appellant. Germani Dreyfelsigkleyt blümen / & Freyschamkr aut uocant.

## FORMA.

Herba hæc folio est initio rotundo, per ambitum serrato, processu temporis oblongiore, cauliculo triangulo, intus cauo, leuiter striato, ex interuallis geniculato, prodeuntibus ex alarum sinu pediculis longis, in quibus summatim elucent flores

figura





HERBA TRI  
NITATIS,

Freyschamkraut.



**C** figura & specie uiolarum purpurearū, superiore parte purpurei, in medio candidi, inferiori uerò lutei, radijs quibusdam nigris distincti. Quibus decidentibus semina protuberant.

## LOCVS.

Sua sponte in aruis interdum prouenit, in hortis tamen ut plurimum plantatur, speciosiorq̃ nascitur.

## TEMPVS.

Vere uiola hæc post purpuream emicat, & tota æstate floret.

## TEMPERAMENTVM.

Herba in gustu lentorem quandam, & que modicam acrimoniam seu mordacitatem præ se fert, atque adeo a Symphyti temperamento non admodū abesse uidetur, id quod etiam ex facultatibus quas illi recentiores tribuunt facile deprehenditur. Calida itaque & sicca est.

## VIRE S.

Quum acrimonię ratione incidendi uim quampiā habeat, ideo recte recentiores asthmaticis, pulmonisq̃ phlegmonibus prodesse tradunt: collectū siquidem in thorace & pulmone pus expurgare potest. Hac ratione puerorum etiam comitialibus morbis auxilio esse solet. Ceterū non parum ad pruritū & scabiem confert, omniaq̃ cutis uicia emendat, idq̃ mediocris acrimonię & siccitatis ratione. Ulcera etiā, quia uiscositatē obtinet, glutinare potest.

## DE TEVTLO CAP. CCCX.

## NOMINA.

**D** *Βούτλον unde dictum.*  
*Beta q̃ dicta.*



**E**ΥΤΛΟΝ, *βούτλον* Græcis, Beta Latinis appellatur. Germanis *Wangolt/ oder Pieffen*. *Βούτλον* autem Græci ab impulsu nominarunt, etenim cultus ratione quadam incrementū capessit arboris, neque ulli hortensium latitudo foliorū maior. Betæ nomen sibi adsciuit, quoniam figuram *β* literæ græcę dum semine turgent referre uidetur. Nam summitatem in cacumine reflexam obtinet. Id quod testatū nobis reliquit Lucius Columella in suo carmine de cultu hortorum ita canens:

*Nomine tum graio, ceu litera proxima primæ,  
Pangitur in cera docti mucrone magistri,  
Sic et humo pingui ferratæ cuspidis iclu  
Deprimitur folio uiridis pede candida Beta.*

## GENERA.

*Candida Beta.* Eius à colore omnes duo genera faciunt, candidam & nigram. Candida alio nomine Sicala, ut Theophrastus libro octauo de historia plantarum, & Plinius libro decimo nono, capite octauo, memorię prodiderunt, appellatur. Et nunc extrita *Sicala*. tera una ferè omnibus nostri seculi medicis Sida nominatur. Germanicè *weisser*  
*Nigra Beta.* *Wangolt*. Nigra ad atrum uidetur tendere colorem, & à Germanis *roter Wangolt* uocatur.

## FORMA.

Caulem habet striatū, bicubitalem, folium ferè Atriplicis, flores exiguos luteos, semē in caulibus copiosum: radicē unicam in longum protensam, è cuius lateribus alia, modò singulæ, modò binæ, nonnunquā ternæ fundunt, fibris multis refertæ.

## LOCVS.

In hortis passim, & cultis locis nascuntur Betæ.

## TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus floribus & semine turgent.

## TEMPERA-



BETA CAN  
DIDA.

Weisser Mangolt.







BETA.  
NIGRA.  
Koter Mangolt.



## TEMPERAMENTVM.

**A** Nitrosa qualitate particeps est. Nigra tamen adstrictionis quippiam adiunctū habet, & magis in radice quā in alijs partibus. Symeon Selhi calidam & siccam esse in tertio ordine asserit.

## VIREs. EX DIOSCORIDE.

Nigra Beta cum lente cocta aluum efficacius cohibet, multoq; magis radix. Candida aluo utilis est. Vtraq; uerò propter nitrosam uim quam habet mali succi est. Vnde succus earum cum melle naribus inditus caput purgat. Auriū etiam doloribus auxiliatur. Decoctū radicum & foliorum, furfures & lendes deterget. Perniones fotu mitigat. Crudis folijs alphos nitro prius perfrictos, alopecias prurientes, atq; depascentia ulcera illini prodest. Cocta exanthematis, erysipelatis, & ambustis medetur.

## EX GALENO.

Beta nitrosæ facultatis est particeps, qua tum extergit, tum digerit, & per nares purgat. Caterum cocta nitrositate omnem exuit, sitq; facultatis phlegmonis aduersæ, leuiter discutientis. Porro ad detergendū digerendumq; ualidior est Beta alba. Nam nigra adiunctū habet quippiam adstrictionis, & magis in radice quā alijs partibus. Beta itaq; absterforius inesse succus conspicitur, adeo ut aluum ad excretionem extimulet, & nonnunquā stomachū demordeat, præsertim ijs quibus ille sensilior obtingit: eoq; largius commansa, stomachum infestat. Huius ceu aliorum oleorum, exigua est alimonia. Iecoris obstructionibus, quā Matua, aptius accommodatur, magis autem ubi cum Sinapi estur, aut aceto, Lienosos item similiter manducata, mirificè iuuat.

## EX PLINIO.

**B** Nec Beta sine remedio est utraq;. Siue candida, siue nigra radix recens & madesacta, suspensa funiculo, contra serpentium morsus efficax esse dicitur. Candida Beta cocta, & cum Allio crudo sumpta, contra tineas. Nigra radices ita in aqua coctæ, pruriginē tollunt, atq; in totum efficacior esse traditur nigra. Succus eius capitis dolores ueteres & uerrugines, item sonitum aurium sedat, infusus ijs. Ciet urinā. Medetur dysentericis iniecta, & morbo regio. Dolores quoque dentium sedat illitus succus. Et contra serpentium ictus ualet, sed huius radici duntaxat expressus. Ipsa uerò decocta, pernionibus occurrit. Albæ succus epiphoras sedat, fronte illita. Aluminis pauco admixto, ignem sacrum. Sine oleo trita licet, adustis medetur. Et contra eruptiones papularum cocta. Eadem contra ulcera quæ serpunt. Illinitur & alopecijs cruda. Et ulceribus quæ in capite manant. Succus eius cum melle naribus inditus, caput purgat. Coquitur & cum lenticula addito aceto, ut uentrem molliat. Validius cocta, fluctuationes stomachi sistit & uentris.

## EX SYMEONE SETHI.

Eius succus mediocriter abstergit. Hic etiam uentrem ad effluxū proritat, & stomachum aliquando uellicat, eorum præsertim qui hunc ualde sensilem obtinent. Quapropter edulium est stomacho infestum, si plurimū comedatur. Exiguum est eius alimentū, sicut ceterorū olerum. Vtilis uerò est ad iecoris obstructiones cum aceto comesta. Pari modo si edatur, & lienis obstructionib. bonum fit medicamentum. Constat autem Beta ex contrarijs facultatibus. Succus enim eius calidus est, uentrem constringit, & sitim affert. Eius uerò corpus crassarum partium, flatuosum, concoctu difficile & frigidum, uentremq; sistit, maximè si aqua in qua coctum est, subinde abijciatur.



808



TINCTORIVS FLOS

Silbblüm.



# DE TINCTORIO FLORE

CAP. CCCXI.

## NOMINA.



N herba hæc ueteribus cognita fuerit nondum compertū habemus: quapropter ad germanicam alludentes appellationē, Tinctoriū florem interim dum certius nomen naſti fuerimus, nominabimus. Germani Gilb oder Streich oder Serbblumen / quod florū illius in tingendis libris & alijs quibusdam uſus ſit, nuncupant. Sunt qui Aſterpſimmen uocant.

## FORMA.

Geniſtæ non admodū diſſimilis eſt hæc herba: ramos enim herbaceos, ut illa habet, ac ſcabros, folia tamen paulò longiora & latiora, ad Hyſſopi ferè formam accedentia, florem luteum, Piſo ſimilem, ſemen in ſiliquis Lenticulæ haud abſimile, radicem planè ligneam.

## LOCVS.

Prouenit locis altis, incultis & aridis, atque pratis nonnullis.

## TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio menſibus, atque deinceps ſemina profert.

## TEMPERAMENTVM.

Amara eſt, haud aliter quàm Geniſta, ut calefacere illam & ſiccare in altero ordine ſit euidentiffimum.

## VIREs.

Vt forma & temperamento Geniſtæ ſimilis eſt, ſic etiam facultatibus haud dubiè eidem reſpondet. Haſ igitur ſuo loco reperies.

# DE TORDYLO CAP. CCCXII.

## NOMINA.



ΟΡΔΥΛΟΝ, ἢ πορδύλιον, ἢ ὀρδύλιον Græcis: Tordylon & Tordylion, & Sefeli Creticū Latinis, Paulus Gordylion appellat. Germanis Beerwurz dicitur, ut ſuprà in capite de Dauco quoque diximus. Nam cum Dauci ſemen hirsutum ſit, utcuq; cætera reſpondeant, hoc uerò minime, non eſt cur Daucum eſſe credamus.

Sefeli Creticum.

## FORMA.

Fruticoſa eſt herbula, ſemen habens rotundū, geminatum, clypeo ſimile, ſubacre & odoratum. Quæ ſanè omnes notæ huic herbæ, quæ à Germanis Beerwurz dicitur, reſpondent, ut eius pictura, quam in capite de Dauco reperies, abundè docet. Hanc autem propter radicum ſimilitudinē inter Daucorum effigies habere locum uoluimus.

## LOCVS.

Nāſcitur in Amano Ciliciæ monte. In multis etiam Germaniæ noſtræ locis copioſiſſimè prouenit.

## TEMPVS.

Iulio menſe floret, ac ſubinde ſemen profert.

## TEMPERAMENTVM.

Calfacit & exiccat, ut ex facultatibus eius abundè colligere licet.

## VIREs. EX DIOSCORIDE.

Potum eius ſemen contra urinae difficultatē, & ducendis menſibus prodeſt. Sucus uerò caulis ſeminisq; adhuc uiuentis trium obolorum pondere hauſtus decem diebus in paſſo, nephriticos ſanat. Efficax etiam radix: cum melle ſiquidem linctā, quæ in thorace ſunt educit.



## EX PAVLO.

C

Gordylon alij Sefeli appellant, urinæ & mensibus ducendis habile. Radix ipsius ex melle linctâ, quæ in thorace hærent, educit.

## EX PLINIO.

Combusta potu ciēt menses, & pectoris excreationes, efficaciore etiamnum radice. Succus eius ternis obolis haustus renes sanat. Additur radix eius & in magmata.

## DE TITHYMALIS CAP. CCCXIII.

## NOMINA.



Lactaria herba  
eius nominata.

Lactuca caprina  
quare uocata.

ΙΟΥΜΑΛΟΣ, ἡ πθυμάλος Græcis, Lactaria herba, & Lactuca caprina aut marina Latinis, barbaris & officinis Esula, Germanis Wolffmilch dicitur. Lactariâ autem herbam cōmuni appellatione, ob cōmune omnibus lac, uniuersum hoc genus uocauerunt. Lactucam uerò ob eandem causam, quia scilicet ex hac herba haud secus atq; ex Lactuca secta lac fluit. Caprinam, quod capræ Tithymalis uescantur.

## GENERA.

Septem sunt, Dioscoride & alijs ueteribus testibus, Tithymalorum genera. Primus Characias, id est, uallaris dicitur, quod uallis septisq; muniendis idoneus sit. Secundus Myrsinites, à Myrti foliorū figura: aut à nucibus, quibus similē fert fructum, Caryites nominatur. Hunc fructum sunt qui Nucem uomicam, Germanis Kronāglin uocatam, esse putent. Tertius Paralium, id est, marinus, quod in maritimis nascatur, appellatur. Quartus Helioscopius, hoc est, solisequus, quia eius coma ad solis cursum circumagitur, nominat: germanicē Sonnenwendede Wolffmilch uocari potest. Alijs nominatur groſſ Wolffmilch. Quintus Cyparissias à Cupressi similitudine nuncupatur. Germanicē cyp:essene Wolffmilch nominari potest. Sextus Dendroedes, à ramorū copia dicitur. Septimus Platyphyllos, id est, latifolius, à latitudine foliorū nominatur. Germanicē breytblettere Wolffmilch/ alij groſſ Teuffelſmilch uocant. Nos ex ijs generibus tria tantum depicta damus, quod reliqua uidere nondum nobis licuerit. Proferent fortē alij longē plura.

## FORMA.

Nos ea tantum genera quorum picturas exhibemus, omisis alijs, describemus. Helioscopius itaque Portulacæ similia folia obtinet, tenuiora tamen atque rotundiora. Ramos autem à radice prodeuntes quatuor aut quinque mittit, dodrantales, tenues & rubentes, copioso lactis liquore plenos. Caput huic est Anetho simile, & semen ueluti in capitulis inclusum. Circumagiť huius coma cum sole, unde & Helioscopij nomen accepit. Cyparissias caulem emittit dodrantalem, aut maiorem, subrubrum, ex quo germinant folia pini similitudine, teneriora tamen ac tenuiora. Et in uniuerſum pino nuper natæ similis est, unde & nomen traxit. Abundat hæc etiam succo candido. Platyphyllos Verbasco similis est, longioraq; reliquis folia habet.

## LOCVS.

Helioscopius in ruderibus potissimum, & circa oppida nascitur. Cyparissias in campestribus frequentissimus occurrit. Platyphyllos uerò in syluis.

## TEMPVS.

Semē Tithymalorū autumnō legitur, succus uerò incipiente pomorū lanugine.

## TEMPERAMENTVM.

Vincentem habent acrem calidamq; facultatē, inest uerò & amaritas. Ex quarto itaque calefacientium sunt ordine, & ualenter desiccant.

## VIRES.



**TITHYMALVS**  
**HELIOSCOPIVS,**

Sonnenwendede Wolffamilch.







TITHYMALVS  
CYPARISSIAS.

Cypressene Wolffsmilch.



**TITHYMALVS**  
**PLATYPHYLLOS.**

*Breychleterrte Wolffmilch;*





## VIREB. EX DIOSCORIDE.

**C** Vim habet Characiæ liquor lacteus aluum per inferna purgandi, pituitā & bilem ducens, duorum obolorū pondere ex posca sumptus. Cum melicrato autem uomitum cit. Appetente uindemia lacteus colligitur liquor. Depilat liquor hic recens ex oleo in sole inunctus, renascentesq̃ flauos & exiles efficit, tandemq̃ omnes destruit. Cauernis dentium inditur, leuatq̃ dolores. In cera dentes oblinendi, ne effluens fauces aut linguam tuitet. Idem inunctus myrmecias, acrochordonas, thymos & impetigines tollit. Valet etiam aduersus pterygia, carbunculos, phagedænas, gangrænas, fistulasq̃. Semen & folia eadem lacteo succo præstant, dimidij acetabuli pondere pota. Radix drachmæ pondere cum hydromelite insparfa & pota, per inferna purgat. Decocta cum aceto, colluto ore, dentiū dolori auxiliatur. Helioscopius eandem priori uim habet, non tamen usque adeo intentā. Nec diuersam facultatem obtinent Cyparissias & Platyphyllos.

## EX GALENO.

Validissimus Tithymalorū liquor est. Secundū locum tenet semen & folia. Sed & radix earundem facultatum particeps est, sed non ex æquo. Sanè ipsa cum aceto decocta dolores dentiū sanat, maximè qui illis erosio proueniūt. At liquores ut qui ualentiorē uim habeant, in foramina quidem ipsa dentium induntur. Cæterum si aliam corporis partem contigerint, continuo adurunt, ulcerantq̃: quapropter foris illis cera circumlinitur. Sic pilos quoque succus inunctus tollit. Porro quum uehementior sit, oleo miscetur & si id sæpe fiat, tandem prorsus radices pilorum adustæ corrumpent, corpusq̃ depile reddetur. Eadem facultate myrmecias, acrochordonas, pterygia & thymos auferunt, detergentq̃ lichenas & ploras, quia scilicet abstergendi illis facultas inest, propter amaritudinē. Præterea ulcerum phagedænica, anthracode & gangrænode, quia ualenter calesciunt & abstergunt, si in tempore & moderatè quis utatur, iuuare poterunt. Verumenimvero & fistularū callos, eadem facultate adimunt. Porro hæc omnia genere quidem similiter, imbecillius tamen & folia & fructus præstare possunt. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnali capiendos uti assolent. Celerrimè namque ab illis in uertiginem acti, ac semimortui reddit, ad aquæ superficiem feruntur. Cæterum quum septem sint eorum genera, ualentissimus est quem Characiam nominant, & Myrsinites, & qui in petris nascitur ad modum arboris: deinceps qui Verbasco adsimilis est, & Cyparissias: post Paralys, denique Helioscopius. Proportionē uerò comprehensæ illorum facultatis & cinis & lixiuium erit.

## EX PLINIO.

Tradunt toties purgari hydropicos fico sumpta, quot guttas lactis Characiæ exceperit. Est & semen in usu cum melle decoctum ad catapotia soluendæ alui gratia. Semen & dentium cauis cera includitur. Colluuntur & dentes succo radici decoctæ in uino aut oleo. Illinunt & lichenas succo, bibuntq̃ eum ut purgent uomitiones, & aluo soluta, aliàs stomacho inutilem. Trahit pituitā sale adiecto in potu, bilem aphronitro. Si per aluū purgari libeat, in posca: si uomitione, in passo aut aqua mulsa. Media potio tribus obolis constat. Ficos à cibo sumpsisse melius est. Fauces urit leniter. Est enim tam feruentis naturæ, ut per se extrà corpori impositū, pustulas igniū modo faciat, & pro caustico in usu sit. Helioscopius trahit bilem per inferna in oxymelite dimidio acetabulo. Cæteri usus qui Characiæ. Cyparissias eadem uis quæ Helioscopio aut Characiæ. Platyphyllos pisces necat, aluum soluit, radice uel folijs, uel succo in mulso, aut aqua mulsa drachmis quatuor. Detrahit priuatim aquas.





TRIFOLIUM  
ODORATUM.

Sibengezeit.



## NOMINA.

Trifolium odora-  
tum cur dictum.



**T**ΡΙΦΥΛΛΟΝ Græcis, Trifolium odoratū Latinis, officinis simpliciter Trifoliū dicitur. Germanis Sibengezeit / propterea quod singulis diebus septies odorē suum habeat, & toties etiam amittat, quandiu in horto creuerit. Decerptum enim & exiccatum, odorem suum perpetuò retinet. Qui certè pluuiosa temporis constitutione ac tempestate instante multò uehementior est, sic sanè ut totas ædes, in quibus hæc herba reposita est, odore suo compleat. Potest etiam appellari cōmodissimè wolricchender Klee.

## FORMA.

Frutex est cubito altior, uirgas habens tenues, nigris, iunceisq; adnascētijs multis præditas, in quibus folia Loto arbori similia sunt, terna in singulis germinationibus. His recens enatis odor Rutę inest, auctis uerò iam, bituminis. Florem emittit purpureum, semen modicè latum & subhirsutū, ex altero extremo apicem obtinens. Radix illi tenuis, longa, ualida. Ex qua quidem deliniatione satis constat herbam, cuius picturam damus, esse Trifolium odoratum: siquidem cubito altior est, caules tenues obtinens, unde ramusculi multi nigricantes quodammodo, ac iuncea oriuntur, qui singuli terna folia producant odorata. Flores etiam habet in purpureo cœruleos. Semen quoq; Milio haud dissimile in folliculis modicè latis, pilosis, & in summitate aculeum habentibus, profert. Radicem deniq; longam, candidam ac ualidam habet, ut prorsus nihil sit quod descriptioni non respondeat.

## LOCVS.

Sponte sua in Germania non prouenit. Satum uerò nulla difficultate prodit.

## TEMPVS.

**D** Iulio mense floret, ac subinde semen producit.

## TEMPERAMENTVM.

Calidum est & siccum in tertio ordine.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Semen & folia in aqua pota lateris dolore laborantibus, difficultati urinæ, comitialibus, incipienti aquæ inter cutem, uuluaq; strangulationibus auxiliantur. Menses etiam ducunt. Oportet autem seminis tres, foliorū uerò quatuor drachmas dare. Succurrunt & uenenatorū moribus folia trita cum oxymelite & pota. Referūt quidam, si totius fruticis, radicis & foliorū decocto foueantur facti ex serpentū moribus dolores, eos mitigari. Si uerò alius ulcus habens eodem illo decocto quo quispiam sanatus fuerit foueatur, eadem sentit quæ morfi à serpentibus. Dant quidam etiā in tertianis bibenda folia eius tria, aut totidē semina cum uino, in quartanis autē quatuor, ueluti quæ circuitus soluere possunt. Misceūt uerò eius radix & antidotis.

## EX GALENO.

Triphyllum potum laterum dolores ab obstructione natos iuuat, urinā & menses prouocat.

## EX PLINIO.

Trifolium scio credi præualere contra serpentū ictus & scorpionū, ex uino aut posca, seminis granis uiginti potis, uel folijs, & tota herba decocta, serpentesq; nunquam in Trifolio aspici. Præterea celebratis autoribus cōtra omnia uenena pro antidoto sufficere uiginti quinque grana eius.

## APPENDIX.

Debet eius Trifolij odorati usus esse subinde in omnibus officinis, quod mirificè uenenis aduersetur, & ad ulcera malefica sananda perquam utile sit.





TRIFOLIUM PRATENSE  
PURPUREUM.

Brann Wyntlee.





TRIFOLIUM PRATEN  
SE ALBUM.

Weiß Wickenklee.





TRIFOLIUM PRAE-  
TENSE LUTEUM.

Geeler Wyntklee.



## DE TRIFOLIO PRATENSIS

CAP. CCCXV.

## NOMINA.



ΤΡΙΦΥΛΛΟΝ ὃν χερσὶν ὁπείσας ῥονόμειον Græcis, Trifolium pratense Latinis dicitur. Officinæ latinum nomen retinuerunt, & simpliciter Trifolium uocant. Utendum uerò illis esset odorato Trifolio, quemadmodum altero abhinc capite diximus. Germanis Wyseñlee nominatur.

## GENERA.

Tria genera pratensis Trifolij.

Purpureum.

Candidum.

Luteum.

Tria apud nos passim in pratis prouenientia Trifolij inueniuntur fastigia, quorum primum à floribus purpureis, Trifoliū pratense purpureū, germanicè braun Wyseñlee / alterum itidem à floribus suis candidis, Trifoliū pratense candidum, germanicè weiß Wyseñlee / & tertium luteum, germanicè geel Wyseñlee appellauimus. Quod ad folia ipsa attinet, non admodum differunt: quoduis enim horum generum tribus constat folijs, quæ in primo sunt latiora & herbacea, in secundo autem longiora & angustiora, magisque pallescentia candicantiæue. In tertio sunt minora & rotunda, atque ad Fœnigræci folia accedentia. Sunt qui hoc genus Lagopum esse putent. Sed de Lagopo suo diximus loco.

## FORMA.

Caulem rotundū, cubitalem obtinent, ramos exiles, folia per interualla tria: flores in summo aut purpureos, aut candidos, aut luteos: radicē longam & lignosam.

## LOCVS.

Scatent ijs prata omnia, unde etiam nomen nata.

## TEMPVS.

D Florent Maio & Iunio mensibus.

## TEMPERAMENTVM.

Adstrictorię cuiusdam qualitatis sensum in gustu præ se ferunt, non tamen multum admodum, ut nihilominus sint tenuium partium & exiccatoria, quandoquidem etiam exigua quasi acrimonia prædita uideantur.

## VIRES.

Haud dubiè mediocriter concoquendi & exiccandi uim possident, ut non temerè quidam ex recentioribus herbarijs tradant, Trifolia hæc albo muliebri profluvio mirificè conferre. Eadem etiam inflammationibus imposita, eas cōcoquunt, & ad maturationem perducunt.

## DE TRAGOPOGONE CAP. CCCXVI.

## NOMINA.

Hirci barba.



Tragopogon cetera.

ΠΑΓΟΠΟΓΩΝ, ἢ ῥομή Græcis nominatur, Latinis Hirci barba, & Coma: officinis ignota est herba. Germanis Boctsbart & Gauchb: or dicitur. Hieronymus herbarius Braunschuuigenensis magno errore hypocisthida in hac herba nasci putauit. Sic autē eam Græci uocarunt, quod à calyce eius promissæ pendeant barbæ, uel rectius quod lutei illius flores in uolucres barbulas euanescent.

## FORMA.

Caulem habet exiguum, longum tamen, & bicubitalem interdum, geniculatū, folia Croco similia, radicem longam & dulcem, supra caulem calycem magnum, & in eius summo semen nigrū, florem luteum, qui in canescentes barbulas fatiscit. Hæc etiam cum carpitur lacte manat.

## LOCVS.

Sua sponte in pratis nascitur.

## TEMPVS.





821

TRAGOPOGON

Bocksbart.

22 3



C

TEMPVS.

Maio &amp; Iunio mensibus floret.

TEMPERAMENTVM.

Dulcedo quæ in radice ac tota ferè planta apparet, satis monstrat eam esse caliditate tepida præditam, & modicè humidam.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Herba &amp; cruda &amp; cocta edendo est.

APPENDIX.

Ex recentiorum traditione, & temperamenti ratione, æstuanti stomacho uillis est herba, thoracis & iecoris uirij, renum item & uesicæ malis. Succus eiusdem mirificè laterum doloribus auxiliatur.

## DE TYPHA CAP. CCCXVII

NOMINA.



Y o h Græcis, Typha Latinis, officinis inusitata. Germanis Mos/ oder Narrentolb dicitur. Anonnullis Knospen vnd Liesen.

FORMA.

Foliū profert Cyperidi simile, caulem læuem, enodem, cuius in summo capite flos obducitur densus, euadens in pappum seu lanuginem. Quæ descriptio huic plantæ sic quadrat, ut nulla sit nota quæ reclamet. Folio siquidem Cyperidis erumpit, caule alto, læui, plano, enodi, cuius cacumen densa florum congerie stipatur, & ueluti spissa cingitur lanugine, quæ in pappos tandem euanescit.

LOCVS.

D Gignitur in palustribus &amp; stagnantibus aquis.

TEMPVS.

Iulio mense caulis lanosa floccorū densitate obducitur. Augusto autem in pappos abit, & euanescit.

TEMPERAMENTVM.

Quantum ex uiribus eiusdem colligi potest, non euidenter, potissimū eius flos, calefacit & refrigerat, modicèq; abstergit, atque adeo exiccat. Quum enim ambustis medeatur, & ambusta, Paulo libro quarto, capite undecimo teste, medicamenta quæ mediocriter citra insignem caliditatem aut frigiditatem abstergunt, requirant, sequitur hoc quale diximus temperamentum obtinere.

VIRES EX DIOSCORIDE.

Flos eius cum suillo adipe uetusto eloto exceptus ambustis medetur.

DE TVRCICO





TYPHA

Marengkolben.



## NOMINA.

Turcicum frumentum  
non est dictum.



HOC frumentum, ut alia multa, ex eorum est genere quæ aliundè ad nos translata sunt. E Græcia autem & Asia in Germaniam uenit, unde Turcicum frumentum appellatū est: Asiam enim uniuersam hodie immensissimus Turca occupat. Germani etiā ad loca unde affertur respicientes, *Türkisch Korn* nominant.

## GENERA.

Quatuor huius frumenti reperiuntur genera. Quoddā enim grana rufa, quoddam uerò purpurea, aliquod lutea, aliquod subcandida grana profert. Spicarū seu panicularum etiam in ijs est diuersitas: etsi enim omnes muticæ sint, tamen alia candidos, alia luteos, alia purpureos, prout scilicet grana colorata erunt, flores obtinet. Aliās, quod ad formam attinet, in ijs nulla est differentia.

## FORMA.

Culmum habet crassum, rotundum, altum longūmque, infima eius parte purpureum, geniculis interfectum: folia oblonga & harundinacea, in summitate paniculas, aut spicam muticam, & granis uacuam, instar Secales florentē, nunc luteo, nunc candido, nunc purpureo colore, prout fructus quem profert coloratus est. Fructū uerò & grana triangula, diuersis iam cōmemoratis coloribus tincta, in foliaceis, rotundis ac crassis membranis ac uaginis, quæ è lateribus geniculorum ferè singulorū prodeunt, contenta obtinent, coaceruata ac penitissime iuncta, inq̃ octo aut decem uersus ordine digesta. E fastigio uaginarū capilli tenues, iam candido, iam luteo, nunc purpureo colore maculati dependent, ut pictura satis ostendit, quæ  
D unica quidē tibi omnia genera repræsentabit. Hæc in una uagina quatuor tibi granorum colores monstrat, cū tamen quæuis unius duntaxat coloris grana, nempe aut lutea, aut purpurea, aut rufa, aut subcandida omnia habeat. Quod nos, ne aliquem pictura deciperet, monendum esse duximus.

## LOCVS.

E Græcia uel Asia, ut dictum est, primū ad nos peruenit. Nunc autem passim in omnibus hortis prouenit.

## TEMPVS.

Seritur mense Aprili, nec nisi sub finem Augusti & initia Septembris ad maturitatem peruenit.

## TEMPERAMENTVM.

Dulcedinē & lentorem quendam grana gustu præ se ferunt, ut haud dubiè idem cum Tritico habeat temperamentum.

## VIRE S.

Cum idem cum Tritico habere uideatur temperamentū, easdem etiam obtineat facultates necesse est. Grana itaque teruntur in candidissimam farinam, quæ in panificia subinde cogitur. Panis tamen ille lentoris quiddam & obstruentis naturæ habet. Hinc est quod in Asia & Turcia illius nullum in cibo usum esse, nisi cum annonæ premit inopia, dicunt. Caterum foliorum succum refrigerandi facultatem obtinere tradunt, hinc ad erysipelata utilem admodum esse coniiciunt.

DE THYMO.





TVRCICVM  
FRUMENTVM.  
Türkisch Korn.



C

NOMINA.

Serpillum Ro-  
manum.Thymus unde  
dictus.

THYMOE Græcis, Thymus Latinis, herbarijs uulgaribus Serpyllū Ro-  
manum, haud dubie ab odore quem cum Serpyllo cōmunem habet, di-  
citur. Officinæ antiquum nomen retinuerunt, Germanis Thym / &  
Köthischer quendel uocatur. Thymus autem Græcis ab excitando,  
quod *θυμω* dicunt, nomen inuenit. Nonnullis potius hoc placet etymum, ut Thy-  
mos quasi thymos, hoc est, sanguinem impellens dicatur.

FORMA.

Thymus surculosus frutex est, minutis multis & angustis folijs circumdatus, in  
summo capitula floribus purpureis referta habens. Ex qua sanè deliniatione omni-  
bus conspicuū fit, herbam cuius picturam damus esse Thymum. Dodrantalis enim  
& surculosus frutex est, folijs exiguis, flosculis ex purpura candicantibus, suauissi-  
mi odoris, capitella specie complicatarū formicarum, radice lignosa, enascentias ui-  
rides multas obtinente, quibus in terra radicitur.

LOCVS.

Nascitur petrosis & tenuibus locis: neque enim locum pinguem, neq; stercola-  
tum, sed aprium desiderat. Nunc in hortis multis Germaniæ prouenit.

TEMPVS.

Floret serò, quod Theophrastus etiam libro sexto de historia plantarū, capite se-  
cundo testatur, circa Solstitia, cum & apes decerpunt, & auguriū mellis est.

TEMPERAMENTVM.

Thymus uehementer calefacit. Itaque in calefaciendo & exiccando in tertio or-  
dine statuendus est.

D

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Potus cum sale & aceto, pituitā per aluum ducit. Decoctū eius cum melle ortho-  
pnoicis & asthmaticis prodest. Lumbricos uentris, menses, fetus & secundas pellit.  
Vrinam ciet. Mixtus melle in eclegmate, excreabilia efficit thoracis uitia. Recentia  
cedemata cum aceto illitus discutit. Sanguinis grumos dissoluit. Thymos & uer-  
rucas pensiles tollit. Ischiadicis cum uino & polenta impositus auxiliatur. Hebeti-  
bus oculis in cibo sumptus opitulatur. Vtilis etiā pro condimento in sanitatis usu.

EX GALENO.

Thymus incēdit, & calefacit manifestè: ob id & urinā & menses prouocat, sctum  
euellit, & uiscera potus expurgat, educendis ex thorace & pulmone confert.

EX AETIO.

Hæc experimentis de Thymo comperta sunt. Dato ieiunis articulari morbo la-  
borantibus, Thymi aridi minutissimi drachmas quatuor cum oxymelitis cyatho.  
Bilem enim reliquosq; humores atq; acrem saniem euacuat. Facit & ad uesicæ ma-  
la. Ventre inflatis, ubi intumescere cœperint, drachmā unam dato ieiuno cum co-  
chleari aquæ mulsæ. Ad lumborū coxendicumq; dolorem, laterisq; & thoracis, ac  
hypochondriorū suspensiones, ac inflationes, pondere trium drachmarū cum oxy-  
melite temperato, mensura cochlearij ieiuno exhibeto. Similiter etiam & melanco-  
licis, & mente turbatis, timoreq; detentis drachmas tres cum oxymelitis temperati  
cochleari præbeto. Dato item ieiunis & ante cœnam aduersus lippitudinē, & uehe-  
mentem oculorum dolorē. Præterea contra podagram, etiam quæ motum omni-  
no interceperit, cum uino utilissimè propinatur. Postremò ad tumefactos testes, ie-  
iunis trium drachmarum pondere exhibeatur.

EX PLINIO.

Oculorū claritati multum conferre existimatur, & in cibo, & in medicamentis.  
Item diutinæ tussi edigmate faciles excreationes facere cum aceto & sale. Sanguinē  
concreescere non patitur è melle. Longas faucium destillationes extrā illita cum Si-  
napi,





THYMVS

Römisch quendel.



C napi, extenuat: item stomachi & uentris uitia. Modicè tamen utendum est, quoniã exalfacit, quamuis sistat aluum: quæ si exulcerata sit, denarij pondus in sextarium aceti & mellis addi oportet. Item si lateralis dolor sit, aut inter scapulas, aut in thorace. Præcordijs medentur ex aceto cum melle: quæ potio datur & in alienatione mentis & melancholicis. Datur & comitialibus, quos correptos olfactus excitat Thymi. Aiunt & dormire eos oportere in molli Thymo. Prodest & orthopnoicis & anhelationi, mulierumq; mensibus retardatis. Vel, si mortui sint in utero partus, decoctum in aqua ad tertias. Viris uerò contra inflationes, cum melle & aceto. Et si uenter turgat, testèsue aut uesicæ dolor exigat. E uino tumores & impetus tollit impositū. Item cum aceto, callum & uerrucas. Coxendicibus imponitur cum uino. Articularibus morbis trium obolorū pondere in tribus cyathis aceti & mellis. Et in fastidio, tritum cum sale.

## DE TEUCRIO CAP. CCCXX

## NOMINA.

Teucrium unde  
dictum.



Teucrium hoc di-  
uersum ab He-  
mionitide, quod  
multi non obser-  
uant.

TEYKPION, ἡ χαμῆδρως Græcis, Teucion Latinis appellatur. Officinis ignotum. Germanis groß Bathengel dicitur. Teucrium autem uocatum est Græcis pariter & Latinis, quod Teucer Aiadis frater hoc inuenit. Inuentum uero ab eo sic tradit Plinius. Quum exta in sacrificio su per id proiecta fuissent, lieni adhæsit, eumq; exinaniuit. Proinde quod casus ostenderat, obseruatumq; à Teucro fuit, ad æternū humani beneficij decus & famam illi accreuit. Diuersum tamen hoc Teucriū ab Hemionitide, quod à Plinio etiam Teucrium appellari diximus. Chamædrys autem nominata est hæc herba, quod Chamædry simillima sit, adeò ut uicissim etiam Chamædrys hoc nomine, ut suo dicemus loco, dicta sit Teucrium. Maius tamen est Teucrium quàm sit Chamædrys, ut meritò Germanis groß Bathengel nuncupari queat.

## FORMA.

Herba est uirgæ referens effigiem, Chamædry similis, tenui folio, non multum Ciceri dissimile. Hæc quanquā breuissima sit Teucrij deliniatio, tamē abundē monstrat herbam hanc, cuius picturā exhibemus, esse uerum Teucriū, cum nihil Chamædry magis simile dici queat, si diligenter utriusq; plantæ notas expendas.

## LOCVS.

Nusquam, quod sciam, sponte sua in Germania prouenit. Satum tamen copiose nascitur. In Cilicia plurimum habetur.

## TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus, ac subinde semen producit.

## TEMPERAMENTVM.

In secundo exalfacientium, tertio autem exiccantium existit ordine.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Viride cum posca potum, aut aridum decoctum ac haustum, lienem potenter minuit. Lienosis cum ficis & aceto illinitur. Venenatorum autem moribus cum aceto sine ficis.

## EX GALENO.

Teucrium incidendi, & tenuium partium facultatis est, quare lienes sanat.

## EX PLINIO.

Recens Teucria in posca, uel sicca deferuefacta, potu lienem efficaciter cōsumit. Item ex aqua illinitur. Pota arida & decocta quantum manus capiat, in aceti heminis tribus lieni medetur. Ad uulnus illinitur eadem cum aceto, aut si tolerari non possit, ex fico uel aqua. Serpentium plagis imponitur cum aceto tantum.





TEUCRIVM

Bischofskraut.

aaa



C

NOMINA.



Perforata.

Androsæmon.

Chamæpitys.

Fuga demoni.

PERIKON, αἰσχροαμαρ, χαμαίπυτος Græcis, Hypericū Latinis dicitur. Nomen latinum in officinis seruat. Vulgus herbariorū Perforatam uocat, quod folia soli obiecta innumeris foraminibus scaterere, & omni ex parte punctis quibusdā pertundi uideantur. Herbam quoq; diui Ioannis appellant. Germanis S. Johans kraut nominatur. Androsæmon ob florem eius qui digitis confricatus sanguineū emittit liquorem, dixerunt. Chamæpitys uerò ab odore seminis resinaceo nominata est. Fugam dæmonū aliqui, quod superstitione quadam inducī, fugare posse dæmones crediderint, appellauerunt.

FORMA.

Folia Rutæ similia habet, surculosus frutex, dodrantalis, rubescens. Florem luteum, qui digitis attritus sanguineum emittit succum, qua ratione Androsæmon, quasi humanum dixeris sanguinē, appellatur. Siliquas gerit subhirsutas, in rotunditate oblongas, hordei magnitudine, in quibus semen nigrum, resinam obolens. Cuius nimirum descriptionis notæ ita herbæ illi, quam Perforatam uocant nostri temporis herbari, respondent, ut nemo nisi prorsus præfractō sit animo Hypericū esse deinceps reclamare possit. Siquidē surculosa est herba, dodrantalis, subrubens, folio Rutæ, flore luteo, quem si digitis libeat terere, manus profectō inuenies sanguineo succo cruentatas. Siliqua denique terete, hordei magnitudine, semine intus nigro, resinam olente. Duo itaq; in Perforata inueniuntur, quæ esse Hypericū certam tibi faciūt fidem, cruentus nempe floris triti succus, odorq; seminis resinaceus.

Marcelli Florentini erratum.

qui diuersum sentiunt haud dubiè Marcelli Florentini interpretatione falsa seducti sunt, qui flore albo constare Hypericum asserit, cum tamen in Dioscoride sit, αἰσχροαμαρ, hoc est, florem luteum habens.

LOCVS.

Gignitur in cultis, & asperis locis.

TEMPVS.

Æstate floret, Iulio potissimum & Augusto mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Hypericum calefacit & exiccat, tenuisq; substantiæ est.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vrinam cit, menstrua ducit appositū. A tertianis quartanisq; cum uino potum liberat. Semen quadraginta diebus potum ischiadicis medetur. Folia cum semine illita sanant ambusta.

EX GALENO.

Menses & urinas prouocat: sed ad hæc totus sumendus est fructus, non tantum semen. Cum folijs illitus uiridis ad cicatricem ducit cum alia, tum etiam ambusta; Caterū si sicca contusa inspergas, humida & putredinosa ulcera sanabis. Sunt nonnulli qui ischiadicis bibendum exhibent.

EX PLINIO.

Natura semini Hyperici spissandi. Aluum sistit, urinam cit, ad calculos uesicæ cum uino bibitur.

DE HYOSCYAMO.





HYPERICVM

S. Johans kraut.

aaa 2



## NOMINA.

Altercū.

Hyoscyamon ut  
de dictum.

Apollinaris.

ΟΣΚΥΑΜΟΣ Græcis, Hyoscyamus, Apollinaris Latinis dicitur. Arabibus Plinius Altercū uocari testatur. Officinis corrupta uoce Iusquiamus dicitur. Germanis Bilsamtraut/ uel simpliciter Bilsen. Hyoscyamon autem Græci uidentur appellare quasi fabam suillam aprināmue, quòd, ut in historia sua Helianus inquit, pastu huius herbe conuellantur sues aprie, præsenti mortis periculo, nisi copiosa aqua statim se foris & intus proluerint. Adeuntq; aquas non ut proluant se tantum, uerumetiam ut caneros uenentur: ijs enim nactis protinus sanitati restituuntur. Atque hinc est quod à nonnullis etiam Germanis Sewbon nominetur, Apollinarem uerò Latini ab Apolline medicinæ inuentore dixerunt.

## GENERA.

Niger Hyoscyamin.

Flauus.

Albus.

Triā sunt Hyoscyami genera. Vnum purpureos fert flores, folia Smilaci similia, semen nigrum, cytinos duros & spinosos. Hoc nigrum herbarij appellant. Alterū flores luteos ceu māli effigie, folia & siliquas teneriores, semen subflauū ceu Irion: flauum uocant. Et hoc est quod pictum damus. Tertium utile ad medicinam, placidissimum existens, pingue, tenerum, lanuginosum, flore & semine candido: album nominant. Quod si uerò illud non adsit, utendum flauo erit. Nigrum ut deterrimum improbandum.

## FORMA.

Frutex est caules emittens crassos, folia lata, oblonga, incisa, nigra, hirsuta. Per caulem deinceps flores prodeunt ueluti māli punici cytini, clypeolis septi, semine, ut Papaueris, plenis. Quid multa: frutex est tristi aspectu, folio lato, longo, pingui, D hirsuto, uenoso, & laciniato: caulibus crassis, è quorum latere flores prodeunt tanquam mālorum punicorum cytini, muricatis calycibus, ramos continua serie uesitibus, semine intus Papaueris refertis.

## LOCVS.

Primum genus in Galatia nascitur. Alterum passim circa littora, & inter ruinas & rudera prouenit. Tertium in maritimis & ruderibus.

## TEMPVS.

Semen nullum nisi postquam inaruerit legendum. Floret ferè per integrā æstatem, potissimum Iulio mense.

## TEMPERAMENTVM.

Candidus ex tertio quodammodo ordine refrigerantium est. Reliqua duo genera uenenosa.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Exprimitur succus ex tenero semine, folijs, caulibusq; in quem usum tunduntur omnia, expressusq; in sole siccatur. Vsus eius ad annum usq;: facile enim putrescit. Exprimitur priuatim etiam succus ex arido semine, aqua calida per fuso, tuso & expresso. Est uerò succus liquore præstantior, & magis dolores finit. Herba autem uiuens contusa, & trimestri farinae mixta in pastillos cōformatur & reconditur. Prior uerò succi expressio, & quod à sicco semine exprimitur, collyrijs dolorem lenientibus cōmodè miscetur, & contra acres calidasq; fluxiones, dolores aurium, & uulue uitia. Cum farina autem aut polenta, contra oculorū, pedum, aliasq; inflammationes. Semen eadem potest. Facit ad tussim, destillationē, oculorum fluxionē, uehementes dolores, muliebria profluvia, aliasq; sanguinis eruptiones, oboli pondere cum Papaueris semine, & aqua mulsa potum. Confert podagris, testibus inflatis, mammisq; à partu turgentibus, si tritum cum uino illinitur. Miscetur utiliter & alijs cataplasmatibus dolorem leuantibus. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per se, & cum polenta mixta utiliter illinuntur. Recentia ad mitigandos omnes





HYOSCYAMVS  
FLAVVS.

Bilsam.



**C** omnes dolores illinunt. Tria aut quatuor cum uino pota, hepialas febres sanant. Decocta olerū modo, & triblij mensura comesta, mediocrem insaniam gignunt. Idem efficere tradunt, si in colo ulcus habenti quis per clysterem infundat. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

## EX GALENO.

Hyoscyamus cuius semen atrum est, insaniam & soporem affert. Huic is cui semen mediocriter flauum est propinquam facultatē obtinet. Fugiendi autem utriq; sunt ut inutiles & uenenosi. Ceterū cuius semen ac flos candidus est, ad sanationes uel maximè idoneus est.

## EX PLINIO.

Hyoscyamū contra canum morsus ualet, inq; uulnera cum melle imponit. Contusum cum folijs ex uino datur peculiariter contra aspidas. Eius succus sanguinem excreantibus medetur. Nidor quoq; accensi tussientibus. Vfus seminis & per se, & succo expresso. Exprimitur separatim, & caulibus folijsq; utuntur, & radice, temeraria in totum (ut arbitror) medicina. Quippe etiam folijs constat mentem corrumpi, si plura quàm quatuor bibantur. Etiam antiqui in uino febrē depelli arbitrabantur. Et oleum fit ex semine, quod ipsum auribus infusum tentat mentem.

## DE HYACINTHO CAP. CCCXXIII.

## NOMINA.



**Y**AKINΘOZ Græcis, Hyacinthus Latinis, officinis incognitus, Germanis Blaw Wergenblümlin / quod uidelicet cum Viola purpurea in Martio & primo uere erumpat, appellatur.

## GENERA.

Albi Hyacinthi.

**D**uplices sunt Hyacinthi, albi & cœrulei, ut ex hoc Columellæ carmine colligi potest: Necnon uel niueos, uel cœruleos hyacinthos. Albos uerò non intelligas prorsus candidos, sed eos potius qui si cum cœruleis cōferas pallefcere uidentur, quemadmodū pictura affabre tibi demonstrat. Germani album fœminā, sicut cœruleum marem uocant. Sunt qui ad ætatem hanc differentiam coloris referre uolunt, quorum ego sententiā ueriorē esse existimo: cum enim adolefcunt, pallefcere incipiunt. Cœruleū autem Hyacinthū nostra terra triplicem producit, ut ē pictura manifestē cernere licet: maximū, maiorem, & minorē. Minor floribus differt plurimū à maiore: in illo enim maiores ac patientiores, in hoc autē minores & quasi orbiculati sunt flores. Omnibus autem descriptio, ut ex ijs quæ statim subiiciemus planū fiet, pulchrè conuenit, ut hinc congeneres herbas esse conicere cuius liceat.

## FORMA.

Folia Bulbo similia habet, caulem dodrantalē, leuem, minimo digito tenuiorē, uiridem, comam adiacentē incuruam, plenam florum purpureorū, radicē & ipsam bulbosam. Hæc certè descriptio ita picturis quas damus quadrat, ut nulla prorsus sit eius nota quæ illas nō appositissimè exprimat. Folia siquidē Bulbi protinus à radice prodeunt, caulis dodrantalis, leuis, & minimo digito tenuior, herbaceus, coma procumbens incurua, plena florum purpureorū, radix bulbacea. Verū posset aliquis cauillari, hos quos descripsimus flores non esse Hyacinthos, quod in ijs discurrentibus uenis græcarū literarum figura A I, ut Plinius lib. xxi. cap. xi. prodidit, & Poætæ fabulantur, haud inscripta legatur. Cui sic respondemus: Hyacinthū, quem Dioscorides & alij historici describunt, diuersum esse ab eo de quo Poætæ fabulantur. Cuius rei testis est Pausanias, qui refert florē qui natus est extincto Aiace apud Salamina, non esse Hyacinthū, sed literis Hyacintho similem uideri, ex candido rubentem, ac Lilio minorem, quemadmodū Ouidius, itemq; Virgilius describunt. Idem etiam autor Cosmofandalon dici florē apud Hermionenenses, Trecentijs con-

Ouidius xiiij. metamor. Ipse suos gemitus folijs inscribit, & ac ac flos habet inscriptum, fœnestaq; littera ducta est.

Theocritus Idyll. xix. Νῦν ὁ Ἰακίνθος ἐκ τῆς γῆς ἀνέβη, καὶ τὸν Ἰάκινθον οὐκ ἔστιν ἄλλος, ἀλλὰ τὸν Ἰάκινθον οὐκ ἔστιν ἄλλος.

fines





HYACINTHVS COERV  
LEVS MAXIMVS.

Blaw Aetgenblum die grösser.





HYACINTHVS COERV-  
LEVS MAIOR.

Blaw Mergenblümlin die Kleiner.





HYACINTHVS COERVLEVS  
MAS MINOR.

Blaw Wergenblüm mēnne.





HYACINTHVS ALBICANS SEV  
FOEMINA

Blaw mergenblümlein weiblich.



- A** fines testatur. Cum itaque constet duplicem esse Hyacinthum, alterum rubentem, cum literis illis inscriptis, qui à Poëtis describitur: alterum uerò purpureū seu cœruleum (nihil enim refert utrum dixeris, quod Dioscorides per purpureum colorem uiolaceum dilutū, hoc est, clariorem & apertiorē, quem cœruleum uocamus, intellexerit: nam & Plinius lib. xxxvij. cap. ix. Hyacinthi colorem uiolaceū dilutum uocauit) sine literis, à Dioscoride alijsq̃ historicis descriptū: nihil enim Dioscorides in suo Hyacintho de literis cōmeminit: Haud igitur temerè in Virgilio ferrugineos hyacinthos, non cœruleos, sed rubentes ad similitudinē ferruginis quispian interpretabitur, potissimum cum Poëtarum Hyacinthus, non cœruleus, sed rubens sit, quemadmodū alibi Virgilius & Pausanias docuere. Rubet etiā color ferrugineus. Neque obstat quod Nonius ferrugineos hyacinthos cœruleos interpretatus est: is enim cœruleū tantum Hyacinthū nouerat. Quod si uerò hæc morosis quibusdā non probabuntur, sed prorsus funestas literas inscriptas esse contendant, ijs ita responsum uolo. Quas in Hyacintho literas appellant Poëtæ, ueras non esse, sed potius notas quasdam nigras, id quod hinc palām fit. Plinius lib. xviij. cap. xij. ubi de leguminibus loquitur, literas lugubres in flore etiam fabæ ex sententia M. Varronis reperiri tradit, in quo tamen flore non literas ullas, sed nigras tantum notas, ut res ipsa & pictura docent, inspicere licet. Quod si nec ista satisfecerint, dicemus tum penitus fabulosum esse quod regum nominibus inscriptum Poëta, florem hunc canit. Si enim id credendū erit, credendum etiam quod idem ex puero transformato natus sit. Vel, quod uero similis est, de regijs florum appellationib. Poëta iocum struxisse uidetur, cum pastorem inducit sciscitantē, quibus in terris inscripti nomina regum nascuntur flores: sunt enim complures flores quibus à suis inuentoribus regibus nomina sunt indita. Neq̃ nunc ulla prorsus regū permultorū extaret memoria, nisi in florū nomenclaturis, qui nominibus regum inscripti sunt, asseruaret.

Hyacinthus  
poëtarum.Hyacinthus Dio  
scoridis.Ferruginei Hyac  
inthis qui apud  
Virgilium.Virgilius Eclog.  
tertia: Et suæ  
rubens Hyacin  
thus.Literæ in Hyacin  
tho quales.Virg. Dic quibus  
in terris inscripti  
nominaregū Na  
scuntur flores.  
Eclog. iij.

## LOCVS.

Nascitur in nemoribus: atque hinc est quod Galli, apud quos, Plinij etiam testimonio, eximiè prouenit, ut in suis cōmentarijs de Natura stirpium uir eruditione clarus Ioannes Ruellius autor est, nemoralem uel agrestem cepam nominent. Et eius certè magna est copia uerno tempore in nemore haud procul à uico Lusche, nau iuxta Tubingam sito, ut uel ex natali etiam satis constet flores hos quos pictos exhibemus, esse genuinos Hyacinthos.

Ruellius.  
Agrestis cepa.

## TEMPVS.

Vere, mensibus nimirū Februario & Martio, cum uiola purpurea, Theophrasto lib. vi. de Stirpium historia, cap. ultimo teste, erumpit: hinc Martium florem Germanis nostris dictum esse suprā monstrauius. Hoc potissimū tempore prorumpit is quem Hyacinthū minorem nominauimus. Exit etiam, eodem Theophrasto autore, cum Gladiolo, qui uernus etiam flos est. Quo sanè tempore is maximè floret, quem maiorem appellauimus. Proinde cum tempus etiam cōueniat, nemo est qui deinceps ueros esse Hyacinthos, dubitare meritò possit aut debeat.

Martius flos.

## TEMPERAMENTVM.

Hyacinthi radix bulbosa est, ordinis primi in desiccando, secundi uerò completi, aut incipientis in refrigerando. Semen autem tertio quadantenus ordine desiccatur, in medio caliditatis & frigiditatis consistens.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Hyacinthi radix pueris cum uino albo illita impuberes seruare creditur. Sistit aluum. Pota urinam ducit, & phalangiorū morsibus auxiliatur. Semen magis adstringit, & cœliacis prodest. Potum cum uino regium morbum emendat.

## EX GALENO.

Radix pueros diutissimè seruare impuberes in uino illita creditur. Semen regio morbo affectis in uino exhibetur.

## EX PLINIO.



C

EX PLINIO.

Radix Hyacinthi in uino dulci illita pubertatē coërcet, & non patitur erumpere. Torminibus & araneorū moribus resistit. Vrinam impellit. Contra serpentes & scorpiones, morbumq̃ regium, semen eius cum Abrotono datur.

## DE HYSSOPO. CAP. CCCXXIIII.

NOMINA.



ΞΥΣΤΡΟΣ græcè, Hyssopus & Hyssopū latinè, Officinæ nomen legitimum retinuerunt. Germanicè Jspen/oder Jfop uocatur.

GENERA.

Hortensis.  
Montana.

Duūm generū Dioscoridi Hyssopus est, hortensis & montana. Hortensis quæ in hortis prouenit, ac culinarū causa colitur, garten Jspen Germanis uocatur. Montana quæ in montibus nascit̃, & germanicè birg Jspen appellari potest.

FORMA.

Herba est pedali altitudine hortensis, fruticosa, folio Satureiæ satiuæ, floribus in cœruleo purpurascens, thyrso spicæ modo uestientibus, radice longa & lignosa. Montana priori haud dissimilis est. Errant qui nostram Hyssopum hortensem non esse ueram putant: habet enim planè folium origani, nisi quod angustius est. Nec plures sunt eius apud Dioscoridē notæ. Nam quæ de umbella quidam obijciunt, nihil ad Hyssopū attinent, cum simpliciter scribat Dioscorides, Origanum non habere umbellam rotæ speciem obtinentem. Id quod uerum est.

LOCVS.

In hortis, ut diximus, hortensis, in montibus uerò montana nascit̃. Cæteris præfertur quæ in Tauro monte prouenit.

TEMPVS.

Æstate floret, quo etiam potissimum tempore carpenda uenit.

TEMPERAMENTVM.

Hyssopū calefacit & desiccet ordine tertio: sed & tenuium est partium.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Vim habet extenuandi & calefaciendi. Decocta cum ficis, aqua, melle ac ruta, & pota, peripneumonicis, asthmaticis, tussi uetustæ, destillationi & orthopnœæ opitulatur. Lumbricos necat. Cum melle linctā idem præstat. Decoctū eius cum oxymelite potum, crassitudinē per aluum ducit. Estur cum ficis uiridibus, aluum subducens. Vehementius purgat adiecto illi cardamomo, aut iride, aut erysimo. Colorem bonum præbet. Cum fico & nitro illinitur ad lienem, aquam intercutē. Cum uino ad inflammationes. Discutit sugillata cum aqua feruenti illita. Angina laborantibus cum decocto ficorum optimū gargarisma. Decocta cum aceto, dentium dolorem collutione mitigat. Inflammationes quæ circa aures sunt suffitu soluit.

EX PLINIO.

Hyssopum in oleo contritum phthiriasi resistit, & prurigini in capite. Stomacho est contrarium. Purgat cum fico sumptum per inferna, cum melle uomitionibus. Putant & serpentium ictibus aduersari, tritum cum melle & sale & cumino.

DE HYDROPI.



HYSSOPVS  
HORTENSIS

Garten Dfen.

bbb





C

## NOMINA.

Hydropiper quare dictum.



ΔΡΟΠΕΡΕΠΙ Græcis, Hydropiper Latinis, officinis incognitum, Germanis Wasserteuffer / oder Wuckentraut nominatur. Hydropiper autem à locis quibus nascitur, & piperis sapore quem præ se fert, quasi dixeris piper aquatile, appellatum est. Muscæ denique ab eo uehementer abhorrent: neque enim id quod succo eius aspersum est attingunt, hincque adeò alteram appellationem Germani illi indiderunt.

## FORMA.

Caulem ædit geniculatū, robustū, circa quem alarum concauitates, & folia Menthe similia, maiora, teneriora, candidioraque, gustu piperis acri, non tamen odorato. Semen in ramulis fert secundum folia nascens, continua serie congestum, racemosum, & acre. Radicē exiguam & inutilē. Ex qua descriptione satis constat herbam hanc, cuius imaginē damus, esse Hydropiper: nulla siquidem nota est quæ illi non cōueniat. Caulis enim eius geniculatus, solidus, circa quem alæ panduntur, & folia Menthe cōsimilia, maiora tantū, hoc est, longiora multò, teneriora & albiora. Quæ singula faciliè diligens quispiam oculis lustrabit. Si uerò linguā consulat, folia meram piperis acrimoniam respiciunt, nullam tamen odoris suauitatē in eis deprehendet. Quod si reliquam faciem excusserit, offendet semen prope folia enatum racematim congestū, & quadā serie cohærens, ipsumque acre. Accedunt denique natales, facultates, & alia, ut nullus planè ambigendi locus relictus sit. Damus hic etiam alterius herbæ quæ in aquis prouenit picturā, quam nonnulli Hydropiperis speciē esse arbitrantur, quæ fere Hedere folia obtinet, & secundū ea semen, Ari semini haud dissimile. Nos à colore seminis appellauimus Hydropiper rubeum, germanicè rot

D Wasserteuffer. Huius herbæ & racemosus fructus, & folia acrimonia sunt prædita.

## LOCVS.

Gignitur prope stantes aquas, aut quæ leniter fluunt. Copiose prouenit ad flumen Pegnicum haud procul à Norimbergo.

## TEMPVS.

Floret Augusto mense floribus albis spicatim cohærentibus, ac subinde semen minutum profert.

## TEMPERAMENTVM.

Calidum est, non tamen usque adeo ut piper, & siccum: id quod gustus abundè docet.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Folia cum semine illita, cedemata, ueteresque durities discutiunt. Sugillata delent. Siccata & tusa pro pipere sali & obsonijs miscentur. Radix parua, nullius in medicina usus.

## EX GALENO.

Hydropiper à locis in quibus nascitur, & à similitudine quæ illi cum Pipere in gustu est, nomen sortitum est. Cæterum calidum est, sed minus quàm piper. Atque herba ipsa etiamnum uiridis cum semine cataplasmatibus in modum imposita sugillata, & induratos tumores digerit.

## EX AETIO.

Hydropiper herba est in aquosis nascens, ramusculis ac folijs Menthe similis, maior tantum, gustu acerrima ut piper, per exigua semina singulis folijs ferens. Calida quidem est, non tamen accedens piperi, quæ recens illita sugillata ac durities sanat. Hanc nonnulli condimentis piperis loco addunt.

## APPENDIX.

Cum interea temporis dum sub prælo sunt nostri cōmentarij, quomodo ueteribus sit appellata herba quam Hydropiper rubeum uocauimus diligentius cogito, tertiam Dracontij apud Pliniū lib. xxiiij. cap. xvi. speciem esse cōperio: hanc enim ita pingit: Tertia demonstratio fuit folio maiore quàm Cornus, radice harundinea,

totidem





HYDROPIPER

Wasserpfeffer.

bbb 2





HYDROPIPER  
RVBEVM.  
Hot Wasserpfeffer.



A totidem ut affirmabant geniculata nodis, quot haberet annos: totidemq̃ esse folia. Hi ea ex uino uel aqua contra serpentes dabant. Quæ quidem notæ huic etiam herbæ competere uidentur. Est enim folio maiore quàm Cornus, radice harundinea, nodisq̃ geniculata. An uerò tot nodis sit geniculata, quot habet annos, totidemq̃ folijs, nondum obseruare potuimus. Quinetiā uniuerſa tum foliorum tum fructus forma, acrisq̃ sapor, Ariac Dracontij genus esse euidenter ostendunt. Facultas denique contra serpentes, quam Dioscorides suis etiam tribuit Dracontijs, abundè quod contendimus docet. Non est autem, ut quidā existimant, Plinij Aris, quod eius radix oliuæ grandis magnitudinem atq̃ formam non referat. Hanc nostram de hac stirpe sententiam hoc loco referre placuit, ne quis nos illam Hydropiperis esse genus pertinaciter asserere ac tueri uelle existimet.

## DE PHLOMO CAP. CCCXXVI

## NOMINA.



ΛΟΜΟΣ græcè, Verbasculū latinè, officinis Tapsus barbatus dicitur. Sunt qui Candelam regis, Candelariam, Lanariamq̃ nominant. Germanicè Wulltraut / Kergentraut / Vnholden kerg / Himelbrant / Brenntraut uocatur. Phlomon autem haud dubiè dixerunt Græci, quòd ea pro ellychnijs utantur. Candelariā quoque recentiores nominarunt, quod caulibus eius adipe, seuo, uel aliquo pingui illitis, nonnulli pro lucernis utantur.

Tapsus barbatus.  
Candelæ regis.  
Phlomos cur dicta.  
Candelaria.

## GENERA.

Verbasculū omnium ueterū testimonio duo habet summa genera. Candidū enim alterum folijs, nigrum alterū est. Candidum rursus in marem & sceminā digeritur. Præter tria hæc, & syluestre habetur, wild Wulltraut Germani appellant. Sunt etiā Verbascula duo, quæ à nostris herbarijs herbæ paralysis, & uulgò artheticae, cum arthriticae dicendum esset, uocantur. Germanicè Schlüsselblumen. Horum unum est odoratū, alterum odoris expers. Prius germanicè simpliciter Schlüsselblumē / oder gelb Schlüsselblumen / Himelschlüssel / oder S. Peters schlüssel / alterum wild Schlüsselblumen / oder weiß Himelschlüssel appellant. Est & tertium Verbasculum, quod Lychnitum, alijs autem Thryallida appellant, Germani Marienroſen uocant. Hæc sunt genera Verbasci quemadmodū à Dioscoride & Galeno commemorantur, quorū sanè omniū picturas damus, excepto ultimo, quod hoc tempore nondum floruerat. Quanquam distingui genera hæc, ut Plinius libro xxv. cap. x. ait, penè superuacuum sit, quum sint eiusdem effectus omnia.

Verbascula duo.  
Herba paralysis.

## FORMA.

Verbasculum candidum scemina, Brassicæ similia folia habet, multò tamen hirsutiora, latiora & candida. Caulis eius cubitalis & amplior, candidus, subhirsutus. Flores albi aut subpallidi. Semen nigrum. Radix longa, acerba, crassitudine digiti. Candidum mas à foliorum candore Leucophyllon Græcis dictum, oblongioribus & angustioribus folijs, & tenui caule. Nigrum in cunctis candido simile, nisi latioribus nigrioribusq̃ constaret folijs. Syluestre uirgas fert altas & arboreſcentes, folia Saluiæ similia. Habet uerò circa uirgas ramulos Marrubij modo. Florem luteum, auri fulgore. Verbascula duo hirsuta, terræ inhærentia, humiliæue: folijs rotundis, & multò minoribus, rugosis, è quibus medijs stylus exilit tenuis, palmi altitudine, incanus, in cuius uertice terni, quaterni, & plures etiā dependent flores lutei, summis labris denticulati, in altero odorati, in altero inodori, calyculo in albū pallescente. Lychnitis siue Thryallis folijs ternis, aut quaternis, aut etiam plusculis, crassis, pinguibus, hirsutisq̃, ad lucernarū lumina utilibus, floribus purpureis.

Candidum mas.  
Nigrum.  
Syluestre.  
Verbascula.

Lychnitis.





VERBASCUM CANDI  
DUM MAS.

Weiß Wollkrautmennle



VERBASCUM CAN-  
DIDUM FOEMINA

Weiß Wulkrantzeibele.

bbb 4







VERBASCUM  
NIGRUM.  
Schwarz Mullenkraut.





VERBASCUM  
SYLVESTRE,

Wild wullkraut.





VERBASCULUM  
ODORATUM.

Seel Schlüsselblumen.



VERBASCUM NON  
ODORATVM.

Weiß Schlüsselblüm.





## LOCVS.

**C** Candidum & nigrum in campestribus, & in syluis etiam proueniunt. Syluestre in campestribus, potissimū siccis & lapidosis, nascitur. Verbascula duo passim in pratis & hortis producuntur. Lychnitis similiter alijs in campestribus nasci solet.

## TEMPVS.

Verbascula duo primo statim uere emicant, certiq; huius appetentis nuncijs. Hoc sanè tempore carpenda ueniunt, quod confestim fugacia euanescent: uita enim illis cum plurimum menstrua, nec temerè ad summum sesquimensē excedunt. Reliqua genera autumnō, dum florent & semen proferunt, colligenda.

## TEMPERAMENTVM.

Omnia folia desiccandi & detergendi uim possident.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Radix priorum duorum adstringit: unde tali ludicri magnitudine in alui profluuiō utiliter cum uino in potu datur. Decoctū eiusdem ruptis, conuulsis, contusis, & antiquæ tussi auxiliatur. Dentium dolorem collutione mitigat. Verbasculum cui flos aurei coloris, capillos tingit, & quocunq; reponatur blattas in se contrahit. Folia in aqua decocta aduersus cedemata, & oculorū inflammationes illinuntur. Syderata ulcera cum melle aut uino, cum aceto autem uulnera sanat. Contra scorpionum ictus auxilio sunt. Syluestris folia ambustis illinuntur. Ferunt scemina folia caricis interposita, incorruptas atq; à putrefactione immunes seruare.

## EX GALENO.

Priorum duorū radix gustu acerba est, & fluxionis affectibus prodest. Sed & ad dentium dolorem eam nonnulli colluunt. Folia tamen digerendi uim habent. Sic etiam aliorum folia, potissimū autem eius quæ aureos flores obtinet. Capillos quoque flouescere faciunt.

## EX PLINIO.

Contra scorpiones bibitur radix cum Ruta ex aqua magna amaritudine, sed effectu pari. Verbasculum priuatim tonsillis in aqua potum medetur. Tribus obolis bibitur Verbasculū cuius flos aureus est, contra omnia pectoris uitia, tussē, & purulenta excreantibus. Tanta huic uis est, ut iumentis etiam nō tussientibus modò, sed ilia trahentibus auxilietur potus. Lateris & pectoris dolores Verbasculum cum Ruta ex aqua sedat. Panos sanat cum sua radice tustum, uino aspersum, & ita cinere calfactum, ut imponatur calidum. Semen ex uino decoctum & contritū luxatis medetur, dolorem & tumore tollens. Radicis medulla collyrii tenuitate in fistulam additur. Contusis, euerfis, & si febris sit potatur in aqua Verbasculum, cuius flos auro similis est. Folia ex aceto imponuntur in struma. Semine ac folijs decoctis in uino ac tritis, omnia corpori infixā extrahuntur.

## APPENDIX.

Recentiores duobus Verbasculis hos effectus assignant. Trita imponuntur efficaciter articulorum doloribus. Radicis decocto uesicæ renumq; obstructions soluentur. Ius herbæ propinatur & illinitur aduersus rupta, luxata & liuentia. Quod uerò hæc eadem possint, temperamentū eorundem palam docet: parum enim adstringunt: si gustaueris, amara, & modicè acria sunt: ut hoc nomine desiccandi & detergendi facultatē, quam illis Galenus ascribit, habere nemo dubitare debeat. Nostri etiam temporis herbarij calida & sicca esse statuunt. Et mulieres formæ studer tes, succo è floribus illorum expresso faciem illinunt, quod maculas, rugasq; & eiusdem uitia mirificè detergeant. Vt hinc euidentissimū sit herbas, quas

Schlüsselblumen uocant Germani, esse  
Verbascula.





FRAGARIA MAIOR  
ET MINOR.

Erdbeer.



C

## NOMINA.

Rubus Idæum uide-  
re esse Fraga-  
ria.



Fragaria unde  
dicta.

**C**RÆCIS ut herba quæ fraga gerit nominata sit, certò constituere nobis nondum licet. Sunt tamen qui *Βάτος Ιδαίος*, hoc est, Rubum Idæum esse putent, eum potissimum qui sine spinis inuenitur. Quorum certè sententiam ob multas uariasq; causas, ut in sequentibus dicemus, minimè repudiandā existimamus. Apuleius Græcis *νόμαρον* appellari scribit, quod si uerum est, alia sit à Comaro quam Dioscorides, Galenus & alij quidam depingunt, necesse est: hæc enim arbor est, illa autem herba. Ego tamen uidi codicem manuscriptū, in quo hæc uerba: Comaron Græci, Romani Fragum nuncupant: non habebantur. Quicquid uerò sit, ex numero Mororū esse cōstat eius fructum optimi odoris: hinc à frago uerbo, quod odorē reddo significat, herba ipsa Latinis Fragaria, & fructus fragum dici cceperunt. Germani *Erdebeer* uocant. Græci autem si Comaron appellarunt, ob fructum arboris eiusdem nominis qui fragis ijs terrestribus similis est, haud dubiè sic dixerunt.

## GENERA.

Duo Fragariæ sunt genera. Vna flores fructusq; paulò maiores, altera minores obtinet. Nos una pictura utranque expressimus.

## FORMA.

Humi sine caule spargitur, multis à radice lanuginosis pediculis, quorum alij flore candido coronantur, alij trigemino comantur, folio per ambitum serrato atque uenoso, alij fructum gerunt exiguis quidem Moris haud absimilem, cæterum sui generis solidum, callosum, tenerū, quum maturuit rubentē, tum gustu, tum etiam odore suauissimum. Radice foris atra aut rubescente, intus candida, multo fibra-  
D ta capillitio.

## LOCVS.

In syluis, dumetis, & in opacis montibus, ac secus uias sponte nascitur. Vnde etiā colligi potest esse Rubum Idæum, quando & is in lucis proueniat. In hortis etiam nonnunquam ut grandiore fructum ministret, colitur Fragaria.

## TEMPVS.

Floret uere, & tota æstate, inq; maximā autumnī partem. Fructus tamen eius fugax, rarò nisi æstatis initio inueniri potest.

## TEMPERAMENTVM.

De temperamento Fragariæ recentiores diuersa tradunt. Serapio calidam & siccam in secundo ordine tradit. Alij frigidam & humidā in primo: nōnulli, qui tamen prorsus meo iudicio hallucinari uidentur, in tertio ordine scribunt. Nos folia ipsa gustu modicè esse amara, & adstringere deprehendimus, ut siccam esse hac ratione, & minimè humidā oporteat. Quapropter in tanta sententiarū de eius temperamento diuersitate animaduertendū, idem de Fragaria, quod de Rubo sentiendum esse, nempe quod folia, flores, fructus & radix adstringāt. Differre tamen inter se, quod  
Folia Fragariæ. folia potissimū recens nata plurimum in se habeant aqueæ substantiæ, parum uerò adstringant: adeò ut uerisimile sit de ijs locutos esse, qui frigidam & humidā in primo ordine Fragariam statuerunt. Est enim eorum temperies ex terrena frigida es-  
Fructus eiusdem. sentia, & aquea tepida. Fructus immaturus frigida terrea substantia præditus est, ut frigidus & siccus hoc nomine dici mereatur. Maturus autē non parum succi temperati calidi qui dulcis est, modicamq; adstrictionē habet, ita ut calidus & siccus cendendus ueniat. De fructu itaque intelligendi erunt, qui Fragariam calidam & siccam esse affirmant. Quare ubi de temperamento Fragariæ agitur, non simplicitè, sed cum prædicta distinctione respondendum est. Vnde cum idem ferè cum Rubo temperamentum habeat Fragaria, iterum hanc ab Idæo Rubo nihil differre uerisimile est.

## VIRES.



## VIRE S.

Quum recentiores in cōmemorandis Fragarię facultatibus partim eas quas Dioscorides Rubo Idæo, partim etiam quas Comaro tribuit Apuleius, vires Fragarię ascripserint, opere præcium me facturum arbitror, si utriusq; de ijs uerba præmiserō, ut nimirum quisq; hac ratione, quapropter iuniores ijs facultatibus Fragariam ornauerint, certius intelligere queat.

## EX DIOSCORIDE.

Idæus Rubus eadem potest quæ Rubus. Amplius eius flos cum melle tritus & illitus, oculorū inflammationibus auxiliatur. Sacros ignes extinguit. Stomachicis cum aqua potui datur.

## EX APVLEIO.

Ad lienis dolorē herbae Fragi succum ex mellis uncia potui datum mirificè proficere certum est. Ad suspiriosos eiusdem succus cum pipere albo & melle mixtus, potui datus, mirificum est remedium. Has facultates etiam antiquus manuscriptus herbarius Fragarię adscribit, nomine tamen Apulei in Dioscoridis nomen immutato. Addit tamen huius fructum comestum stomacho conferre, & ex succo eius os contra fectorem collui, id quod Serapion quoque tradit.

## EX RECENTIORIBVS.

Herba Fragaria in cibo sumpta medet̃ lienosis, item succus ex melle potus. Idem cum pipere candido datur suspiriosis. Fraga sitim sedāt, stomacho profunt, sed præsertim bilioso. Succus Fragis exprimitur, uetustate vires accipiens, præsentaneo remedio ad faciei ulcera, oculorū suffusiones, neq; nō epiphoras. Radicis decoctū iccicioris feruores multo matutino & meridie potū. Vtuntur hodie frequenter Fragaria ad glutinanda uulnera, alium sistendam, menstrua cohibenda, gingiuis contrimandas, oris ulcera, eiusdemq; fectore tollendum, quæ singula Rubus etiam Idæus potest, ut inde rursus conijcere liceat Fragariam ab eodem nihil differre.

## DE PHV GERMANICO

## CAP. CCCXXVIII

## NOMINA.



ov, *ῥαζζία ραζζο* Græcis, Phu & Nardus syluestris Latinis, Valeriana officinis & herbarijs nostri temporis, Germanis Baldrian/ Dennenmarck/ oder Kagenkraut/ oder Augewurzel appellatur, quod scilicet catti odore radicis eius, quo eorū oculi roborant̃, impense delectent̃.

Nardus syluestris.  
Valeriana.

## GENERA.

Duo sunt præcipua Phu genera. Magnum, quod alio nomine Theriacaria uocatur. Hoc descriptioni per omnia respondet, germanicè groß Baldrian/ & Triackß appellatur. Vulgus herbariorū Valerianā maiorem nominat. Alterum uulgare, quod alio nomine Valeriana etiam uulgaris nuncupatur. Germanis gemein Baldrian/ & Kagenwurzel dicitur. Hoc etiam genus à pictura Dioscoridis, ut paulo post fusius docebimus, non abhorret.

## FORMA.

Folia Elaphobosco, siue Olusatro similia habet. Caulem cubitalē, aut proceriorem, leuem, tenerū, purpurascētē, in medio cōcauum, geniculis intersectū. Flores ad Narcissi flores accedentes, minores & teneriores, in subalbido purpurascētes. Radices in superiore parte minimi digiti crassitudine. Adnascentes etiam radicales obliquas ueluti iuncus odoratus, aut ueratrū nigrum, inuicē implicitas, subflauas, bene odoratas, nardum in gustu referentes, cum quadam uirosa grauitate. Ex qua certē descriptione sole clarius fit, herbam quam uulgare hodie Valerianā no-

Valeriana uulgaris.



PHV MAGNUM

Groß Baldrian.







PHV GER-  
MANICVM.

Gemein Baldrian.



**C** minant esse Dioscoridis Phu, quod omnia ferè sic illi respondeant, ut prorsus nulla reclamare nota uideatur. Folia namq; huius cum primùm erumpunt Elaphobosci præ se ferunt imaginē: postea uerò dum adolefcit in Olusatri modum laciniantur. Caulis quoq; eius cubitalis, & maior (nō enim rarò ad trium cubitorū longitudinē caulis à nobis uisus est) læuis, potissimū in infima eius parte, deniq; tener, purpurascens, in medio cōcauus, geniculatus. Flores eiusdem qui summis caulibus emergunt, Narcissi certam exprimunt effigiē, quamuis minores sint, atque adeo teneriores. Vt hoc nomine cum Ruellio in græcis codicibus Dioscoridis *ῥαζοῦρα* pro *μειζοῦρα* legendum esse putem. Nisi quis existimet Phu Ponti, quod Dioscorides potissimū describit, fauentis cœli beneficio maiusculos habere flosculos. Prædicti etiā flores aceruatim coeūtes in purpuram candicant. Radices quoq; in superiore parte minimi digiti crassitudinē obtinent, multasq; radículas obliquas, Schenī, aut nigri Veratri modo sibijsis implicitas, subflauas, odoratas, Nardum, cum uirosa tamē grauitate, imitantes. Quum itaq; hæ omnes notæ, Valerianę nostrę respondeant, multorumq; cōsensus nobis subscribat, & facultates eius quas illi recentiores tribuunt, planè cum ijs quæ Dioscorides Phu adscribit cōueniant, quid impediatur cur non certò affirmemus Valerianam hanc uulgarem esse Phu Dioscoridis non uideo, præsertim cum manuscriptus etiam herbarius Phu esse Valerianā apertè doceat, ita ut mirari satis non queam cur aliquot docti uiri in Germania nostra diuersum astruere uoluerint.

## LOCVS.

Nascitur in humectis locis, & prope aquas, hæc q; ad mirandā altitudinē surgit. Prouenit etiam in lucis & cædus syluis, sed hæc in tantam proceritatē non emergit.

## TEMPVS.

Floret integra æstate.

D

## TEMPERAMENTVM.

Calidam & siccam esse in secundo ordine tradunt.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Phu calefacit. Sicca pota urinā mouet. Potest idem & decoctum eius. Ad lateris dolorem prodest. Menses ducit, & antidotis miscetur.

## EX GALENO.

Odorata quodammodo est huius herbæ radix, Nardo uiribus similis, sed tamen ad plurima infirmior. Vrinam plus mouet quàm Indica aut Syriaca Nardus, similiter autem ut Celtica.

## EX PLINIO.


Radix Phu datur potui trita, uel decocta ad strangulationes, uel pectoris dolores, uel laterum. Menses quoque cit. Bibitur cum uino.

## APPENDIX.

Magni Phu radice hodie multi, magno cum errore, pro calamo aromatico utuntur, quod hoc in loco monere placuit.

## DE PHACO CAP. CCCXXIX.

## NOMINA.

**Lent.**  *Λκος*, ῥαζοῦρα Græcis, Lens & Lenticula Latinis dicitur. Officinis & herbarijs latinum nomen retinuit. Germani Linsen appellant.

## FORMA.

Lens racemosum legumen est, folijs Viciæ, sed minoribus, floribus exiguis in candido purpurascens, siliquis paruis, molliter in latitudinē fusis, in quibus tria aut quatuor grana, inter legumina minima, sunt.

## LOCVS.

Prouenit passim in agris satum.

## TEMPVS.





LENS

Linsen.



C

Iulio mense floret, & deinceps in siliquis grana profert.

## TEMPERAMENTVM.

Lentes mediū tenent caliditatis & frigiditatis, desiccant tamē in secundo ordine.

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Lens crebrò comesta, oculorū aciem hebetat. Aegrè cōcoquitur. Stomacho nocet, cumq; & intestina inflat. Aluum cum cortice suo comesta sistit. Præstat quæ facillimè concoquitur, & nihil atri in maceratione reddens. Vim habet adstrictoriā: quapropter aluū sistit, si detracto antea cortice accuratè coquat, primāq; aqua intercoquendū effundatur. Primū enim eius decoctū aluum soluit. Somnia tumultuosa & grauiā facit. Neruis, pulmoni & capiti inutilis. Melius suo fungetur officio contra alui fluxiones, admixto illi cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut myrto, aut cortice punici māli, aut rosis siccis, aut mespilis, aut sorbis, aut pyris Thebanis, aut cotoneis mālis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quæ post decoctionē abijciuntur, aut rhois quæ obsonijs inspargitur. Acetum autem cum eo diligenter percoqui debet, aliās aluum conturbat. Cōtra subuersionē stomachi trīginta grana lentis suis corticibus denudata, deuorata profunt. Decocta cum polenta, & illita, podagram lenit. Sinus cum melle glutinat. Crustas rumpit, & ulcera purgat. Decocta in aceto duritias & strumas discutit. Cum meliloto, aut cotoneo mālo, medetur inflammationibus oculorum & sedis, addito rosaceo. In maioribus sedis inflammationibus & sinu amplo cum malicorio aut siccis rosis, adiecto melle decocta. Contra nomas gangrænicas similiter utuntur, aut adiuncta maris aqua. Aduersus autem pustulas, herpetas, erysipelata, pernionesq; ut antea dictum est. Contra mammas grumofum lac continentes, & lactis copia turgentes, in aqua maris

D decocta & illita auxiliatur.

## EX GALENO.

Lentes non ualenter adstringūt. Ipsum itaq; earum corpus desiccāt & sistit uentrem: ceterum decoctū irritat. Proinde etiam prior aqua abijcitur, ubi retentionis causa adhibent. Cortex eius uehementer adstringit, carnea substantia tenuiter, quæ & crassi succi & terrestris est. Succus porrò Lentis adstringenti est cōtrarius. Quocirca si elixæ in aqua iusculum sale garo oleoq; conditum bibatur, aluum dericiet. At quod ex his decocta Lente ferculum apparatur, contrariam succo uim obtinet. Nam quæ uentri obueniunt fluxiones desiccāt, os uentriculi, intestina, & totum deniq; uentrem corroborans. Quamobrem coeliacis & dysentericis accommodatus est cibus. Lens uerò decorticata, ut illam adstringendi uehementiā, cumq; hac alia uidelicet omnia quæ cōsequuntur, amittit, ita alibilibior quā integra illa efficitur, crassum prauumq; succū gignens, tardè cōmeans: alui tamen fluores haud desiccāt, uti ea quæ cortice non est spoliata. Iurē igitur qui modum in hoc edulio non seruant, elephantiasim quam uocant, & cancerum incurrunt. Siquidem crassa siccaq; cibaria facillè in melancholicos humores uertuntur. Quare ijs duntaxat quibus uitiosa est habitudo ob aquā in carne diffusam, Lens cibo utiliter præbetur, ceu aridis & squalentibus admodū damnose. Eandem ob causam uisum integrum & inculpatū hebetat, immoderatè exiccans. Ei uerò qui contrario modo se habet, humidiori uidelicet, opitulatur. Menstruis purgationibus inepta est: crassum enim & tardifluum sanguinem facit. At muliebri appellato profluuio conuenientissima.

## • EX PLINIO.

Lens optima quæ facillimè coquitur, eaq; quæ maximè aquam absorbet. Aciem quidem oculorū obtundit, & stomachū inflat: sed aluum sistit in cibo, magisq; discōcta cœlesti aqua. Eadem soluit, minus percocta. Crustulas ulcerū rumpit, eaq; quæ intra os sunt, purgat & adstringit. Collectiones omnes imposita sedat, maximeq; exulceratas & rimosas. Oculorū autem epiphoras cum meliloto aut cotoneo. Contra sup,



A tra suppurantia cum polenta imponitur. Decoctæ succus ad oris exulcerationes & genitalium adhibetur. Ad sedem, cum rosaceo aut cotoneo. In ijs quæ acrius remedium exigunt cum putamine punici, melle modico adiecto. Ad id demum ne celeriter inarescat, adijciunt & Betæ folia. Imponit & strumis panisq; uel maturis, uel maturefcentibus, ex aceto discocta. Rimis ex aqua mulsa, & gangrænis cum punici tegmine. Item podagris, cum polenta, & uuluis, & renibus, & pernionibus, ulceribus difficile cicatricem trahentibus. Propter dissolutionē stomachi triginta grana Lentis deuorantur. In choleris quoque & dysenteria, efficacior est in tribus aquis cocta, in quo usu melius semper eam torrere aut tundere, ut quam tenuissima detur, uel per se, uel cum cotoneo mælo, aut pyris, aut myrto, aut intubo erratico, aut beta nigra, aut plantagine. Pulmoni est inutilis, & capitis dolori, neruosisq; omnibus, & felli, nec somno facilis. Ad pustulas utilis, igniq; sacro, & mammis, in aqua marina decocta: in aceto autem, duritias & strumas discutit. Stomachi quidem causa, polentæ modo portionibus inspergitur. Quæ sunt ambusta, aqua semicocta curat, postea trita, & per cribrum effuso furfure, mox procedente curatione addito melle. Ex posca coquitur ad guttura.

## EX SYMEONE SETHI.

Crassi succi est, & austeram uim atque qualitatem possidet. Si quis ergo in aqua coquat, & eam aquæ, oleo & sapæ cum sale misceat, portionem faciet quæ uentrem subducatur. Bis autem cocta, uentriculum & ad ipsum defluxus sistit. Inducit autem stomacho robur, & intestinis, & uniuerso uentri. Quapropter utilis est cibus coeliacis & dysentericis. Si uerò cortice ablato sumatur, uehementiam adstringendi abijcit, magis uerò nutrit, cum tardi sit transitus, & crassi succi, non tamen adeo siccatur, ut antea dixi. Qui uerò hoc edulio crebrò utuntur, elephantiam contrahunt, & can-  
 B cros, & duritias, & neruorum dolores, & melancholicos affectus. Aptus enim est crassus & siccus sanguis, ut fiat succus melancholicus. Quibus igitur habitus quilibet malus aquosus in carne est, ijs solis utile est edulium, quemadmodum siccis & squalidis maximè noxium. Similiter uisum salubriter se habentem nimium exiccando hebetat, contra uerò affectum iuuat. Neque etiam ad menstruas purgationes utilis est, eò quod crassum & difficulter fluentem sanguinem efficiat. Ad hæc Veneris appetentiam, semen exiccando, extinguit: ideo castè uiuere uolentibus ad hoc maximè confert. Grauiam somnia facit, eò quod ex ea melancholici succi in totum distribuuntur corpus. Cum Mentha decocta, plurimū inflationis deponit. Nonnulli & Betam huius rei gratia eo quo decoquitur tempore iniiciunt. Lens uerò probè decocta & trita, si uulneribus ex iaculo aut telo facta imponatur, sanguinis fluxum uehementer compescit. Paruæ uerò Lentis decoctum sum-  
 ptum, difficilem partum soluit. Auribus ex quibus pus emanat instillatum, succurrit.

DE PHILYRA.





TILIA FOE-  
MINA

Lindenbaum.



A

## NOMINA.



**P**ILYRA Græcis, Tilia Latinis & officinis, Germanis Linden appellatur. Alia ab hac est arbor quæ Dioscoridi *Φιλυρία* uocatur. Quod non animaduertentes uiri etiam nonnulli doctissimi, utraq; arbores magno errore confundunt, quod forma admodum discrepent, ut ex his quæ paulo post dicemus, & è Dioscoride & Theophrasto lib. iij. de plantarum historia, cap. x. inuicem collatis abunde constabit. Differunt itaq; inter se Philyra & Phillyrea, neque una utraq; uoce arbor significatur, sed diuersæ.

*Phillyrea alia à  
Philyra.*

## GENERA.

Tiliæ, Theophrasto loco iam citato autore, duo habentur genera, mas scilicet & fœmina. Distantq; inter se tum materiæ, tum totius corporis forma, & quod altera fructifera, altera sterilis. Materies mari dura, flaua, nodosior, spinosiorq;: fœminæ candidior: & cortex mari crassior, detractusq; inflexibilis propter duritiã est: fœminæ candidior flexibiliorq;, ex quo cunas faciunt: item fœminæ odoratiores. Et mas sterilis, nulloq; flore est: fœmina, cuius tibi picturam damus, & florem & fructum gignit.

## FORMA.

Folio est hederaceo, molliore, & in angulum acutiorem rotundiore & prolixiore, & in orbem lente crispo atq; serrato: flore tantisperdum calyculo continet herbaceo, ubi emerit flauo: fructus magnitudine fabæ, similis acinis hederæ, in quo semine prætenuè quantum atriplicis, omnibus animantibus ingratis, cum foliorum pabulo maxime ducant, eorumq; mira dulcedine capiant. Nunc cum his confer ea quæ Dioscorides de Phillyrea tradit, & senties esse diuersissima. Nam quis unquam dixit Tiliam habere folia oleæ, & fructum ferre subdulcem ad similitudinem Lentisci, nigrum, uuarum more congestum: Philyræ enim seu Tiliæ folia sunt hederacea atq; serrata, adeoque ab oleæ folijs dissidentia: fructum denique fert non modo non subdulcem, sed qui à nullo mandi potest.

## LOCVS.

Montes & ualles diligit Tilia, sed plus montibus gaudet aquosis.

## TEMPVS.

Floret Iunio mense.

## TEMPERAMENTVM.

Calidam esse Tiliam, uel ex eo liquet quod frigidis cerebri malis, epilepsie & id genus alijs mirifice conferat. Amaritudo etiam cum glutinositate quadam in ea reliquis qualitatibus præualere uidetur, si hanc degustes. Quare abstergendi planè facultatem cum modica adstrictoria, perinde atq; Vlmus, cuius facultates illi Plinius, ut ex his quæ paulo post subiiciemus planum fiet, tribuit, habere euidentissimum est.

## VIRE. EX GALENO.

Vlmi folijs aliquando recens uulnus glutinauimus, confidentes adstringentem pariter & extergentem illis inesse facultatem. Cortex amplius etiam subamarus est, & adstrictorius, itaq; cum aceto lepram sanat. Porro uiridis etiam nunc & recens si uulneribus deligatur uice circumligetur, ea glutinare potest. Radices eandem uim obtinent: proinde & decocto earum quidam perfundunt fracturas quibus callo inducto opus est.

## EX PLINIO.

Cortex interior Tiliæ lepras sedat, & folia ex aceto illita. Multi corticem comanducatum uulneribus utilissimum esse putant. Folia trita, aqua aspersa, pedum tumori. Humor quoque medulla castratæ arboris effluens, capillum reddit capiti illitus, defluentesq; continet. Humor denique cuti nitorem inducit, faciemq; gratiorem præstat. Folia ad infantium ulcera in ore comanducata profunt. decocta & pota, urinam ciunt & menses.

## APPENDIX.

Quum Plinius ferè omnes facultates Vlmi etiã Tiliæ adscribat, ut ex eiusdem uerbis patet, ideo è Galeno quæ ille de Vlmo tradit produximus. Si uerò quispiam uires quæ à



C quæ à recentioribus Tiliæ tribuuntur, probè expendet, nihil ab ijs quæ ex Plinij & Galeni sententia retulimus differre comperiet. Nam maculas faciei abstergere scribunt Tiliam, si illa eius succo lauetur. Mederi etiam morbo comitiali bibulum eius liquorem stillatitiū, oculis claritatem inducere, calculum sanare, tumores discutere iſdem docent. Quid multa? omnes facultates Vlmi obtinet Tilia, ideoq̃ uulneribus etiam recentibus succurrit, & alia quæ à Dioscoride & Galeno in Vlmi historia cōmemorantur, potest.

## DE CHELIDONIO MAIORE

CAP. CCCXXXI.

NOMINA.



Chelidoniū unde  
dictum.

ΕΑΙΔΑΝΙΟΝ *μῆλα* Græcis, Chelidoniū maius Latinis, officinis Chelidonia, Germanis Schelltraut / Schelwurg / groß Schwalbentraut dicitur. Chelidonio autem, uel si maius Hirundinarię, auis hirundo quæ Græcis *χελιδών* uocatur, nomen indidit, uel, ut autor est Plinius, quod hanc primū inuenit, & ea oculis pul-  
lorum in nido restituit uisum, ut quidam tradunt, etiam erutis, uel quod floret aduentu hirundinum, discessuq̃ commarcescit: id quod de minore uerè dicitur.

FORMA.

Caulem emittit cubitalem & maiorem, gracilem, adnata folijs plena habentem. Folia Ranunculo similia, teneriora tamen, & colore subcæſia, iuxtaq̃ singula folia florem Leucoio similem. Succus illi croceus, acris, mordax, cum aliqua amaritudine & odoris grauitate. Radix supernè singularis, infernè autem plures. Fructus cornuti Papaueris instar tenuis, longus ueluti galeę conus, in quo exigua semina sunt, Papaueris semine maiora. Huius descriptionis notæ omnes Chelidonio nostro respondent. Siquidem fruticosa est herba, cubitali altitudine, cauliculis lanuginosis, teneris, folio Ranunculi, magis anguloso, tenuiori, aduersa parte cæſio, auersa incano, flore luteo, Leucoio conſimili, semine Papaueris, quod in corniculis seu siliquis longis exilibus clauditur. Vulnerata succum crocēū emittit, gustum uellicantē. Radix in superiore parte una, in inferiore parte multis luteis fibris capillata.

LOCVS.

Nascitur in opacis & parietinis.

TEMPVS.

Chelidoniū hirundinum aduentu florem excitat, atque adeo toto deinceps uere & æſtate floret, quibus etiam temporibus carpitur.

TEMPERAMENTVM.

Herba hæc tertij ordinis absoluti est in calefaciendo & desiccando.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Succus Chelidonię mixtus melli, & in æneo uase in carbonibus decoctus, contra oculorum caliginem prodest. Exprimitur autem succus ex folijs, radicibus & floribus incipiente æſtate, siccaturq̃ in umbra & in paſtillos conformatur. Radix cum Aniso & uino albo pota, regio morbo medet̃. Sanat herpetas cum uino illita. Dentium dolores cōmanducata sedat.

EX GALENO.

Chelidoniū admodum extergentis & calidæ facultatis est. Sed & succus eius ad acuendum uisum cōmodus est, utique in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur discussione indigens. Vſi sunt quidam radice eius ad morbum regium à iecoris obstructione profiſcentē, in uino albo eam potui exhibentes cum Aniso. Pari modo manſa, dentium doloribus confert.

EX PLINIO.





CHELIDONIVM  
MAIUS.

Echelkraut.



C

EX PLINIO.

Florentibus succus exprimitur, & in aëreo uase cum melle Attico leniter cinere feruenti decoquitur, singulari remedio contra caligines oculorum. Vtuntur & per se succo in collyrijs, quæ Chelidonia appellantur ab ea. Eadem oculorū aciem adiuuat, si addita aqua foueantur. Succus eius cum melle culices, nubeculas, obscuritatemque discutit, cicatrices extenuat. Albugines etiam iumentorum.

## DE CHELIDONIO MINORE

CAP. CCCXXXII.

NOMINA.

Scrofularia minor  
causa dicta.



ΧΕΛΙΔΟΝΙΟΝ μικρόν Græcis, Chelidoniū minus Latinis, officinis Scrofularia minor uocatur, quod strumosa radix multis granorum frumenti grumis uideatur coaluisse: uel quod strumis, quas imitatione græca Scrofulas uocant, medeatur. Germanis Feigwargen oder Blaternkraut / id est Ficariam, Psaffenhödlin / Klein Schelwurz / oder Schwalbenwurz / oder Meyentrut nominatur. Chelidonium autem hæc herba uocata est haud dubie, quod, ut Theophrastus lib. vii. cap. xiiij. hirundinū aduentu florem excitet.

FORMA.

Herbula est à stolonibus pediculisue pendens, sine caule, folijs Hederae figura, rotundioribus minoribusque, item teneris & aliquatenus pinguibus. Radices habet paruas multas, ex eodem callo prodeuntes, tritici modo acruatim congestas, quarum tres aut quatuor in longitudinem progrediuntur. Hæc Dioscoridis deliniatio prorsus herbae illi quam Scrofulariam minorem uulgò nominant, conuenire uidetur. Nam hæc herbula est à pediculis pendens, uidua caule, folijs Hederae, rotundioribus multò minoribusque, teneris & modicè pinguibus. Radices ostendit ex eodem callo prodeuntes, paruas, complures in granorū tritici morem acruatim collectas, quarum tres uel quatuor in longum protenduntur. Flos ei Ranunculi ut maiori, luteo colore nitens. His accedunt locus, tempora, uires, & alia quæ iam commemorantur, quæ singula Scrofulariae minori admodum quadrant, ut nemo hanc Chelidonium minus esse inficias ire sine magna impudentia possit.

LOCVS.

In palustribus, prope aquas, & in limitibus humidis, omnibusque uliginosis tractibus ac hortis passim gignitur.

TEMPVS.

Verno tempore, Martio mense, & præsertim hirundinū aduentu floret, nec longo post tempore marcescens euanescit, sic ut irrigui limites, qui largo foliorum florumque stipatu pubescebant, confestim ipsi spoliati glabrescere conspiciantur.

TEMPERAMENTVM.

Chelidoniū minus, Galeno teste, quarti ordinis absoluti est in calefaciendo & de siccando, ideoque magnam præ se fert acrimoniā, gustum erodentem. Nostrum autem usque adeo acre non est, ut commanducando sæpe nullam prorsus sentias acrimoniam, potissimum in eo quod humido in loco natum sit. In hoc autem quod locis siccis prouenit, senties & amaritudinem & acrimoniam, sensim tamen gustum erodentem.

VIRES. EX DIOSCORIDE.

Acrem uim habet, Anemones modo summam cutem exulcerantē. Scabiem & unguium lepras tollit. Ex radicibus expressus succus ad purgationem capitis addito melle naribus utiliter instillatur. Similiter decoctum eius cum melle gargarissatum, caput strenuè purgat, & omnia pectoris uitia.

EX GALENO.





CHILIDONIVM  
MINVS.

Leigwartzenkraut.



C

## EX GALENO.

Chelidoniū minus cum acrius sit maiore, illitum confestim cutem exulcerat, unguesq; scabros eiicit. Succus eius per nares purgat, utpote uehemēter acris existens.

## APPENDIX.

Recentiores ea herba in exterendis ficubus mariscisue, & strumis, magna experientia utuntur, ut inde certē Scrofularia nominari, quemadmodū diximus, meruerit. Antiquus etiam ac manuscriptus herbarius, sub nomine tamē Pedis uituli, quo Aron nominatur, se à quodam qui expertus sit cognouisse scribit, quod hæc herba contra mariscas ac strumas mirificè proffit.

## DE CHAMÆDRY CAP. CCCXXXIII.

## NOMINA.

Serratula.  
Chamædrys unde dicta.



Serrata.

ΑΜΑΙΔΡΥΣ græcè, Trissago latinè, officinis græcum nomen infedit, uulgo Quercula minor, & à serratis folijs Serratula appellatur. Chamædrys uerò Græcis dicta est, quasi humilis ac terrestris quercus, quod scilicet folia Quercus habeat, & huius respectu quasi humi repat. Sunt qui Serratā nominatā ideo putent, quod ab ea serra inuenta sit. Dioscorides hanc Teucrium etiā, propterea quod Teucrio similis admodū sit, appellari à nōnullis scribit.

## GENERA.

- Et si Dioscorides aliq; ueteres unicā faciant Chamædryn, tamen nos, quia plures herbas ad eius formam ac picturā accedere uidemus, duo eius genera produximus. Quorum sanè primum uera Chamædrys existit, & germanicè Klein Bathengel nominatur. Illius autem rursus duo sunt genera. Vnum enim quod præ cæteris omnibus picturæ Dioscoridis maximè accedit, mas dicitur, alterum uerò scemina: neque enim aliter nobis discrimen indicare licuit nisi sexus ratione. Alterum genus uulgaris est Chamædrys, quod iterum duūm est generum, mas scilicet & scemina. Mas germanicè Erdweirauch / scemina uerò Gamenderle / Blawmenderle / Vergiß mein nit / appellatur.

## FORMA.

Obiectionis solutio.

Frutex dodrantalis, folijs exiguis, forma & diuisuris quernis similibus, amarisq; flore subpurpureo, exili, semine in calyculis atro. Quæ utique descriptio ita herbis illis quas pictas exhibemus respondet, ut nulla prorsus nota reclamare uideatur. Sunt enim herbæ palmum altæ ut plurimum, exili folio, effigie & diuisura Quercus, amaro, flore penè purpureo & exiguo, ita ut mirari satis non possim, cur nonnulli alteram speciem genuinam Chamædryn esse negent, cum tamen Germanica etiam appellatio pulchrè ad antiquum atque adeo græcum nomen alludat. Sed instabit forsitan quispiam dicens, Chamædrys Dioscoridis palmum alta est, hæc tua mensuram hanc excedit. Fateor sanè, attamē non multum exuperat, quod si etiam plus exuperaret, non tamen hoc nomine alterius speciei herba putanda esset: neq; enim adeò statam atque certam mensuram herbis tribuit Dioscorides, ut quandoque ultra citraq; consistere non liceat: uerum cum alicui herbæ mensuram adscribit, id ea ratione facit, ut maiori parti indiuiduorū illius speciei quadrare existimet. In prioris itaque inopia, alterius usus esse potest.

## LOCVS.

Nascitur asperis & petrosis locis, interdum etiam in montosis & campestribus solidis.

## TEMPVS.

Primum genus Iunio & Iulio mensibus floret. Alterum autem uere potissimū. Carpuntur semine prægnantia.

## TEMPERA-





CHAMAEDRYS  
VERA MAS.  
Klein Barchengel.





CHAMAEDRYS VERA  
FOEMINA.

Klein Bachelweible.





CHAMAEDRYS VVLGA-  
RIS MAS.

Lederweirauch.





CHAMAEDRYS VVLGA-  
RIS FOEMINA.

Gamenderle.



## TEMPERAMENTVM.

A Ex tertio ordine calefacientiũ & desiccantium facit Galenus, Germanicæ tamen minus calefacere & desiccare uidentur, utpote in regione frigidiore natæ.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Reçens ac uiridis in aqua decocta & pota, conuulsis, tussientibus, lieni indurato, urinæ difficultatibus, hydropicis inter initia auxiliatur. Cit menses, foetusq̃ extrahit. Lienem ex aceto pota minuit. Aduersus uenenata cum uino pota & illita efficax est. Trita ad prædicta in pilulas conformatur. Cum melle uetera ulcera purgat. Cum oleo trita, inuncta & illita, oculorum caliginem discutit.

## EX GALENO.

Chamædrys uincentem qualitatē amarā habet, & est quodammodo acris. Quo circa meritò lienem colliquat, urinam & menses mouet, crassitudinē humorum incidit, & uiscerum obstructions expurgat.

## EX THEOPHRASTO.

Triflaginis folia ad rupta, uulneraq̃ in oleo trita ualent, & ad depascentia ulcera. Semen bilem extrahit, & oculis quoq̃ beneficum est. Folium ad albugines tritum in oleo prodest.

## EX PLINIO.


Aduersus serpentiũ uenena potu illituq̃ efficacissima. Item stomacho, tussi uetustæ, pituitæ in gula cohærescenti, ruptis, conuulsis, lateris doloribus. Lienem consumit. Vrinā & menses cit, ob id incipientibus hydropicis efficax, manualibus scopis eius in tribus heminis aquæ decoctis usque ad tertias. Sanat & uomicas, & sordida ulcera cum melle. Fit & uinum ex ea pectoris uitij. Foliorũ succus cum oleo, caliginem oculorum discutit. Ad splenem ex aceto sumitur.

B

## DE CHAMÆCYPARISSO

## CAP. CCCXXXIIII.

## NOMINA.



ΑΜΑΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ Plinio dicta est, quasi pumila Cupressus. Apud Græcos, quod sciā, eius fruticis nulla sit mentio. Vulgo Cupressus, Germanis Cypreß nominatur. Cupressus ab odore & forma foliorũ eiusdem nomenclaturæ arboris uocata est.

Cupressus unde dicta.

## FORMA.

In arbusculi formam fruticat, folijs incanis, Abrotoni fœminæ modo scissis. Floribus in summo auri instar fulgentibus. Totus frutex odoratus est. Errāt qui Chamæpityn esse arbitrantur; neque enim ut illa humi serpit, sed altius à terra, ut pictura monstrat, confurgit.

Chamæcyparissus non est Chamæpitys.

## LOCVS.

In hortis passim ac figulinis prouenit.

## TEMPVS.

Æstate floret. Paucos autē frutices inuenies in quibus flores intueri liceat, quando per uniuersam uitam non nisi unum hunc, cuius picturam damus, fruticem in quo flores apparuerint, uiderim.

## TEMPERAMENTVM.

Apparet in ea, sicut gustus testificatur, leuis quidem acrimonia, sed maior amaritudo, multoq̃ etiam plus acerbitalis in tota planta. Resiccat itaque absq̃ insigni caliditate.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Quum easdem quas arbor Cyparissus qualitates habeat Chamæcyparissus, necesse est





CHAMAECYPARISSUS.

Cypress.



A cesse est ut etiam facultates easdem obtineat. Arboris igitur hæ sunt uires. Adstringit & refrigerat. Folia eius cum passo & myrrha modica pota, uesicæ fluxionibus & urinæ difficultati medentur. Pilulæ tusæ, & cum uino potæ, contra sanguinis reiectionem, dysenterias, alui fluxiones, orthopneam, tussimq; profunt. Decoctum earum idem potest. Tusæ cum fico duritias emolliunt, & polypos in naribus sanant. Leprosos ungues cum aceto decoctæ & tritæ adiectis lupinis tollunt. Intestinorū ramices illitæ coërcent. Folia idem possunt. Pilulæ cum coma suffitæ culices abigere creduntur. Folia trita & illita uulnera glutinant, sanguinemq; supprimunt. Cum aceto autem trita, capillos tingunt. Illinitur per se aut cum polenta ad erysipelata, herpetas, carbunculos, & oculorum phlegmonas. Cerato mixta & imposita uentriculum firmant.

## EX GALENO.

Cupressi folia, germina, pilulæ recentes & molles, magna ulcera in duris corporibus glutinant. Ex quo clarum est quod resiccandi uim habeat, absq; insigni acrimonia & caliditate. Tanta inest ei acrimonia caliditasq;, quanta satis sit deducendæ in altum acerbitati: nullam tamen mordicationē aut caliditatem in corporibus efficit. Proinde in alto latentes in flaccidis putrescentibusq; affectibus humiditates, sine molestia tutoq; depascitur, quum quæ calefaciunt & desiccant, eas quidem quæ contentæ sunt absument, cæterum acrimonia & caliditate alias attrahant. Sic intestinorū ramice affectos iuuat: siquidem exiccat & robur addit corporibus præ humiditate laxis, utpote quum adstrictio in altum subeat, eò quod caliditas quæ illi admista est deducat, ad eam quidem mensuram perueniens, ut præire quidem ualeat, nondum tamen mordicare. Quidam ea utuntur ad carbunculos & herpetes polentæ miscentes, tanquam absumat citra calefactionem eos morbos efficientem humiditatem. Sunt qui ad erysipelata utantur, admista nimirum polenta cum aqua, aut oxycrato aquoso.

## EX PLINIO.

Cupressi folia trita serpentum ictibus imponuntur, & capiti cum polenta, si à sole doleat. Item ramici, qua de causa bibuntur. Testium quoque tumori cum cera illinuntur. Capillū denigrant ex aceto. Eadem trita cum duabus partibus panis molliis, & uino Amingo subacta, pedum ac neruorum dolores sedant. Pilulæ aduersus serpentium ictus bibuntur, aut si efficiatur sanguis. Collectionibus illinuntur. Ramici quoq; teneræ tusæ cum axungia & lomento profunt. Bibuntur ex eadem causa. Parotidi & strumæ cum farina imponuntur. Exprimitur succus tusus cum semine, qui mixto oleo, caliginem oculorum aufert. Item uictoriati pondere in uino potus illitusq;, cum fico sicca pingui, exemptis granis, uitia testium sanat, tumores discutit, & cum fermento strumas. Radix cum folijs trita potaq;, uesicæ & stranguriæ

medetur, & contra phalangia. Ramenta pota menses ciunt, scorpionum ictibus aduersantur. Chamæcyparissos herba ex uino pota contra uenena serpentium omnium scorpionumq; pollet.

*Chamæcyparissi  
facilitates.*





CHAMAECISSOS

Sundclieb.



A

## NOMINA.



ΑΜΑΙΚΙΣΣΟΣ, ἡ γῆς στέφανος Græcis, Hederæ terrestris, Terræ corona *Hederæ terrestris.*  
 Latinis appellatur. Officinæ nomen Hederæ terrestris retinuerunt.  
 Germanicè Gündelreb / corrupto sanè nomine uocatur, cum dicendū  
 esset Gündreb / hoc est, humi repens uiticula. Nominatur etiam Ger  
 manis Erdephew / & Erdenkrenglin. Chamæcissos uerò dicta est, quod nunquā *Chamæcissos unde dicta.*  
 non repat humi, folijs Hederæ similibus. Corona terræ, quod ramulos suos per ter  
 ram spargens, folioso ueluti sermo eandem coronare uideatur. *Corona terre.*

## FORMA.

Folia Hederæ similia habet, minora tamen & tenuiora. Ramulos dodranta  
 multos, folijs plenos, à terra quinq; aut sex prodeuntes. Flores Leucois similes, mi  
 niores tamen, & in gustu uehementer amaros. Radix illi est tenuis, alba, & inutilis.  
 Ex hac historia satis constat herbam hodie uocatam Hederam terrestrem, esse Dio  
 scoridis Chamæcisson. Siquidem folijs Hederæ constat, minoribus tamen & te  
 nuioribus, ac in circuitu incis. Legendū enim esse *μικρότερα*, & non *μακρότερα*, res *Dioscoridis locut*  
 ipsa docet: nam etsi folia Chamæcissi aliquatenus Hederæ similia sint, tamen rotun  
 diora, atque adeo minora etiam & tenuiora existunt. Et est hic lapsus ab in α apud  
 Dioscoridem frequens, ut ex alijs etiam locis suprā notatis liquet. Ramulis etiam  
 dodrantalibus multis, foliosis, qui tamen antequam scindantur quinq; aut sex à ra  
 dice procedunt. Flores denique eius Leucois similes sunt, non quidem luteis, al  
 bis, aut purpureis, sed cœruleis: ita ut uehementer errent qui eius flores neque figu  
 ra neque colore floribus Chamæcissi, qui Leucois adsimilantur, esse similes pu  
 tant. Etsi enim colore neque albi, neque lutei sint, cœruleos tamen, qui color etiam  
 Leucoiorū est, esse constat. In gustu deniq; sicut etiam folia, amari sunt. Radix quo  
 que eius tenuis, & nullius prorsus usus est. His omnibus accedit, quod nomen etiā  
 pulchrè quadrat: neq; enim Græcis aliud sonat Chamæcissos, nisi humilemachu. *Chamæcissos*  
 mi repentem Hederam. Cæterum non esse Elatine, præter alia multa quæ referre *Hederæ terrestris*  
 superuacaneum arbitror, sapor manifestè ostendit, qui in Hederæ terrestri amarus *non est Elatine.*  
 & modicè acris est, atque adeo calorem præ se fert. Elatine uerò refrigerat atque ad  
 stringit. Sic non esse Asclepiada, ut taceam quod Securigaceæ simile semen non pro  
 ferat, uel unus locus natalis satis monstrat. Asclepias enim in montibus, Hederæ au  
 tem terrestris in decliuibus locis & uallibus, ut germanicum nomen Gündreb  
 abundè indicat, prouenire solet. Quæ autem herba sit Asclepias, suo loco dictum à  
 nobis est. *Non est Asclepias.*

## LOCVS.

Nascitur in cultis locis, iuxta etiam sepēs & dumeta.

## TEMPVS.

In Martio statim erumpit, & floret in magnam usq; æstatis partem.

## TEMPERAMENTVM.

Amaritudo exiguaq; acrimonia foliorū & florum satis monstrant herbam hanc  
 calidam & siccam esse, ita ut hi qui frigidā esse statuunt, reprehensione non careant. *Error quorundā*  
*notatur.*

## VIRE. EX DIOSCORIDE.

Folia eius trioboli pondere in aquæ cyathis tribus, quadragenis aut quinquage  
 nis diebus pota, ischiadicis profunt. Morbum quoque regium in senos septenósue  
 dies similiter pota emendant atq; expurgant.

## EX GALENO.

Chamæcissi flos quum sit admodum amarus, iecoris obstructions soluit. Sunt  
 qui illum etiam ischiadicis exhibeant.

ccc

EX PLINIO.



## EX PLINIO.

C

Chamaecisson appellant Hederam non attollentē se à terra. Et hæc contusa in uino acetabuli mensurā leni medetur. Eius folia bibunt ischiadici tribus obolis, in uino cyathis duobus septem diebus, admodum amara potione.

## APPENDIX.

Has omnes iam cōmemoratas facultates Hederae terrestri recentiores tribuunt: neque dubium est, quum sit admodū amara, quin easdem habeat, & alia etiam possit quæ illi adscribunt, ut euocare suppressos menses, urinam mouere, obtusum auditum remouere. Contra pestem etiam tradunt efficacem esse: id quod equites quoque sciunt: hi enim quoties fibula dicta pestis equum corripuerit, hac contra eandē herba magna efficacia utuntur.

## DE CHRYSANTHEMO. CAP. CCCXXXVI.

## NOMINA.

Chrysanthemum  
unde dictum.



ΠΥΣΑΝΘΕΜΟΝ Græcis, Chrysanthemū Latinis, officinis inusitatum, Germanis Goldtblüm / Schmalztblüm / à pinguedine quæ contrito digitis flosculo apparet, & Dlattblüm nominatur. Chrysanthemon uerò à flosculis auri splendorem & colorem præ se ferentibus, dictum est.

## FORMA.

Herba est tenera, fruticis tamen speciem obtinens, leues proferens caules, & multifida folia: luteos flores, uehementer splendentes, & oculi instar circulares. Ex qua sanè descriptione satis clarum est, herbam quam pictam damus, esse Chrysanthemon, quod illi omnes à Dioscoride traditæ notæ, nulla prorsus reclamante, conueniant. Quibus Democriti in Hydrosopico accedit testimonium, qui herbam hanc quæ Batrachio similis est, Chrysanthemon Græcis appellari scribit, folijsq; Apij esse, maioribus tamen, flore auri colore splendente. Addit deniq; ab Aquilegijs mirè celebratā esse, eò quod aquam subesse certum sit, ubi solet emicare. Quæ quidē singula herbe illi quam depictā exhibemus respondent. Nam ut cætera omittam, ubi hæc nascitur aquæ latices subesse non est dubium. Quidam perperam Wasserhannsiß germanicè nominant: nam hoc nomine appellata herba, alia ab ea est, ut in capite de Batrachio docuimus. Nam cum hæc nostra acrimonia uacet, quanquam Batrachij similis sit, tamen in numero illorum esse hoc nomine non potest.

## LOCVS.

Nascitur prope urbes, in pratis humidis, & alijs locis aquosis.

## TEMPVS.

Maior mense eius floribus prata & loca humida splendescunt.

## TEMPERAMENTVM.

Eiusdem esse cum Buphthalmo temperamenti, & gustus & facultates declarant. Calidum itaque esse & siccum constat.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Eius flores cum cerato triti, steatomata discutere produntur. Regio morbo correptis coloris bonitatem tempestiuè reddit, à balneo post longiorem in eo moram exitu pota.

## EX PLINIO.

Vesicæ calculos Chrysanthemon eijcit.

DE CHAMAE-





CHRYSANTHEMUM

Schmalzblüm.



## NOMINA.

*Carduus suarius.**Cardopatium.**Chamaeleon unde dictus.**Suarius Carduus quare nominatus*

ΑΜΑΙΛΕΩΝ λευκός Græcis, Chamaeleon albus, Carduus suarius & uarius Latinis, officinis & barbaris Cardopatium appellatur. Quod nomen haud dubiè corruptum est, deductumq; à dictione Pancration, nam sic olim esse nominatum Chamaeleonem Apuleius testatur: aut à Carduo uario, à qua dictione, u scilicet litera in p, & r in t mutata, in Cardopatiū facilis est lapsus. Germanis *Eberwurz*, eleganti allusione ad Carduum suarium, nuncupatur. Chamaeleon autem à foliorū uarietate dici cœpit. Mutat enim cum terra colores, Plinio teste: hic niger, illic uiridis, aliubi cyaneus, aliubi croceus, atq; alijs coloribus uidetur. Suarius autem Carduus dictus est, quod sues si in polenta exhibeatur, perimat. Ob quam etiam causam *Eberwurz* Germanis nuncupatam puto.

## FORMA.

Folia habet Silybo aut Scolymo similia, asperiora autem, acutiora, nigroq; Chamaeleone ualidiora. Caule uacat, uerum è medio spinam Echino marino, aut Cinaræ similem erigit. Flores purpureos, ueluti capillos, qui in pappos euanescent. Semen Cnico simile. Radicē in pinguibus collibus crassam, in montosis uerò graciliorem, in profundo albam, aliquatenus aromaticam, graueolentē & dulcem. Plinius libro xxij. cap. xviij. breuius herbam hanc depingit, sic inquit: Asperiora folia habet, serpit in terra Echini modo spinas erigens, radice dulci, odore grauissimo. Quæ certè notæ in uniuersum omnes, herbæ quæ hodie barbara & corrupta uoce Cardopatiū uocatur, adamussim respondent, ita ut nemo non esse Chamaeleonem perspicuè intelligat. Huc accedit quod facultates etiam eadem sint. Radix enim Chamaeleonis albi hausta, uenenis resistit. Radix etiam Cardopati ex recentiorum traditione, mirificè uenenis aduersari, & contra pestilentiam populatim fauentem, ut paulò post dicemus, efficacissimū esse remediū dicitur. Quod si tamen rectiora quis protulerit, non grauabimur hic, ut in alijs quoq; mutare sententiā.

## LOCVS.

In glabretis montium prouenit, & in syluis, ut hinc etiam syluaticus Carduus cognominatus sit.

## TEMPVS.

Iulio & Augusto mensibus cum suis floribus effodi potest.

## TEMPERAMENTVM.

Radix eius calefacit secundo ordine absoluto, desiccatur autem tertio.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix pota acetabuli mensura, latos lumbricos pellit. Sumitur autem in uino austero, cum decocto Origani. Hydropicis cōmodè drachma in uino datur: etenim eos extenuat. Contra difficultatem urinæ decoctum eius propinatur. Pro theriaca cum uino pota est. Occidit canes & sues. Mures item necat subacta cum polenta, aut hydrelæo madefacta.

## EX GALENO.

Radix eius potui datur acetabuli mensura contra latos lumbricos cum uino austero. Exhibent etiam aqua inter cutem laborantibus.

## EX PLINIO.

Hydropicos sanat succo radice decoctæ. Bibitur drachma in passo. Pellit & interaneorum animalia acetabuli mensura succi eiusdem in uino austero cum Origani scopis. Facit ad difficultatē urinæ. Hic succus occidit canes suesq; in polenta. Ad-dita aqua & oleo contrahit in se mures & necat, nisi protinus aquam sorbeant. Radicem





891

CHAMAELEON  
ALBUS.

Ebermurtz.



C dicem eius aliqui concisam seruari iubent funiculis pendentē, decoquuntq̃ in cibo contra fluxiones, quas Græci rheumatismos uocant.

## APPENDIX.

Recentiores radicē Cardui suarij drachmæ pondere in uino sumptam cōtra pestilentiae contagia prodesse tradunt. Eandem etiam in aceto decoctam, contra scabiem, impetiginē, & omnes cutis foeditates curatu difficiles conferre scribunt, si eius decocto lauentur. Idem dentium etiam dolori succurrit.

## DE CHAMAELEONE NIGRO

CAP. CCCXXXVIII.

## NOMINA.



Chamæleonis  
gerar dictus.

ΑΜΑΙΛΕΩΝ *μάλας* Græcis, Carduus niger aut Vernilagium Latinis dicitur. Officinis hæc planta incognita existit. Germanis allusione ad latinam nomenclaturam schwarzer Gartendistel uocari potest, quod scilicet in hortis tantum culta proueniat. Sunt qui eam à candore foliorum nominent welsch weiß Distel / sed prior appellatio ad discriminandas plantas melior existit. Chamæleon uerò dictus est à uarietate foliorū, quæ pro terræ & locorū differentia, aut admodū uiridia, aut subalba, aut cærulea, aut rubra inueniuntur. Niger uerò haud dubiè à radice appellari ccepit.

## FORMA.

Folij Scolymo similis est, minora tamen, tenuioraq̃, & rubentia ea habet. Caulē mittit digitali crassitudine, dodrantalem, subrubrū, qui in summo habet umbellam, & spinosos flores tenues, hyacinthi æmulos, uersicolores. Radicē crassam, nigram, densam, & aliquando corrosam, quæ dissecta subflauescit, & cōmanducata mordet. Hæ quidem notæ quanquā plantę, cuius hic picturā damus, ferè omnes uideantur quadrare: caulem enim euehit dodrantalē, & altiorē etiam, digitū equantem crassitudine, subrubrum, folia instar Scolymi, minora, subalba & leniter punicea, candidū ac hispidum florem, hyacinthina purpura uariatū, radicem nigram & subflauam: tamen cum non admodū linguam uellicet cōmanducata radix, sit ut nō parum an legitimus sit Chamæleon niger addubitem. Verū cum multi huius temporis uiri eruditi hanc plantam Chamæleonē nigrum esse credant, nolui hoc tempore ab ijs prorsus dissentire, atque adeo eandem quæ illi, plantæ huic indere appellationem uolui, maximè cum nullam aliam eidem cōuenire apud Dioscoridem descriptionem uideam, donec aliquid certius de ea nobis aut alijs compertum fuerit.

## LOCVS.

Nusquam sua sponte in Germania prouenit, quare cultura indiget. Nascitur autem Chamæleon niger, Dioscoride autore, siccis, campestribus, diuosisq̃, & maritimis locis.

## TEMPVS.

Iulio mense floret, ac subinde in capitulis rotundis Augusto mense semen hispidum profert.

## TEMPERAMENTVM.

Chamæleonis nigri radix sicca est in tertio ordine, calefacit uerò in secundo absoluto.

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Radix trita, additis exiguo atramento sutorio, cedrino oleo, & axungia, scabiem abigere potest. Abstergit etiam impetigines, admixtis sulphure & bitumine. Decoctum eius collutione dentium dolorē mitigat. Cum pari pipere & cæra oblita, dolentibus dentibus auxiliatur. Quinetiā fouentur ea dentes, quū decocta in aceto, & calens imposita fuerit. Scriptorio stylo dolenti denti calida admota, cum frangit. Cum sulphure decolorē ob solē faciē, & albos emendat. Miscetur medicamentis erodentibus. Phagedænas, ferinaq̃ ac tetra ulcera illita, ad mitiorē habitū transferens sanat.

EX GALENO.





CHAMAELEON  
NIGER.

Schwarz Gartendistel.



C

EX GALENO.


Radix quiddam letale obtinet, quamobrem eius foris usus ad scabies, impetigines, alphas, & in summa ad omnia quæ deterfionē postulant. Præterea emollientibus & discutientibus medicamentis miscetur, ac illita phagedænica ulcera sanat.

EX PLINIO.

Radice eius lichenes curantur, cum sulphure & bitumine unâ coctis: cōmanducata uerò dentes mobiles, aut in aceto decocta, Succo scabiem etiam quadrupedum sanant. Et ricinos canum necant.

## DE CHAMÆPITY CAP. CCCXXXIX.

NOMINA.



Ibige.

Iua.

Chamæpitys un-

de dicta.

Abiga quare uo-

cald.

AMAIPTYZ Græcis, Aiuga siue Abiga, autore Plinio, Latinis dicitur. Inuenitur & Ibige uocari, quod nomē, Hermolao teste, ferè seruant homines Illyrici. Hinc abiectis duabus literis i & g, Iba, & ab Aiuga abiectio- ne literarum a & g, Iua manauit in uulgi nomenclationē. Officinæ Iuam cognomento muschatam appellant, Germani ye lenger ye lieber. Ceterū Chamæpitys dicta est, quasi humilis & breuis, humiq; depressa picea: nam eius folia piceam olent. Abiga uerò uocata propter abortus, quos, educendis ijs quæ in utero sunt, excitare solet.

GENERA.

Prima. Tria eius sunt genera. Vna folijs Sedi seu Aizoi, quam nos fœminā fecimus. Al-  
Altera. tera ramis anchoræ modo incuruis, quam nondum uidimus. Tertia mas dicitur  
Tertia. etiam Dioscoridi. Harum discrimina ē descriptionibus certius cognosces.

D

FORMA.

Prima, herba est per terram serpens, subcurua, folia minori Azioo similia ha- bens, multò tamen tenuiora, pinguiora: hoc est, ut Serapion interpretatur, super se plus humiditatis tenacis habentia, & hirsuta, circa ramos frequentia, odore piceæ, flores exiguos, luteos aut candidos, radicem Cichorij. Altera cubitalibus est ra- mis anchoræ modo incuruis, tenuibus, coma supradictæ simili, flore candido, semi- ne nigro. Olet autem & ipsa piceam. Tertia quæ mascula appellatur, herbula est foliolis tenuibus, candidis & hirsutis, caule aspero, candido, flosculis luteis, semine secus alas pusillo, Piceam & hæc olet.

LOCVS.

Sua sponte, quod sciam, in Germania non prouenit. Nunc tamen in hortis plan- tari coepit. Plinius tertiam in petris nasci tradit.

TEMPVS.

Floret Iunio & Iulio mensibus.

TEMPERAMENTVM.

Chamæpitys gustu quidem amarū saporem acri ualidiorem obtinet. Est autem in calefaciendo secundi, in siccando uerò tertij ordinis.

VIRE. EX DIOSCORIDE.

Folia primæ septem diebus in uino pota, regio morbo medentur. Quadraginta uerò ex hydromelite, ischiadicos sanant. Dantur peculiariter iecinorosis, urinæ dif- ficultatibus, & renum uitij. Profunt etiam torminosis. Ea apud Heracleam Pon- ticam, perinde atq; antidoto contra aconitum utuntur, bibentes decoctū. Ad ante- dicta illinitur, cum polenta iure decocti macerata. Trita & cum fico pro pilulis data aluum emollit. Excepta melle, squama aris, & resina, purgat. Apposita ex melle, ex utero ducit. Mammarū duritias discutit. Vulnere glutinat. Vlcera quæ serpunt,

cum





CHAMAEPITYS  
PRIMA.

Yelenger ye lieber weible.





CHAMAEPITYS  
TERTIA.

Yelenger ye lieber mennle.



A cum melle illita cohibet. Secunda & tertia eandem uim obtinent, non tamen usque adeo efficacem.

## EX GALENO.

Effectu expurgat Chamæpitys, abstergitque uiscera plus quam calfacit. Proinde regio morbo correptis, & omnino quibus facile iecur obstruitur, bonum est medicamentum. Quin & menses ducit tum pota, tum apposita cum melle. Sed & urinæ mouendæ aptum est medicamen. Sunt qui etiam eam exhibent ischiadicis decoctâ in melicrato. Herba porro ipsa uiridis magna uulnera conglutinat, & ulcera putrescentia sanat. Mammarum præterea durities discutit.

## EX PLINIO.

Profunt aduersus scorpionû ictus. Item iecinori illitæ cum palmis aut cotoneis. Renibus & uesicæ, decoctû earû cum farina hordeacea. Morbo quoque regio, & urinæ difficultatibus, ex aqua decocta bibunt. Nouissima contra serpentes ualet cum melle. Sic & apposita uulvas purgat. Sanguinē densatum extrahit pota. Sudores facit, perunctis ea. Peculiariter renibus utilis est. Fiunt ex ea & hydropicis pilulæ, cum ficu aluum trahentes. Lumborû quoque dolorē uictoriati pondere in uino finit, & tussim recentē. Mortuos fœtus ex aceto cocta pota, ejicere protinus dicitur.

## APPENDIX.

Recentiores herbarij, & magna officinarû pars, aliam Chamæpityn ostendunt, Officinarium error. folio Saluæ rimoso, angustiore tamen, & ad radicē maiore, flore subcandido ac luteo, & semine nigro: quæ tamē legitima Chamæpitys non est, sed prima potius Sideritidis, ut suo diximus loco, species. Desinant igitur subinde hac herba pro Chamæpity uera uti, ac illius loco has quarum nunc picturas damus usurpent. Erroris autem huius nulla alia fuit causa, quam quod Chamæpitys etiam ueteribus alio nomine dicta sit Sideritis. Hinc plerique decepti eam herbam quæ priuatim ac propriè sic nominatur, pro Chamepity usurpare cœperunt, Sideritis autē nulla alia de causa dicta est Chamæpitys, nisi quod illi uulnera glutinandi insit facultas.

## DE PSYLLIO CAP. CCCXL

## NOMINA.



ΥΑΛΙΟΝ græcè, herba Pulicaris latinè, nomen græcum in officinis retinet, germanicè Psilientraut nominatur. Tam græcam autem quam latinam appellationē à pulice, cuius effigiē semen eius Psyllium unde dictum. refert, sortita est herba. Vel, ut nonnullis uidetur, quia si uiridis in domum feratur, generari in ea pulices prohibeat.

## FORMA.

Psyllion folia Coronopo similia habet, hirsuta, longiora, ramos dodrantaes. Tota herba ad fœni graminisue formam accedit. Coma eius à medio caule incipit, capitula bina aut terna in summo contracta conuolutaue, in quibus semen pulicibus simile, nigrum durumque.

## LOCVS.

In aruis & incultis nascitur. Nusquam tamen, quod sciam, in Germania nisi satum prouenit.

## TEMPVS.

Flores tota ferè æstate ex capitulis eius, quæ spicæ formam obtinent, erumpentes dependent, canino capiti haud dissimiles, ut pictura abundè monstrat. Semen uero autumnoprofert.

## TEMPERAMENTVM.

Semen eius ex secundo refrigerantium est ordine, in desiccando uerò & humectando medium quodammodo & symmetrum. Cōmentum Mesues de substantia Mesues cōmentum. eius interiore calida nihil moror.

## VIREs.





PSYLLIVM

Psyllienkraut.



A

## VIRES. EX DIOSCORIDE.

Vis Psyllio refrigeratoria. Cum rosaceo, aceto, aut aqua illitum articulorū doloribus, parotidibus, tuberculis, cedematis, luxatis, capitisq̃ doloribus prodest. Ente rocelis seu intestinorū ramicibus puerorum, & umbilicis prominentibus cum aceto illitum medetur. Oportet autem acetabuli mensura tusum in aquæ heminis duabus madere, & ubi aqua concreuerit illinire: egregiè siquidem refrigerat: deiectum enim in feruentem aquam, calorem eius reprimit. Prodest erysipelatis. Perhibent si uiridis domum importetur, prohibere ne in ea pulices generentur. Tusa cum adipe, sordida & maligna ulcera expurgat. Succus eius cum melle ad aures fluxione tentatas, & uermiculosas conducit.

## EX PLINIO.

Vis ei ad refrigerandū ingens. Semen in usu. Fronti imponitur in dolore & temporibus, ex aceto & rosaceo, aut posca. Ad cætera illinitur acetabuli mensura, sextario aquæ densat ac contrahit. Tunc terere ac crassitudinē illinere oportet cuicunq̃ dolori, & collectioni inflammationiq̃. Tenasmo in aqua cum radicibus decoctum medetur. Omnibus articulorū morbis salutare est huius semen madefactū in aqua, admistis in heminam seminis duobus resinæ colophonig cochlearibus, thuris uno.

## DE PSEVDONARDO CAP. CCCXLI.

## NOMINA.



ΕΥΔΟΝΑΡΔΟΣ græcè & latinè nominatur, quod scilicet non sit uera & genuina Nardus, cuius Dioscorides & alij ueteres meminerunt.

*Pseudonardus  
unde dicta.*

## GENERA.

B

Duū cernitur generum. Alterum procerius est, & maiorem spirat odorem, nec minus quàm Nardus placet. Hoc nos Pseudonardū marem diximus. Officinæ & uulgus herbariorum Spicam à spicatis floribus nominant, Germani *Spica.* *Spicanardi.* Alterum amplitudine & odore minus, quod nos Pseudonardū fœminam appellauimus. Officinæ & herbarij recentiores Lauandulam uel Lauen- *Lauandula.* *dulam,* eò quod balneis & hominum lauacris expetatur, elotaq̃ omnia si permisceatur odoris commendet suauitate, uocant. Germani ad hoc nomen alludentes *La-* *nendel* nuncupant.

## FORMA.

Frutex est folio crassiore, carnoso, angusto, colore languido, in candidum uergente, piloso, frequentibus spicis in aristas sparsis, flosculis in spica ferè cœruleis, in Lauendula autem purpureis.

## LOCVS.

Gaudent apricis & petrosis, tanta suauitatis fragrantia, ut omnes penè flores odoris iucunditate uincant, qua dote uestibus inferuntur.

## TEMPVS.

Vtraque perpetua coma exitu ueris canescit, Iunio & Iulio mense spicatur, floribusq̃ prægnans est.

## TEMPERAMENTVM.

Calefacit & siccatur ordine secundo, tenuibusq̃ constat partibus, haud multum à natura Celticæ Nardi dissidens.

## VIRES.

Antiquus manuscriptus herbarius easdem ferè facultates Pseudonardo, quas Celtica habet, tribuit, dum in hunc modum scribit: Stomachi dolorem frigidum, eiusdem inflationes, uteri dolores, lienis duritiem, iecinorisq̃ obstructions tollit.

fff Strangu-





PSEVDONARDVS  
MAS.

Spicanardi.





PSEVDONARDVS  
FOEMINA.

Lauendel.



**C** Stranguriæ & difficultati urinæ auxiliatur. Capiti admota calefacit, eiusq̃ humiditates exiccat. Hinc est quod recentiores tantisper eius usum in frigidis cerebri & neruorum morbis, apoplexia, paralyfi, & similibus cōmendent.

*Sequentia duo capita, quoniam absoluto fermè opere ad nos uenerunt, & idcirco suo loco reponi non potuerunt, tamen ne lector ijs fraudaretur, in calcem potius reijcere, quàm omnino præterire, collibuit.*

## DE DIGITALI CAP. CCCXLII

### NOMINA.

*Digitalis.*



Vod appellatione tum græca tum latina herba hæc hodie destituta sit, nulla alia de causa factum existimamus, quàm quod ueteribus incognita fuerit. Nos pulchritudine eius illecti, αὐάνθημιν esse diutius non sumus passi. Appellauimus autem Digitalem, alludentes ad germanicam nomenclaturam *Singerhūt*/sic enim Germani hanc stirpem nominant, à florum similitudine, quæ digitale pulchrè referunt ac exprimunt. Hac appellatione utemur, donec nos uel alij meliorem inuenerint.

### GENERA.

*Digitalis purpurea.* Duū est generū. Vna enim purpureos obtinet flores, ideoq̃ Digitalem purpuream appellauimus, Germanis *brauner Singerhūt* dicitur. Altera luteos habet flores, ob id Digitalis lutea dicta nobis est. Germanis *geeler Singerhūt* nominatur. In alijs per omnia similes sunt.

*Digitalis lutea.*

**D**

### FORMA.

Herba est cubitalis, folijs latis & oblongis, Plantagini non dissimilibus, in extremitatibus serratis, floribus à lateribus caulis ordine dependentibus. digitalis formam referentibus, purpureis aut luteis. Quibus decidentibus, semen in calycibus latum & oblongum profert. Radix illi est exigua & capillata.

### LOCVS.

Nascitur in montibus, umbrosis & saxosis locis.

### TEMPVS.

Floret Iulio potissimū mense, atq̃ subinde cadentibus floribus semen producit.

### TEMPERAMENTVM.

Impense amara est herba, perinde atq̃ Gentiana, ut hoc nomine calidā & siccam esse euidentissimum sit.

### VIREs.

Hæc herba haud dubiè quum opus est extenuatione, abstersione, purgatione, & obstructionis liberatione, efficax admodū esse solet. Nam, ut testatur Galenus libro iij. de simp. med. facul. cap. xvij. amari sapes abstergunt, expurgant, & quæ in uenis est crassitiem incidunt. Quamobrè menses etiam quæ amara sunt mouere possunt, & ex thorace & pulmone pus educere. Quid multa? potest hæc herba ferè omnia quæ Gentiana, cuius uires suo in loco inuenient studiosi.



DIGITALIS  
PURPUREA

Brauner Fingerhut.

fff 3







**DIGITALIS**  
 PURPUREA.

Geeler Fingerhut.



A

## NOMINA.



KIMOEIAEZ Græcis, Ocimastrum Latinis dicitur. Officinis inusitatum atque incognitum, Germanis wild Basilg appellatur. Ocimoides uerò Græcis haud alia ratione dictum est, quàm quod Ocimo, suis potissimum folijs simile sit. Ocimastrum autem Latini, quasi syluestre Ocimum appellauerunt. Nam sic ipsum uocare uidetur lib. xx. cap. xiiij. Plinius.

Ocimoides cur dictum.

Ocimastrum. Syluestre Ocimum.

## FORMA.

Folia habet Ocimo similia, ramulos dodrantaes, eosdemq; hirsutos, siliquas Hyoscyamo persimiles, semine nigro plenas, Melanthio seu Nigellæ simili (legendū em̃ in Dioscoride *ioulior*, & non *ioulior*, ut habent aliqua exemplaria) Radix illi est gracilis & inutilis. Ex qua quidem deliniatione omnibus palam sit, stirpem, cuius effigiem atq; picturā damus, esse Ocimastrū: siquidē folia fert Ocimi, ramulos palmares & quadratos (quod Dioscorides omisit) hirsutos, flores purpureos (quos itidē Dioscorides nō explicauit) forma Ocimi floribus similes, qui tamen colore, qui illis candidus est, distant: decidentibus floribus siliquas Hyoscyamo similes, seminis nigri, Melanthio similis, plenas ostendit. Radice etiā nititur tenui & superuacua. His omnibus etiam accedit odor, qui planē Ocimum referre uidetur: ita ut nemo dubitare debeat, quin hæc herba uerum sit Ocimastrū, potissimum cum illi Dioscoridis descriptio sic quadret, ut nulla prorsus nota reclamare uideatur.

Dioscoridis locum emendatum.

## LOCVS.

Nascitur arenosis in locis. Copiose autē iuxta Nirtingam ad Nicerum oppidulū prouenit, ubi id ipsum primū uidi, ac reperi: aliās, quod sciam, mihi nunquā uisum.

## TEMPVS.

Floret in fine Septembris & Octobre mense, atq; simul in siliquis semen profert.

B

## TEMPERAMENTVM.

Ocimastrum, maximē eius semen, est calidæ & siccæ temperaturæ, quod sapor etiam satis ostendit, qui cum modica adstrictione amarus est.

## VIREs. EX DIOSCORIDE.

Semen Ocimastri in uino potum, medetur uiperarū & aliarum serpentiū moribus. Ischiadicis datur cum myrrha & pipere.

## EX GALENO.

Ocimoides quidam philiteriū cognominant. Radix superuacanea est. At semen tenuium partium, & desiccantis citra mordacitatem facultatis est.

## EX PLINIO.

Syluestri Ocimo uis efficacior ad eadem omnia, quæ satiuo. Peculiaris ad uitia quæ uomitionibus crebris cōtrahuntur, Vomiciisq; uulua, contraq; bestiarū morsus radix in uino est efficacissima.

## APPENDIX.

Vel syluestre Plinij Ocimū diuersum est ab Ocimastro, aut in uerbis eiusdē iam productis, error subest. Quum enim Ocimastri radix, Dioscoridis & Galeni testimonio, inutilis sit, non rectē à Plinio dicitur quod eius radix in uino contra bestiarū morsus efficacissima sit: sed hoc potius, Dioscoride teste, semini tribuendum erit. Quare in Plinio legendū, contraq; bestiarū morsus semen in uino est efficacissimū.

Plinij locus emendatur.

Quam sanē lectionem Dioscoridis autoritas abundē confirmat, qui Ocimastri semen cum uino potum, contra uiperarum & aliorum repulium ictus efficax esse tradit.

fff 4





OCIMASTRUM

Wild Basil



PICTORES OPERIS,

Heinricus Küllmaurer.

Albertus Meyer.



SCULPTOR

Vitus Rodolph. Spectle.





EMENDANDA IN COMMENTARIIS  
*de Stirpium historia.*

Pag. 4. uers. 11. legendum, Hypochondrijs, iecinori &c. Ibid. uers. 20. legendum, Eadem potest præstare cum sapa, aut lenticula. Pag. 8. uers. 11. Plin. lib. 21. cap. 21. marem quidem campestre &c. Ibid. uers. 13. eiusdem nomenclaturæ expungendum itaq; cōma post eiusdem. Ibid. uers. 16. quod masculinum appellamus. Pag. 11. uers. 19. Ex Macro. Pag. 14. uers. 39. lege, de Acoro uero affirmare. Pag. 16. uers. 40. tubercula facul-  
tatem obtinet, Pag. 28. uers. 29. tenuis intestini dolores. Pag. 29. uers. 16. ramoium. Pag. 37. uers. ult. acris,  
ut piper, admodum sit. Pag. 43. uers. penult. axungia. Pag. 54. uers. 10. mollibus duntaxat spinis prædita.  
Pag. 79. uers. 22. Tærias, pro Tineas. Pag. 86. uers. 11. ab Aconis. Pag. 93. uers. 9. illira, aduersus. Pag. 98.  
uers. 8. si quis in uilla eam extruxerit. Pag. 126. uers. 27. destituitur. Pag. 128. uers. 34. lege, Cum polenta, &  
expunge dictionem Si. Pag. 135. uers. 46. Ieiuno. Pag. 141. uers. 26. aquæ. Pag. 148. iuxta picturam lege,  
BELLIS MAIOR. Pag. 210. uers. ult. dulcis est quodammodo. Pag. 236. uers. 35. unq; maxime. Pag. 263. iux-  
ta picturam, ERUCA SYLVESTRIS. Pag. 264. uers. 19. Kunigundis. Pag. 304. iuxta picturam, SATV-  
RIA SEV THYMBRA SATIVA. Pag. 326. uers. 34. nitatur, adñciendū, radice. Pag. 328. uers. 37. ter-  
rena substantia constat. Pag. 344. uers. 5. *ad pte* enim Græcis &c. Pag. 355. uers. 28. tærias. Pag. 363. uers. 6.  
quæ in thorace sunt educit. Pag. 397. uers. 37. crasisisq; nōnullis. Pag. 440. uers. 28. abundat, que. Pag. 450.  
uers. 25. per integrum retinuit annum amittit &c. Pag. eadem, uers. 38. Sedi etiam ad deñcienda. Pag. 452.  
uers. 1. ad secessum prouocat. Pag. 472. uers. 28. utranq; uero. Pag. 510. uers. 14. floreat. Pag. 529. uers. 13. aut  
cum lini, &c. Pag. 672. uers. 9. esset discrimen.









BIBLIOTECA NAZ.  
ROMA  
VITTORIO EMANUELE





























BIBLIOTECA NAZ.  
ROMA  
VINCIGIO EMANUELE











LEGATORIA DI LIBRI  
R. CICCIORICCIO  
Borgo Vittorio, 26  
ROMA



